

微分方程实验二：二次有限元方法求解两点边值问题

15336134 莫凡

2018 年 4 月 11 日

1 实验假设

这次实验是实验一：使用线性有限元求解两点边值问题的改进。使用二次有限元方法求解两点边值问题

$$Lu = -\frac{d}{dx} \left(p \frac{du}{dx} \right) + qu = f \quad x \in (a, b) \quad (1)$$

$$u(a) = 0, u'(b) = 0$$

仍然假设具体问题为书后 P47 中的

$$p = 1, q = \frac{\pi^2}{4}, f = \frac{\pi^2}{2} \sin \frac{\pi}{2} x, a = 0, b = 0 \quad (2)$$

(只是为了测试方便，程序可以在任意问题上运行)

2 理论分析与实验过程

通过 Galerkin 方法推导出二次函数插值的方程组。首先通过拉格朗日插值得到函数 $\varphi_i(x)$ 和 $\varphi_{i.5}(x)$ ，有

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} \left(2 \frac{x_i - x}{h_i} - 1 \right) \left(\frac{x_i - x}{h_i} - 1 \right) & x_{i-1} \leq x < x_i \\ \left(2 \frac{x - x_i}{h_{i+1}} - 1 \right) \left(\frac{x - x_i}{h_{i+1}} - 1 \right) & x_i \leq x \leq x_{i+1} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3)$$

$$\varphi_{i.5}(x) = \begin{cases} 4 \frac{x - x_i}{h_{i+1}} \left(1 - \frac{x - x_i}{h_{i+1}} \right) & x_i \leq x \leq x_{i+1} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4)$$

接下来对他们求导数

$$\varphi'_i(x) = \begin{cases} \frac{3h_i + 4x - 4x_i}{h_i^2} & x_{i-1} \leq x < x_i \\ \frac{-3h_{i+1} + 4x - 4x_i}{h_{i+1}^2} & x_i \leq x \leq x_{i+1} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5)$$


$$\varphi'_{i.5}(x) = \begin{cases} \frac{-3h_{i+1} + 4x - 4x_i}{h_{i+1}^2} & x_i \leq x \leq x_{i+1} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (6)$$

通过 Galerkin 方程可以发现，刚度矩阵是若干个 3×3 的对称矩阵摆在对角线上相加。每个元素可以表示成双线性积分。公式实在是太长了就不打上来了。

最后得到刚度矩阵，由于它显然是一个严格对角占优的大型稀疏矩阵，所以最后使用 Jacobi 方法求出方程的解。具体流程请参见代码及其中简明注释。

3 实验结果

得到了一个效果不是很好的结果，应该是哪里出了一点问题，本着实事求是的原则就这么贴上来，日后再回来仔细修正



在一些很简单的多项式函数上没有问题。

4 实验心得

要时刻注意数组下标加一减一的问题。MATLAB 的函数句柄在判断返回值类型的时候会出现一些问题。要善于利用多种多样的计算工具。讨论有助于交流经验及发现问题。

5 附件

- script.m 运行主脚本

- solve.m 二次元方法程序
- phi_i.m φ_i 函数的实现
- phi_i_5.m $\varphi_{i.5}$ 函数的实现
- dphi_i.m φ_i 函数的导数
- dphi_i_5.m $\varphi_{i.5}$ 函数的导数
- plotans.m 用于展现最终插值结果