

# 数值最优化期末作业

15336134 莫凡

2018 年 1 月 30 日

## 目录

<b>1</b>	<b>Problem 1</b>	<b>2</b>
1.1	问题描述 . . . . .	2
1.2	变量消去法 . . . . .	2
1.3	Lagrange 方法 . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Problem 2</b>	<b>3</b>
2.1	问题描述 . . . . .	3
2.2	起作用集方法 . . . . .	3

# 1 Problem 1

## 1.1 问题描述

求解二次规划问题

$$\begin{aligned} \min f(x) &= (x_1 - 1)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_4 - x_5)^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 - 5 = 0 \\ & x_3 - 2(x_4 + x_5) + 3 = 0 \end{aligned}$$

初始点  $x^{(0)} = (3, 5, -3, 2, -2)^T$  为可行点, 最优解  $x^* = (1, 1, 1, 1, 1)^T$

## 1.2 变量消去法

从等式约束中可以得到

$$\begin{aligned} x_1 &= -x_2 - 3x_4 - 3x_5 + 8 \\ x_3 &= 2x_4 + 2x_5 - 3 \end{aligned}$$

然后代入展开, 可以得到

$$f(x) = 58 - 8x_2 + 2x_2^2 - 54x_4 + 2x_2x_4 + 14x_4^2 - 54x_5 + 2x_2x_5 + 24x_4x_5 + 14x_5^2$$

设

$$t = (x_2, x_4, x_5)^T$$

则  $\varphi(t) = f(x)$  的梯度为

$$g(t) = \begin{bmatrix} -8 + 4t_1 + 2t_2 + 2t_3 \\ -54 + 2t_1 + 28t_2 + 24t_3 \\ -54 + 2t_1 + 24t_2 + 28t_3 \end{bmatrix}$$

Hessian 矩阵

$$G = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 28 & 24 \\ 2 & 24 & 28 \end{bmatrix}$$

计算  $G$  的特征值为  $\{2(14 + \sqrt{146}), 4, 2(14 - \sqrt{146})\}$  均大于 0, 所以  $G$  正定, 问题是严格凸二次规划, 有唯一全局最优解。

由一阶必要条件, 最优解处一定有  $g(t) = 0$ , 解得  $t = (1, 1, 1)^T$ , 代回解得  $x = (1, 1, 1, 1, 1)^T$ , 是唯一全局最优解,  $f(x) = 0$

这个问题太简单了, 所以没有代码。

### 1.3 Lagrange 方法

将二次规划改写为规范形式，

$$G = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}, h = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$$

后面采用零空间方法求解方向

% 原问题

```
G = 2*[1 0 0 0 0; 0 1 -1 0 0; 0 -1 1 0 0; 0 0 0 1 -1; 0 0 0 -1 1];
```

```
h = [-2;0;0;0;0];
```

```
A = [1 0; 1 0; 1 1; 1 -2; 1 -2];
```

```
b = [5;-3];
```

% 对A进行QR分解

```
[Q, R] = qr(A);
```

```
Q1 = Q(1:5, 1:2);
```

```
Q2 = Q(1:5, 3:5);
```

```
R1 = R(1:2, 1:2);
```

```
x0 = [3; 5; -3; 2; -2];
```

```
Z = Q2;
```

```
A_ = Q1 * inv(R1)';
```

```
d = (Z' * G * Z) \ (-Z' * (h + G * x0));
```

```
x = x0 + Z * d;
```

```
disp('x=')
```

```
disp(x);
```

## 2 Problem 2

### 2.1 问题描述

$$\min f(x) = 9 - 8x_1 - 6x_2 - 4x_3 + 2x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$$

$$\begin{aligned} s.t. \quad & 2 - x_1 - x_2 - 2x_3 \geq 0 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3 \end{aligned}$$

初始点  $x^{(0)} = (0.5, 0.5, 0.5)^T$  为可行点，最优解为  $x^* = (\frac{4}{3}, \frac{7}{9}, \frac{4}{9})^T$

## 2.2 起作用集方法

Active-Set( $G, h, x^{(0)}$ )