Esercizi sul lambda calcolo α -conversione, β -riduzione, forme normali, manipolazione sintattica


Tutorato di Fondamenti di Informatica xx/xx/2024

Martin Gibilterra

Università di Catania

github.com/w8floosh

in linkedin.com/in/w8floosh



Effettuare l' α -conversione dei seguenti λ -termini trovando almeno due termini α -convertibili al termine in esame:

- 1. $x(\lambda x.zx)(\lambda yz.zyx)$
- 2. $x(\lambda x.yy)(\lambda z.yz)$
- 3. $(\lambda f.fx(f(\lambda x.gx(fx))))$
- 4. $xy(x(\lambda z.y)(\lambda y.zzy))xy$



Dati i seguenti λ -termini, β -ridurre ciascuno di essi utilizzando la strategia di riduzione call-by-name, descrivendo tutti i passi di β -riduzione in maniera formale evidenziando il β -redex considerato ad ogni passo.

- 1. $(\lambda x.x)((\lambda y.y)(\lambda z.z))$
- 2. $x(\lambda x.yy)(\lambda z.yz)$
- 3. $(\lambda f.fx(f(x)))(\lambda z.zz)$
- 4. $xy(\lambda z.y(\lambda q.zq))xy$
- 5. (λ*abc.a*)(λ*abc.b*)(λ*abc.c*)

Esempio

$$\frac{(\lambda x.x)((\lambda y.y)(\lambda z.z))}{\overset{\beta}{\underset{\beta}{\longrightarrow}}} \ \frac{(\lambda y.y)(\lambda z.z)}{\lambda z.z} \ \ \underset{\lambda y.y[\lambda z.z/y]}{\lambda x.x[(\lambda y.y)(\lambda z.z)/x]}$$

Dati i seguenti λ -termini, β -ridurre ciascuno di essi utilizzando la strategia di riduzione call-by-value, descrivendo tutti i passi di β -riduzione in maniera formale.

- 1. $(\lambda c.ccc)(\lambda f.fc(fc))$
- 2. $(\lambda xy.zzy)(\lambda y.zy)(\lambda y.b(yb))$
- 3. $(\lambda xz.xxz)xy$
- 4. $f(\lambda abf.f(b(a)))(\lambda z.ffbz)$