

数学规划第三次作业

胡家琦 2016012108

汪 圣 2015012087

夏 焱 2016012110

2019 年 12 月 8 日

4.1

(1) 不正确

反例:

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 x_2 = 1 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

取 $x_2 = k, x_1 = \frac{1}{k}, k \in \mathbb{N}$ 知该优化问题最优值为0,但不可达,又当 $x_1 > 0$ 递增时, x_1^2 严格递增($x_1 < 0$ 同理),故知该问题没有局部优解,也没有最优可行解。

(2) 不正确

反例: 同(1)

(3) 正确

此即最优解的定义

(4) 不正确

反例：定义 $f(x) = \begin{cases} -p, & x \in \mathbb{Q}, x = \frac{q}{p}, q, p \in \mathbb{Z} \text{互质}, p > 0; \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$

考虑优化问题：

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{s.t.} & x \in [0, 1] \end{array}$$

则可行解区域有界，但目标值无解。

(5) 正确

由连续函数在紧集上可取到最值即知。

(6) 不正确

反例：

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) = x_1 \\ \text{s.t.} & g_1(x) = x_2 - x_1^3 \leq 0 \\ & g_2(x) = -x_2 \leq 0 \\ & x = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2 \end{array}$$

我们有 $x_2 \geq 0 \Rightarrow x_1^3 \geq x_2 \geq 0$, 所以 $\bar{x} = (0, 0)^T$ 是优化问题的全局最小解。计算 $\nabla f(\bar{x}) = (1, 0)^T$, $\nabla g_1(\bar{x}) = (0, 1)^T$, $\nabla g_2(\bar{x}) = (0, -)^T$, 从而知 $\nabla f(\bar{x}) + \lambda_1 g_1(\bar{x}) + \lambda_2 g_2(\bar{x}) = 0$ 不可能成立, 即 KKT 条件不成立。

4.2

(1) KKT 条件为

$$1 + 2\lambda x_1 = 0$$

$$1 + 2\lambda x_2 = 0$$

$$\lambda \geq 0, \quad g(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, \quad \lambda g(x) = 0$$

$$\text{显然 } \lambda \neq 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = \frac{-1}{2\lambda}, g(x) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{\sqrt{2}}{2}, (x_1, x_2) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\text{此时目标值 } -\sqrt{2}, \text{ 而模型有 } x_1 + x_2 \geq -\sqrt{2(x_1^2 + x_2^2)} = -\sqrt{2}$$

因此上面所求为全局最优解

(2) KKT条件为

$$2x_1 + 2\lambda x_1 + \mu = 0$$

$$1 + 4\lambda x_2 + \mu = 0$$

$$-1 + 2\lambda x_3 + \mu = 0$$

$$\lambda, \mu \geq 0, \quad g_1(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 1 \leq 0, \quad g_2(x) = x_1 + x_2 + x_3 \leq 0, \quad \lambda g_1(x) = 0, \quad \mu g_2(x) = 0$$

$$\lambda = 0 \text{ 显然无解; } \lambda > 0 \text{ 时, } x_1 = -\frac{\mu}{2(1+\lambda)} \leq 0, x_2 = -\frac{\mu+1}{4\lambda} < 0$$

$$\Rightarrow g_2(x) < 0, \text{ 否则 } x_3 > 1, \text{ 与 } g_1(x) \leq 0 \text{ 矛盾! } \Rightarrow \mu = 0$$

$$\text{从而 } x_1 = 0, x_2 = -\frac{1}{4\lambda}, x_3 = \frac{1}{2\lambda} \text{ 代入 } g_1(x) = 0$$

$$\text{解得 } (x_1, x_2, x_3) = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right), (\lambda, \mu) = \left(\frac{\sqrt{6}}{4}, 0\right) \text{ 目标值 } -\frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\text{而模型有 } x_1^2 + x_2^2 - x_3 \geq x_2 - x_3 \geq -\sqrt{(2x_2^2 + x_3^2)\left(\frac{1}{2} + 1\right)} \geq -\sqrt{1 \times \frac{3}{2}} = -\frac{\sqrt{6}}{2}. \text{ 因此上面KKT点为全局最优解。}$$

4.4

(1) 记 $g(x) = f(x) + \frac{1}{2\alpha}(x-y)^T(x-y)$, 则 $g(x)$ 亦为 \mathbb{R}^n 上的二阶连续可微函数, 且有

$$\nabla^2 g(x) = \nabla^2 f(x) + \frac{1}{\alpha} I_n = \frac{1}{\alpha} (I_n + \alpha \nabla^2 f(x))$$

又 $\|\nabla^2 f(x)\|_2 \leq L > 0 \Rightarrow \|\alpha \nabla^2 f(x)\|_2 \leq \alpha L < 1$

于是 $\forall u \in \mathbb{R}^n, u \neq 0$ 有

$$\begin{aligned} & u^T (I_n + \alpha \nabla^2 f(x)) u \\ &= u^T u + \alpha u^T \nabla^2 f(x) u \\ &\geq \|u\|_2^2 - \alpha \|u\|_2 \|\nabla^2 f(x) u\|_2 \\ &\geq \|u\|_2^2 - \alpha \|u\|_2 \|\nabla^2 f(x)\|_2 \|u\|_2 \\ &\geq (1 - \alpha L) \|u\|_2^2 \\ &> 0 \end{aligned}$$

也即有 $I_n + \alpha \nabla^2 f(x)$ 严格正定，于是有 $g(x)$ 为 \mathbb{R}^n 上的严格凸函数。

2 由 z 为问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} g(x) = f(x) + \frac{1}{2\alpha} (x - y)^T (x - y)$$

的一个最优解，于是有 $g(z) \leq g(y)$ ，也即 $f(z) + \frac{1}{2\alpha} (z - y)^T (z - y) \leq f(y) + \frac{1}{2\alpha} (y - y)^T (y - y) = f(y)$ ，于是有 $f(y) - f(z) \geq \frac{1}{2\alpha} (z - y)^T (z - y) \geq 0$

4.5

二次约束二次规划模型为

$$\min x^T Q x + q^T x$$

$$s.t. \quad x_k(x_k - 1) = 0; \quad k = 1, 2, \dots, n$$

直接由书上结论或者下一题结果，得Lagrange对偶模型

$$\max \quad \sigma$$

$$s.t. \quad \begin{pmatrix} -\sigma & \frac{q^T - a^T}{2} \\ \frac{q - a}{2} & Q + \text{diag}\{a_1, \dots, a_n\} \end{pmatrix} \in D$$

$$\sigma \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}^n$$

$\Leftrightarrow U \in S^{n+1}_+$

$$\text{其中 } D = \{U \in S^{n+1} \mid (1, x^T) U \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n\}$$

4.6

对于二次约束二次规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = \frac{1}{2}x^T Q_0 x + (q^0)^T x + c_0 \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) = \frac{1}{2}x^T Q_i x + (q^i)^T x + c_i \leq 0, i = 1, 2, \dots, m \quad (\text{QCQP}) \\ & x \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

其中 $\forall 0 \leq i \leq m, Q_i \in \mathcal{S}^n, q^i \in \mathbb{R}^n, c_i \in \mathbb{R}$ 记可行解区域为

$$\mathcal{F} = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid g_i(x) = \frac{1}{2}x^T Q_i x + (q^i)^T x + c_i \leq 0, i = 1, 2, \dots, m \right\}$$

则原问题的 Lagrange 函数为

$$L(x, \lambda) = \frac{1}{2}x^T \left(Q_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i Q_i \right) x + \left(q^0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i q^i \right)^T x + c_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i c_i, x \in \mathbb{R}^n$$

而将 Lagrange 对偶问题写成矩阵形式为:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sigma \\ \text{s.t.} \quad & \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}^T U \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n \\ & \sigma \in \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{R}_+^m \end{aligned}$$

其中

$$U = \begin{pmatrix} -2(\sigma - c_0 - \sum_{i=1}^m \lambda_i c_i) & (q^0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i q^i)^T \\ q^0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i q^i & Q_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i Q_i \end{pmatrix}$$

进一步可以写为

$$\begin{aligned} \max \quad & \sigma \\ \text{s.t.} \quad & \begin{pmatrix} -2\sigma + 2c_0 + 2\sum_{i=1}^m \lambda_i c_i & (q^0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i q^i)^T \\ q^0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i q^i & Q_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i Q_i \end{pmatrix} \in \mathcal{D}_{\mathcal{F}} \\ & \sigma \in \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{R}_+^m \end{aligned}$$

其中

$$\mathcal{D}_{\mathcal{F}} = \left\{ U \in \mathcal{S}^{n+1} \mid \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}^T U \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n \right\} \quad (\Leftrightarrow U \in \mathcal{S}_+^{n+1})$$

即为所求。

注: 在上面的问题中将 \mathcal{F} 换为任一包含 \mathcal{F} 的区域 \mathcal{G} 便可得到广义 Lagrange 对偶问题。

4.8

令 $L(x, \bar{\lambda}) \triangleq f(x) + \sum_{i=1}^m \bar{\lambda}_i g_i(x)$ 为凸函数, 由题知 $\nabla_x L(\bar{x}, \bar{\lambda}) = 0$, 由 KKT 条件与凸函数的性质知 $f(\bar{x}) = L(\bar{x}, \bar{\lambda}) \leq L(x, \bar{\lambda}), \forall x \in \mathbb{R}^n, \Rightarrow f(x) \geq f(\bar{x}), \forall x \in \mathbb{R}^n$, 故 \bar{x} 为原问题的全局最优解, 又由 $f(\bar{x}) = L(\bar{x}, \bar{\lambda})$ 知 $\bar{\lambda}$ 为对偶问题的最优解.

4.9

令 $\mathcal{X} = \{u \in \mathbb{R}^{n+1} | u_i = a^i \bullet x - b_i, i = 1, \dots, m, u_{m+1} = c \bullet x, x \in \mathcal{K}\}$, $\mathcal{K}_0 = \{u \in \mathbb{R}^{n+1} | u_i \geq 0, i = 1, \dots, m, u_{m+1} \in \mathbb{R}\}$, 则(4.29)等价于下面模型:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(u) \\ \text{s.t.} \quad & u \in \mathcal{X} \cap \mathcal{K}_0 \end{aligned}$$

$f(u)$ 的共轭对偶函数为: $f^*(w) = \max_{u \in \mathcal{X}} \{u^T w - f(u)\} = \max_{x \in \mathcal{K}} \{-\sum_{i=1}^m w_i b_i + [\sum_{i=1}^m w_i a^i + (w_{m+1} - 1)c] \bullet x\}$, 在 $f^*(w) < \infty$ 的条件下, 有

$$[\sum_{i=1}^m w_i a^i + (w_{m+1} - 1)c] \bullet x \leq 0, \forall x \in \mathcal{K}$$

即-

$$\sum_{i=1}^m w_i a^i - (w_{m+1} - 1)c \in \mathcal{K}^*$$

于是共轭函数为

$$f^*(w) = -\sum_{i=1}^m w_i b_i$$

其定义域为 $\mathcal{Y} = \{w \in \mathbb{R}^{m+1} | -\sum_{i=1}^m w_i a^i - (w_{m+1} - 1)c \in \mathcal{K}^*\}$. 又明显有

$$\mathcal{K}_0^* = \{w \in \mathbb{R}^{n+1} | w_i \geq 0, i = 1, \dots, m, w_{m+1} = 0\}$$

$$\mathcal{Y} \cap \mathcal{K}_0^* = \{w \in \mathbb{R}^{n+1} | w_i \geq 0, i = 1, \dots, m, w_{m+1} = 0, -\sum_{i=1}^m w_i a^i + c \in \mathcal{K}^*\}$$

于是共轭对偶问题为:

$$\min_{w \in \mathcal{Y} \cap \mathcal{K}_0^*} f^*(w) = \min_{\{w \in \mathbb{R}^m | w \in \mathcal{K}^*, w_i \geq 0, i=1, \dots, m\}} - \sum_{i=1}^m w_i b_i$$

即:

$$\begin{aligned} \min \quad & f^*(w) = -b^T w \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^m w_i a^i + s = c \\ & s \in \mathcal{K}^*, w \in \mathbb{R}_+^m \end{aligned}$$

令 $y = (w_1, \dots, w_m)^T$, 可写为

$$\begin{aligned} \max \quad & f^*(w) = b^T y \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^m y_i a^i + s = c \\ & s \in \mathcal{K}^*, y \in \mathbb{R}_+^m \end{aligned}$$

此即(4.30)

4.10

(1) 此时对偶问题如下

$$\begin{aligned} \max \quad & 0 \cdot y \\ \text{s.t.} \quad & \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} - y \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ -2 \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{L}^3 \\ & y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

此时容易看出原问题目标值有限, 而对偶问题没有可行解, 无强对偶性。

(2) 由线性锥优化模型理论直接写出对偶模型为:

$$-\max \quad -y_2$$

$$s.t. \quad y_1 + y_3 - y_4 + y_5 = 0$$

$$y_2 + y_4 = -1$$

$$y_1 + s_1 = 0$$

$$y_2 + s_2 = 0$$

$$y_3 + s_3 = 0$$

$$y_4 + s_4 = 0$$

$$y_5 + s_5 = 0$$

$$y \in \mathbb{R}^5, s \in \mathcal{L}^3 \times \mathcal{L}^2$$

令 $z = -y$ 得更简单形式

$$-\max \quad z_2$$

$$s.t. \quad z_1 + z_3 = -(z_5 - z_4)$$

$$z_2 + z_4 = 1$$

$$z \in \mathcal{L}^3 \times \mathcal{L}^2$$

分析原问题有

$$x_3 = -x_1 = x_5, (x_3, x_4, x_5) \in \mathcal{L}^3 \Rightarrow x_4 = 0 \Rightarrow x_2 = -1$$

注：定理4.28条件不满足，无法凭理论判断强对偶性。

易验证 $(-1, -1, 1, 0, 1, 0, 1)$ 可行，从而原问题最优值为1

分析对偶问题有 $0 \leq z_1 + z_3 = -(z_5 - z_4) \leq 0 \Rightarrow z_2 = 0 < 1$

因此不具有强对偶性。

(3) 令 $A = I_7$ 表示7阶单位阵, $b = (1, 0, -2, 0, 0, 0, 0)^T$, $c = (0, 0, 0, 2, 0, 0, -5)^T$, $x = (x_1, x_2, x_3, t_1, x_4, x_5, t_2)$, $\mathcal{K} = \mathcal{L}^4 \times \mathcal{L}^3$ 原问题为:

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \geq_{\mathcal{K}} b \\ & x \in \mathbb{R}^7 \end{aligned}$$

从而知对偶模型为

$$\begin{aligned} \min \quad & b^T y = 2y_4 - 5y_7 \\ \text{s.t.} \quad & y = c \\ & y \in \mathcal{K}^* = \mathcal{K} \end{aligned}$$

注意到原问题的 t_2 可任意大, 即知原问题无界, 令 $x_0 = (0, 1, 0, 100, 1, 1, 100)^T$, 则 $Ax_0 >_{\mathcal{K}} 0$, 即知对偶问题没有可行解. 无强对偶性.

(4) 由线性锥优化模型理论直接写出对偶模型为:

$$\min \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \bullet X$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \bullet X = 1$$

$$X \in S_+^2$$

易知 $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \in S_{++}^2$ 可行, 且显然有下界1;

由定理4.28知具有强对偶性。

(5) 对偶模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & y \\ \text{s.t.} \quad & y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & s \in S_+^2, y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

注意到原问题有可行解 $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \in S_+^2$ 则知强对偶性成立. 此时

由 $y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, s \in S_+^2$ 知对偶问题的最优解为 $\bar{y} = 1$.

(6) 对偶模型为:

$$\begin{aligned} \max \quad & -2x_{23} \\ \text{s.t.} \quad & x_{22} = 0, x_{11} - 2x_{23} = 1 \\ & X \in S_+^3 \end{aligned}$$

由 $x_{22} = 0, X \in S_+^3$ 得到 $x_{23} = 0$, 从而知对偶问题的最优值为 0. 又由原问题的约束条件可得到: $\begin{pmatrix} -x_2 & 0 & 0 \\ 0 & -x_1 & 1+x_2 \\ 0 & 1+x_2 & 0 \end{pmatrix} \in S_+^3$, 得到 $x_2 = -1$, 从而最优值为 1, 即两问题无强对偶性.

4.11

$$(1) \quad c \bullet x - b^T y = s \bullet x + \sum_{i=1}^m y_i (a^i \bullet x - b_i) \geq s \bullet x \geq 0$$

(2) $c \bullet x^* = b^T y^*$ 满足定理 4.21 条件, 从而定理 4.31 第一条结论成立。

由定理 4.29 直接得到定理 4.31 后面两条结论成立。

4.12

(1) 记

$$\tilde{\mathcal{Y}} = \left\{ \lambda \in \mathbb{R}^m \mid Q_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i Q_i \in \mathcal{S}_{++}^n \right\}$$

则 $\forall \lambda, \eta \in \tilde{\mathcal{Y}}, t \in [0, 1] \Rightarrow Q_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i Q_i \in \mathcal{S}_{++}^n, Q_0 + \sum_{i=1}^m \eta_i Q_i \in \mathcal{S}_{++}^n$ 由 \mathcal{S}_{++}^n 为凸集, 于是有 $Q_0 + \sum_{i=1}^m (t\lambda_i + (1-t)\eta_i)Q_i = t(Q_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i Q_i) + (1-t)(Q_0 + \sum_{i=1}^m \eta_i Q_i) \in \mathcal{S}_{++}^n \Rightarrow t\lambda + (1-t)\eta \in \tilde{\mathcal{Y}} \Rightarrow \tilde{\mathcal{Y}}$ 为凸集, 又 $\mathcal{Y} = \tilde{\mathcal{Y}} \cap \mathbb{R}_{++}^m$, \mathbb{R}_{++}^m 为凸集, 于是有 \mathcal{Y} 为凸集。

另一方面, 由 \mathcal{S}_{++}^n 为开集, 于是 $\forall \lambda \in \mathcal{Y} \Rightarrow Q_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i Q_i \in \mathcal{S}_{++}^n \Rightarrow \exists \varepsilon > 0$, s.t. $Q_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i Q_i + A \in \mathcal{S}_{++}^n, \forall \|A\| < \varepsilon$. 取 $M = \max\{\|Q_i\|; 1 \leq i \leq m\}$ 则 $\forall \|\alpha\| < \varepsilon/mM$ 有 $\|\sum_{i=1}^m \alpha_i Q_i\| \leq \sum_{i=1}^m |\alpha_i| \|Q_i\| < \varepsilon$ 于是有 $Q_0 + \sum_{i=1}^m (\lambda_i + \alpha_i) Q_i = Q_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i Q_i + \sum_{i=1}^m \alpha_i Q_i \in \mathcal{S}_{++}^n \Rightarrow \lambda + \alpha \in \mathcal{Y} \Rightarrow \mathcal{Y}$ 为开集。

于是有 \mathcal{Y} 为开凸集。

(2) 简便起见不妨记: $Q(\lambda) := Q_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i Q_i, q(\lambda) := q_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i q_i$ 则由

$$0 = \frac{\partial}{\partial \lambda_i} I = \frac{\partial}{\partial \lambda_i} (Q(\lambda)^{-1} Q(\lambda)) = \frac{\partial}{\partial \lambda_i} (Q(\lambda)^{-1}) Q(\lambda) + Q(\lambda)^{-1} Q_i$$

有

$$\frac{\partial}{\partial \lambda_i} (Q(\lambda)^{-1}) = -Q(\lambda)^{-1} Q_i Q(\lambda)^{-1}$$

由 \mathcal{Y} 为开凸集。于是对于最优解 $\bar{\lambda}$ 有

$$0 = \frac{\partial}{\partial \lambda_i} P(\bar{\lambda}) = -q_i^T Q(\bar{\lambda})^{-1} q(\bar{\lambda}) + \frac{1}{2} q(\bar{\lambda})^T Q(\bar{\lambda})^{-1} Q_i Q(\bar{\lambda})^{-1} q(\bar{\lambda}) + c_i$$

于是

$$g(\bar{x}) = \frac{1}{2} \bar{x}^T Q_i \bar{x} - q_i^T \bar{x} + c_i = 0$$

考虑

$$L(x, \lambda) = \frac{1}{2} x^T \left(Q_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i Q_i \right) x + \left(q_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i q_i \right)^T x + c_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i c_i$$

则 $L(x, \bar{\lambda})$ 关于 x 为凸函数, 且 $\frac{\partial}{\partial x} L(x, \bar{\lambda}) = 0 \Rightarrow x = \bar{x}$ 于是有 $L(x, \bar{\lambda})$ 在 \bar{x} 处取最小值。于是对 $f(x) = \frac{1}{2}x^T Q_0 x + (q^0)^T x + c_0, g_i(x) = \frac{1}{2}x^T Q_i x + (q^i)^T x + c_i$ 有 $f(\bar{x}) = L(\bar{x}, \bar{\lambda}) \leq L(x, \bar{\lambda}) = f(x) + \sum_{i=1} \bar{\lambda}_i g_i(x) \leq f(x)$, 于是有 \bar{x} 为原 QCQP 问题的全局最优解。

(3) 一个充分条件是 $Q(\bar{\lambda})$ 可逆: 此时 $\bar{\lambda}_i = 0 \Rightarrow 0 = \frac{\partial}{\partial \lambda_i} P(\bar{\lambda}) = g_i(\bar{x}); \bar{\lambda}_i \neq 0 \Rightarrow 0 \geq \frac{\partial}{\partial \lambda_i} P(\bar{\lambda}) = g_i(\bar{x})$ 也即总有 $\bar{\lambda}_i g_i(\bar{x}) = 0$, 同上知此时亦有 $f(\bar{x}) = L(\bar{x}, \bar{\lambda}) \leq L(x, \bar{\lambda}) = f(x) + \sum_{i=1} \bar{\lambda}_i g_i(x) \leq f(x)$, 即有 \bar{x} 为原 QCQP 问题的全局最优解。