

選手プロフィール・シーズン全体像（NotebookLM用 統合ドキュメント）

最終更新: 2026-04-17

1. 選手基本情報

項目	内容
学年	大学4年（ラストイヤー）
専門	長距離（10000m・ハーフ）← 2026年から中距離（800m）より転換
最大心拍数	187 bpm
安静時心拍	約45 bpm
体型	軽量（スピード型）
現在日付	2026年4月17日

2. 自己ベスト一覧

種目	記録	達成時期	VDOT
800m	1'55"39	2025年10月	74.9
1000m	2'35"	不明	—
3000m	9'28"	不明	~62
5000m	16'00"	不明	~62
10000m	34'02"	2024年10月	62.8
ハーフ	75'48"	2025年3月	62.1

VDOT乖離（ギャップ12ポイント）：800m VDOT 74.9 vs 10000m VDOT 62.8。エンジン（速筋）は大きいが有酸素タンクが追いついていない「速さの貯金・有酸素の借金」状態。有酸素ベースを積むほど長距離記録が大きく伸びる構造。

競技歴年表

時期	出来事
中学	1500m 4'30"
高校～浪人（約4.5年間）	陸上ブランク

時期	出来事
大学1年（2023年4月～）	本格再開
2024年3月	ハーフ初出走 76'10"
2024年4月	800m初出走 1'59"30（中距離練習ゼロ）
2024年10月	10000m 34'02"（PB）
2025年3月	ハーフ 75'48"（PB）
2025年5月	400m TT 52"0（向かい風4m/s単独走）、800m 1'55"59
2025年9月	MKディスタンス 10000m 6000mDNF、東海大 10000m 5000mDNF（有酸素限界）
2025年10月	800m 1'55"39 （PB・大学歴代5位）
2026年1月14日	左膝打撲（リバースランジ中） → ポイント練習離脱
2026年2～3月	エリプティカル+スクワット系でクロストレーニング（心肺維持）
2026年4月1日～	フルトレーニング再開。長距離路線へ完全転換

3. 2025年9月のDNF：教訓

日付	大会	DNF地点	崩壊要因
9/21	MKディスタンス	6000m	3:24/km × 4kmで有酸素上限（約13分）に到達
9/28	東海大記録会	5000m	同様のメカニズム

- 「調子が悪かった」ではなく有酸素システムの物理的上限に2回連続でぶつかった。
- 1週間後に同じ場所で同じように崩れたことが証明。
- これが2026年のダブルスレッシュホールドアプローチの根拠。

4. 2026年1月の怪我：経緯と回復

受傷から回復まで

期間	状態	対応
1/14	左膝打撲（リバースランジで誤って強打）	急性炎症
0～2週	急性炎症期	安静
2～6週	組織修復期	エリプティカル+スクワット系
6～10週	リモデリング期	徐々に負荷増加
10週目（4月初旬）	修復完了	走行再開、痛みなし

- 慢性化の原因：打撲後に「試しにジョグ」を繰り返し炎症が再燃 → 代償動作 → 左膝内側二次損傷
- エリプティカルにより心肺ベースを85〜90%維持できたため、4/4から高強度ダブル練習に即移行可能だった
- 現在（4/17）は完全無症状

5. 現在のフィットネス状態（2026年4月15日時点）

CTL/ATL/TSB

指標	値	意味
CTL	47.9	42日蓄積フィットネス
ATL	55.9	7日蓄積疲労
TSB	-8.1	適正な蓄積疲労域（オーバーリーチング段階）

TSS計算式

$$TSS = \text{時間[h]} \times 100 \times ((\text{avg_hr} - 45) / (150 - 45))^2$$
$$\text{REST_HR} = 45 \text{ bpm} / \text{THR_HR} = 150 \text{ bpm (LT2/Z4境界)}$$

4/15練習走（10000mペースラン）データ

項目	値
タイム	37:05（avg 3:43/km）
平均心拍	163 bpm / 最大 171 bpm
前半8000m	3:40.8/km @ HR 162.9
後半2000m	3:49.4/km @ HR 165.6（意図的ペースダウン）
当日条件	大雨・AM LTインターバル実施後・ポイント練習再開8回目

37:05は「あらゆる悪条件が重なった最低値」。フレッシュ・晴天・全力なら現時点で34:20〜34:50相当の走力あり。

フォーム指標（Jan 2025 vs Apr 2026）

指標	Jan 2025	Apr 2026
ピッチ	178 spm	178 spm
歩幅	1.62m	1.55m（−4.3%）
接地時間	207ms	189ms
GCTバランス	—	左52%（高負荷時。受傷側）

6. 心拍ゾーン定義（最大心拍 187bpm）

ゾーン	心拍数	目的	想定ペース
Z1	< 112 bpm	積極的回復（バイク推奨）	—
Z2	112～130 bpm	有酸素基礎・ミトコンドリア密度増加	4:30～5:30/km
Z3（LT1）	131～149 bpm	乳酸取り込み（MCT1増加）	3:35～3:45/km
Z4（LT2）	150～168 bpm	乳酸閾値・ダブルスレッシュホールドPM	3:25～3:30/km
Z5	169+ bpm	VO2max	3:20/km以内

※ダブルスレッシュホールドの「AM」はZ3（HR148以下）、「PM」はZ4（HR168以下）。Z4の超過（3:20/kmより速い）は厳禁。

7. 2026年シーズン目標

区分	目標	期日
最上位目標	全日本インカレ 1500m 出場（3:47.50）	2026年9月5日
通過点①	10000m 34:00切り	5/10（確認）→ 6/7本命
通過点②	10000m 32:30以内	9月後半 部内選考会
通過点③	箱根駅伝予選会 出走	10月

動機: 関東インカレに出場できなかった悔しさを全日本インカレの舞台で晴らす。「箱根予選会出場」を最大目標にした瞬間、そこに上限が固定される。高い志がすべてを引き上げる。

8. フェーズ別トレーニング計画

4月

5月

6月

7月

8月

9月

← Phase 1 →

← Phase 2 →

← Phase 3 →

← P4 →

← Phase 5 →

移行 + 標準突破

ダブルLT蓄積

VO2max + 特異化

1500m本番

10000m仕上げ

Phase 1（4月～5/10）移行期 + 有酸素ベース再構築

テーマ: 着地耐性回復 → ダブルLT本格導入 → 5/10は経過確認レース

週間構造（確定スケジュール）

曜日	AM	PM
月	バイク/エリプティカル 45分（HR120～130）	完全休養
火	イージージョグ 40～50分（HR125～135）	筋力トレーニング

曜日	AM	PM
水	ダブルLT AM: 2000m×3～4本（LT1域・HR148以下）	ダブルLT PM: チームペース走（LT2域・HR168以下）
木	バイク/エリプティカル 45分（HR120～130）	イージージョグ 30分
金	イージージョグ 40分（HR125～135）	ウッドウェイスプリント（神経系刺激）
土	ダブルLT AM: 1000m×6～8本（3:20～3:25/km）	ダブルLT PM: 400m×10～12本（TM）
日	ロングラン 15～20km（HR135～148）	完全休養

4月確定ポイント練習

日付	セッション
4/18（土）	ダブルLT W2: AM 1000m×6～8本 / PM 400m×10～12本
4/22（水）	ダブルLT W3: AM 2000m×3～4本 / PM チームペース走
4/25（土）	VO2maxセッション（最大負荷日）: 3000m+2000m+1000m / PM完全休養
4/29（水）	ダブルLT W4（最終本格ポイント）: AM 1000m×4～5本 / PM 12000m@3:35～3:38/km
5/2（土）	レースシミュレーション: 8000m@3:22～3:24/km
5/10（日）	東海大学記録会 10000m

Phase 2（5/11～6/30）ダブルLT蓄積 + VO2max導入

- ダブルLT継続 → LT2が3:12～3:15/kmへ右方シフト（ブレイクスルーは6月上旬）
- 6月からVO2maxインターバル（800m×4～5本）導入
- ロングラン 15～20km継続（9月の脚もちへの仕込み）

Phase 3（7/1～8月第1週）スピード持久力完成

- スピード持久力（600m×5 / 1:25）導入 → 約4週で急激な余裕度向上
- WTTK記録会（8月第1週）で1500m 3:47.50挑戦

Phase 4（8月第2週～9月後半）10000m仕上げ

- 1500mで引き上げたVO2maxを10000mに統合
- 9/5 全日本インカレ 1500m（最上位目標）
- 9月後半 部内選考会 10000m 32:30

9. 5/10 東海大学記録会 詳細プラン

予測タイム

シナリオ	タイム
中央予想	33:50～34:30
保守	34:30～35:00
楽観	33:20～33:50
sub-34:00確率	55～70%

レースプラン

区間	目標ペース	通過タイム	HR目安
1～3km	3:26/km	10:18	158～168
4～5km	3:24/km	17:18	165～172
6～8km	3:22/km	27:24	172～178
9km	3:20/km	30:44	178～183
10km	3:16/km以内	34:00以内	183～187

なぜ5/10が唯一の記録チャンスか

日程	夜間気温	確率
5/10（夜間17～21℃）	好条件	55～70%
6/7（昨年28.5℃実績）	気温ペナルティ4～5%	～5～10%
6月以降	梅雨・高温	ほぼ0%

5/10出走判断マトリクス（5/2シミュレーション結果別）

5/2後半4000mの結果	5/10判断	予想タイム
3:20～3:22/km	GO・積極的プラン	33:50～34:20
3:22～3:24/km	GO・プラン通り	34:10～34:40
3:24～3:28/km	GO・保守的プランに変更	34:30～35:10
大幅失速 or HR 182超	DNS検討	35:00～

10. 出場予定レーススケジュール

5/10	東海大学長距離（10000m）← 本命・唯一の好条件日
5/16～17	日体大（800m or 1500m 復帰確認）
6/7	東海大学長距離（10000m 経験レース）
6/13～14	日体大（1500m 初出走候補①）
6/27～28	日体大（1500m 初出走候補②）
7/5	早稲田大学競技会（1500m 追加レース・確率+15～20%）

7/25～26	日体大	(1500m Phase 3確認)
8/8	トワイライトゲームス	(1500m WTTK前最終確認)
8月第1週	WTTK記録会	(1500m 3:47.50 挑戦)
9/5	全日本インカレ	(1500m 最上位目標)
9月後半	部内選考会	(10000m 32:30 必達)
10月	箱根予選会	(ハーフマラソン)

月別PB予測（フルタイム合宿スタイル前提）

時期	1500m	5000m	10000m	ハーフ
4月（現状）	～4:10	16:10～16:40	34:30～35:30	—
5/10	—	—	33:50～34:30	—
6月末	3:55～4:02（初出走）	15:30～15:50	32:30～33:10	—
7月	3:47～3:55	15:05～15:25	—	—
8月（WTTK）	3:40～3:49	—	—	—
9月後半	—	—	31:20～32:00	—
10月	—	—	—	69:00～70:30

11. 1500m 3:47.50 達成への分析

スピードリザーブ

種目	記録	400m換算	1500mペースとの差
400m TT	52.0秒（向かい風4m/s・単独走）	52.0秒	+8.6秒/周
600m	84.6秒	56.4秒	+4.2秒/周
800m	1'55"40	57.7秒	+2.9秒/周

→ スピードの器は十分。課題は有酸素ベースのみ。

3:47.50突破確率（現時点）：**45～60%**

確率を上げる戦略:

- 1. 7月に1500m追加レース（+15～20%）
- 2. 5月末からVO2maxインターバル前倒し導入（+5～10%）
- 3. 月1回 200m×5レペティションでスピード維持

12. 練習環境

タイムスケジュール

- 水曜13:00～14:00のみ大学義務。それ以外は全時間陸上に充てられる

- 毎日2部練習可能。昼寝・食事タイミング自由

アクセス（実測）

場所	移動時間
ジム	片道40分（朝7時～22時）
大学トラック	片道1時間（水曜PM・土曜AM）
代々木公園	約15～20分
ジム→トラック直行	約30分

1日に「ジム+トラック」の組み合わせは移動コスト3時間超のため原則禁止。

ジム設備

- **ウッドウェイ（自走式TM）**: 衝撃吸収・殿筋主導・スプリントに最適
- **電動TM**: LT走の強度を正確にコントロール（傾斜設定可能）
- **エリプティカル**: 着地衝撃ゼロ・クロストレーニング・リカバリー代替
- **屋内バイク**: 膝衝撃ゼロ・回復走代替
- **スミスマシン / ダンベル**: 補強トレーニング

ホームケア

- オムロン マイクロカレントパッド（組織修復）
- マッサージガン（筋膜リリース）
- フォームローラー・ストレッチポール

13. HRVプロトコル（毎朝必須）

判定	HRV値	アクション
● GO	65ms以上	予定通り実行
● MODIFY	53～64ms	AMのみ / PMをバイクへ変更
● STOP	53ms未満（または●が3日連続）	ポイント練習全中止

14. 強みと課題の構造

強み

- **絶対的スピード**: 800m 1:55・400m 52秒（スピードリザーブ大）
- 1500m 3:47.50に対してヘッドルーム +7.6秒/周
- **ブランク明けからの急回復歴**: 大学1年から2年で10000m 34:02・800m 1:55台に到達
- **回復環境**: 睡眠確保・学業ストレスなし（フルタイム合宿スタイル）

課題

- **有酸素ベース:** 800m VDOT 74.9 vs 10000m VDOT 62.8（乖離12ポイント）
- **腱のバネ剛性:** 怪我後に歩幅-4.3%（現在回復中）
- **GCTバランス:** 高負荷時に左接地が長い（左52%）

解決策（ダブルスレッシュホールドを選ぶ理由）

2025年9月に有酸素ボトルネックを2回のDNFで実証 → だからこそ有酸素ベース構築（ダブルLT）が正しい処方箋。速さの器（神経筋）はすでにある。あとは有酸素タンクを接続するだけ。

15. 栄養プロトコル

タイミング	内容	目的
朝	ゆで卵×2（+12g） + ホエイプロテイン（+25g）	筋修復資材の朝確保
練習後30分以内	ホエイプロテイン or RTD 200ml	筋線維・ミトコンドリア修復
夜	サラチキ1袋（+28g）	総タンパク質80g/日以上確保
就寝前	カルノパワーDAILY 4粒	アシドーシス耐性・睡眠中の細胞回復

現状のタンパク質は25〜40g/日（不足約80g/日）。ダブルLTの刺激が適応に変換されない最大リスクファクター。

16. 適応タイムライン（参考）

適応	所要時間
ミトコンドリア密度増加	10〜14日
毛細血管新生	2〜3週間
LT2ペース向上（計測可能）	3〜4週間
VO2max向上（体感）	2〜4週間
ロングランの脚もち改善	8〜12週間

4/1再開から4/17時点で16日目。現在は「刺激入力中」の段階。効果はテーパー後（5/3〜）に表面化し、5/10のレースで全量が出る。

17. スピード型アスリートのトレーニング原則

- **イージーデイは原則1部練のみ**（ジョグ2部練禁止）：速筋が低ペースでもグリコーゲンを消耗しやすく、ダブルLTの質を破壊する
- **グレーゾーン（Z3: HR131〜149）を安易に使わない**：翌日のダブルLTに影響

- **有酸素ボリュームを増やしたい場合はバイクまたは水泳で足し算:** 走行距離ではなく乳酸ゾーン内での質が重要
 - **ポイント練習間隔は最低48時間:** スピード型の超回復には48〜72時間必要
-

統合作成: Claude Code / 2026-04-17