

Algorithmen und Datenstrukturen

Vincent Dahmen 6689845 Roberto Seidel 6537468

Rafael Heid 6704828

8. November 2015

3.1

ALGO1 Für den ersten Algorithmus gilt:

Die äußere Schleife wird n mal betreten.

Die inneren beiden Schleifen werden jeweils n mal betreten.

Daraus folgt eine gesamte Laufzeit von $(n * (n + n))$ was in $O(n^2)$ liegt.

ALGO2 Für den zweiten Algorithmus gilt:

Die äußere Schleife wird n mal betreten (Grenze bei $2n$, aber Schritt bei $n+=2$).

Die innere Schleife wird n mal ausgeführt (Schleife wird $2 \cdot n$ mal betreten, geht aber nur bis $\frac{n}{2}$)

Daraus folgt eine gesamte Laufzeit von $(n \cdot (2 \cdot \frac{n}{2})) \in O(n^2)$.

ALGO3 Für den dritten Algorithmus gilt:

Die äußere Schleife wird \sqrt{n} mal betreten, was aus der Äquivalenzumformung von $i \cdot i < n$ folgt.

Die innere Schleife wird $\log_2 n$ mal betreten, was aus der Halbierung von j , das mit n initialisiert wird, bei jeder Iteration folgt.

Daraus folgt eine gesamte Laufzeit von $\sqrt{n} \cdot \log_2 n$.

3.2

3.3

$$T_1(n) := \begin{cases} c_1, & \text{für } n = 1 \\ 8 \cdot T_1(\frac{n}{2}) + d_1 \cdot n^3, & \text{sonst} \end{cases}$$

mit $a = 8$ und $b = 2$ ist $\log_b(a) = 3$ und $f(n) = d_1 \cdot n^3$

Unter Verwendung des 1. Falles des Mastertheorems gilt:

$T(n) \in \Theta(n^{\log_b(a)})$, falls $f(n) \in O(n^{\log_b(a)-\epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$.

Dies gilt hier leider nicht, da für kein $\epsilon > 0$ die Ungleichung $d_1 \cdot n^3 \leq n^{3-\epsilon}$ erfüllt ist, beziehungsweise nur für bestimmte d_1 .

Betrachtung des 2. Falles des Mastertheorems:

Es gilt: $T(n) \in \Theta(n^{\log_b(a)} \cdot \log_2(n))$, falls $f(n) \in \Theta(n^{\log_b(a)})$

Da für $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^{\log_b(a)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_1 \cdot n^3}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_1 \cdot 1}{1} = d_1$ die Beziehung $f(n) \in \Theta(n^{\log_b(a)})$ erfüllt ist. Damit gilt $T_1(n) \in \Theta(n^{\log_b(a)} \cdot \log_2(n))$.

$$T_2(n) := \begin{cases} c_2, & \text{für } n = 1 \\ 5 \cdot T_2(\frac{n}{4}) + d_2 \cdot n^2, & \text{sonst} \end{cases}$$

mit $a = 5$ und $b = 4$ ist $\log_b(a) \approx 1,16$ und $f(n) = d_2 \cdot n^2$

Unter Betrachtung des 3. Falles des Mastertheorems gilt:

$T(n) \in \Theta(f(n))$, falls $f(n) \in \Omega(n^{\log_b(a)+\epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$ und $a \cdot f(\frac{n}{b}) \leq \delta \cdot f(n)$ für ein $\delta < 1$ und große n .

Mit $\epsilon = 0,5$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^{\log_b(a)+\epsilon}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_2 \cdot n^2}{n^{1,16+0,5}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_2 \cdot n^2}{n^{1,66}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_2 \cdot n^{0,34}}{1} = \infty$$

Hiermit ist $f(n) \in \Omega(n^{\log_b(a)+\epsilon})$.

3.4