

MT26 A 16

PROJET : INTERPOLATION

RAPPORT FINAL

ROBIN TRIoux, WILLIAM VEAL PHAN

Introduction

L'interpolation d'une série de points est le processus visant à remplacer un nombre fini de points, donc une représentation discrète d'un phénomène sur un segment donné, par une représentation continue, une fonction d'interpolation, sur ce même segment.

Il existe de nombreuses méthodes d'interpolation, utilisées dans de nombreux domaines scientifiques : en physique, avec de nombreuses applications au traitement de signaux, en statistique, mais aussi, et surtout, en informatique. L'interpolation permet la résolution approchée d'équations, la compression d'information ou encore le lissage de police d'écriture.

Dans le cadre de notre projet, nous nous proposons de suivre les instructions d'un sujet du semestre d'automne 2012. Nous étudierons donc l'interpolation de Lagrange, l'interpolation de l'Hermite, la méthode des moindres carrés polynomiaux et, enfin, l'interpolation trigonométrique.

Ces méthodes d'interpolation seront dans un premier temps implémentées sous forme de fonctions Maxima. Nous considérerons que l'interface de wxMaxima, couplée au présent rapport et à une fonction d'aide, permettront d'utiliser de façon suffisante nos fonctions.

Table des matières

Introduction	2
Table des matières.....	3
1. Méthodes d'interpolation implémentées.....	4
1.1. Interpolation de Lagrange.....	4
1.1.1. Principe général	4
1.1.2. Algorithme.....	4
1.2. Interpolation de l'Hermite	4
1.2.1. Principe général	4
1.2.2. Algorithme.....	4
1.3. Méthode des moindres carrés.....	4
1.3.1. Principe général	4
1.3.2. Algorithme.....	5
1.4. Interpolation trigonométrique.....	6
1.4.1. Principe général	6
1.4.2. Algorithme.....	7
2. Étude et comparaison des méthodes d'interpolation	7
2.1. Listes de points.....	7
2.2. Définition du critère d'erreur.....	8
2.3. Comparaison Lagrange – l'Hermite.....	8
2.4. Fiabilité des moindres carrés polynomiaux	8
Conclusion.....	8

1. Méthodes d'interpolation implémentées

1.1. Interpolation de Lagrange

1.1.1. Principe général

L'interpolation selon Lagrange se propose d'interpoler $n+1$ points (x_0, y_0) , (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) ... (x_n, y_n) avec les x_i distincts deux à deux. On cherchera alors à construire un polynôme

$$L(X) = \sum_{j=0}^n y_j \cdot L_j(X)$$

Avec,

$$\forall i \in \llbracket 0; n \rrbracket; L_i(x_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } j = i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1.1.2. Algorithme

1.2. Interpolation de l'Hermite

1.2.1. Principe général

1.2.2. Algorithme

1.3. Méthode des moindres carrés

1.3.1. Principe général

La méthode des moindres carrés polynomiaux consiste à ajuster une série de points par le polynôme du degré choisi minimisant la somme l'erreur quadratique.

Soit n un entier positif, et $\{(x_i, y_i) \text{ pour } i \in \llbracket 1; n \rrbracket\}$ une série de n points que nous souhaitons ajuster par un polynôme P de degré d :

$$P(X) = \sum_{i=0}^d a_i X^i$$

On se fixe comme condition que P doit minimiser la somme du carré des erreurs, ie.

$$A = (a_0, \dots, a_d) \text{ minimise } \sum_{i=0}^n (y_i - P(x_i))^2$$

On notera la solution

$$\hat{A} = \arg \min_{\hat{A} \in \mathbb{R}^{d+1}} \sum_{i=1}^n (y_i - P(x_i))^2$$

On détermine \hat{A} en posant :

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \text{ et } T = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^d \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^d \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^d \end{pmatrix}$$

Et on peut montrer (la démonstration est possiblement au programme des UV MT25 et MT27) que

$$\hat{A} = (T^T T)^{-1} T^T Y$$

1.3.2. Algorithme

Arguments :

Lx : liste des abscisses des n points, $[x_1, x_2, \dots, x_n]$

Ly : liste des ordonnées des n points, $[y_1, y_2, \dots, y_n]$

d : le degré souhaité du polynôme

Résultat :

P(x) : polynôme d'interpolation minimisant l'erreur quadratique.

Fonction moindresCarres(Lx,Ly,d) : fonction de x
DEBUT

```

    n <- taille(Lx)
    T : matrice n x d+1
    Y : matrice n x 1
    P(x) : fonction de x
    P(x) <- 0
    pour k de 1 a n faire
        Y[k][1] <- Ly[k]
        pour j de 1 a d+1 faire
            T[k][j] <- Lx[k]^(j-1)
        fait
    fait
    A : matrice 1 x d+1
    A <- inverse(transpose(T).T).transpose(T).Y
    pour k de 0 a d faire
        P(x) <- P(x) + A[k] * x^k
    fait
    moindresCarres <- P(x)

```

FIN

1.4. Interpolation trigonométrique

1.4.1. Principe général

L'interpolation trigonométrique consiste à interpoler une série de points, en supposant la fonction f sous-jacente comme étant T -périodique, par un polynôme trigonométrique :

$$\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \sum_{k=-n}^{k=n} c_k e^{ik\frac{2\pi}{T}x} \text{ avec } (c_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ une suite de complexes ou de réels}$$

P peut aussi s'exprimer sous forme réelle

$$\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = a_0 + \sum_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket} (a_k \cos\left(k \frac{2\pi}{T} x\right) + b_k \sin\left(k \frac{2\pi}{T} x\right))$$

Avec,

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx$$

Et pour $k > 0$,

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(k \frac{2\pi}{T} x\right) dx \text{ et } b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(k \frac{2\pi}{T} x\right) dx$$

Les fonctions que nous allons approximer n'étant probablement pas périodique, nous allons poser que T , la période, est égale à notre intervalle d'interpolation.

1.4.2. Algorithme

2. Étude et comparaison des méthodes d'interpolation

2.1. Listes de points

Afin de quantifier la qualité des différentes interpolations, nous avons besoin de pouvoir les tester sur des séries de points. Le sujet propose d'utiliser des distributions régulières, c'est-à-dire une série de points d'abscisses uniformément espacés, et des distributions de Tchebychev, ie.

Soit a et b deux réels ; $a < b$, n un entier et $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$;

$$\text{Dist}_{\text{Régulière}} = \{x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}\}$$

Et

$$\text{Dist}_{\text{Tchebychev}} = \{x_k = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} \cdot \cos((k + \frac{1}{2})\pi \frac{1}{n+1})\}$$

Ces distributions sont obtenues avec les fonctions

reglist : (a,b,n) -> x et **tchebylist** : (a,b,n) -> x

Avec a et b les bornes inférieures et supérieures, n l'indice du dernier point et x une liste d'abscisses.

Les ordonnées sont ensuite obtenues en appliquant la fonction à interpoler à la liste. Sous maxima, en posant u la fonction à interpoler et y la liste des ordonnées, on écrirait :

y : u(x) ;

On choisira une fonction u non polynomiale ou trigonométrique.

2.2. Définition du critère d'erreur

2.3. Comparaison Lagrange – l'Hermite

2.4. Fiabilité des moindres carrés polynomiaux

Conclusion