

Nous résumons la procédure à suivre dans le cas de la méthode du rapport des données de la série à la tendance, obtenue par régression.

	1. Obtenir les données mensuelles couvrant plusieurs années.
	2. Déterminer, par la méthode des moindres carrés, l'équation de régression entre les valeurs y_t de la série (variable dépendante) et les mois observés (variable indépendante). Cette équation est également appelée dans la nomenclature des séries chronologiques « équation du Trend».
Calcul des estimations $\hat{y}_t$	3. Calculer les estimations pour chaque mois à l'aide de l'équation de régression $\hat{y}_t = b_0 + b_1 x_t$ où x_t prend les valeurs 1,2,3, ..., T périodes considérées.
Calcul des coefficients saisonniers spécifiques S_t pour chaque période t : $S_t = y_t / \hat{y}_t$	4. Pour chacune des périodes considérées (ici période mensuelle), on effectue le quotient de la valeur y_t (valeur de la série originale pour la période t) par l'estimation $\hat{y}_t$ obtenue de la droite de régression pour la même période. On obtient un coefficient saisonnier spécifique S_t .
Calcul des coefficients saisonniers spécifiques moyens : $\bar{S}_t = \frac{\sum S_t}{k}$ où k est le nombre d'années couvertes. Calcul des coefficients saisonniers : $\hat{S}_t = \bar{S}_t \frac{1}{\frac{1}{12} \sum \bar{S}_t}$	5. Pour obtenir un seul coefficient saisonnier associé à chaque mois de l'année, on calcul d'abord la moyenne (on utilise également la médiane ou encore une moyenne modifiée en éliminant du calcul les valeurs extrêmes) des coefficients saisonniers spécifiques obtenus en 4. et ceci pour chaque mois des années couvertes. On corrige par la suite ces moyennes de telle sorte que la somme des moyennes des coefficients donne 12. Ceci s'obtient en appliquant le facteur de correction suivant à chaque moyenne : 12/ Somme des moyennes des coefficients spécifiques On obtient alors les coefficients saisonniers mensuels $\hat{S}_t$.
Données désaisonnalisées : $y_t / \hat{S}_t$	6. pour désaisonnaliser la série, on divise chaque valeur y_t par son coefficient saisonnier respectif $\hat{S}_t$.