

NB : (Cocher une seule réponse)

1. La schizophrénie débute le plus souvent :

- A. Avant 10 ans
- B. Entre 15 et 35 ans
- C. Après 50 ans
- D. Exclusivement à l'adolescence

2. Le symptôme le plus spécifique de la schizophrénie est :

- A. Trouble de l'humeur
- B. Dissociation de la pensée
- C. Anxiété généralisée
- D. Amnésie

Dans la schizophrénie, le traitement de fond repose :

- A. Antidépresseurs
- B. Anxiolytiques
- C. Antipsychotiques (neuroleptiques)
- D. Psychothérapie uniquement

Un épisode dépressif caractérisé dure au minimum :

- 1 jour
- 1 semaine
- 2 semaines
- 2 mois

Parmi les symptômes suivants, lequel appartient à la schizophrénie ?

- A. Hallucinations auditives
- B. Inhibition psychomotrice
- C. Pensées intrusives
- D. Somnolence paradoxale

Le traitement de première intention d'un épisode dépressif est :

- A. Benzodiazépines
- B. Antidépresseurs
- C. Régulateurs (lithium, valproate)
- D. Psychothérapie

Un épisode de panique survient :

- A. Généralement la nuit
- B. De façon brutale et imprévisible
- C. Généralement le matin
- D. Généralement l'après-midi

- C. Toujours liée à un traumatisme
- D. Après un effort physique

8. Le trouble anxieux généralisé se définit par :

- A. Anxiété diffuse ≥ 6 mois
- B. Attaques de panique répétées
- C. Phobies spécifiques
- D. Amnésie sélective

9. Le traitement de fond du trouble anxieux généralisé est :

- A. Benzodiazépines au long cours
- B. Antidépresseurs ISRS
- C. Neuroleptiques
- D. Aucun

10. Le delirium tremens survient :

- A. Après intoxication alcoolique
- B. Après sevrage brutal d'alcool
- C. Après consommation de cannabis
- D. Après prise de cocaïne

11. Le traitement du delirium tremens est :

- A. Antidépresseurs
- B. Benzodiazépines + vitamine B1
- C. Neuroleptiques seuls
- D. Abstinence stricte

12. Le craving correspond à :

- A. Symptôme négatif de schizophrénie
- B. Désir irrésistible de consommer
- C. Amnésie antérograde
- D. Compulsion alimentaire

13. La personnalité borderline se caractérise par :

- A. Instabilité affective
- B. Rigidité excessive
- C. Méfiance permanente
- D. Indifférence affective

14. La personnalité paranoïaque se définit par :

- A. Relations sociales riches
- B. Méfiance et idées de persécution
- C. Goût pour l'ordre
- D. Hypersociabilité

15. Les effets secondaires du lithium

- A. Insuffisance rénale et dysthyroïdie
- B. Hypoglycémie
- C. HTA
- D. Dépression respiratoire

16. Les benzodiazépines exposent surtout à

- A. Dépendance et troubles mnésiques
- B. HTA
- C. Hypothyroïdie
- D. Schizophrénie

17. Les ISRS agissent sur

- A. Dopamine
- B. Sérotonine
- C. Noradrénaline
- D. GABA

18. L'autisme infantile débute

- A. Avant 3 ans
- B. Après 10 ans
- C. A l'adolescence
- D. Après 20 ans

19. La triade autistique comprend :

- A. Trouble du langage + relations sociales altérées + intérêts restreints
- B. Hyperactivité + impulsivité + anxiété
- C. Euphorie + insomnie + logorrhée
- D. Mutisme + hallucinations + catatonie

20. Le TDAH associe

- A. Inattention + hyperactivité + impulsivité
- B. Dépression + anxiété
- C. Hallucinations + délire
- D. Crises convulsives

21. Le risque majeur en cas de mélancolie grave :

- A. Violence hétéro-agressive
- B. Suicide
- C. TOC
- D. Confusion

22. Un patient agité en urgence, première mesure :

- A. Contention immédiate
- B. Isolement + sédation adaptée
- C. Hospitalisation obligatoire

23. Appeler la famille

23. La bouffée délirante aiguë évolue souvent vers

- A. Guérison
- B. Démence
- C. Trouble anxieux
- D. Trouble bipolaire

24. La maladie d'Alzheimer débute par

- A. Troubles du langage
- B. Troubles de mémoire épisodique
- C. Troubles moteurs
- D. Hallucinations

25. Le MMSE évalue

- A. Anxiété
- B. Fonctions cognitives
- C. Schizophrénie
- D. Dépression

26. Hallucination la plus fréquente dans Alzheimer

- A. Visuelle
- B. Auditive
- C. Olfactive
- D. Gustative

27. La catatonie est fréquente dans :

- A. Schizophrénie
- B. TAG
- C. Alcoolisme
- D. Trouble bipolaire

28. Les idées de référence appartiennent au registre

- A. Délirant
- B. Anxieux
- C. Amnésique
- D. Dépressif

29. Un patient qui répète les paroles de l'interlocuteur

- A. Palilalie
- B. Écholalie
- C. Logorrhée
- D. Mutisme

30. La clinophilie signifie :

- A. Rester couché
- B. Peur des lieux publics
- C. TOC
- D. Délire hypochondriaque