

RATTRAPAGE DE LA QUATRIEME UEI : APPAREIL ENDOCRINIEN ET DE LA REPRODUCTION
DEUXIEME ANNEE MEDECINE
BLIDA LE 24 JUIN 2026

Anatomie

Q1/ L'appareil génital féminin : (la réponse juste)

- A. L'utérus est un muscle plein impair et médian
- B. Le pavillon est le segment le plus mobile de la trompe
- C. L'ovaire est entièrement péritonisé
- D. Le vagin est dirigé obliquement en haut et en avant
- E. Le fundus représente l'extrémité supérieure du vagin ✓

~~A (1,3) B (2,3) C (2,4) D (1,2) E (1,4)~~

Q2/ Anatomie de l'appareil génital masculin : (la réponse juste)

- A. La verge est constituée par 3 structures érectiles : 2 corps caverneux ; 1 Corps spongieux.
- B. La situation normale des testicules est extra pelvienne. ✓
- C. Les enveloppes du testicule sont formées par la paroi abdominale qui est refoulée par le testicule. ✓
- D. La vésicule séminale s'étend entre la vessie et le rectum.
- E. Toutes les réponses sont justes.

Q3/ (la réponse juste)

- A. La veine surrénale moyenne se draine à droite, dans la veine rénale.
- B. Le lobe antérieur formé de tissu nerveux et prend le nom d'adéno-hypophyse.
- C. Le lobe antérieur de l'hypophyse est plus petit que le lobe postérieur
- D. La glande mammaire est une glande, endocrine tubulo-alvéolaire ✓
- E. Les surrénales sont situées dans l'espace rétro péritonéal de l'abdomen de part et d'autre de D12. ✓

Q4/ Concernant les rapports anatomiques et la vascularisation de la thyroïde : (la réponse fausse)

- A. La thyroïde est une glande endocrine impaire médiane située en avant du larynx et de la trachée, en regard des vertèbres C5 à C7. ✓
- B. Le ligament médian de Gruber fixe la face postérieure de l'isthme thyroïdien à la face antérieure de la trachée.
- C. Le nerf laryngé inférieur (récurrent) est un rapport postérieur direct du lobe thyroïdien, situé dans l'angle trachéo-œsophagien à gauche et sur le bord latéral droit de l'œsophage à droite.
- D. L'artère thyroïdienne supérieure naît de l'artère subclavière et donne une branche postérieure qui s'anastomose avec la thyroïdienne inférieure.
- E. Une paralysie récurrentielle après atteinte du nerf laryngé inférieur entraîne principalement une dysphonie.

Q5/ Concernant les lobes thyroïdiens: (la réponse juste)

- 1. Leur face latérale est en rapport avec l'axe aérodigestif
- 2. Leur face postérieure est en rapport avec les glandes parathyroïdes et le paquet vasculo-nerveux cervical.
- 3. Le pôle inférieur est en rapport avec les vaisseaux thyroïdiens supérieurs.
- 4. Le pôle inférieur est en rapport avec le nerf laryngé supérieur.
- 5. L'isthme mesure environ 1 cm de largeur et 1,5 cm de hauteur.

A (1,2) B (1,3) C (2,3) D (3,4) E (2,5)

6. Concernant le développement embryologique de l'hypophyse :

1. Le diverticule de Rathke est d'origine neuroectoblastique
2. Le processus infundibulaire dérive du plancher du diencephale
3. Le canal pharyngo-hypophysaire persiste normalement chez l'adulte ✓
4. Le lobe intermédiaire dérive du feuillet postérieur de la poche de Rathke
5. Les pituicytes se différencient dans l'adénohypophyse

A(1,2) B(1,2,3) C(1,2,4) D(2,4) E(1,2,4,5)

7. Concernant le plexus porte hypophysaire et le tractus hypothalamo-hypophysaire :

1. Les veines portes longues drainent le plexus primaire supérieur vers l'adénohypophyse
2. Les facteurs hypophysiotropes parviennent à l'adénohypophyse par voie nerveuse directe
3. L'artère trabéculaire participe à la formation du plexus secondaire
4. Le tractus supra-optico-hypophysaire se termine dans l'éminence médiane externe
5. Le plexus porte secondaire est drainé par des veines efférentes vers les sinus de la dure-mère

A(1,2) B(1,3,5) C(2,4) D(2,3,4) E(1,5)

8. Parmi les propositions suivantes concernant la cytophysiologie du thyrocyte :

1. La prethyroglobuline est synthétisée dans l'appareil de Golgi ✗
2. La fixation de l'iode sur la prethyroglobuline se fait dans la région apicale de la cellule ✓
3. La colloïde est phagocytée par des pseudopodes basaux
4. La thyroglobuline est dégradée par des protéases lysosomiales ✓
5. La T3 et la T4 sont stockées intracellulaires avant sécrétion ✓

A(1,2) B(1,3) C(2,4) D(2,3,4) E(2,4,5)

9. À propos de la structure histologique des glandes parathyroïdes :

1. Les cellules oxyphiles sont la source principale de la parathormone
2. Les cellules principales claires sont responsables de la sécrétion de PTH ✓
3. Les cellules oxyphiles sont les cellules fondamentales à l'origine de tous les types cellulaires
4. L'architecture est folliculaire comme la thyroïde
5. Le parenchyme est organisé en cordons anastomosés ✓

A. (1,2,3) B(2,3,4) C(3,5) D(2,5) E(2,3)

10. Concernant la vascularisation de la glande surrénale :

1. Le sang du réseau capillaire cortical contribue à l'irrigation de la médullaire
2. Des artérioles longues issues du réseau sous-capsulaire traversent la corticale sans se diviser pour atteindre la médullaire ✓
3. La médullaire est exclusivement irriguée par les artérioles longues sous-capsulaires ✓
4. Le sang du réseau médullaire se déverse dans de larges veines rejoignant la grande veine surrénale
5. Le réseau capillaire sous-capsulaire est la source unique d'irrigation de la médullaire

A(1,2,4) B(3,4,5) C(1,3,5) D(1,2,3) E(1,2,5)

11. Concernant le cycle de l'endomètre :

1. La phase de prolifération s'étend du 1er au 4e jour du cycle
2. L'aspect en dent de scie des glandes est caractéristique de la phase sécrétoire ✓
3. Les cellules prédéciduales apparaissent dans le chorion en phase sécrétoire
4. La couche fonctionnelle est éliminée lors des règles, la couche basale reste intacte
5. Les artérioles spiralées sont caractéristiques du myomètre ✓

A(1,3,5) B(2,3,4) C(1,2,3) D(3,4,5) E(2,3,4,5)

12. À propos des cellules de Sertoli :

1. Elles sécrètent la testostérone
2. Elles constituent la barrière hémato-testiculaire
3. Elles sécrètent l'inhibine qui régule la TSH
4. Elles phagocytent les corps résiduels issus de la spermiogenèse

5. Elles se multiplient activement tout au long de la vie
A(2,3,4) B(1,3,5) C(2,4) D(1,2,4) E(2,3,4,5)

13. Concernant la structure histologique de la prostate :

1. Les glandes sont tubulo-alvéolaires disposées en 3 plans concentriques autour de l'urètre ✓
2. Le sable prostatique apparaît dès la naissance ✓
3. Le stroma prostatique est riche en fibres musculaires lisses ✓
4. Les glandes périphériques s'abouchent à l'urètre par des canaux courts ✓
5. Le liquide prostatique représente environ 25% du volume du sperme
A(1,3,5) B(2,4,5) C(1,3,4,5) D(1,2,3,4) E(3,4,5)

14. Les vésicules séminales sont caractérisées par :

1. Une sécrétion représentant environ 70 à 80% du volume de l'éjaculat
2. Un épithélium pseudostratifié cilié ✓
3. Une sécrétion riche en fructose, principale source énergétique des spermatozoïdes ✓
4. Une musculature à disposition plexiforme
5. Une indépendance vis-à-vis des androgènes
A(1,5) B(1,2,3) C(2,3,4) D(1,3,4) E(3,4,5)

Physiologie :

15. L'hormone antidiurétique (ADH) :

- A/est synthétisée par l'hypophyse postérieure D/est une hormone hydrophobe
B/ est sécrétée en réponse à l'hypovolémie ✓ E/ toutes les propositions sont justes
C/ agit au niveau proximal du néphron ✓

16. L'hypofonctionnement endocrinien au cours d'une atteinte primaire, répond aux propositions suivantes :

- 1/ le taux de l'hormone effectrice est bas 4/ le test à l'hormone est négatif ✓
2/ le taux de la stimuline est élevé ✗ 5/ le test à la stimuline est négatif ✗
3/ le taux de la RH est bas

A/ 1, 2, 3 B/ 1, 2, 4 C/ 2, 4, 5 D/ 1, 2, 5 E/ 2, 3, 4

17. La synthèse des hormones thyroïdiennes nécessite la réunion des critères suivants :

- A/ un transporteur d'iode au pôle apical de type NIS
B/ la présence d'une protéine d'origine thyroïdienne « la thyroglobuline »
C/ la présence d'un équipement enzymatique « la thyroperoxydase »
D/ la disponibilité de la TSH
E/ toutes ces propositions sont justes ✓

18. Quel transporteur de glucose est principalement présent dans le tissu adipeux ?

A/ GLUT1 B/ GLUT2 C/ GLUT3 D/ GLUT4 E/ SGLT1

19. En période post absorptive, la sécrétion d'insuline est :

- A/ En un seul pic tardif. D/ Indépendante du calcium.
B/ Continue et pulsatile. E/ Aucune proposition n'est juste.
C/ Biphase. ✓

20. Concernant le métabolisme des protéines, le principal site de production de l'urée est :

A/ Le muscle B/ L'intestin C/ Le rein D/ Le foie E/ Le tissu adipeux

BIOCHIMIE :

21. Comment les hormones stéroïdes agissent-elles dans l'organisme ?

- A. En se liant à des récepteurs de surface cellulaire
B. En pénétrant directement dans la cellule et en se liant à des récepteurs intracellulaires
C. En modifiant la structure des membranes cellulaires
D. En stimulant la synthèse de protéines dans le cytoplasme
E. En agissant comme neurotransmetteur

concordance → LH ← FSH ←

22. Une fillette âgée de 5 ans est amenée en consultation pour développement mammaire précoce, apparition de poils pubiens et augmentation de la taille sur les 3 derniers mois. L'examen clinique ne révèle pas d'acné ni de phénomènes de virilisation marquée. Le bilan hormonal montre : Estradiol : élevé, LH : très bas, FSH : bas. Le test de stimulation à la GnRH : pas d'élévation de LH ni de FSH. Une échographie pelvienne met en évidence une masse ovarienne unilatérale de 3 cm, kystique, bien limitée. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Puberté précoce vraie
- B. Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)
- C. Pseudo-puberté précoce d'origine ovarienne
- D. Hirsutisme
- E. Pseudo-puberté précoce causée par les androgènes corticosurrénaux

23. Une jeune femme de 19 ans consulte pour aménorrhée secondaire depuis 8 mois après des cycles auparavant réguliers. Elle ne prend aucun médicament. Le bilan hormonal montre : FSH élevée et estradiol bas. Quelle est l'interprétation la plus probable ?

- A. Grossesse débutante
- B. Hypogonadisme hypogonadotrophique
- C. Insuffisance ovarienne primaire
- D. Aménorrhée hypothalamique fonctionnelle
- E. Hypothyroïdie

24. A propos de l'hypoaldostéronisme secondaire, quelle proposition est exacte ?

- A. Il se manifeste par une hypokaliémie et une acidose métabolique
- B. il peut être dû à une insuffisance hépatique
- C. la mesure de l'activité rénine est utile pour son diagnostic
- D. les propositions B et C sont exactes
- E. Les propositions A, B et C sont exactes

25. La thyroïdite subaiguë : cocher la proposition juste

- 1. Est généralement d'origine virale ou post virale
- 2. C'est une thyrotoxicose douloureuse
- 3. Elle est due à une hyperplasie thyroïdienne
- 4. Elle doit être traitée par des antithyroïdiens de synthèse
- 5. Se caractérise au début de la maladie par une TSH basse et T4 élevée

A-1,2,3,4 B-1,2,3,5 C-2,3,4,5 D-1,2,4,5 E-1,2,5

26. L'utilisation des anticorps anti monoclonaux dirigés contre l'EGFR : CRJ

- A. C'est une voie de thérapie ciblée anticancéreuse
- B. Empêche l'EGF de se fixer sur son récepteur EGFR intracellulaire
- C. Elle est utilisée pour traiter le cancer colorectal
- D. les propositions A, B et C sont exactes.
- E. Les propositions A et C sont exactes

27. le récepteur à activité guanylcyclase est : CRJ

- 1. une protéine intracellulaire
- 2. un canal ionique riche en GTP
- 3. une protéine membranaire avec activité enzymatique intrinsèque
- 4. son activation est à l'origine d'une hypertension
- 5. son activation entraîne les mêmes effets que ceux du monoxyde d'azote (NO) sur la guanylcyclase soluble

A-1,3,4,5 B-2,3,4,5 C-3,4,5 D-1,3,5 E-3,5

28. le déficit en IGF1 peut être observé dans les situations suivantes :

- 1. dénutrition
- 2. insuffisance hépatique
- 3. déficit en GH
- 4. hypothyroïdie
- 5. Acromégalie

A-1,2,3 B-1,2,3,4 C-1,2,3,4,5 D-1,2,4,5 E-2,3,4

29. A propos de l'androstenedione, quelle est la combinaison exacte

- 1-c'est un précurseur des œstrogènes et progestérone
- 2-il est majoritairement synthétisé dans la corticosurrénale chez les 2 sexes
- 3- il peut être transformé en testostérone dans le foie
- 4- sa concentration plasmatique est la même chez les 2 sexes
- 5- sa concentration plasmatique est plus élevée chez l'homme

A-1,2,3 B-1,3,4 C-1,3,5 D-2,3,4 E-2,3,5

30. Quelle combinaison est exacte parmi les suivantes concernant les liposomes ?

- 1. C'est le lieu de synthèse des hormones stéroïdes
- 2. Ils représentent une réserve d'hormones stéroïdes
- 3. Ils sont situés dans le cytoplasme des organes stéroïdes
- 4. C'est une réserve de cholestérol directement utilisable

A-1,2 B-1,3 C-2,3 D-3,4 E-aucune combinaison n'est exacte

Université LAAD DAINAB de RMDs - Faculté de Médecine

RMDs, le Mercredi 24 Juin 2026

Rattrapage de l'Appareil endocrinien et de la reproduction - Deuxième année de Médecine

Nom											
Prénom											
Salle Place						Date de naissance					
Matricule											

Corrigé

Compléter au crayon ou au feutre noir avec un 2B/2B50 ou équivalent. Choisir avec une bonne lisibilité les lettres par : **X** ou **Y**.

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1		X				26	X				X
2					X	27					X
3				X		28		X			
4				X		29				X	
5				X		30					X
6				X							
7				X							
8			X								
9				X							
10	X										
	A	B	C	D	E						
11		X									
12			X								
13	X										
14				X							
15		X									
16				X							
17					X						
18				X							
19		X									
20				X							
	A	B	C	D	E						
21		X									
22			X								
23			X								
24				X							
25					X						