

RATTRAPAGE DE LA DEUXIEME UEI : APPAREIL DIGESTIF
DEUXIEME ANNEE MEDECINE
BLIDA LE 22 JUIN 2026

Anatomie

Cocher la réponse juste pour toutes les questions

Q1/ Les glandes salivaires :

- A. La submandibulaire est la plus volumineuse
- B. Le canal de Stenon est le canal excréteur de la sublinguale
- C. Le canal de Wharton est le canal excréteur de la submandibulaire
- ☒ D. Les glandes labiales sont situées sur la face externes des lèvres
- E. Les glandes palatines sont des glandes majeures

Q2/ Le pharynx :

- ☒ A. A la forme d'une gouttière verticale ouverte en arrière
- B. L'oro-pharynx est situé entre le voile du palais et le bord inférieur de l'épiglotte
- C. Sa muqueuse est rose et régulière
- D. Répond à l'espace maxillo-pharyngien latéralement
- E. Les muscles du pharynx sont au nombre de 6

Q3/ Le duodénum et le pancréas:

- A. Le duodénum est seulement sous- mésocolique
- ☒ B. La muqueuse duodénale est munie de nombreux plis longitudinaux au niveau de la partie supérieure
- C. La tête du pancréas est effilée
- D. Le canal de santorini parcourt tout le pancréas selon son grand axe.
- E. L'ampoule de Water s'ouvre dans le bord latéral de D2

Q4/ Le jéjuno-iléon :

- A. Le jéjunum est constitué par des anses allongées verticalement
- B. Le bord libre de l'anse gèle est concave
- ☒ C. Les artères jéjuno-iléales naissent du bord droit de l'artère mésentérique supérieure
- D. Le drainage veineux se fait dans la veine cave inférieure
- E. Son innervation provient du plexus mésentériques supérieur

Q5/ La rate :

- A. Est située au niveau de l'épigastre
- B. N'est pas entièrement péritonisée
- ☒ C. Sa face diaphragmatique répond à la plèvre et poumon gauche
- D. Son bord inférieur est crénelé
- E. Son extrémité supérieure répond à l'angle collique gauche

- A. La jonction pharyngo-oesophagienne, correspond à C6
- B. L'oesophage cervical fait suite au pharynx au niveau du bord supérieur du cricoïde,
- C. L'oesophage thoracique Il s'étend donc de C3 à T1
- D. Le bord droit de l'oesophage déborde la trachée et forme l'angle trachéo-oesophagien dans lequel chemine le nerf récurrent droit.
- E. Le segment Inter azygo-aortique de l'oesophage, répond dorsalement à la vertèbre T3.

7/

- A. La bourse omentale est ouverte à gauche par 2 épiploons.
- ✓ B. Un méso, est une lame péritonéale à 2 feuillets contenant un pédicule vasculo-nerveux.
- C. L'espace rétro-péritonéal, compris entre le péritoine pariétal et la paroi abdominale lombaire contient les gros vaisseaux et les organes génitaux internes.
- D. Etage sus-mésocolique contient une partie minime du duodéno-pancréas, et le colon.
- E. En arrière de l'estomac, la bourse omentale qui communique avec le vestibule par le foramen épiploïque.

Q8/

- A. Le foie est maintenu dans la loge sous-phrénique droite par les veines sus-hépatiques.
- ✓ B. Par l'intermédiaire du diaphragme, le foie répond au thorax au poumon gauche et à la masse cardio-péricardique
- C. Le lobe droit et le lobe gauche du foie sont séparés sur la face diaphragmatique par le ligament falciforme,
- D. Le canal hépatique commun naît dans le parenchyme hépatique.
- E. La face diaphragmatique comporte une seule face, qui est la supérieure .

Q9/

1. La face postérieure du foie présente 2 gouttières verticales, le sillon de la veine cave inférieure et le sillon du ligament veineux
2. Le lobe carré est situé entre les 2 gouttières verticales.
3. L'artère hépatique propre naît directement de la trifurcation du tronc coeliaque
4. Les veines sus-hépatiques : naissent dans le parenchyme hépatique
5. Face supérieure du foie répond à la plèvre droite et au poumon droit

✓ A (1,2,3) B (1,3,4) C (2,4,5) D (1,4,5) E (2,3,4)

Q10/

1. Le territoire correspondant à la branche gauche de la veine porte constitue le lobe gauche du foie.
2. Le secteur paramédian droit comprend le segment V (postérieur) et le segment VIII (antéro—Inférieur).
3. Voies biliaires intra-hépatiques sont intra-parenchymateuses, et aboutissent au niveau du hile à 2 conduits hépatiques droit et gauche
4. Le canal cholédoque est étendu de l'abouchement du cystique jusqu'à sa terminaison dans le duodénum.
5. La vésicule biliaire située à la face inférieure du foie dans la fossette cystique entre le lobe carré à gauche et le lobe droit à droite

(1,2,3) B (2,3,4) ✓ C (1,4,5) D (2,4,5) E (3,4,5)

HISTOLOGIE : (cochez la réponse juste)

11. Les glandes sublinguales se caractérisent par les structures suivantes :
1. La présence de cellules myo-épithéliales ✓
 2. Une prédominance en cellules à mucus ✓
 3. Une prédominance en cellules à séreuses X
 4. La présence de canaux excréteurs ✓
 5. Une absence des cellules à mucus au niveau des acini ✓
- A (1,3,5) B (3,4,5) C (3,4) D (3,5) ✓ E (1,2,4)
12. Concernant la vascularisation sanguine de la paroi gastrique, toutes ces propositions sont justes sauf une laquelle ?
- A. Le sang artériel provient du tronc coeliaque ✓
 - B. Comporte un réseau sous séreux ✓
 - C. Comporte des vaisseaux perforants qui traversent la sous muqueuse ✓
 - D. Comporte un réseau sous muqueux ✓
 - ✓ E. Comporte un réseau intra muqueux X ?
13. L'un des critères suivants permet de reconnaître la cellule bordante de l'estomac :
- A. La présence d'un appareil de Golgi très développé
 - B. La présence d'un réticulum endoplasmique granuleux réduit
 - C. La présence de mitochondries peu nombreuses
 - D. La présence de fines vacuoles cytoplasmiques
 - ✓ E. La présence d'un système canaliculaire intra cytoplasmique à parois garnies de microvillosités.
14. Parmi les éléments suivants, lequel n'appartient pas au stroma de la villosité intestinale :
- A. Fascicules de fibres musculaires lisses
 - ✓ B. Tissu conjonctif glandulaire
 - C. Vaisseaux lymphatiques
 - D. Capillaires sanguins
 - E. Des fibres nerveuses
15. L'appendice se distingue du côlon par :
- A. Villosités longues
 - B. Cryptes beaucoup plus profondes
 - ✓ C. Anneau lymphoïde quasi circulaire
 - D. Absence totale de glandes
 - E. Épithélium stratifié
16. Le système vasculaire fonctionnel du lobule hépatique est :
- ✓ A. Un système vasculaire purement veineux intercalé entre la branche de la veine porte et la veine centrolobulaire
 - B. Un système vasculaire provenant des ramifications de l'artère hépatique
 - C. Un système artério-veineux intercalé entre l'artère hépatique et la veine porte
 - D. Un système vasculaire artériel représenté par le réseau capillaire sinusoïde
 - ✓ E. Un système vasculaire purement veineux intercalé entre la veine hépatique et la veine porte
17. Les canaux biliaires intra hépatiques sont des conduits véhiculant la bile et délimités par :
- A. Un épithélium cylindrique pseudostratifié
 - ✓ B. Un épithélium cubique simple
 - C. Un épithélium endothéliforme dépourvu de membrane basale
 - D. Une simple dépression en gouttière des parois des cellules hépatiques adjacentes.
 - E. Une simple dépression en gouttière des parois des cellules endothéliales adjacentes.
18. Quel canal pancréatique est entouré d'un sphincter musculaire lisse ?
- A. Canal interlobulaire
 - B. Tube intercalaire
 - C. Canal intra-lobulaire
 - D. Canal de Santorini
 - ✓ E. Canal de Wirsung

BIOCHIMIE

19-Quelles sont les caractéristiques des vitamines hydrosolubles ?

- 1- Elles se dissolvent dans l'eau
- 2- Elles peuvent être stockées dans le foie pour une utilisation future.
- 3- Elles sont généralement excrétées par les urines.
- 4- Elles sont sensibles à la chaleur et à la lumière.
- 5- Elles sont principalement trouvées dans les graisses et les huiles.

A-1,2,3,4,5

✓ B-1,2,3,4

C-1,3,4

D-1,4,5

E-3,4,5

20- Quelles sont les fonctions de la vitamine A dans l'organisme ?

- 1- Elle aide à la vision nocturne.
- 2- Elle renforce le système immunitaire.
- 3- Elle favorise la croissance osseuse.
- 4- Elle est impliquée dans la coagulation sanguine.
- 5- Elle joue un rôle dans la santé de la peau.

A-1,2,3,4,5

B-1,2,3,4

✓ C-1,2,3

D-1,2,4

E-1,2,5

21-Quelles sont les principales sources de vitamine D ?

- 1- L'exposition au soleil ✓
- 2- Le poisson gras (comme le saumon) ✓
- 3- Les agrumes
- 4- Les produits laitiers enrichis
- 5- Les légumes verts

A-1,2,3,4

B-1,2,3

C-1,2,4,5

✓ D-1,2,4

E-1,3

22-Quelle affirmation concernant la vitamine D est correcte ?

- A. La vitamine D est uniquement obtenue par l'alimentation. ✗
- B. La vitamine D aide à réguler le calcium dans le corps.
- C. La vitamine D est soluble dans l'eau. ✗
- D. Le corps ne peut pas synthétiser de la vitamine D. ✓
- E. La vitamine D est principalement stockée dans les muscles.

23-Quelle affirmation concernant le fer est correcte ?

- A. Le fer héminique se trouve principalement dans les produits végétaux.
- ✓ B. Le fer est essentiel pour la synthèse de l'hémoglobine et des myoglobines.
- C. Une carence en fer ne peut pas affecter les performances cognitives.
- D. Le fer est exclusivement absorbé dans le côlon.
- E. Les besoins en fer sont identiques chez les hommes et les femmes en âge de procréer.

LA PHYSIOLOGIE

In cas d'atrophie gastrique fundique, il est retrouvé :

- ☐ A/ Une achlorhydrie
- ☒ B/ Une maldigestion des lipides
- ☐ C/ Un déficit en trypsinogène
- ☐ D/ Un trouble de l'absorption de la vitamine C
- ☐ E/ Une maldigestion des glucides

5. Concernant l'activité mécanique péristaltique de l'estomac, quelle est la proposition juste ?

- ☒ A/ Est absente au cours de la période interdigestive.
- ☐ B/ Prend naissance au niveau du fundus gastrique.
- ☐ C/ Est indépendante du rythme électrique de base.
- ☐ D/ Sa fréquence est déterminée par celle des potentiels à plateau.
- ☒ E/ Sa puissance est proportionnelle à la fréquence des ondes lentes de dépolarisation.

26. Concernant la bile : cocher la réponse fausse

- ☐ A. Elle est l'excrétion exocrine du foie.
- ☐ B. Son rôle principal est de favoriser l'absorption des graisses.
- ☐ C. Les sels biliaires sont synthétisés à partir du cholestérol.
- ☐ D. Les sels biliaires favorisent l'émulsification des lipides.
- ☒ E. La bile est sécrétée uniquement pendant les repas.

27. Concernant la vésicule biliaire : cocher la réponse fausse

- ☐ A. Son remplissage dépend de la résistance du sphincter d'Oddi.
- ☐ B. La bile vésiculaire est plus concentrée que la bile hépatique.
- ☒ C. La CCK stimule sa contraction.
- ☒ D. Le parasympathique favorise sa contraction.
- ☐ E. Le sympathique stimule la contraction vésiculaire.

28. Concernant le suc pancréatique : cocher la réponse fausse

- ☐ A. Il est globalement isotonique au plasma.
- ☐ B. La sécrétine stimule surtout la sécrétion d'eau et de bicarbonates.
- ☐ C. La CCK stimule principalement la sécrétion enzymatique.
- ☒ D. Le trypsinogène est sécrété sous forme active.
- ☐ E. L'entérokinase active le trypsinogène en trypsine.

29. L'absorption de la vitamine B12 nécessite :

- ☐ A/ Le suc pancréatique
- ☐ B/ L'acide chlorhydrique
- ☒ C/ Le facteur intrinsèque
- ☐ D/ Le trypsinogène
- ☐ E/ La CCK

30. L'enzyme responsable de l'activation des protéases pancréatiques est :

- ☐ A/ La sécrétine
- ☒ B/ La trypsine
- ☐ C/ L'entérokinase
- ☒ D/ La pepsine
- ☐ E/ La gastrine

Les bords contiennent de petits carrés noirs pour la lecture automatique. Ne pas raturer !

Université SAAD DAHLAB de Bida - Faculté de Médecine

Bilda, le Lundi 22 Juin 2026

Rattrapage de l'UE1 02 Appareil digestif- Deuxième année de Médecine

Nom:[illegible]

Prénom:

[illegible]**Salle/Place**

										/					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Date de naissance

		/		/				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

Matricule

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (**✱** ou **✴**)

A B C D E

1. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

2. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

3. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

4. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

5. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

6. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

7. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

8. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

9. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

10. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

A B C D E

11. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

12. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

13 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

14. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

15. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

16. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

17. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

18 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

19 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

20 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

A B C D E

21. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

22 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

23 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

24 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

25 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

28. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

27. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

28. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

29. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

30. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Corrigé typ