




<http://al9ahira.com/>



Itinéraire d'accès à Al9ahira (point B sur la carte) en partant de la Place Ibéria





**ROYAUME DU MAROC**

**المملكة المغربية**

Ministère de l'Enseignement Supérieur,  
de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique

Présidence du Concours National Commun 2015  
**École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique**



**CONCOURS NATIONAL COMMUN**

d'Admission dans les Établissements de Formation

d'Ingénieurs et Établissements Assimilés

Édition 2015

**ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES I**

Filière **PSI**

Durée **4** heures

Cette épreuve comporte 4 pages au format A4, en plus de cette page de garde  
L'usage de la calculatrice est interdit

L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière PSI,  
comporte 4 pages.

L'usage de tout matériel électronique, y compris la calculatrice, est **interdit**.

Les candidats sont informés que la qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies. Il convient en particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Le sujet de cette épreuve est composé de deux problèmes indépendants entre eux.

## Problème 1

### Étude d'une fonction définie par une intégrale

#### 1<sup>ère</sup> Partie

Convergence et calcul de l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$

#### 1.1. Convergence de l'intégrale en question

1.1.1. Montrer que la fonction  $t \mapsto \frac{1 - \cos t}{t^2}$  est intégrable sur l'intervalle  $]0, +\infty[$ .

1.1.2. Montrer que, pour tout couple  $(\varepsilon, a)$  de réels tels que  $0 < \varepsilon < a$ , on a

$$\int_{\varepsilon}^a \frac{\sin t}{t} dt = \frac{1 - \cos a}{a} - \frac{1 - \cos \varepsilon}{\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^a \frac{1 - \cos t}{t^2} dt.$$

1.1.3. En déduire que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$  est convergente.

#### 1.2. Calcul d'une intégrale auxiliaire.

1.2.1. Montrer que, pour tout  $t \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$  et tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kt) = \frac{\sin \frac{2n+1}{2}t}{2 \sin \frac{t}{2}}$ . Que vaut la somme  $\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kt)$  si  $t \in 2\pi\mathbb{Z}$ ?

1.2.2. On prolonge la fonction  $t \mapsto \frac{\sin \frac{2n+1}{2}t}{2 \sin \frac{t}{2}}$  par continuité en 0. Montrer que  $\int_0^{\pi} \frac{\sin \frac{2n+1}{2}t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = \frac{\pi}{2}$ .

1.3. On considère la fonction  $g$  définie sur le segment  $[0, \pi]$  par :  $g(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t = 0; \\ \frac{1}{2 \sin \frac{t}{2}} - \frac{1}{t} & \text{si } 0 < t \leq \pi. \end{cases}$

1.3.1. Montrer que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, \pi]$ .

1.3.2. Montrer que  $\int_0^{\pi} g(t) \sin \frac{2n+1}{2}t dt = \frac{2}{2n+1} \int_0^{\pi} g'(t) \cos \frac{2n+1}{2}t dt$ .

1.3.3. En déduire que  $\int_0^{\pi} g(t) \sin \frac{2n+1}{2}t dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

#### 1.4. Calcul de l'intégrale en question

1.4.1. Montrer que  $\int_0^{\pi} \frac{\sin \frac{2n+1}{2}t}{t} dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$ .

1.4.2. Conclure que  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$ .

**2<sup>ème</sup> Partie****Application à l'étude d'une fonction**

**2.1.** Soit  $x$  un réel non nul.

**2.1.1.** Montrer que la fonction  $t \mapsto \frac{1 - \cos(xt)}{(1+t)^2}$  est intégrable sur l'intervalle  $[0, +\infty[$ .

**2.1.2.** Montrer que, pour tout réel  $a > 0$ ,

$$\int_0^a \frac{\sin(xt)}{1+t} dt = \frac{1 - \cos(xa)}{x(1+a)} + \frac{1}{x} \int_0^a \frac{1 - \cos(xt)}{(1+t)^2} dt.$$

**2.1.3.** En déduire que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{1+t} dt$  est convergente et que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{1+t} dt = \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(xt)}{(1+t)^2} dt.$$

Dans la suite du problème, on pose  $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{1+t} dt$ ,  $x \neq 0$ .

**2.2.** Montrer que la fonction  $f$  est impaire.

**2.3. Étude de  $f$  au voisinage de  $+\infty$**

**2.3.1.** Montrer que, pour tout  $x > 0$ ,  $0 \leq f(x) \leq \frac{2}{x}$  et en déduire la limite de  $f$  en  $+\infty$ .

**2.3.2.** Vérifier que, pour tout  $x > 0$ ,  $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{(1+t)^2} dt$  puis montrer qu'au voisinage de  $+\infty$ , on a  $f(x) = \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ .

**2.4. Sens de variation de  $f$**

**2.4.1.** Montrer que, pour tout  $x > 0$ ,  $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos u}{(x+u)^2} du$ .

**2.4.2.** En déduire que  $f$  est strictement décroissante sur  $]0, +\infty[$  et sur  $] -\infty, 0[$ .

**2.5. Étude de la régularité de  $f$  sur  $]0, +\infty[$**

**2.5.1.** On note  $h$  la fonction définie sur l'intervalle  $]0, +\infty[$  par :  $h(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{(1+t)^3} dt$ .

Justifier la convergence de l'intégrale définissant  $h$  et montrer que  $h$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]0, +\infty[$  puis exprimer sa dérivée sous forme intégrale.

**2.5.2.** Justifier que, pour tout  $(x, y) \in ]0, +\infty[^2$ ,  $|h(x) - h(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$ .

**2.5.3.** Montrer que, pour tout  $x > 0$ ,  $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{(1+t)^3} dt$  et en déduire que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur l'intervalle  $]0, +\infty[$ .

**2.6. Étude de  $f$  à droite en 0**

**2.6.1.** Montrer que, pour tout  $x > 0$ ,  $\frac{\pi}{2} - f(x) = x \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u(x+u)} du$ .

**2.6.2.** Montrer que, pour tout  $x > 0$ ,  $\left| \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u(x+u)} du \right| \leq 1 + \ln(1+x) - \ln x$ .

**2.6.3.** En déduire la limite de  $f$  en  $0^+$  et justifier que, pour tout  $x > 0$ ,  $0 < f(x) < \frac{\pi}{2} = \sup_{t>0} f(t)$ .

**2.6.4.** Montrer que, pour tout  $x > 0$ ,  $0 < \frac{\frac{\pi}{2} - f(x)}{x} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin u}{u(x+u)} du + \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin u}{u(x+u)} du$  puis en

déduire que la fonction  $x \mapsto \frac{\frac{\pi}{2} - f(x)}{x}$  tend vers  $+\infty$  lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ . On pourra justifier et utiliser le fait que, pour tout  $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ,  $\sin t \geq \frac{2}{\pi}t$ .

**2.7.** Donner une interprétation graphique du résultat de la question **2.6.4.** précédente et dessiner l'allure de la courbe représentative de  $f$ .

**2.8.** Montrer que la fonction  $x \mapsto f^2(x)$  est intégrable sur l'intervalle  $]0, +\infty[$ .

## Problème 2

### Étude d'un problème de DIRICHLET

Dans ce problème, le nombre  $d$  est un entier naturel strictement positif. On note  $\|\cdot\|_1$  la norme définie sur  $\mathbb{R}^d$  par  $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^d |x_i|$ , pour tout  $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ . Pour tout  $x \in \mathbb{Z}^d$ , on définit  $V(x)$  le voisinage discret (sous-entendu dans  $\mathbb{Z}^d$ ) de  $x$  par :  $V(x) = \{y \in \mathbb{Z}^d ; \|y - x\|_1 = 1\}$ .

Ce voisinage est l'ensemble des plus proches voisins de  $x$ , il est fini de cardinal  $2d$ .

Si  $A$  est une partie non vide de  $\mathbb{Z}^d$ , on note  $I(A)$  l'ensemble des  $x \in A$  tels que  $V(x) \subset A$  et  $\partial A$  le complémentaire dans  $A$  de  $I(A)$ . On remarquera que pour  $A = \mathbb{Z}^d$  on a  $I(A) = A$  et  $\partial A = \emptyset$ , et pour  $A$  fini de cardinal  $< 2d$ , on a  $I(A) = \emptyset$  et  $\partial A = A$ .

On dit qu'une fonction  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  est harmonique sur  $I(A)$  si, pour tout  $x \in I(A)$ ,

$$f(x) = \frac{1}{2d} \sum_{y \in V(x)} f(y).$$

Toutes les variables aléatoires considérées dans ce problème sont supposées définies sur un même espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  qu'il n'est pas nécessaire d'expliciter.

### 1<sup>ère</sup> Partie

#### Fonctions harmoniques sur le graphe $\mathbb{Z}^d$

Dans les trois premières questions de cette partie, on prend  $d = 1$ .

**3.1.** Montrer qu'une fonction  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$  est harmonique sur  $\mathbb{Z}$  si, et seulement si, quel que soit l'entier relatif  $k$ , on a  $f(k+2) - 2f(k+1) + f(k) = 0$ .

**3.2.** Montrer que l'ensemble des fonctions harmoniques sur  $\mathbb{Z}$  est un espace vectoriel de dimension 2, préciser une base de cet espace.

**3.3.** Montrer que l'ensemble des fonctions  $f : \mathbb{Z}^* \rightarrow \mathbb{R}$ , harmoniques sur  $I(\mathbb{Z}^*)$ , est un espace vectoriel de dimension 4, préciser une base de cet espace. On commencera par déterminer  $I(\mathbb{Z}^*)$ .

Dans la suite de cette partie,  $d$  est un entier strictement positif quelconque.

**3.4.** On considère une fonction  $f : \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{R}$ , positive et harmonique sur  $\mathbb{Z}^d$ .

**3.4.1.** Montrer que, pour tout  $k \in \mathbb{Z}^d$  et tout  $\ell \in V(k)$ ,  $f(\ell) \leq 2d f(k)$ .

**3.4.2.** Montrer que, pour tout  $k \in \mathbb{Z}^d$  et tout  $\ell \in \mathbb{Z}^d$ ,  $f(\ell) \leq (2d)^{\|\ell - k\|_1} f(k)$ .

**3.4.3.** Montrer que si  $k \in \mathbb{Z}^d$  et  $f(k) = 0$ , alors  $f$  est la fonction nulle.

**3.4.4.** Montrer que si  $f$  n'est pas la fonction nulle, alors, pour tout  $\ell \in \mathbb{Z}^d$ ,

$$|\ln(f(\ell)) - \ln(f(k))| \leq \|\ell - k\|_1 \ln(2d).$$

### 2<sup>ème</sup> Partie

#### Problème de DIRICHLET sur le graphe $\mathbb{Z}^2$

Dans cette partie  $d = 2$ . La base canonique de  $\mathbb{R}^2$  est notée  $(e[1], e[2])$ .

On considère une suite de variables aléatoires  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  qui sont mutuellement indépendantes et de même loi, la loi uniforme sur l'ensemble  $D_2 = \{-2, -1, 1, 2\}$ .

On définit une suite de variables aléatoires  $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  en posant

$$Y_0 = (0, 0), \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, Y_{n+1} = \begin{cases} Y_n + e[1] & \text{si } X_n = 1 \\ Y_n - e[1] & \text{si } X_n = -1 \\ Y_n + e[2] & \text{si } X_n = 2 \\ Y_n - e[2] & \text{si } X_n = -2 \end{cases}$$

Noter que chaque  $Y_n$  est un couple de variables aléatoires entières qu'on écrit  $Y_n = (Y_{n,1}, Y_{n,2})$ . La suite  $Y$  est appelée *une marche aléatoire symétrique* sur  $\mathbb{Z}^2$ , issue de  $(0, 0)$ . On modélise ainsi l'évolution d'un point mobile sur  $\mathbb{Z}^2$ , qui à tout instant  $n$  choisit au hasard uniforme un des 4 plus proches voisins de sa position précédente  $Y_{n-1}$ .

Soit  $\nu$  un entier  $\geq 2$ , fixé dans ce qui suit.

**4.1.** Pour tout  $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{Z}^2$  vérifiant  $\|a\|_1 < \nu$  on considère l'événement

$A_{a,\nu}$  : "il existe  $n \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\|a + Y_n\|_1 = \nu$ ."

**4.1.1.** Montrer que cet événement est certain, c'est-à-dire de probabilité égale à 1. On pourra commencer par montrer l'implication suivante :

Si pour tout  $n$ ,  $-\nu < a_1 + Y_{n,1} < \nu$  alors il n'existe pas d'entier  $j$  tel que  $X_j = X_{j+1} = \dots = X_{j+2\nu} = 1$ .

On définit une variable aléatoire réelle  $T_a$  en posant, pour tout aléa  $\omega \in \Omega$ ,

$$T_a(\omega) = \begin{cases} \min\{n \in \mathbb{N}^* ; \|a + Y_n\|_1 = \nu\} & \text{si } \omega \in A_{a,\nu} ; \\ 0 & \text{si } \omega \notin A_{a,\nu}. \end{cases}$$

**4.1.2.** Montrer que, pour tout sous-ensemble  $W$  de  $\mathbb{R}^2$ ,  $P(Y_{T_a} \in W) = \sum_{m=1}^{+\infty} P(Y_m \in W \text{ et } T_a = m)$ .

Pour tout  $m \in \mathbb{N}^*$ , on note  $K_m$  la boule discrète de rayon  $m$ ,  $K_m = \{x \in \mathbb{Z}^2 ; \|x\|_1 \leq m\}$ . On utilisera sans avoir à le prouver les propriétés évidentes  $I(K_m) = K_{m-1}$  et  $\partial K_m = \{x \in \mathbb{Z}^2 ; \|x\|_1 = m\}$ .

**4.2.** Soit  $\varphi$  une fonction de  $\partial K_\nu$  dans  $\mathbb{R}$ . On définit une fonction  $f : K_\nu \rightarrow \mathbb{R}$  en posant :

$$f(a) = \begin{cases} E(\varphi(a + Y_{T_a,\nu})) & \text{si } a \in K_{\nu-1} ; \\ \varphi(a) & \text{si } a \in \partial K_\nu. \end{cases}$$

Il s'agit dans cette section de prouver que  $f$  est harmonique sur  $I(K_\nu)$ .

**4.2.1.** Montrer la relation

$$E(\varphi(a + Y_{T_a})) = \sum_{n \geq 2, z \in \partial K_\nu} \varphi(z) P(T_a = n \text{ et } a + Y_n = z)$$

en justifiant l'existence de la somme et de l'espérance.

**4.2.2.** On suppose  $\|a\|_1 \leq \nu - 2$ . Montrer que, pour tout entier  $n \geq 2$  et tout  $z \in \partial K_\nu$ ,

$$P(T_a = n \text{ et } a + Y_n = z) = \frac{1}{4} \sum_{b \in V(a)} P(T_b = n - 1 \text{ et } b + Y_{n-1} = z).$$

**4.2.3.** On suppose que  $\|a\|_1 \leq \nu - 2$ . Montrer que  $f(a) = \frac{1}{4} \sum_{b \in V(a)} f(b)$ .

**4.2.4.** On suppose que  $\|a\|_1 = \nu - 1$ . Montrer que  $f(a) = \frac{1}{4} \sum_{b \in V(a)} f(b)$ .

**4.2.5.** Conclure.

N.B. : On peut montrer (mais ce n'est pas demandé) que  $f$  est la seule fonction harmonique sur  $K_\nu$  qui coïncide avec  $\varphi$  sur  $\partial K_\nu$ .

FIN DE L'ÉPREUVE

*Rien ne saurait remplacer un livre en papier*

*Des livres de prépas très joliment imprimés  
à des prix très accessibles*

*Al9ahira*

*En 3 clics seulement, on livre, tu étudies*

*en ligne*



*La qualité est notre point fort.*

Vos commentaires sont importants pour nous  
Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter

<mailto:al9ahira@gmail.com>

<http://al9ahira.com/>

Tél : 0539/34 33 20

7, rue Égypte. Tanger