

Chapitre 4 : Dérivabilité d'une fonction à variable réelle

1. Dérivée en un point, fonction dérivée

Définition 1 Soit f une fonction réelle définie sur un intervalle $]a, b[$, et soit $x_0 \in]a, b[$. On dit que f est dérivable en x_0 si le rapport $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ admet une limite dans \mathbb{R} quand $h \rightarrow 0$, ou de manière équivalente, si le rapport $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ admet une limite dans \mathbb{R} quand $x \rightarrow x_0$. Cette limite est notée $f'(x_0)$ (ou aussi $\frac{df}{dx}(x_0)$) et est appelée dérivée (ou parfois aussi nombre dérivé) de f en x_0 . Le rapport $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ est appelé taux d'accroissement de f en x_0 .

Avec les notations de la définition, si M_0 est le point $(x_0, f(x_0))$ du graphe de f , et M le point $(x, f(x))$, le rapport $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ désigne la pente de la droite (M_0M) dans un repère orthonormé. Lorsque f est dérivable en x_0 , ce rapport admet une limite lorsque $x \rightarrow x_0$, et cette limite est la pente de la tangente au graphe de f au point M_0 .

Proposition 2 Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in]a, b[$, alors

$$f \text{ dérivable en } x_0 \implies f \text{ est continue en } x_0$$

Définition 3 On dit que f est dérivable sur $]a, b[$ lorsque f est dérivable en tout point de $]a, b[$. Dans ce cas la fonction $x \rightarrow f'(x)$, définie sur $]a, b[$, est appelée fonction dérivée de f et est notée f' .

2. Dérivées à gauche, à droite

Définition 4 Soit f une fonction réelle définie sur un intervalle $]a, b[$, et soit $x_0 \in]a, b[$.

1. On dit que f est dérivable à droite en x_0 si le rapport

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

existe. Cette limite est notée $f'_d(x_0)$. Nous dirons que f est dérivable sur $]a, b[$ lorsque f est dérivable dans $]a, b[$ et à droite en a .

2. On dit que f est dérivable à gauche en x_0 si le rapport

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

existe. Cette limite est notée $f'_g(x_0)$. Nous dirons que f est dérivable sur $]a, b[$ lorsque f est dérivable dans $]a, b[$ et à gauche en b .

3. Nous dirons que f est dérivable sur $[a, b]$ lorsque f est dérivable dans $]a, b[$ à droite en a et à gauche en b et que $f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.

Proposition 5 Soit $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in]a, b[$. Alors f est dérivable en x_0 si et seulement si f est dérivable à la fois gauche et à droite en x_0 et $f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.

3. Graphe et tangente

1. Soit f une fonction dérivable en $x_0 \in]a, b[$. Dans un repère (O, \vec{i}, \vec{j}) la tangente au graphe de f au point $(x_0, f(x_0))$ a pour équation

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

2. Lorsque les dérivées à gauche et à droite ne sont pas égales, on introduit la notion de demi-tangente. Si f est dérivable à droite (resp. à gauche) en x_0 , la courbe représentative de f admet une demi-tangente à droite (ou à gauche) au point $(x_0, f(x_0))$. Les équations de ces droites sont respectivement :

$$y = f(x_0) + f'_d(x_0)(x - x_0) \quad \text{et} \quad y = f(x_0) + f'_g(x_0)(x - x_0).$$

Si f est continue en x_0 , mais n'est pas dérivable en x_0 , et

$$\text{si } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$$

ou si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty,$$

alors, dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) , le graphe de f en x_0 admet une tangente parallèle à \vec{j} .

4. Règles de calcul

Proposition 6 Soit $I =]a, b[$ un intervalle de \mathbb{R} , $x_0 \in I$, et soient f et g deux fonctions de I dans \mathbb{R} dérivables en x_0 . Alors :

1. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, la fonction λf est dérivable en x_0 et

$$(\lambda f)'(x_0) = \lambda f'(x_0).$$

2. La fonction $f + g$ est dérivable en x_0 et

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0).$$

3. La fonction fg est dérivable en x_0 et

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0).$$

4. Si de plus, $g(x_0) \neq 0$, la fonction f/g est dérivable en x_0 et

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

Proposition 7 (Dérivation des fonctions composées) $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow J \subset \mathbb{R}$, $g : J \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. Si f est dérivable en x_0 et g dérivable en $f(x_0)$ alors $g \circ f$ est dérivable en x_0 et

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

5. Extremum d'une fonction

Définition 8 Soit I un intervalle de \mathbb{R} et f une fonction de I dans \mathbb{R} . Soit $x_0 \in I$.

1. On dit que x_0 est un minimum local de f dans I , s'il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x \in [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha] \cap I, \quad f(x_0) \leq f(x)$$

2. On dit que x_0 est un maximum local de f dans I , s'il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x \in [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha] \cap I, \quad f(x_0) \geq f(x)$$

3. On dit que x_0 est un extremum local de f dans I , s'il est soit un maximum local soit un minimum local de f dans I .

Définition 9 Soit I un intervalle de \mathbb{R} et f une fonction de I dans \mathbb{R} . Soit $x_0 \in I$.

1. On dit que x_0 est un minimum global de f dans I , si

$$\forall x \in I, \quad f(x_0) \leq f(x)$$

2. On dit que x_0 est un maximum global de f dans I , si

$$\forall x \in I, \quad f(x_0) \geq f(x)$$

3. On dit que x_0 est un extremum global de f dans I , s'il est soit un maximum global soit un minimum global de f dans I .

Remarque 10 1. Notons que : L'existence des extremums globaux d'une fonction f continue sur un intervalle fermé borné est garantie par Le théorème de Weierstrass.

2. Une fonction peut avoir plusieurs extremums locaux.

3. La fonction n'est pas nécessairement dérivable, voire même continue, au point où elle admet un extremum. Par exemple, $x \rightarrow |x|$ admet un minimum global en $x_0 = 0$ et n'est pas dérivable en ce point.

Théorème 11 Soit f une fonction de $[a, b]$ dans \mathbb{R} . Si $x_0 \in]a, b[$ est un extremum local de f et si f est dérivable en x_0 , alors $f'(x_0) = 0$.

Démonstration. x_0 est un minimum local de f dans $]a, b[$, ouvert, alors il existe $\alpha > 0$ tel que

$$x \in]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[\subset]a, b[\Rightarrow f(x_0) \leq f(x).$$

Donc,

$$x \in]x_0 - \alpha, x_0[\Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

et

$$x \in]x_0, x_0 + \alpha[\Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

et comme f est dérivable en x_0 alors les dérivés à gauche et à droite existent et sont égales, en passant à la limite, on trouve que $f'_g(x_0) \leq 0$ et $f'_d(x_0) \geq 0$ ce qui prouve le théorème.

6. Théorème de Rolle, théorème des accroissements finis

Théorème 12 (Rolle) Soit f une fonction continue de $[a, b]$ dans \mathbb{R} . Si f est dérivable sur $]a, b[$ et si $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Démonstration. D'après le théorème des bornes atteintes, f admet un minimum et un maximum globaux sur $[a, b]$, notés m et M respectivement. Si $m = M$, alors f est constante sur $[a, b]$, donc f' est nulle sur tout $]a, b[$ et c'est fini. Si $m \neq M$, alors, sachant que $f(a) = f(b)$, l'un au moins de ces deux extrémums est atteint en un point c appartenant à l'intervalle ouvert $]a, b[$. Mais alors, c est un extremum local intérieur à $[a, b]$, donc $f'(c) = 0$. \square

Théorème 13 Soit P un polynôme réel ayant au moins n racines réelles distinctes, avec $n \geq 2$. Alors son polynôme dérivé P' a au moins $n - 1$ racines réelles distinctes.

Démonstration. Soient $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ les racines de P rangées par ordre croissant. On applique le Théorème de Rolle à la fonction P sur chacun des intervalles $[a_1, a_2], \dots, [a_{n-1}, a_n]$, ce qui donne $n - 1$ points distincts en lesquels P' est nul. \square

Théorème 14 (Accroissements finis) Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Démonstration. Soit $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$g(x) = f(x) - f(a) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a)$$

Alors g est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$. De plus $g(a) = 0 = g(b)$. On peut appliquer le théorème de Rolle à la fonction g , il existe donc $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$. Or,

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Par suite,

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

\square

Théorème 15 Soit f est une fonction dérivable sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ alors,

1. $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$ si et seulement si f est constante sur I .
2. $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$ si et seulement si f est croissante sur I .
3. $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$ si et seulement si f est décroissante sur I .
4. Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \overset{\circ}{I}$, alors f est strictement croissante sur I .
5. Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in \overset{\circ}{I}$, alors f est strictement décroissante sur I .

Démonstration.

1. Si f est constante alors f' est nulle sur I . Réciproquement, supposons que f' est nulle sur I , soient $a, b \in I$ avec $a < b$, alors par le théorème des accroissements finis il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c) = 0$$

donc $f(b) = f(a)$, ce qui montre que f est constante.

2. Supposons f croissante, et soit $x_0 \in I$. Alors, pour tout h nous avons,

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$$

(en effet, si $h > 0$ alors $f(x_0 + h) \geq f(x_0)$, et si $h < 0$ alors $f(x_0 + h) \leq f(x_0)$).

On en déduit par passage à la limite que $f'(x_0) \geq 0$. Réciproquement, soient $a, b \in I$ avec $a < b$, alors par le théorème des accroissements finis il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c) \geq 0$$

donc $f(a) \leq f(b)$, ce qui montre que f est croissante. □

Proposition 16 Soit f une application dérivable sur un intervalle $[a, b]$. Si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$, (respectivement $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in [a, b]$) et si f' s'annule en un nombre fini de points de $]a, b[$ alors f est strictement croissante (respectivement strictement décroissante).

Théorème 17 (Dérivation des fonctions réciproques) Soit $I =]a, b[$ et f une fonction réelle dérivable dans I . Si $f'(x) > 0$ (respectivement $f'(x) < 0$) pour tout $x \in I$, alors

1. f admet une limite à droite en a dans $\overline{\mathbb{R}}$ (notée α) et une limite à gauche en $b \in \overline{\mathbb{R}}$ (notée β),

2. f est une bijection de I sur $J =]\alpha, \beta[$ (respectivement sur $J =]\beta, \alpha[$),
3. la bijection réciproque de f , notée f^{-1} , est dérivable sur J et

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'((f^{-1})(y))} \quad \text{avec} \quad y = f(x)$$

En particulier, f^{-1} est strictement croissante (respectivement strictement décroissante) et nous avons

$$\lim_{y \rightarrow \alpha} f^{-1}(y) = a \quad \text{et} \quad \lim_{y \rightarrow \beta} f^{-1}(y) = b$$

respectivement,

$$\lim_{y \rightarrow \alpha} f^{-1}(y) = b \quad \text{et} \quad \lim_{y \rightarrow \beta} f^{-1}(y) = a$$

Proposition 18 (Règle de l'Hopital) Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle ouvert I telles que $f(a) = g(a) = 0$ avec $a \in I$. Si f et g sont dérivables en a et si $g'(a) \neq 0$, alors la limite de f/g existe en a et

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)-g(a)}{x-a}} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Définition 19 Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert $I \subset \mathbb{R}$, dérivable sur I . Si f' est dérivable en $x_0 \in I$, sa dérivée est notée $f''(x_0)$ et est appelée dérivée seconde de f en x_0 . Si f' est dérivable sur I , nous dirons que f est deux fois dérivable sur I . Nous utilisons aussi la notation $f' = f^{(1)}$ et $f'' = f^{(2)}$. Plus généralement, si $f^{(n-1)}$ est dérivable (en un point x_0 ou sur I) nous définissons la dérivée n -ième de f par $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$.

Par convention, il est utile, dans certaines formules, de poser $f^{(0)} = f$.

f est dite de classe C^n sur I ou $f \in C^n(I)$ si f est n fois dérivable sur I et f^n est continue sur I . f est dite de classe C^∞ sur I ou $f \in C^\infty(I)$ si $f \in C^n(I)$ pour tout entier $n \in \mathbb{N}$.

Proposition 20 Soient f et g deux fonctions n fois dérivables en x_0 . Alors, pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, les fonctions $\lambda f + \mu g$ et $f g$ sont n fois dérivables en x_0 et

$$(\lambda f + \mu g)^{(n)}(x_0) = \lambda f^{(n)}(x_0) + \mu g^{(n)}(x_0)$$

et Formule de Leibniz

$$(f g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=1}^{k=n} C_k^n f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0)$$

Théorème 21 Soient I un intervalle ouvert, f une fonction n fois dérivable dans I , avec $n \in \mathbb{N}^*$. Alors, pour tout $x_0 \in I$ et $x_0 + h \in I$, il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{h}{1!} f^{(1)}(x_0) + \cdots + \frac{h^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x_0) + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x_0 + \theta h)$$

Démonstration. Si $h = 0$, c'est vrai. Fixons $h \neq 0$ et posons $x = x_0 + h$. Nous cherchons donc à montrer l'existence d'un réel c strictement compris entre x_0 et x tel que l'on ait

$$f(x) = f(x_0) + \frac{x - x_0}{1!} f^{(1)}(x_0) + \cdots + \frac{(x - x_0)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x_0) + \frac{(x - x_0)^n}{n!} f^{(n)}(c)$$

On introduit la fonction g définie par

$$g(t) = f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(x-t)^k}{k!} f^{(k)}(t) - K(x-t)^n$$

où K est un réel choisi de telle façon que $g(x_0) = 0$.

Suite de la Démonstration Il est clair que $g(x) = 0$. Pour démontrer le théorème, il suffit de montrer que K est de la forme $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$ pour un certain c . Vu les hypothèses, nous pouvons appliquer le théorème de Rolle pour trouver c (strictement compris entre x_0 et x) tel que $g'(c) = 0$. En calculant g' , on trouve

$$g'(t) = (x-t)^{n-1} \left(-\frac{f^n(t)}{(n-1)!} + Kn \right)$$

L'égalité $g'(c) = 0$ se traduit donc par :

$$K = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$$

D'où le résultat. □

Corollaire 22 Soit I un intervalle ouvert contenant x_0 , et soit $f \in C^n(I)$. Alors il existe une fonction ε , définie au voisinage de 0, telle que

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{h}{1!} f^{(1)}(x_0) + \frac{h^2}{2!} f^{(2)}(x_0) + \cdots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x_0) + h^n \varepsilon(h)$$

avec

$$\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$$

Démonstration. Il suffit de poser

$$\varepsilon(h) = \frac{1}{n!} (f^{(n)}(x_0 + \theta h) - f^{(n)}(x_0))$$

Dans la formule de Taylor-Lagrange

□

Corollaire 23 Si P est une fonction polynôme de degré $d \in \mathbb{N}$, définie par $P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_dx^d$ ($a_d \neq 0$), alors $P^{(d+1)} = 0$, et

$$P(x) = \sum_{k=0}^{k=d} \frac{P^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

En particulier, nous avons $a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$.