

Manual


PROTOCOLO DE AVE – SEPSE - IAM

Apresentação

O guia prático demonstrará o uso dos protocolos ativos conforme últimas atualizações. Alguns dos campos agora serão fornecidos em etapas anteriores ao atendimento médico, durante a classificação de risco. As informações são arquivadas nas tabelas individuais do protocolo selecionado e só devem contabilizar no indicador CASO TENHA SIDO CONTINUADA PELO MÉDICO (em prontuário eletrônico ou evolução do paciente).

## ABERTURA DO PROTOCOLO E PREENCHIMENTO DOS CAMPOS ESSENCIAIS (INDICADORES).

- Durante a classificação de risco, o protocolo selecionado anteriormente será mostrado na caixa de seleção (caso em branco, o atendimento anterior não selecionou nenhum protocolo). Caso seja selecionado outro protocolo que não o aberto anteriormente, o sistema irá apresentar a seguinte pop-up



The screenshot shows a web interface for selecting a protocol. At the top, there's a dropdown menu labeled 'Protocolos' with 'PROTOCOLO DE AVE' selected. Below it are fields for 'Início dos Sintomas de AVE', 'Quadro Clínico' (with a dropdown 'SELECIONE'), and a toggle for 'Suspeita de AVE Hiperagudo' set to 'Não'. The 'ESCALA DE CINCINATTI' section shows two icons: 'Normal' (smiling face) and 'Alterado' (frowning face), with a 'SELECIONE' dropdown below. A blue pop-up dialog box is overlaid on the right, titled 'Protocolos', asking 'Deseja realmente alterar o protocolo?' with 'Sim' and 'Nao' buttons.

O sistema priorizará o atendimento da classificação de risco em caso de troca de protocolo.

- Para cada protocolo um corpo diferente de informações será exibido. Desta forma:  
PROTOCOLO DE IAM:



The screenshot shows the 'PROTOCOLO DE IAM' form. The 'Protocolos' dropdown is set to 'PROTOCOLO DE IAM'. Below it are fields for 'Nível de consciência do paciente com dor torácica' (dropdown 'SELECIONE'), 'Alterações no exame físico' (text area), 'Início dos sintomas de dor torácica' (text field), 'Data/Hora 1º ECG' (text field), 'Piora dos sintomas de dor torácica' (text field), 'IAM com Supra de ST' (toggle set to 'Sim'), and 'Resultado do 1º ECG' (text area).

Manual





PROTOCOLO DE AVE – SEPSE - IAM

Apresentação

PROTOCOLO DE AVE

Protocolos	PROTOCOLO DE AVE
Início dos Sintomas de AVE	
Quadro Clínico	SELECIONE
Suspeita de AVE Hiperagudo	Não

### ESCALA DE CINCINATTI

Característica do Sorriso	 Normal	 Alterado
	SELECIONE	
Levantamento de Braços	 Normal	 Alterado
	SELECIONE	
Característica de Fala	Fale a frase: "O Brasil é o país do futebol".	
	SELECIONE	

PROTOCOLO DE SEPSE

Protocolo	
Protocolos	PROTOCOLO DE SEPSE
Comorbidades	SELECIONE
Tipo de Infecção da SRIS	SELECIONE
Sinais de SRIS	SELECIONE
Disfunção Orgânica	SELECIONE
História Sugestiva de Infecção	SELECIONE
Data	

## Manual

## PROTOCOLO DE AVE – SEPSE - IAM


### Apresentação

- Durante o atendimento médico, ao selecionar o protocolo e clicar em salvar a ficha de preenchimento será carregada:



A ficha pode ser preenchida neste momento, ou o profissional pode clicar em FECHAR no rodapé e prosseguir com o atendimento.

A qualquer momento do atendimento, caso deseje, o profissional também pode preencher a ficha clicando no protocolo exibido em prontuário:





Manual

PROTOCOLO DE AVE – SEPSE - IAM

Apresentação


Ao finalizar a anamnese, caso o médico não tenha selecionado um protocolo, o sistema irá apresentar o seguinte pop-up (de acordo com o protocolo aberto pelos processos anteriores). O médico também tem a opção de abrir um protocolo ou substituir o protocolo vigente;



## Manual

## PROTOCOLO DE AVE – SEPSE - IAM

## Apresentação



**PROTOCOLO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO**

Protocolo Ativo ☒ Sim

ABERTURA DO PROTOCOLO 17/06/2020 17:03:25

**PREENCHIMENTO DO PROTOCOLO**

**EXAME FÍSICO**

Nível de consciência do paciente com dor torácica SELECIONE

Pressão Arterial Sistólica mmHg

Pressão Arterial Diastólica mmHg

Frequência Respiratória rpm

Frequência Cardíaca bpm

Saturação O2 %

Temperatura °C


O atendimento ao paciente pode seguir normalmente a partir deste ponto (com informação de cid e prescrição) e agora o prontuário contará com uma aba ativa de PROTOCOLOS, onde serão ofertados os formulários dos protocolos ativos.

- Em sua nova versão também é possível abrir os protocolos em pacientes internados, basta mudar a flag para ATIVO e salvar.

**Observação:** A fim de indicadores, o sistema irá contabilizar apenas os dados que forem atribuídos APÓS a abertura do protocolo do paciente internado.

**Exemplo:** Se um paciente foi internado sem abertura do protocolo e solicitado a tomografia ou prescrito um antibiótico, esses dados são sensibilizarão os indicadores de solicitação de tomografia e tempo para administração de atb na sepse. O sistema irá contabilizar a primeira prescrição/ou solicitação de TC APÓS a abertura do protocolo.

Uma vez cancelado, o protocolo não pode ser reaberto na mesma internação do paciente, se comportando assim como é no prontuário eletrônico (para cancelar o protocolo basta desativar a flag marcada acima e salvar).



**PACIENTE NORMAL** - M - 30 Ano(s) - Prontuário: 216190 - Convênio: SUS

Boletim de Atendimento: 366158

Data de Entrada: 13/08/2020 15:44:04

Data Internação: 13/08/2020 16:57:46

Profissional: LEONARDO SCARPARO

Leito: CLINICA MEDICA - 101-1

Clinica: CLINICA MEDICA

Permanência na Unidade: 2m 23d 3h 36min

Permanência no Leito: 2m 23d 2h 23min

**Protocolos**

Protocolo Ativo ☐ Não

## Manual

## PROTOCOLO DE AVE – SEPSE - IAM

## Apresentação

## PREENCHIMENTO DE DADOS ESSENCIAIS PARA

PACIENTE NORMAL - M - 30 Ano(s) - Prontuário: 216190 - Convênio: SUS

Voltar ao Painel de Leitos

Boletim de Atendimento: 366158

Data de Entrada : 13/08/2020 15:44:04

Data Internação : 13/08/2020 16:57:46

Permanência na Unidade: 2m 23d 3h 36min

Profissional: LEONARDO SCARPARO

Leito: CLINICA MEDICA - 101-1

Clínica: CLINICA MEDICA

Permanência no Leito: 2m 23d 2h 23min

Sumário do paciente  
Sistematização de Enfermagem  
Apache II  
Evoluições  
Exames  
Imagem  
Diagnóstico  
Protocolos  
Prescrição  
Parecer médico

Protocolo de IAM  
Notificação de Violência  
Protocolo de AVE  
Protocolo de SEPSE

O profissional cancelou o Protocolo de IAM na etapa de atendimento.

## INDICADORES

### ➤ PROTOCOLO DE IAM

o DENOMINADOR do protocolo será sensibilizado pelos atendimentos com protocolo aberto e a seleção do item SUPRA DE ST.

Protocolos

PROTOCOLO DE IAM

Nível de consciência do paciente com dor torácica

SELECIONE

Alterações no exame físico

Início dos sintomas de dor torácica

Piora dos sintomas de dor torácica

Data/Hora 1º ECG

IAM com Supra de ST

Sim

Resultado do 1º EC

Que não tenham contra indicações selecionadas no protocolo

Diagnóstico do episódio de dor torácica

SELECIONE

CID

Descrição

Problema: Z000 - Exame médico geral (CID10) - Tipo do Problema: RISCOS DE SAÚDE

Data

17/06/2020 16:50:31

Motivos para contra indicação absoluta ao uso de medicação trombolítica

SELECIONE

Motivos para contra indicação relativamente ao uso de medicação trombolítica

SELECIONE

O NUMERADOR será sensibilizado pelos atendimentos com SUPRA DE ST marcado como SIM, sem contra indicação de trombolítico e COM ADMINISTRAÇÃO DE TROMBOLITICO. A administração será contabilizada no momento de confirmação de medicamento na sala de procedimentos,

## Manual

## PROTOCOLO DE AVE – SEPSE - IAM

## Apresentação

MEDICAMENTO			
Concluído	MEDICAMENTO	Estado atual	Solicitar Todos
<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	ALTEPLASE 1MG/ML 50ML (ALTA VIGILANCIA), ADMINISTRAR 1,0 FRASCO VIA INTRAMUSCULAR, IMEDIATO, (JUSTIFICATIVA: AAAAAA)	PENDENTE	Solicitar Produto
<div>Confirmar</div>			

## ➤ PROTOCOLO DE AVE

O NUMERADOR deste protocolo será sensibilizado pelos atendimentos cujo protocolo aberto possui o marcador SUSPEITA DE AVE HIPERAGUDO e TOMOGRAFIA REALIZADA (esse campo indica a solicitação de tomografia e deve ser preenchido com a data da solicitação).

Início dos Sintomas de AVE	
Quadro Clínico	SELECIONE
Pressão Arterial Sistólica	mmHg
Glicemia	mg/dl
Pressão Arterial Diastólica	mmHg
Saturação O2	%
Frequência Respiratória	rpm
Temperatura	°C
Frequência Cardíaca	bpm
Suspeita de AVE Hiperagudo	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Tomografia realizada?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Data	17/06/2020 00:00:00
ESCALA DE CINCIN	DATA DA SOLICITAÇÃO DE TOMOGRAFIA
Característica do Sorriso	
Tempo	00:00
Hora	
Minuto	
Atual	Fechar

O DENOMINADOR será sensibilizado pelos atendimentos com o marcador de AVE HIPERAGUDO marcado como SIM.

## ➤ PROTOCOLO SEPSE

O NUMERADOR será sensibilizado pelos atendimentos com administração de antibiótico que tiveram marcador SEGUIMENTO SRIS com uma das opções selecionadas;

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO	
Seguimento SRIS	SELECIONE
Condução médica	SELECIONE
Resultado do Lactato	Infecção (ainda sem disfunção clínica, necessita coleta de exames para descartar disfunção orgânica laboratorial) Infecção Grave (com disfunção orgânica) SEPSE
Resultado da Hemocultura	Choque Séptico
Descrição do Resultado	Afastado Infecção/Sepse/Choque Séptico Sepse/Choque Séptico em cuidados de fim de vida com seguimento fora do protocolo

Manual

PROTOCOLO DE AVE – SEPSE - IAM

Apresentação

A administração de ATB será sensibilizada ao atendimento do item pela dispensação na farmácia em ATENDER SOLICITAÇÃO DE PRODUTO após a solicitação da sala de procedimentos (em caso de emergência) ou prescrição interna.

MEDICAMENTO

Concluído	MEDICAMENTO	Estado atual	Solicitar Todos
<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG, ADMINISTRAR 1,0 FRASCO /AMPOLA VIA INTRAMUSCULAR, IMEDIATO, POR 3 DIA(S) (JUSTIFICATIVA: AA)	PENDENTE	Cancelar solicitação(272913441)
	ALTEPLASE 1MG/ML 50ML (ALTA VIGILANCIA), ADMINISTRAR 1,0 FRASCO VIA INTRAMUSCULAR, IMEDIATO, (JUSTIFICATIVA: AAAAAA)	REALIZADO	

Confirmar

Sim

65050804930 - VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG

Apresentação FRASCO /AMPOLA

Qtde. Solicitada 1

Qtde. Atendida -

Pendente ?

Item de prescrição: VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG, ADMINISTRAR 1,0 FRASCO /AMPOLA VIA INTRAMUSCULAR, IMEDIATO, POR 3 DIA(S) (JUSTIFICATIVA: AA)

Aprazamento: 18

1ª Solicitação

Data de vencimento	Data de vencimento atual	Fabricante	Marca	Lote	Localização	Unidade	Código Lote	Quantidade sugerida	Quantidade separada	Atender?
30/12/2020	30/12/2020	GENERIC	GENERIC	1935352	FARMACIA SATELITE	FRASCO /AMPOLA	11420	1	1	<input type="button" value="Sim"/> <input type="button" value="Não"/>

Atender sem Confirmação de Recebimento

O DENOMINADOR será sensibilizado pelos atendimentos com abertura de protocolo.