

第三章 广义逆矩阵

3.1 基本概念

第五章 广义逆矩阵——基本概念

定义1（广义逆矩阵） 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 若 $X \in \mathbb{C}^{n \times m}$ 满足以下四个Penrose方程:

$$(1) \quad AXA = A$$

$$(2) \quad XAX = X$$

$$(3) \quad (AX)^H = AX$$

$$(4) \quad (XA)^H = XA$$

的全部或者一部分, 则称矩阵 X 是矩阵 A 的**广义逆矩阵**.

第五章 广义逆矩阵——基本概念

注1： 满足 **定义1** 中一个、两个、三个或四个 Penrose 方程的广义逆矩阵 **共计15种**. 若矩阵 G 是满足第 i 个 Penrose 方程的广义逆矩阵, 则记为

$$G = A^{(i)}, i = 1, 2, 3, 4$$

若矩阵 G 是满足第 i 和第 j 个 Penrose 方程的广义逆矩阵, 则记为

$$G = A^{(i,j)}, i, j = 1, 2, 3, 4 \text{ 且 } i \neq j$$

若矩阵 G 是满足第 i 、第 j 个和第 k 个 Penrose 方程的广义逆矩阵, 则记为

$$G = A^{(i,j,k)}, i, j, k = 1, 2, 3, 4 \text{ 且 } i, j, k \text{ 互不相等}$$

第五章 广义逆矩阵——基本概念

若矩阵 G 满足全部四个Penrose方程, 则记为

$$G = A^{(1,2,3,4)} \text{ 或 } A^+$$

并将其称之为**加号逆**或**伪逆**, 或**Moore-Penrose广义逆**.

常见的广义逆有 $A^{(1)}$, $A^{(1,3)}$, $A^{(1,4)}$ 和 A^+ , 其中 $A^{(1)}$ 称为**减号逆**, 记为 A^- ; $A^{(1,3)}$ 称为**最小二乘广义逆**, 记为 A_l^- ; $A^{(1,4)}$ 为**极小范数广义逆**, 记为 A_m^- .