

药物组合临床风险复核（第 1 页 / 共 2 页）

说明：以下 12 个组合用于系统病例标注的复核。请直接给出您对该组合临床风险的判断（高/中/低），与当前标注是否一致均可——您的独立判断即金标准。

编号	眼科局部用药	全身用药	临床情境	当前标注	您的判断
R01	酮咯酸（滴眼液）	依诺肝素（皮下注射）	白内障术后滴用酮咯酸；因静脉血栓预防皮下注射依诺肝素。	当前标注：中风险（需监测） 系统判定：中风险（酮咯酸眼用吸收低，NSAID×抗凝出血相加需监测）	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
R02	溴莫尼定（滴眼液）	曲马多（口服）	青光眼滴用溴莫尼定；因慢性疼痛口服曲马多。白天嗜睡。	当前标注：高风险（建议监测） 系统判定：高风险（α2 激动×阿片 CNS 抑制相加，与 G03 专家共识一致）	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
R03	地塞米松（滴眼液）	利福平（口服）	术后炎症滴用地塞米松；因结核病口服利福平。	当前标注：中风险（需监测） 系统判定：中风险（利福平强 CYP3A4 诱导降低激素暴露，疗效损失有临床意义）	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
R04	阿托品（滴眼液）	曲马多（口服）	虹膜睫状体炎滴用阿托品；因疼痛口服曲马多。	当前标注：高风险 系统判定：高风险（阿托品高吸收×阿片，中枢抗胆碱综合征）	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
R05	东莨菪碱（滴眼液）	阿米替林（口服）	睫状肌麻痹滴用东莨菪碱；因抑郁症口服阿米替林。	当前标注：高风险 系统判定：高风险（东莨菪碱高吸收×TCA 强抗胆碱）	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
R06	阿托品（滴眼液）	羟考酮（口服）	葡萄膜炎滴用阿托品；因癌痛口服羟考酮。	当前标注：高风险 系统判定：高风险（阿托品高吸收×阿片，同 R04 机制）	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低

标注含义：高=建议规避或严格监测；中=需监测或调整；低=眼科剂量下风险可忽略。意见可写在表格空白处。

药物组合临床风险复核（第 2 页 / 共 2 页）

说明：以下 12 个组合用于系统病例标注的复核。请直接给出您对该组合临床风险的判断（高/中/低），与当前标注是否一致均可——您的独立判断即金标准。

编号	眼科局部用药	全身用药	临床情境	当前标注	您的判断
R07	左氧氟沙星（滴眼液）	索他洛尔（口服）	角膜炎滴用左氧氟沙星；因心律失常口服索他洛尔。	当前标注：低风险（无需特殊处理） 系统判定：低风险（喹诺酮 QT 机制存在但眼用吸收<5%，无临床 QT 意义）	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
R08	倍他洛尔（滴眼液）	维拉帕米（口服）	青光眼滴用倍他洛尔；因高血压口服维拉帕米。	当前标注：中风险 系统判定：中风险（倍他洛尔中吸收 β 1 选择性×CCB，暴露受限）	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
R09	酮咯酸（滴眼液）	利伐沙班（口服）	白内障术后滴用酮咯酸；因房颤口服利伐沙班。	当前标注：中风险 系统判定：中风险（同 R01，NSAID×NOAC 出血相加）	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
R10	氟米龙（滴眼液）	泼尼松（口服）	结膜炎滴用氟米龙；因类风湿口服泼尼松。	当前标注：低风险；系统提示中风险（弱效激素争议） 系统判定：中风险（弱效激素类级保守提示，IOP/全身效应弱）	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
R11	氟米龙（滴眼液）	格列美脲（口服）	结膜炎滴用氟米龙；因糖尿病口服格列美脲。	当前标注：低风险；系统提示中风险（同上） 系统判定：中风险（弱效激素×磺脲，类级保守提示）	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
R12	酮咯酸（滴眼液）	华法林（口服）	白内障术后滴用酮咯酸；因房颤口服华法林（INR 2.2）。	当前标注：中风险 系统判定：中风险（同 R01/R09，NSAID×华法林监测 INR）	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低

标注含义：高=建议规避或严格监测；中=需监测或调整；低=眼科剂量下风险可忽略。意见可写在表格空白处。