

**Exercise 3.2.** Consider the heat conduction problem:

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = f, & \forall t \in (0, T], \forall x \in (a, b), \\ u(x, 0) = u_0(x), & \forall x \in (a, b), \\ u(a, t) = u(b, t) = 0, & \forall t \in (0, T]. \end{cases}$$

The Forward Euler/centered schema:

$$L_h u_i^n := \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{k} - \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{h^2} = f_i^{n+1}, \quad n = 0, 1, \dots, M, i = 1, 2, \dots, N-1,$$

where  $u_i^n$  is an approximation of  $u(x_i, t^n)$ . Prove that the truncation error  $R_i^n = L_h u(x_i, t^n) - [Lu](x_i, t^n) = O(k + h^2)$ .

*Proof.* By Tylor development, we have

$$\begin{aligned} u(x_i, t^{n+1}) - u(x_i, t^n) &= k u_t(x_i, t^n) + O(k^2), \\ u(x_{i+1}, t^n) - 2u(x_i, t^n) + u(x_{i-1}, t^n) &= h^2 u_{xx}(x_i, t^n) + O(h^4). \end{aligned}$$

Thus  $R_i^n = O(k + h^2)$ . □

**Exercise 3.3.** Consider the transport-diffusion problem

$$\begin{aligned} u_t - u_{xx} + v u_x &= 0, \quad \forall x \in (a, b), \quad t \in (0, T), \\ u(a, t) = u(b, t) &= 0, \quad t \in (0, T), \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad \forall x \in (a, b), \end{aligned}$$

where  $v$  is a constant. Derive estimates for the truncation error and global error of the following schema, and prove that

$$\|u_h^n\|_0 \leq \|u_h^0\|_0, \quad \forall n = 0, 1, \dots,$$

- If  $v \geq 0$ ,

$$\begin{aligned} \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{k} - \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{h^2} + v \frac{u_i^{n+1} - u_{i-1}^{n+1}}{h} &= 0, \quad \forall i = 1, \dots, N-1, \\ u_0^{n+1} = u_N^{n+1} &= 0, \\ u^0 &= u_0, \end{aligned}$$

- if  $v \leq 0$ ,

$$\begin{aligned} \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{k} - \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{h^2} + v \frac{u_{i+1}^{n+1} - u_i^{n+1}}{h} &= 0, \quad \forall i = 1, \dots, N-1, \\ u_0^{n+1} = u_N^{n+1} &= 0, \\ u^0 &= u_0, \end{aligned}$$

in an uniform mesh  $\{x_i\}_{i=0}^N$ ,  $x_i = a + ih$ ,  $h = (b - a)/N$ ,  $\{t^n\}_{n=0}^M$ ,  $t^n = nk$ ,  $k = T/M$ .

*Solution.*

• Truncation Error.

Let  $Lu = u_t - u_{xx} + v u_x$  and

$$L_h u_i^n = \begin{cases} \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{k} - \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{h^2} + v \frac{u_i^{n+1} - u_{i-1}^{n+1}}{h}, & \text{if } v \geq 0, \\ \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{k} - \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{h^2} + v \frac{u_{i+1}^{n+1} - u_i^{n+1}}{h}, & \text{if } v \leq 0. \end{cases}$$

Then  $R_i^n = L_h u(x_i, t^n) - [Lu](x_i, t^n)$ . If  $v \geq 0$ , by Tylor developments:

$$\begin{aligned} u(x_i, t^{n+1}) - u(x_i, t^n) &= k u_t(x_i, t^n) + O(k^2), \\ u(x_{i+1}, t^{n+1}) - 2u(x_i, t^{n+1}) + u(x_{i-1}, t^{n+1}) &= h^2 u_{xx}(x_i, t^{n+1}) + O(h^4), \\ u(x_i, t^{n+1}) - u(x_{i-1}, t^{n+1}) &= h u_x(x_i, t^{n+1}) + O(h^2), \end{aligned}$$

we have  $R_i^n = O(k + h)$ . The similar result can also be obtained for  $v \leq 0$ .

• Global Error.

Let  $e_i^n = u(x_i, t^n) - u_i^n$ . Then  $L_h e_i^n = R_i^n$ ,  $\forall i = 1, \dots, N-1$ .

- If  $v \geq 0$ , we have

$$\left(1 + \frac{2k}{h^2} + v \frac{k}{h}\right) e_i^{n+1} = \frac{k}{h^2} e_{i+1}^{n+1} + \left(\frac{k}{h^2} + v \frac{k}{h}\right) e_{i-1}^{n+1} + e_i^n + k R_i^n.$$

Multiplying both sides of the above formula by  $e_i^{n+1} h$  and summing in  $i$  from 0 to  $N$  gives

$$\left(1 + \frac{2k}{h^2} + v \frac{k}{h}\right) \|e_h^{n+1}\|_0^2 = \frac{k}{h^2} \sum_{i=0}^{N-1} e_{i+1}^{n+1} e_i^{n+1} h + \left(\frac{k}{h^2} + v \frac{k}{h}\right) \sum_{i=1}^N e_{i-1}^{n+1} e_i^{n+1} h + \sum_{i=0}^N (e_i^n + k R_i^n) e_i^{n+1} h.$$

By Cauchy-Schwarz inequality, we have

$$\left(1 + \frac{2k}{h^2} + v \frac{k}{h}\right) \|e_h^{n+1}\|_0^2 \leq \left(\frac{2k}{h^2} + v \frac{k}{h}\right) \|e_h^{n+1}\|_0^2 + (\|e_h^n\|_0 + k \|R_h^n\|_0) \|e_h^{n+1}\|_0.$$

Thus

$$\|e_h^{n+1}\|_0 \leq \|e_h^n\|_0 + k \|R_h^n\|_0 \leq \dots \leq \|e_h^0\|_0 + k \sum_{j=0}^n \|R_h^j\|_0 \leq T \max_j \|R_h^j\|_0 = O(k + h).$$

The similar result can be obtained for  $v \leq 0$ .

• Stability.

If  $v \geq 0$ , multiplying both sides of  $L_h u_i^n = 0$  by  $u_i^{n+1} h$  yields

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{k} u_i^{n+1} h - \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{h} u_i^{n+1} + v(u_i^{n+1} - u_{i-1}^{n+1}) u_i^{n+1} = 0.$$

Summing in  $i$  from 1 to  $N-1$  gives

$$\frac{h}{k} \sum_{i=1}^{N-1} (u_i^{n+1} - u_i^n) u_i^{n+1} - \frac{1}{h} \sum_{i=1}^{N-1} (u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}) u_i^{n+1} + v \sum_{i=1}^{N-1} (u_i^{n+1} - u_{i-1}^{n+1}) u_i^{n+1} = 0.$$

The first term

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{N-1} (u_i^{n+1} - u_i^n) u_i^{n+1} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N-1} (u_i^{n+1} - u_i^n) (u_i^{n+1} - u_i^n + u_i^{n+1} + u_i^n) \\ &\geq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N-1} (u_i^{n+1} - u_i^n) (u_i^{n+1} + u_i^n) \\ &= \frac{1}{2h} (\|u_h^{n+1}\|_0^2 - \|u_h^n\|_0^2). \end{aligned}$$

The second term

$$\begin{aligned} -\frac{1}{h} \sum_{i=1}^{N-1} (u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}) u_i^{n+1} &= \frac{1}{h} \sum_{i=1}^{N-1} [2(u_{i+1}^{n+1})^2 - (u_{i+1}^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}) u_i^{n+1}] \\ &= \frac{1}{h} \left[ (u_{N-1}^{n+1})^2 + \sum_{i=1}^{N-1} (u_i^{n+1} - u_{i-1}^{n+1})^2 \right] \geq 0, \end{aligned}$$

where we note that  $\sum_{i=1}^{N-1} u_{i+1}^{n+1} u_i^{n+1} = \sum_{i=1}^{N-1} u_i^{n+1} u_{i-1}^{n+1}$  and

$$\sum_{i=1}^{N-1} (u_i^{n+1})^2 = (u_{N-1}^{n+1})^2 + \sum_{i=1}^{N-1} (u_{i-1}^{n+1})^2.$$

The third term

$$\begin{aligned} v \sum_{i=1}^{N-1} (u_i^{n+1} - u_{i-1}^{n+1}) u_i^{n+1} &= \frac{v}{2} \sum_{i=1}^{N-1} (u_i^{n+1} - u_{i-1}^{n+1}) (u_i^{n+1} - u_{i-1}^{n+1} + u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}) \\ &\geq \frac{v}{2} \sum_{i=1}^{N-1} [(u_i^{n+1})^2 - (u_{i-1}^{n+1})^2] = \frac{v}{2} (u_{N-1}^{n+1})^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Thus we obtain  $\|u_h^{n+1}\|_0 \leq \|u_h^n\|_0$ , which leads to  $\|u_h^n\|_0 \leq \|u_h^0\|_0$ . For  $v \leq 0$ , a similar approach can be applied to obtain the desired result, except for the treatment of the third term:

$$\begin{aligned} v \sum_{i=1}^{N-1} (u_{i+1}^{n+1} - u_i^{n+1}) u_i^{n+1} &= \frac{-v}{2} \sum_{i=1}^{N-1} (u_i^{n+1} - u_{i+1}^{n+1}) (u_i^{n+1} - u_{i+1}^{n+1} + u_i^{n+1} + u_{i+1}^{n+1}) \\ &\geq \frac{-v}{2} \sum_{i=1}^{N-1} [(u_i^{n+1})^2 - (u_{i+1}^{n+1})^2] = \frac{-v}{2} (u_1^{n+1})^2 \geq 0. \end{aligned}$$

□