

数的历史与发展

王介哲

优才教育

2018 年 6 月 18 日

- ① 数的诞生
- ② 古代计数方法
 - 古埃及
 - 古巴比伦
 - 古印度
 - 古中国
- ③ 罗马数字
- ④ 正数和负数
- ⑤ 有理数

1 数的诞生

2 古代计数方法

- 古埃及
- 古巴比伦
- 古印度
- 古中国

3 罗马数字

4 正数和负数

5 有理数

你能想到那些简单的计数方式？

- 绳子打结
- 骨头穿孔
- 泥板刻痕
-

最早的数字


问题

最早的数字出现在什么时候？

- Ⓐ 十万年前
- Ⓑ 三万年前
- Ⓒ 一万年前
- Ⓓ 五千年前

答案

(B)
数的第一次使用可以追溯到大约公元三万年前，迄今为止发现的最早的例子是在南非的一个洞穴里。



图：南非·甘果洞

一则笑话

谁说出的数字大？

两个匈牙利贵族决定做一次数数游戏——谁说出的数字最大谁赢。

“好，”一个贵族说，“你先说把！”

另一个绞尽脑汁想了好久，终于说出他所想到的最大数字：“3”。

现在轮到第一个动脑筋了。苦思冥想了更久，他表示弃权说：“你赢啦！”

——伽莫夫《从一到无穷大》

问题

最大的数是多少？

① 数的诞生

② 古代计数方法

- 古埃及
- 古巴比伦
- 古印度
- 古中国

③ 罗马数字

④ 正数和负数

⑤ 有理数

- ① 数的诞生
- ② 古代计数方法
 - 古埃及
 - 古巴比伦
 - 古印度
 - 古中国
- ③ 罗马数字
- ④ 正数和负数
- ⑤ 有理数



图: 莱因德数学纸草书, 著于约公元前 1700 年



莱因德数学纸草书

总长 525 厘米、高 33 厘米，现藏大英博物馆。

纸草书的内容分两部分：前面是一个分数表，后面是 84 个数学问题和一段无法理解的话（也称为问题 85）。

问题涉及素数、合数和完全数，算术，几何，调和平均数以及简单筛法等概念，其中还有对 π 的简单计算，所得值为 3.1605。

古埃及



图：古埃及数字

古埃及

这是多少？



答案

1,333,330



图: 荷鲁斯之眼

荷鲁斯之眼

荷鲁斯之眼顾名思义，它是鹰头神荷鲁斯的眼睛。

荷鲁斯的右眼象征完整无缺的太阳，依据传说，因荷鲁斯战胜赛特，右眼有著远离痛苦，战胜邪恶的力量。


荷鲁斯的左眼象征有缺损的月亮，依据传说，荷鲁斯后来将左眼献给欧西里斯，因而左眼亦有分辨善恶、捍卫健康与幸福的作用，亦使古埃及人也相信荷鲁斯的左眼具有复活死者的力量。



图: 荷鲁斯之眼

- ① 数的诞生
- ② 古代计数方法
 - 古埃及
 - 古巴比伦
 - 古印度
 - 古中国
- ③ 罗马数字
- ④ 正数和负数
- ⑤ 有理数

古巴比伦



图：普林顿 322，刻于约公元前 1800 年

普林顿 322

普林顿 322 为古巴比伦的一个泥板，约 13 厘米宽，9 厘米高，2 厘米厚，现藏于哥伦比亚大学。

泥板上有一个四个行十五列和楔形文字组成的表格，表格列出了 15 组勾股数。

古巴比伦

| | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 𐎶 1 | 𐎵𐎶 11 | 𐎶𐎶 21 | 𐎶𐎶𐎶 31 | 𐎶𐎶𐎶𐎶 41 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 51 |
| 𐎶𐎶 2 | 𐎵𐎶𐎶 12 | 𐎶𐎶𐎶 22 | 𐎶𐎶𐎶𐎶 32 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 42 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 52 |
| 𐎶𐎶𐎶 3 | 𐎵𐎶𐎶𐎶 13 | 𐎶𐎶𐎶𐎶 23 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 33 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 43 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 53 |
| 𐎶𐎶𐎶𐎶 4 | 𐎵𐎶𐎶𐎶𐎶 14 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 24 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 34 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 44 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 54 |
| 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 5 | 𐎵𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 15 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 25 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 35 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 45 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 55 |
| 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 6 | 𐎵𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 16 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 26 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 36 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 46 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 56 |
| 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 7 | 𐎵𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 17 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 27 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 37 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 47 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 57 |
| 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 8 | 𐎵𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 18 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 28 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 38 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 48 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 58 |
| 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 9 | 𐎵𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 19 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 29 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 39 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 49 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 59 |
| 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 10 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 20 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 30 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 40 | 𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 50 | |

图: 巴比伦数字

- ① 数的诞生
- ② 古代计数方法
 - 古埃及
 - 古巴比伦
 - 古印度
 - 古中国
- ③ 罗马数字
- ④ 正数和负数
- ⑤ 有理数

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

图：天城文数字

- ① 数的诞生
- ② 古代计数方法
 - 古埃及
 - 古巴比伦
 - 古印度
 - 古中国
- ③ 罗马数字
- ④ 正数和负数
- ⑤ 有理数

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直式 | ○ | 丨 | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ |
| 横式 | ○ | 一 | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ |

图：算筹正数


| | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 直式 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 横式 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |

图：负数

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直式 | ○ | 丨 | ＝ | ＝ | × | ○ | ＝ | ＝ | ＝ | × |
| 横式 | ○ | 一 | ＝ | ＝ | × | ○ | ＝ | ＝ | ＝ | × |

图：南宋正筹码

古法七蔡方圖



图：杨辉三角

- ① 数的诞生
- ② 古代计数方法
 - 古埃及
 - 古巴比伦
 - 古印度
 - 古中国
- ③ 罗马数字
- ④ 正数和负数
- ⑤ 有理数

罗马数字

罗马数字共有 7 个：

| 罗马数字 | I | V | X | L | C | D | M |
|------|---|---|----|----|-----|-----|------|
| 数值 | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |

拼写规则

- 右加左减
- 加线乘千
- 数码限制

罗马数字

右加左减

- 在较大的罗马数字的右边记上较小的罗马数字，表示大数加小数
- 在较大的罗马数字的左边记上较小的罗马数字，表示大数减小数
- 左减的数字有限制，仅限于 I、X、C
比如 45 不可以写成 VL，只能是 XLV
- 左减时不可跨越一个位值
比如，99 不可以用 IC ($100-1$) 表示，而是用 XCIX ($[100-10]+[10-1]$) 表示。

加线乘千

- 在罗马数字的上方加上一条横线，表示将这个数乘以 1000，即是原数的 1000 倍
- 同理，如果上方有两条横线，即是原数的 1000000 (1000^2) 倍

数码限制

- 同一数码最多只能连续出现三次，如 40 不可表示为 XXXX，而要表示为 XL
- 例外：由于 IV 是古罗马神话主神朱庇特（即 IVPITER，古罗马字母里没有 J 和 U）的首字，因此有时用 IIII 代替 IV

右加左减

- 在较大的罗马数字的右边记上较小的罗马数字，表示大数加小数
- 在较大的罗马数字的左边记上较小的罗马数字，表示大数减小数
- 左减的数字有限制，仅限于 I、X、C
- 左减时不可跨越一个位值

加线乘千

- 在罗马数字的上方加上一条横线，表示原数的 1000 倍
- 同理，如果上方有两条横线，即是原数的 1000000 倍

数码限制

- 同一数码最多只能连续出现三次
- 例外：有时可以用 IIII 代替 IV

罗马数字

罗马数字 -> 数值:

- VIII
- XIV
- LX
- XCIX
- CXCIX
- $M\bar{V}$

答案:

- 8
- 14
- 60
- 99
- 199
- 4000

罗马数字

数值 -> 罗马数字:

- 19
- 145
- 361
- 1437
- 8191
- 65537

答案:

- XIX
- CXLV
- CCCLXI
- MCDXXXVII
- $\overline{\text{V}}$ MMMCXCI
- $\overline{\text{LXV}}$ DXXXVII

- ① 数的诞生
- ② 古代计数方法
 - 古埃及
 - 古巴比伦
 - 古印度
 - 古中国
- ③ 罗马数字
- ④ 正数和负数
- ⑤ 有理数

为什么会有负数？

1、日常生活需要

- 建国以后北京历史最低温度：零下 27.4°C (1966) -27.4°C
- 中国大陆最低点（新疆吐鲁番艾丁湖洼地）海拔：海平面以下 154.31 米 -154.31m
- 2018 年 5 月 9 日上证指数：下跌 2.35 个点，收于 3159.15 个点 -2.35
- 支出，负资产……

为什么会有负数？

2、数学的对称性

正整数具有如下运算规律：

- ① 加法交换律： $a + b = b + a$
- ② 加法结合律： $(a + b) + c = a + (b + c)$
- ③ 乘法交换律： $a \times b = b \times a$
- ④ 乘法分配率： $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$
- ⑤ 加法单位元： $a + 0 = 0 + a = a$
- ⑥ 乘法零元： $a \times 0 = 0 \times a = 0$

问题

什么数满足： $\boxed{?} + 1 = 0$

为什么会存在负数？

解方程：

$$x + 1 = 0$$

$$x = 0 - 1$$

$$x = -1$$

省去 0

定义

负整数 设 a 为整数，则

$$-a = 0 - a$$

对于负分数，我们可以作同样的定义。

负数的运算法则

加减法

$$\textcircled{1} \quad a + (-b) = a + (0 - b) = (a + 0) - b = a - b$$

$$\textcircled{2} \quad -a + b = (-a) + b = b + (-a) = b - a$$

$$\textcircled{3} \quad -a + (-b) = (-a) + (-b) = (-a) - b = 0 - a - b = 0 - (a + b) = -(a + b)$$

$$\textcircled{4} \quad a - (-b) = a - (0 - b) = a - 0 + b = a + b$$

$$\textcircled{5} \quad -a - (-b) = -a + b = b - a$$

规律

负号 \approx 减号

负数的运算法则

$$\text{+} + \text{+} = \text{+}$$

$$\text{-} + \text{-} = \text{-}$$

$$\text{+} + \text{-} = \text{+}$$

$$\text{+} + \text{-} = \text{-}$$

负数的运算法则

乘法

- ① $a \times (-b) = a \times (0 - b) = a \times 0 - a \times b = 0 - a \times b = -a \times b$
- ② $(-a) \times b = b \times (-a) = -b \times a = -a \times b$
- ③ $(-a) \times (-b) = -a \times (-b) = -(-a \times b) = a \times b$
- ④ $(-a) \div b = -a \div b$
- ⑤ $a \div (-b) = -a \div b$
- ⑥ $(-a) \div (-b) = a \div b$

规律


负负得正，奇负偶正

- ① 数的诞生
- ② 古代计数方法
 - 古埃及
 - 古巴比伦
 - 古印度
 - 古中国
- ③ 罗马数字
- ④ 正数和负数
- ⑤ 有理数

我们学过那些数？

- 自然数
- 整数
- 小数
- 分数
- π

还记得小数的分类吗？



能不能给“有理数”下个定义？

注意：有限小数 \rightarrow 整数或分数，无限循环小数 \rightarrow 分数；

$$\text{整数} = \frac{\text{整数}}{1}, \quad \text{分数} = \frac{\text{整数}}{\text{整数}}$$

定义

有理数 能表示为整数之比的数。

$$\text{有理数} \begin{cases} \text{整数} & 0, 1, 4, -3, \frac{6}{6}, \frac{40}{8}, 600\%, \dots \\ \text{分数} & \frac{1}{2}, \frac{4}{6}, -\frac{7}{12}, 3.14, -0.05, \dots \end{cases}$$

如何将有理数分类？

$$\text{有理数} \left\{ \begin{array}{l} \text{整数} \left\{ \begin{array}{l} \text{正整数} \\ 0 \\ \text{负整数} \end{array} \right. \\ \text{分数} \left\{ \begin{array}{l} \text{正分数} \\ \text{负分数} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

$$\text{有理数} \left\{ \begin{array}{l} \text{正有理数} \left\{ \begin{array}{l} \text{正整数} \\ \text{正分数} \end{array} \right. \\ 0 \\ \text{负有理数} \left\{ \begin{array}{l} \text{负整数} \\ \text{负分数} \end{array} \right. \end{array} \right.$$