

可疑不良反应报告															

1. 不良反应信息

1. 患者姓名 首字母 隐私	1a. 国家 中国	2. 出生日期			2a. 年龄 58岁	3. 性别 男	3a. 体重 67公斤	4-6 出生日期			8-12 检查所有与不良反应相关的严重标准
		日	月 隐私	年				日 27	月 03	年 2026	
7+13描述反应（包括相关试验/实验室数据） 事件报告术语（首位语）（相关症状，如有，用逗号分隔） 可疑感染（感染） 病例描述: 受试者男，58岁，亚洲人，参加：SHR-A1912联合利妥昔单抗+吉西他滨+奥沙利铂（R-GEMOX）对比R-GEMOX在复发难治弥漫大B细胞淋巴瘤中的随机、开放3期临床研究，研究方案编号：SHR-A (续附加信息页)											
											☐ 患者死亡 ☒ 导致或延长住院时间 ☐ 永久或重大伤残/丧失工作能力 ☐ 危及生命 ☐ 先天畸形 ☐ 其他

II. 怀疑用药信息

14. 怀疑药物（包括通用名称） #1) 注射用SHR-A1912(注射用SHR-A1912) 冻干粉 70mg #2) 奥沙利铂注射液(奥沙利铂注射液) 注射剂 20ml		20. 停药后反应减轻了吗？
15. 日剂量 #1) 128 mg, 每3周1次 #2) 180 mg, 每3周1次		☐ 是 ☐ 否 ☐ 不明 ☒ 不适用
16. 给药途径 #1) 静脉滴注 #2) 静脉滴注		
17. 适应症 #1) 弥漫大B细胞淋巴瘤 (弥漫性大B细胞淋巴瘤) #2) 弥漫大B细胞淋巴瘤 (弥漫性大B细胞淋巴瘤)		21. 重新用药后是否再次出现反应？
18. 给药日期（从/到） #1) 2025年10月25日 / 2025年10月25日 #2) 2025年10月25日 / 2025年10月25日		☐ 是 ☐ 否 ☐ 不明 ☒ 不适用
19. 给药持续时间 #1) 1 day #2) 1 day		

III.合并药物与病史

22. 合并药物和给药日期（不包括用于治疗反应的药物）		
#1) 唑吡坦片 (唑吡坦片) ;2025年10月10日 / 继续		
#2) 益血生胶囊 (益血生胶囊) ;不明 / 继续		
#3) 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 (盐酸坦索罗辛缓释胶囊) ;不明 / 继续		
#4) 碳酸钙D3片 (碳酸钙D3片) ;不明 / 继续		
#5) 骨化三醇软胶囊 (骨化三醇软胶囊) ;不明 / 继续		
23. 其他相关病史(例如诊断、过敏、妊娠及末次月经等)		
开始/结束日期	病史类型/备注	描述

IV公司信息

24a. 公司名称和地址 江苏恒瑞医药股份有限公司		26. 备注	
	24b. 生产企业控制编号. H2026001202331		25b. 报告者名称和地址 姓名和地址被保护.
24c. 公司接收日期 2026年03月27日	24d. 报告来源 ☒ 试验 ☐ 文献 ☒ 医疗专业 ☐ 其他:		
本报告日期 2026年04月03日	25a. 报告类型 ☒ 首次 ☐ 随访:		

附加信息

7+13. 不良反应描述（续）

1912-301（研究中心编号：CN037/受试者编号：CN037001）。2025年10月23日，随机到"SHR-A1912 + R-GemOx"组。

合并用药：2025年07月-持续，益血生胶囊（1g tid po），用于贫血。2025年10月10日-持续，唑吡坦片（10mg qd po），用于失眠。不明日期-持续，复方磺胺甲噁唑片（0.4g：80mg biw po）、阿昔洛韦片（0.2g tid po），用于预防感染；弥可保（甲钴胺片）（0.5mg bid po），用于麻木；盐酸坦索罗辛缓释胶囊（0.2mg qd po），用于前列腺增生；碳酸钙D3片（600mg qd po）、骨化三醇软胶囊（0.25ug qd po），用于骨质疏松。

2025年10月09日，签署知情同意书。

2025年10月24日，进行首次用药，具体用药方案如下：

2025年10月24日，利妥昔单抗注射液（670mg q3w ivgtt）；

2025年10月25日，注射用SHR-A1912（128mg q3w ivgtt）、注射用盐酸吉西他滨（1800mg q3w ivgtt）、奥沙利铂注射液（180mg q3w ivgtt）。

2025年11月13日，利妥昔单抗注射液（700mg q3w ivgtt）；

2025年11月14日，注射用SHR-A1912（133mg q3w ivgtt）、注射用盐酸吉西他滨（1800mg q3w ivgtt）、奥沙利铂注射液（180mg q3w ivgtt）。

2025年12月04日，利妥昔单抗注射液（700mg q3w ivgtt）；

2025年12月05日，注射用SHR-A1912（134mg q3w ivgtt）、注射用盐酸吉西他滨（1800mg q3w ivgtt）、奥沙利铂注射液（180mg q3w ivgtt）。

2025年12月25日，利妥昔单抗注射液（700mg q3w ivgtt）；

2025年12月26日，注射用SHR-A1912（133mg q3w ivgtt）、注射用盐酸吉西他滨（1800mg q3w ivgtt）、奥沙利铂注射液（180mg q3w ivgtt）。

2026年01月21日，利妥昔单抗注射液（700mg q3w ivgtt）；

2026年01月22日，注射用SHR-A1912（130mg q3w ivgtt）、注射用盐酸吉西他滨（1800mg q3w ivgtt）、奥沙利铂注射液（180mg q3w ivgtt）。

2026年02月09日，利妥昔单抗注射液（700mg q3w ivgtt）；

2026年02月10日，注射用SHR-A1912（128mg q3w ivgtt）、注射用盐酸吉西他滨（1800mg q3w ivgtt）、奥沙利铂注射液（180mg q3w ivgtt）。

2026年03月05日，利妥昔单抗注射液（700mg q3w ivgtt）；

2026年03月06日，注射用SHR-A1912（128mg q3w ivgtt）、注射用盐酸吉西他滨（1800mg q3w ivgtt）、奥沙利铂注射液（180mg q3w ivgtt）。

2026年03月23日，利妥昔单抗注射液（700mg q3w ivgtt）；

2026年03月24日，注射用SHR-A1912（130mg q3w ivgtt）、注射用盐酸吉西他滨（1800mg q3w ivgtt）、奥沙利铂注射液（180mg q3w ivgtt）。

2026年03月23日，受试者来院完成C8访视用药，自诉从2026年01月24日咳嗽至今。胸部平扫CT示，左肺下叶局限性间质性改变，较前无著变，左肺上叶多发局限性不张，较前无著变，考虑双肺小气道病变，较前无著变，余诊断同前。

2026年03月24日，14：38，输完最后一袋药物（奥沙利铂注射液）。

2026年03月27日，可疑感染（CTCAE 3级）符合严重不良事件标准（导致住院时间延长）。

2026年03月27日，普通细菌培养结果显示，肺炎克雷伯菌、流感嗜血杆菌。脱氧核苷酸（EB病毒DNA）<400（参考值：阴性）；脱氧核糖核酸<400（参考值：<400）；降钙素原<0.02（参考值：<0.046，低风险严重脓毒症/感染性休克<0.5，高风险严重脓毒症/感染性休克>0.2）。原计划受试者于15：30后出院，现因普通细菌培养结果异常，无法按照原计划时间出院，出院时间延长。住院期间予以氨溴索化痰以及雾化治疗，较前好转。

其他AE：

2026年01月24日-持续，咳嗽。

治疗用药：

咳嗽：2026年03月27日-持续，标准桃金娘油肠溶胶囊（300mg bid po）。

可疑感染的结局为：症状持续。

因可疑感染，针对研究药物采取的措施为：继续用药（注射用SHR-A1912、利妥昔单抗注射液、奥沙利铂注射液、注射用盐酸吉西他滨）。

研究者因果关系判断：方案中已写接受注射用SHR-A1912的不良反应有感染，故可疑感染与利妥昔单抗注射液、注射用SHR-A1912、注射用盐酸吉西他滨、奥沙利铂注射液可能有关。

其他导致该事件的可能因素：临床实验操作。

2026年03月27日收到首次报告。

企业评估：

可疑感染（PT：感染）是SHR-A1912（IgG1亚型人源化抗CD79b单克隆抗体偶联DNA拓扑异构酶I抑制剂9106-IM-2的ADC）研究者手册安全参考信息（RSI）、吉西他滨(非我司)说明书、利妥昔单抗说明书中非预期不良事件，是奥沙利铂说明书中预期不良事件。

附加信息

SAE发生于2026年03月27日，距首次用药约5月，距最近一次用药3天，细菌培养结果示，肺炎克雷伯菌、流感嗜血杆菌，考虑肺部感染可能。ADC药物血液学毒性常见，可能增加感染风险。其联合用药利妥昔单抗靶向CD20阳性B细胞，化疗药物奥沙利铂、吉西他滨可引起骨髓抑制，均可增加感染风险。基于时间相关性和药物作用机制，公司考虑可疑感染与注射用SHR-A1912、奥沙利铂注射液、注射用盐酸吉西他滨、利妥昔单抗注射液可能有关。受试者为淋巴瘤患者，本身免疫功能低下，考虑与研究适应症也可能有关。

13. 相关实验室检查

2026年03月23日，胸部平扫CT示，左肺下叶局限性间质性改变，较前无著变，左肺上叶多发局限性不张，较前无著变，考虑双肺小气道病变，较前无著变，余诊断同前。
2026年03月27日，普通细菌培养结果示，肺炎克雷伯菌、流感嗜血杆菌。脱氧核苷酸（EB病毒DNA）<400（参考值：阴性）；脱氧核糖核酸<400（参考值：<400）；降钙素原<0.02（参考值：<0.046，低风险严重脓毒症/感染性休克<0.5，高风险严重脓毒症/感染性休克>0.2）。

14-19. 怀疑药物（续）

14. 怀疑药物(包括通用名称)	15. 日剂量	17. 适应症	18. 给药日期（从/到）
16. 给药途径	19. 给药间期		
#1)注射用SHR-A1912(注射用SHR-A1912) 冻干粉；给药方案 #2	133 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2025年11月14日 / 2025年11月14日； 1 day
#1)注射用SHR-A1912(注射用SHR-A1912) 冻干粉；给药方案 #3	134 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2025年12月05日 / 2025年12月05日； 1 day
#1)注射用SHR-A1912(注射用SHR-A1912) 冻干粉；给药方案 #4	133 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2025年12月26日 / 2025年12月26日； 1 day
#1)注射用SHR-A1912(注射用SHR-A1912) 冻干粉；给药方案 #5	130 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2026年01月22日 / 2026年01月22日； 1 day
#1)注射用SHR-A1912(注射用SHR-A1912) 冻干粉；给药方案 #6	128 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2026年02月10日 / 2026年02月10日； 1 day
#1)注射用SHR-A1912(注射用SHR-A1912) 冻干粉；给药方案 #7	128 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2026年03月06日 / 2026年03月06日； 1 day
#1)注射用SHR-A1912(注射用SHR-A1912) 冻干粉；给药方案 #8	130 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2026年03月24日 / 2026年03月24日； 1 day
#2)奥沙利铂注射液(奥沙利铂注射液) 注射剂；给药方案 #2	180 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2025年11月14日 / 2025年11月14日； 1 day
#2)奥沙利铂注射液(奥沙利铂注射液) 注射剂；给药方案 #3	180 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2025年12月05日 / 2025年12月05日； 1 day
#2)奥沙利铂注射液(奥沙利铂注射液) 注射剂；给药方案 #4	180 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2025年12月26日 / 2025年12月26日； 1 day
#2)奥沙利铂注射液(奥沙利铂注射液) 注射剂；给药方案 #5	180 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2026年01月22日 / 2026年01月22日； 1 day
#2)奥沙利铂注射液(奥沙利铂注射液) 注射剂；给药方案 #6	180 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2026年02月10日 / 2026年02月10日； 1 day
#2)奥沙利铂注射液(奥沙利铂注射液) 注射剂；给药方案 #7	180 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2026年03月06日 / 2026年03月06日； 1 day
#2)奥沙利铂注射液(奥沙利铂注射液) 注射剂；给药方案 #8	180 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2026年03月24日 / 2026年03月24日； 1 day
#3)注射用盐酸吉西他滨(注射用盐酸吉西他滨) 冻干粉；给药方案 #1	1800 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2025年10月25日 / 2025年10月25日； 1 day
#3)注射用盐酸吉西他滨(注射用盐酸吉西他滨) 冻干粉；给药方案 #2	1800 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2025年11月14日 / 2025年11月14日； 1 day
#3)注射用盐酸吉西他滨(注射用盐酸吉西他滨) 冻干粉；给药方案 #3	1800 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2025年12月05日 / 2025年12月05日； 1 day
#3)注射用盐酸吉西他滨(注射用盐酸吉西他滨) 冻干粉；给药方案 #4	1800 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2025年12月26日 / 2025年12月26日； 1 day
#3)注射用盐酸吉西他滨(注射用盐酸吉西他滨) 冻干粉；给药方案 #5	1800 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2026年01月22日 / 2026年01月22日； 1 day
#3)注射用盐酸吉西他滨(注射用盐酸吉西他滨) 冻干粉；给药方案 #6	1800 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2026年02月10日 / 2026年02月10日； 1 day
#3)注射用盐酸吉西他滨(注射用盐酸吉西他滨) 冻干粉；给药方案 #7	1800 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2026年03月06日 / 2026年03月06日； 1 day
#3)注射用盐酸吉西他滨(注射用盐酸吉西他滨) 冻干粉；给药方案 #8	1800 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2026年03月24日 / 2026年03月24日； 1 day
#4)利妥昔单抗注射液(利妥昔单抗注射液) 注射剂；给药方案 #1	670 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2025年10月24日 / 2025年10月24日； 1 day
#4)利妥昔单抗注射液(利妥昔单抗注射液) 注射剂；给药方案 #2	700 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤（弥漫性大B细胞淋巴瘤）	2025年11月13日 / 2025年11月13日； 1 day

附加信息

#4)利妥昔单抗注射液(利妥昔单抗注射液) 注射剂；给药方案 #3	注	700 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤 (弥漫性大B 细胞淋巴瘤)	2025年12月04日 / 2025年12月04日; 1 day
#4)利妥昔单抗注射液(利妥昔单抗注射液) 注射剂；给药方案 #4	注	700 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤 (弥漫性大B 细胞淋巴瘤)	2025年12月25日 / 2025年12月25日; 1 day
#4)利妥昔单抗注射液(利妥昔单抗注射液) 注射剂；给药方案 #5	注	700 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤 (弥漫性大B 细胞淋巴瘤)	2026年01月21日 / 2026年01月21日; 1 day
#4)利妥昔单抗注射液(利妥昔单抗注射液) 注射剂；给药方案 #6	注	700 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤 (弥漫性大B 细胞淋巴瘤)	2026年02月09日 / 2026年02月09日; 1 day
#4)利妥昔单抗注射液(利妥昔单抗注射液) 注射剂；给药方案 #7	注	700 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤 (弥漫性大B 细胞淋巴瘤)	2026年03月05日 / 2026年03月05日; 1 day
#4)利妥昔单抗注射液(利妥昔单抗注射液) 注射剂；给药方案 #8	注	700 mg, 每3周1次 静脉滴注	弥漫大B细胞淋巴瘤 (弥漫性大B 细胞淋巴瘤)	2026年03月23日 / 2026年03月23日; 1 day

22. 合并药物和给药日期 (续)
- #6) 阿昔洛韦片 (阿昔洛韦片) 不明 / 继续
 - #7) 复方磺胺甲噁唑片 (复方磺胺甲噁唑片) 不明 / 继续
 - #8) 弥可保 (甲钴胺片) 不明 / 继续