






a
Estimate=0.21 ± 0.09 P=0.02 *
43
48
Seed Weight (log)
10
0
Weak
Strong



b
40
48
Fruit size (log)
6
4
2
0
−2
Weak
Strong



c
14
5
Oil content %
100
50
0
Weak
Stong



d
Proportion (Dispersal mode)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
22
12
13
23
8
15
Abiotic
Biotic
Both


e
Proportion (Seed dormancy)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
13
11
27
34
No dormancy
Dormancy


f
Wind vs. animal: Estimate = 1.72 ± 0.72 P=0.02 *
Proportion (Pollination mode)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
14
3
11
20
2
2
Animals
Wind
Both


g
Proportion (Reproductive type)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
12
5
22
40
8
2
Dioecious
Monoecious
Polygamous


h
Proportion (Drought tolerance)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
12
17
11
12
14
13
High
Low
Moderate


i
Leaf longevity (year)
4
3
2
1
0
−1
7
9
Weak
Stong


Weak
Strong
Weak
Stong
Weak
Strong
Weak
Stong