

极限运算准则

高等数学 I-计算机系外招

Weiwen Wang(王伟文)

暨南大学

2026 年秋季学期



[课程网页](#)

常数和基本初等函数的导数公式

- $(C)' = 0$

- $(\sin x)' = \cos x$

- $(a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$

- $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1)$

- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

- $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

- $(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$

- $(\cos x)' = -\sin x$

- $(e^x)' = e^x$

- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

- $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

定理 1 (函数的和、差、积、商的求导法则)

如果函数 $u = u(x)$ 及 $v = v(x)$ 都在点 x 具有导数, 那么它们的和、差、积、商 (除分母为零的点外) 都在点 x 具有导数, 且

- $[u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x);$
- $[u(x) \cdot v(x)]' = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x);$
- $\left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}.$

运算	口诀	公式
加法 ($u + v$)	和的导数等于导数的和	$(u + v)' = u' + v'$
减法 ($u - v$)	差的导数等于导数的差	$(u - v)' = u' - v'$
乘法 ($u \cdot v$)	前导后不导 + 后导前不导	$(u \cdot v)' = u'v + uv'$
除法 ($\frac{u}{v}$)	母平方，子导母不导 减 母导子不导	$(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

随堂练习

(1) $y = 2x^3 - 3x^2 + 7x + 5$, 求 y' 及 $y'|_{x=1}$.

(2) $f(x) = x^2 \cos x$, 求 $f'(x)$ 及 $f'(\frac{\pi}{2})$.

(3) 求曲线 $y = \frac{e^x}{x+1}$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线.

(1) $y = 2x^3 - 3x^2 + 7x + 5$, 求 y' 及 $y'|_{x=1}$.

解 $y' = (2x^3)' - (3x^2)' + (7x)' + (5)' = 6x^2 - 6x + 7$

$$y'|_{x=1} = 6 \cdot 1^2 - 6 \cdot 1 + 7 = 7$$

(1) $y = 2x^3 - 3x^2 + 7x + 5$, 求 y' 及 $y'|_{x=1}$.

解 $y' = (2x^3)' - (3x^2)' + (7x)' + (5)' = 6x^2 - 6x + 7$

$$y'|_{x=1} = 6 \cdot 1^2 - 6 \cdot 1 + 7 = 7$$

(2) $f(x) = x^2 \cos x$, 求 $f'(x)$ 及 $f'(\frac{\pi}{2})$.

解

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2 \cos x)' = (x^2)' \cdot \cos x + x^2 (\cos x)' \\ &= 2x \cos x - x^2 \sin x. \end{aligned}$$

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cdot \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \sin \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi^2}{4}$$

(3) 求曲线 $y = \frac{e^x}{x+1}$ 在点 $(0,1)$ 处的切线.

解

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{e^x}{x+1} \right)' = \frac{(e^x)'(x+1) - e^x(x+1)'}{(x+1)^2} \\ &= \frac{xe^x}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

(3) 求曲线 $y = \frac{e^x}{x+1}$ 在点 $(0,1)$ 处的切线.

解

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{e^x}{x+1} \right)' = \frac{(e^x)'(x+1) - e^x(x+1)'}{(x+1)^2} \\ &= \frac{xe^x}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

函数 y 在 $x=0$ 处的导数 $y'|_{x=0} = 0$.

(3) 求曲线 $y = \frac{e^x}{x+1}$ 在点 $(0,1)$ 处的切线.

解

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{e^x}{x+1} \right)' = \frac{(e^x)'(x+1) - e^x(x+1)'}{(x+1)^2} \\ &= \frac{xe^x}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

函数 y 在 $x=0$ 处的导数 $y'|_{x=0} = 0$.

由导数的几何意义知所求切线斜率 $k = y'|_{x=0} = 0$, 相应的切线方程

$$y - 1 = 0 \cdot (x - 0),$$

即 $y = 1$.

定理 3 (复合函数求导法则)

如果 $u = g(x)$ 在点 x 处可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$ 可导, 那么复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 可导, 且其导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x) \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

定理 3 (复合函数求导法则)

如果 $u = g(x)$ 在点 x 处可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$ 可导, 那么复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 可导, 且其导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x) \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

- $\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x) = \frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
- “外导不变里, 乘以内导再”

例

设 $y = \sin x^3$, 求 $\frac{dy}{dx}$

例

设 $y = \sin x^3$, 求 $\frac{dy}{dx}$

$$y = \sin x^3$$

例

设 $y = \sin x^3$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解 令 $u = g(x) = x^3$, 则 $y = f(u) = \sin u$.

例

设 $y = \sin x^3$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解 令 $u = g(x) = x^3$, 则 $y = f(u) = \sin u$. 由复合函数求导公式

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \cos u \cdot 3x^2 = 3x^2 \cos x^3$$

例

设 $y = e^{x^2+1}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

例

设 $y = e^{x^2+1}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

$$y = e^{x^2+1}$$

例

设 $y = e^{x^2+1}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解 令 $u = x^2 + 1$, 则 $y = e^u$. 由复合函数求导公式

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = e^u \cdot (2x) = 2xe^{x^2+1}.$$

例

设 $y = \sin x^3$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解 令 $u = g(x) = x^3$, 则 $y = f(u) = \sin u$.

例

设 $y = \sin x^3$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解 令 $u = g(x) = x^3$, 则 $y = f(u) = \sin u$. 由复合函数求导公式

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \cos u \cdot 3x^2 = 3x^2 \cos x^3$$

$$\frac{dy}{dx} = (\sin x^3)' = \cos x^3 \cdot (x^3)' = \cos x^3 \cdot 3x^2$$

例

设 $y = e^{x^2+1}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解 令 $u = x^2 + 1$, 则 $y = e^u$. 由复合函数求导公式

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = e^u \cdot (2x) = 2xe^{x^2+1}.$$

$$\frac{dy}{dx} = \left(e^{x^2+1}\right)' = e^{x^2+1} \cdot (x^2 + 1)' = e^{x^2+1} \cdot 2x.$$

随堂练习

- (1) 设 $y = e^{\sin x} \cdot \cos 2x$, 求 $\frac{dy}{dx}$.
- (2) 设 $y = \ln(2x + 1)$, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$
- (3) 设 $y = \sqrt{x^2 + 1}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

随堂练习

(1) 设 $y = e^{\sin x} \cdot \cos 2x$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解

$$\frac{dy}{dx} = \left(e^{\sin x}\right)' \cos 2x + e^{\sin x} \cdot (\cos 2x)'$$

随堂练习

(1) 设 $y = e^{\sin x} \cdot \cos 2x$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \left(e^{\sin x}\right)' \cos 2x + e^{\sin x} \cdot (\cos 2x)' \\ &= e^{\sin x} (\sin x)' \cos 2x + e^{\sin x} \cdot (-\sin 2x) \cdot (2x)'\end{aligned}$$

随堂练习

(1) 设 $y = e^{\sin x} \cdot \cos 2x$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \left(e^{\sin x}\right)' \cos 2x + e^{\sin x} \cdot (\cos 2x)' \\ &= e^{\sin x} (\sin x)' \cos 2x + e^{\sin x} \cdot (-\sin 2x) \cdot (2x)' \\ &= e^{\sin x} \cos x \cos 2x - 2e^{\sin x} \sin 2x\end{aligned}$$

随堂练习

(2) 设 $y = \ln(2x + 1)$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$

解

$$\frac{dy}{dx} = [\ln(2x + 1)]' = \frac{1}{2x + 1} (2x + 1)' = \frac{2}{2x + 1}$$

随堂练习

(3) 设 $y = \sqrt{x^2 + 1}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解

$$\frac{dy}{dx} = \left[(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} \right]' = \frac{1}{2}(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}-1} \cdot (x^2 + 1)'$$

随堂练习

(3) 设 $y = \sqrt{x^2 + 1}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \left[(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} \right]' = \frac{1}{2} (x^2 + 1)^{\frac{1}{2} - 1} \cdot (x^2 + 1)' \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \cdot 2x \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\end{aligned}$$

作业

- 教材习题 2-2: $2(1)(5)(7); 3(3); 6(1)(3)(5); 8(3); 10; 11(5)$