



微积分I-中值定理及导数的应用

3学分、经管类外招

数学系王伟文



课程网页二维码




第一节 中值定理

罗尔中值定理 若函数 $f(x)$ 满足以下3个条件：

- a. 在闭区间 $[a, b]$ 上连续；
- b. 在开区间 (a, b) 上可导；
- c. 在区间的两个端点函数值相等，即 $f(a) = f(b)$ ；

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，满足 $f'(\xi) = 0$

如果连续光滑曲线 $y = f(x)$ 在点 A 、 B 处的纵坐标相等，那么在弧 \widehat{AB} 上至少有一点 $C(\xi, f(\xi))$ ，曲线在 C 点的切线平行于 x 轴



第一节 中值定理

拉格朗日中值定理 若函数 $f(x)$ 满足以下2个条件：

a. 在闭区间 $[a, b]$ 上连续；

b. 在开区间 (a, b) 上可导；

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，满足

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

或等价地

$$f(b) = f(a) + f'(\xi)(b - a)$$

- 在上述两个条件的基础上，若在区间的两个端点函数值相等，即 $f(a) = f(b)$ ，则有 $f'(\xi) = 0$ ，拉格朗日中值定理即为罗尔中值定理。

第一节 中值定理

拉格朗日中值定理的一个推论 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内任意一点的导数 $f'(x) = 0$ ，则函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内是一个常数

在区间内导数为0的函数，在这个区间上必然是一个常数

随堂练习

- 求下列函数是否满足罗尔定理的三个条件？

(1) $y = x^2, x \in [0, 1]$ 端点不等, No

(2) $y = \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2}}, x \in [0, 2]$ $x = 1$ 处不连续, No

(3) $y = x^2 - 5x + 6, x \in [2, 3]$ 连续、可导、端点相同, Yes

- 求出下列函数中满足拉格朗日中值定理的 ξ

(1) $y = f(x) = x^3 - x^2 + 2x, x \in [-1, 1]$

$$f'(\xi) = 3\xi^2 - 2\xi + 2 = \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = 3$$

$$\xi = 1(\text{舍弃}), \xi = -\frac{1}{3}$$

第二节 洛必达法则

洛必达法则是求这类未定式极限的一种重要方法

在函数商的极限中，如果分子分母同是无穷小或同是无穷大，那么极限可能存在，也可能不存在，这种极限称为**未定式**，记为

$$\frac{0}{0} \quad \text{及} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} \quad (n > 0)$$

第二节 洛必达法则

设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足条件:

(1) $\lim_{x \rightarrow P} f(x) = \lim_{x \rightarrow P} g(x) = 0$ 或 $\lim_{x \rightarrow P} f(x) = \lim_{x \rightarrow P} g(x) = \infty$

(2) 在 $x \rightarrow P$ 的某个邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$

(3) $\lim_{x \rightarrow P} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (或 ∞)

则必有

$$\lim_{x \rightarrow P} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow P} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \text{ (或 } \infty \text{)}$$

- 洛必达法则表明, 若满足洛必达法则的使用条件, 求极限 $\lim_{x \rightarrow P} \frac{f(x)}{g(x)}$ 可以等价与求极限 $\lim_{x \rightarrow P} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

第二节 洛必达法则

课本例1 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$

解：

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^4 - 16)'}{(x - 2)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x^3}{1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} 4x^3 \\ &= 4 \cdot 2^3 = 32\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^4 - 16) = \lim_{x \rightarrow 2} (x - 2) = 0$$

$f(x) = x^4 - 16$ 和 $g(x) = x - 2$
均可导

且 $g'(x) = 1$ 在 $x = 2$ 的某个
空心邻域内不等于 0

故符合洛必达法则的使用条件

第二节 洛必达法则

课本例10 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$

解:

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(x^2)'}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(2x)'}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2}$$

$$= +\infty$$

再次符合洛必达
法则的使用条件

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

$f(x) = e^x$ 和 $g(x) = x^2$ 均可导

且 $g'(x) = 2x$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 的过程中不等于0

故符合洛必达法则的使用条件

只要满足洛必达法则的使用条件都可以使用洛必达法则

第二节 洛必达法则

例 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \cos x}{x}$

$\frac{\infty}{\infty}$


解:

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x + \cos x)'}{(x)'}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \sin x}{1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \sin x)$$

此极限不存在，不符合洛必达法则使用条件



解: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \cos x \right) = 1$

第二节 洛必达法则

洛必达法则不是无所不能

- 若不是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 的未定式，不能使用洛必达法则化简极限

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{6x - 2}$$

- 当 $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不是常数 A 且不为 ∞ 时，不能断言 $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 不存在，只能说明使用洛必达法则失效，需要使用其他的解决方法

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \cos x}{x}$$

随堂练习

- 使用洛必达法则求极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x - \cos a}{x - a}$$

$$-\sin a$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$$

$$2$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\ln x}$$

$$2$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

$$\frac{1}{6}$$

第三节 使用洛必达法则求其他类型的未定式

$$0 \cdot \infty \quad \infty - \infty \quad 0^0 \quad 1^\infty \quad \infty^0$$

转化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的未定式求解

第三节 使用洛必达法则求其他类型的未定式

课本例11 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot (1 - \cos \frac{1}{x})$

$(\infty \cdot 0)$

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}}$ $\frac{0}{0}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1 - \cos \frac{1}{x})'}{(\frac{1}{x^2})'}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}}{-\frac{2}{x^3}} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{2}$$

第三节 使用洛必达法则求其他类型的未定式

例 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right]$ $(\infty - \infty)$

解： 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \cdot \ln(1+x)}$

= $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \cdot x}$ 等价无穷小替换 $\frac{0}{0}$

= $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{x+1}}{2x}$

= $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(2x+1)} = \frac{1}{2}$

第三节 使用洛必达法则求其他类型的未定式

例 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ (0^0)

解: 原式 $= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln x^x]}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln x^x] = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \quad 0 \cdot \infty$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)'}{(\frac{1}{x})'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = 0$$

$$\text{故原式} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln x^x]} = e^0 = 1$$

第三节 使用洛必达法则求其他类型的未定式

课本例13 求 $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$ (1^∞)

解： 原式 = $e^{\lim_{x \rightarrow 1} [\ln x^{\frac{1}{1-x}}]}$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} [\ln x^{\frac{1}{1-x}}] &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} \ln x \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1-x} \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)'}{(1-x)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{-1} = \lim_{x \rightarrow 1} -\frac{1}{x} = -1\end{aligned}$$

故原式 = $e^{\lim_{x \rightarrow 1} [\ln x^{\frac{1}{1-x}}]} = e^{-1}$

$$f(x) = e^{\ln f(x)}$$

e^x 为连续函数

$$\begin{aligned}\lim f(x) &= \lim e^{\ln f(x)} \\ &= e^{\lim [\ln f(x)]}\end{aligned}$$

要求 $\lim f(x)$ ，先求 $\lim [\ln f(x)]$

第三节 使用洛必达法则求其他类型的未定式

例 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + e^x)^{\frac{1}{x}}$ ∞^0

解: 原式 = $e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(1+e^x)^{\frac{1}{x}}]}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(1+e^x)^{\frac{1}{x}}] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[\ln(1+e^x)]'}{x'}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1+e^x} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(1+e^x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x} = 1$$

$$\text{故原式} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(1+e^x)^{\frac{1}{x}}]} = e^1 = e$$

第三节 使用洛必达法则求其他类型的未定式

转化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的未定式求解

$$\begin{array}{lcl} 0 \cdot \infty & \longrightarrow & \frac{1}{\infty} \cdot \infty \longrightarrow \frac{\infty}{\infty} \\ & \searrow & \\ & & 0 / \frac{1}{0} \longrightarrow \frac{0}{0} \end{array}$$

$$\infty - \infty \longrightarrow \frac{1}{0} - \frac{1}{0} \longrightarrow \frac{0 - 0}{0}$$

第三节 使用洛必达法则求其他类型的未定式

转化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的未定式求解

$$\left. \begin{array}{l} 0^0 \\ 1^\infty \\ \infty^0 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{取对数}} \left\{ \begin{array}{l} 0 \cdot \ln 0 \\ \infty \cdot \ln 1 \\ 0 \cdot \ln \infty \end{array} \right. \Rightarrow 0 \cdot \infty.$$

随堂练习

- 使用洛必达法则求极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$$

0

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$$

$\frac{1}{2}$