

2004.1 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)x}{nx^2+1}$, 则 $f(x)$ 的间断点为 $x =$

2004.2 设函数 $y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = t^3 - 3t + 1 \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 向上凸的 x 的取值范围为

2004.3 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} =$

2004.4 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = e^{2x-3z} + 2y$ 确定, 则 $3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$

2004.5 微分方程 $(y + x^3) dx - 2x dy = 0$ 满足 $y|_{x=1} = \frac{6}{5}$ 的特解为

2004.6 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵, 则 $|B| =$

2004.7 把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos(t^2) dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^3) dt$ 排列起来, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列次序是 ()。

(A) α, β, γ . (B) α, γ, β . (C) β, α, γ . (D) β, γ, α .

2004.8 设 $f(x) = |x(1-x)|$ ，则 ()。

- (A) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点，但 $(0, 0)$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- (B) $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，但 $(0, 0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- (C) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点，且 $(0, 0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- (D) $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点， $(0, 0)$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

2004.9 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2}$ 等于 ()。

(A) $\int_1^2 \ln^2 x \, dx$. (B) $2 \int_1^2 \ln x \, dx$. (C) $2 \int_1^2 \ln(1+x) \, dx$. (D) $\int_1^2 \ln^2(1+x) \, dx$.

2004.10 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 ()。

(A) $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调增加.

(B) $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调减少.

(C) 对任意的 $x \in (0, \delta)$, 有 $f(x) > f(0)$.

(D) 对任意的 $x \in (-\delta, 0)$, 有 $f(x) > f(0)$.

2004.11 微分方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为 ()。

(A) $y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x)$.

(B) $y^* = x(ax^2 + bx + c + A \sin x + B \cos x)$.

(C) $y^* = ax^2 + bx + c + A \sin x$.

(D) $y^* = ax^2 + bx + c + A \cos x$.

2004.12 设函数 $f(u)$ 连续, 区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 则 $\iint_D f(xy) \, dx dy$ 等于 ()。

(A) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(xy) \, dy.$

(B) $2 \int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) \, dx.$

(C) $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) \, dr.$

(D) $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) r \, dr.$

2004.13 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B , 再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C , 则满足 $AQ = C$ 的可逆矩阵 Q 为 ()。

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2004.14 设 A, B 为满足 $AB = O$ 的任意两个非零矩阵, 则必有 ()。

- (A) A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关.
- (B) A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.
- (C) A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关.
- (D) A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.

2004.15 （本题满分 10 分）求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right]$ 。

2004.16 (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 在区间 $[0, 2]$ 上, $f(x) = x(x^2 - 4)$, 若对任意的 x 都满足 $f(x) = kf(x+2)$, 其中 k 为常数。

() 写出 $f(x)$ 在 $[-2, 0]$ 上的表达式;

() 问 k 为何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导。

2004.17 （本题满分 11 分）设 $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| \, dt$,

（ ）证明 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数；

（ ）求 $f(x)$ 的值域。

2004.18 (本题满分 12 分) 曲线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 与直线 $x = 0$, $x = t$ ($t > 0$) 及 $y = 0$ 围成一曲边梯形。该曲边梯形绕 x 轴旋转一周得一旋转体, 其体积为 $V(t)$, 侧面积为 $S(t)$, 在 $x = t$ 处的底面积为 $F(t)$ 。

() 求 $\frac{S(t)}{V(t)}$ 的值;

() 计算极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{S(t)}{F(t)}$ 。

2004.19 （本题满分 12 分）设 $e < a < b < e^2$ ，证明 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a)$ 。

2004.20 （本题满分 11 分）某种飞机在机场降落时，为了减少滑行距离，在触地的瞬间，飞机尾部张开减速伞，以增大阻力，使飞机迅速减速并停下。现有一质量为 9000 kg 的飞机，着陆时的水平速度为 700 km/h 。经测试，减速伞打开后，飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比（比例系数为 $k = 6.0 \times 10^6$ ）。问从着陆点算起，飞机滑行的最长距离是多少？注： kg 表示千克， km/h 表示千米/小时。

2004.21 （本题满分 10 分）设 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$ ，其中 f 具有连续二阶偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

2004.22 （本题满分 9 分）设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 + (3+a)x_3 + 3x_4 = 0, \\ 4x_1 + 4x_2 + 4x_3 + (4+a)x_4 = 0, \end{cases}$$

试问 a 取何值时，该方程组有非零解，并求出其通解。

2004.23 （本题满分 9 分）设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根，求 a 的值，并讨论 A 是否可相似对角化。