

2003.1 原卷一 (1)

若 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - ax^2)^{\frac{1}{4}} - 1$ 与 $x \sin x$ 是等价无穷小, 则 $a =$ _____。

2003.2 原卷一 (2)

设函数 $y = f(x)$ 由方程 $xy + 2\ln x = y^4$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程是_____。

2003.3 原卷一 (3)

$y = 2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数是_____。

2003.4 原卷一 (4)

设曲线的极坐标方程为 $\rho = e^{a\theta}$ ($a > 0$)，则该曲线上相应于 θ 从 0 变到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形的面积为_____。

2003.5 原卷一 (5)

设 α 为 3 维列向量, α^{T} 是 α 的转置, 若 $\alpha\alpha^{\text{T}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha^{\text{T}}\alpha =$ _____。

2003.6 原卷一 (6)

设 3 阶方阵 A, B 满足 $A^2B - A - B = E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $|B| =$ _____。

2003.7 原卷二 (1)

设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则必有 ()。

(A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立. (B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立. (C) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$ 不存在. (D) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在.

2003.8 原卷二 (2)

设 $a_n = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{n}{n+1}} x^{n-1} \sqrt{1+x^n} dx$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$ 等于 ()。

(A) $(1+e)^{\frac{3}{2}} + 1$. (B) $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} - 1$. (C) $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} + 1$. (D) $(1+e)^{\frac{3}{2}} - 1$.


2003.9 原卷二 (3)

已知 $y = \frac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \varphi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的解, 则 $\varphi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的表达式为 ()。

- (A) $-\frac{y^2}{x^2}$. (B) $\frac{y^2}{x^2}$. (C) $-\frac{x^2}{y^2}$. (D) $\frac{x^2}{y^2}$.

2003.10 原卷二 (4)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 $f(x)$ 有 ()。



(A) 一个极小值点和两个极大值点. (B) 两个极小值点和一个极大值点. (C) 两个极小值点和两个极大值点. (D) 三个极小值点和一个极大值点.

2003.11 原卷二 (5)

设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则 ()。

(A) $I_1 > I_2 > 1$. (B) $1 > I_1 > I_2$. (C) $I_2 > I_1 > 1$. (D) $1 > I_2 > I_1$.

2003.12 原卷二 (6)

设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则 ()。

(A) 当 $r < s$ 时, 向量组 II 必线性相关. (B) 当 $r > s$ 时, 向量组 II 必线性相关. (C) 当 $r < s$ 时, 向量组 I 必线性相关. (D) 当 $r > s$ 时, 向量组 I 必线性相关.

2003.13 原卷三

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}, & x < 0, \\ 6, & x = 0, \\ \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}}, & x > 0, \end{cases}$ 问 a 为何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续; a 为何值时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点?

2003.14 原卷四

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1 + 2t^2, \\ y = \int_1^{1+2\ln t} \frac{e^u}{u} du, \end{cases} \quad (t > 1)$ 所确定, 求 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=9}$ 。

2003.15 原卷五

计算不定积分 $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx$ 。

2003.16 原卷六

设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $y' \neq 0$, $x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数。

(1) 试将 $x = x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy}\right)^3 = 0$ 变换为 $y = y(x)$ 满足的微分方程;

(2) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0) = 0$, $y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解。

2003.17 原卷七

讨论曲线 $y = 4 \ln x + k$ 与 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数。

2003.18 原卷八


设位于第一象限的曲线 $y = f(x)$ 过点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的法线与 y 轴的交点为 Q , 且线段 PQ 被 x 轴平分。

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 的方程;

(2) 已知曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的弧长为 l , 试用 l 表示曲线 $y = f(x)$ 的弧长 s 。

2003.19 原卷九

有一平底容器，其内侧壁是由曲线 $x = \varphi(y)$ ($y \geq 0$) 绕 y 轴旋转而成的旋转曲面（如图），容器的底面圆的半径为 2m 。根据设计要求，当以 $3\text{m}^3/\text{min}$ 的速率向容器内注入液体时，液面的面积将以 $\pi\text{m}^2/\text{min}$ 的速率均匀扩大（假设注入液体前，容器内无液体）。



(1) 根据 t 时刻液面的面积，写出 t 与 $\varphi(y)$ 之间的关系式；

(2) 求曲线 $x = \varphi(y)$ 的方程。

（注： m 表示长度单位米， min 表示时间单位分。）

2003.20 原卷十

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$ 。若极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x - a)}{x - a}$ 存在, 证明:

(1) 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

(2) 在 (a, b) 内存在点 ξ , 使 $\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) \, dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$;

(3) 在 (a, b) 内存在与 (2) 中 ξ 相异的点 η , 使 $f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) \, dx$ 。

2003.21 原卷十一

若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 相似于对角矩阵 Λ ，试确定常数 a 的值；并求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

2003.22 原卷十二

已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$l_1 : ax + 2by + 3c = 0,$$

$$l_2 : bx + 2cy + 3a = 0,$$

$$l_3 : cx + 2ay + 3b = 0.$$

试证：这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$ 。