

# AREAFORMEL FÖR REGELBUNDEN FEMHÖRNING – ETT ELEMENTÄRT BEVIS

WANMIN LIU  
[wanminliu@gmail.com](mailto:wanminliu@gmail.com)

8 februari 2025


## Abstract

Vi presenterar ett elementärt bevis för formeln för arean av en likbent triangel med en basvinkel på 54 grader. Beviset leder också till en formel för arean av en regelbunden femhörning med sidolängd  $a$ . Notera att vi inte har använt några trigonometriska funktioner i detta bevis.

**Nyckelord:** Pythagoras sats, area, likbent triangel, regelbunden femhörning.

## 1 PROBLEM: AREAN AV EN LIKBENT TRIANGEL MED EN BASVINKEL PÅ 54 GRADER

**Exempel 1.1.** I triangeln  $\triangle ABC$  är sidorna  $AC$  och  $BC$  lika långa.  $AB$  längd är 4,5 cm. Vinkeln  $B$  är 54 grader. Beräkna triangelns area.



Detta problem förekommer inom matematik för årskurs 9 i Sverige. Enligt *Kursplan i Matematik* [1] och det centrala innehållet för årskurs 7–9 kan vi inte använda trigonometriska funktioner, eftersom dessa inte behandlas i kursen. Vi presenterar därför ett elementärt bevis för formeln för arean av en likbent triangel. Beviset bygger på tre viktiga egenskaper:

- En likbent triangel har lika stora basvinklar.
- Likformighet: Förhållandet mellan motsvarande sidor i likformiga trianglar är lika.
- Pythagoras sats.

## 2 FÖRESLAGEN LÖSNING

### Steg 1. Två grundläggande egenskaper hos likbenta trianglar

Vi börjar med att granska två grundläggande egenskaper hos likbenta trianglar. För att tydligt representera längder använder vi symbolen  $|AC|$  för längden av linjesegmentet  $AC$ .

**Lemma 2.1.** För en likbent triangel  $\triangle ABC$  där  $|AC| = |BC|$  gäller att  $\angle BAC = \angle ABC$ .

**Lemma 2.2.** Om en vinkelrät linje dras från  $C$  till  $AB$ , med skärningspunkten  $D$ , så är  $CD$  bisektrisen av vinkeln  $\angle ACB$ . Det vill säga, vinkeln  $\angle ACD$  är lika med vinkeln  $\angle DCB$ .

I det här exemplet vet vi att  $\angle ABC = \angle BAC = 54^\circ$  och  $\angle ACB = 180^\circ - 2 \cdot 54^\circ = 72^\circ$ . Enligt Lemma 2.2 kan vi därför dra slutsatsen att vinkeln  $\angle ACD = 36^\circ$ .

Vi vet också att:


$$|AD| = \frac{1}{2}|AB| = \frac{9}{4} \quad (\text{cm}).$$

Arean av  $\triangle ABC$  ges av:

$$\triangle ABC = |AD| \cdot |DC| \quad (\text{cm}^2).$$

### Steg 2. Konstruktion av tre likbenta trianglar

Vi förlänger linjesegmentet  $CD$  till  $E$  så att  $|CA| = |CE|$ . På så sätt bildas en likbent triangel  $\triangle ACE$ . Med hjälp av Lemma 2.1 och det faktum att vinkeln  $\angle ACE = 36^\circ$ , får vi att  $\angle AEC = \angle EAC = 72^\circ$ .




Vi utelämnar enheten "cm" för enkelhetens skull och betecknar  $x := |AC|$  och  $y := |AE|$ . Eftersom vinkeln  $\angle AEC$  är större än vinkeln  $\angle ACE$ , gäller:

$$x > y. \quad (2.1)$$

Låt punkten  $F$  ligga på linjen  $CD$  så att  $|DE| = |DF|$ . Då är triangeln  $\triangle EAF$  också en likbent triangel med  $y = |AE| = |AF|$ . Genom att återigen använda Lemma 2.1 får vi att  $\angle AFE = \angle AEF = 72^\circ$ .

Eftersom  $\angle FAC + \angle FCA = \angle AFE$ , har vi:

$$\angle FAC = \angle AFE - \angle FCA = 72^\circ - 36^\circ = 36^\circ.$$



Därför är triangeln  $\triangle AFC$  också en likbent triangel, och sidolängden  $|CF|$  är lika med  $|AF|$ , det vill säga  $|CF| = |AF| = y$ .

**Steg 3. Likformighet** Två trianglar är likformiga om två vinklar i den ena triangeln är lika stora som två vinklar i den andra triangeln. Vi kan konstatera att triangelarna  $\triangle ACE$  och  $\triangle EAF$  är likformiga. Därför gäller att förhållandet mellan motsvarande sidor är lika:

$$\frac{|CA|}{|AE|} = \frac{|AE|}{|EF|}.$$

Vi utelämnar enheten "cm" och skriver  $|EF| = |CE| - |CF| = x - y$ . Därmed får vi

$$\frac{x}{y} = \frac{y}{x - y}. \quad (2.2)$$

#### Steg 4. Pythagoras sats

För den rätvinkliga triangeln  $\triangle ADC$  använder vi Pythagoras sats, vilket ger:

$$|AC|^2 = |AD|^2 + |DC|^2.$$

Vi beräknar längden av  $|DC|$ :  $|DC| = |CF| + |FD| = |CF| + \frac{1}{2}|EF| = y + \frac{x-y}{2} = \frac{x+y}{2}$ .

Beteckna längden av  $AB$  med  $a$  (cm). Då är  $|AD| = \frac{a}{2}$ .

Genom att sätta in dessa värden i Pythagoras sats får vi följande formel:

$$x^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{x+y}{2}\right)^2. \quad (2.3)$$

#### Steg 5. Beräkningen

Vi beräknar arean av  $\triangle ABC$  enligt följande:

$$\text{Arean av } \triangle ABC = |AD| \cdot |CD| = \frac{a}{2} \cdot \frac{x+y}{2}, \quad (2.4)$$

med hjälp av ekvationerna (2.2) och (2.3).

Från ekvationen (2.2) får vi:

$$x^2 = xy + y^2.$$

Beteckna  $x = \phi y$  för ett tal  $\phi$ . Då får vi ekvationen

$$\phi^2 y^2 = \phi y^2 + y^2.$$

Eftersom  $y \neq 0$ , kan vi förenkla detta till:

$$\phi^2 = \phi + 1. \quad (2.5)$$

Kom ihåg relationen i (2.1), vilket ger att  $\phi > 1$ . Vi löser denna andragradsekvation och får:

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}. \quad (2.6)$$

Från ekvationen (2.3) får vi:

$$4x^2 = a^2 + (x + y)^2.$$

Sätt in relationen  $x = \phi y$  i ekvationen ovan. Vi får

$$4\phi^2 y^2 = a^2 + (1 + \phi)^2 y^2 = a^2 + \phi^4 y^2, \quad (2.7)$$

där vi använder relationen (2.5) i den sista ekvationen.

För att lösa för  $y$  har vi

$$(4\phi^2 - \phi^4) y^2 = a^2,$$

vilket ger

$$\phi^2(4 - \phi^2) y^2 = a^2.$$

Genom att använda ekvationen (2.5) får vi att  $4 - \phi^2 = 4 - (1 + \phi) = 3 - \phi$ . Så vi får

$$y = \frac{a}{\phi\sqrt{3 - \phi}}.$$

Därför är arean av  $\triangle ABC$ :

$$\begin{aligned} \text{Arean av } \triangle ABC &= |AD| \cdot |CD| = \frac{a}{2} \cdot \frac{x + y}{2} = \frac{a}{2} \cdot \frac{(1 + \phi)y}{2} \\ &= \frac{a^2}{4} \frac{1 + \phi}{\phi\sqrt{3 - \phi}} = \frac{a^2}{4} \frac{\phi^2}{\phi\sqrt{3 - \phi}} \\ &= \frac{a^2}{4} \frac{\phi}{\sqrt{3 - \phi}}, \end{aligned} \quad (2.8)$$

där  $\phi$  ges av (2.6) och  $a = \frac{9}{2}$  cm.

**Lösning.** Arean av  $\triangle ABC$  är

$$\frac{81}{16} \frac{\phi}{\sqrt{3 - \phi}} \text{ cm}^2$$

där  $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ . □

**Kommentar 2.3.** Vi kan också göra följande beräkningar, men detta är inte nödvändigt eller viktigt. Beräkningen använder formlerna

$$\begin{aligned} (a + b)(a - b) &= a^2 - b^2, \\ (a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Arean av } \triangle ABC &= \frac{a^2}{4} \frac{\phi}{\sqrt{3-\phi}} = \frac{a^2}{4} \frac{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{3-\frac{1+\sqrt{5}}{2}}} \\
&= \frac{a^2}{4} \frac{1+\sqrt{5}}{\sqrt{12-2(1+\sqrt{5})}} \\
&= \frac{a^2}{4} \frac{(1+\sqrt{5})\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{\sqrt{(10-2\sqrt{5})(10+2\sqrt{5})}} \\
&= \frac{a^2}{4} \frac{(1+\sqrt{5})\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{\sqrt{(10^2-(2\sqrt{5})^2)}} \\
&= \frac{a^2}{4} \frac{\sqrt{(1+\sqrt{5})^2(10+2\sqrt{5})}}{\sqrt{80}} \\
&= \frac{a^2}{4} \frac{\sqrt{(6+2\sqrt{5})(10+2\sqrt{5})}}{\sqrt{80}} \\
&= \frac{a^2}{4} \sqrt{\frac{80+32\sqrt{5}}{80}} = \frac{a^2}{4} \sqrt{\frac{5+2\sqrt{5}}{5}} \\
&= \frac{a^2}{4} \frac{\sqrt{(5+2\sqrt{5})5}}{5} \\
&= \frac{a^2}{4} \frac{\sqrt{25+10\sqrt{5}}}{5}. \tag{2.9}
\end{aligned}$$

**Kommentar 2.4.** Om vi kan använda trigonometriska funktioner, så är

$$\tan(\angle DAC) = \frac{|DC|}{|AD|}, \quad \text{dvs} \quad |DC| = |AD| \tan(54^\circ). \tag{2.10}$$

Sedan har vi

$$\text{Arean av } \triangle ABC = |AD| \cdot |DC| = |AD|^2 \tan(54^\circ) = \frac{a^2}{4} \tan(54^\circ).$$

Ovanstående beräkning ger faktiskt

$$\tan(54^\circ) = \frac{\sqrt{25+10\sqrt{5}}}{5}. \tag{2.11}$$

Att beräkna  $\tan(54^\circ)$  i exakt form som i (2.11) är en standardövning i trigonometriska formler.


**Kommentar 2.5.** Ekvationen (2.5) kallas för den gyllene snittets ekvation, och lösningen  $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  kallas det gyllene snittet. Detta tal har många applikationer, till exempel för att beräkna Fibonaccis talföljd.

### 3 AREAFORMEL FÖR REGELBUNDEN FEMHÖRNING

**Sats 3.1.** Arean av en regelbunden femhörning med sidolängd  $a$  är

$$\text{Arean av } \triangle = \frac{a^2}{4} \sqrt{25+10\sqrt{5}}. \tag{3.1}$$

*Bevis.* Låt  $C$  vara mitten av den regelbundna femhörningen. Dra linjer från punkt  $C$  till varje hörn för att skapa fem identiska trianglar. Låt en av dessa trianglar ha basen  $AB$  som är en sida av femhörningen. Då är vinkeln  $\angle ACB = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$ . Vinklarna  $\angle CAB$  och  $\angle CBA$  är lika och har värdet  $(180^\circ - 72^\circ)/2 = 54^\circ$ . Vi får triangeln  $\triangle ABC$  som är precis som i Exempel 1.1. Genom ekvationerna (2.8) och (2.9) kan vi beräkna arean av triangeln  $\triangle ABC$ .



Därför ges arean av den regelbundna femhörningen av formeln

$$\text{Arean av } \diamond = 5 \cdot \text{Arean av } \triangle ABC = \frac{a^2}{4} \sqrt{25 + 10\sqrt{5}}. \quad \square$$

## REFERENCES

- [1] ‘Läroplan (Lgr22) för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet’. <https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr22-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet>.