

Efektivitas dan Keamanan Serum Kombinasi *Salicylic Acid* 2 % dan *Niacinamide* 2 % sebagai Terapi Adjuvan Akne Vulgaris Ringan dan Sedang pada *Ethnic Skin*

Arie Kusumawardani, Lilik Norawati, Sinta Murlistyarini, Slivia veronika, Alamanda Murasmita, Ervina Rosmawati

Abstrak

Latar Belakang: Akne vulgaris (AV) merupakan penyakit inflamasi kronik pada unit pilosebaceus kulit dengan penyebab multifaktorial, sehingga penanganannya menasar lebih dari satu mekanisme. *Salicylic acid* 2% bekerja sebagai keratolitik dan *niacinamide* 2% melengkapinya sebagai antiinflamasi dan pengendalian produksi sebum. Perpaduan *salicylic acid* 2% dan *niacinamide* 2% (SN2%) dalam serum bersifat sinergis, namun bukti klinis pada populasi dengan ragam warna kulit seperti penduduk Indonesia masih terbatas.

Metode: Penelitian ini merupakan *randomized-controlled trial single-blinded* yang dilaksanakan di tiga pusat dermatologi di Indonesia. Kelompok perlakuan menerima *adapalene* 0,1% pada malam hari disertai serum SN2% dua kali sehari, sedangkan kelompok kontrol hanya memperoleh *adapalene* 0,1% pada malam hari. Respons terapi dipantau pada hari ke-0, ke-14, dan ke-28 menggunakan Mexameter untuk menilai indeks melanin dan eritema, disertai skala *Global Acne Evaluation* (GAE), *Indonesian Acne Expert Meeting* (IAEM), *Clinical Erythema Assessment* (CEA), *Cardiff Acne Disability Index* (CADI), serta Acne-QoL-INA.

Hasil: Terdapat 102 subjek dengan AV yang terdiri atas 49 subjek pada kelompok perlakuan dan 53 subjek pada kelompok kontrol. Kelompok perlakuan maupun kontrol menunjukkan perbaikan yang bermakna pada indeks melanin ($p = 0,001$; $p = 0,001$), indeks eritema ($p = 0,004$; $p = 0,001$), skala GAE ($p = 0,001$; $p = 0,004$), CADI ($p = 0,001$; $p = 0,001$) dan Acne-QoL-INA ($p = 0,001$; $p = 0,001$). Sementara itu, perbaikan pada parameter skala IAEM ($p = 0,001$) dan CEA ($p = 0,001$) hanya diamati pada kelompok perlakuan dan tidak pada kelompok kontrol ($p = 0,275$; $0,221$). Pada penilaian hari ke-28, kelompok perlakuan menunjukkan hasil terapi yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol pada parameter skala indeks eritema ($p = 0,034$), skala GEA ($p = 0,001$), CEA ($p = 0,001$), CADI ($p = 0,001$) dan Acne-QoL ($p = 0,024$). Tidak efek samping yang diamati pada kedua kelompok.

Kesimpulan: Serum SN2% sebagai terapi adjuvan pada terapi *adapalene* memberikan manfaat tambahan, terutama penurunan eritema klinis, penurunan derajat keparahan dan perbaikan kualitas hidup dengan tolerabilitas baik.

Kata Kunci: Akne vulgaris, *Niacinamide*, Ragam warna kulit, *Salicylic acid*, Terapi adjuvant