

Numerieke Wiskunde

Joni Allaert
Ward Schodts

2013 - 2014





Professor Dr. ir. Marc Van Barel

1 Deel 1: Numerieke integratie

1.1 Vast Deelinterval

(a) Benadering van de integralen $\int_{-1}^1 e^x dx$ en $\int_{-5}^5 \frac{1}{1+x^2}$



$\int_{-1}^1 e^x dx$ met de trapeziumbenadering in het blauw en met de simpsonbenadering in het rood. $\int_{-5}^5 \frac{1}{1+x^2}$ met de trapeziumbenadering in het blauw en met de simpsonbenadering in het rood.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de benaderingen, hebben we in het geval van de exponentiële functie een loglog-plot genomen en voor de andere functie een semilogy-plot. Het doel was om de lijnen zo veel mogelijk te lineariseren. In het geval van de tweede functie was dit echter niet mogelijk.

(b) De waarden k in $O(h^k)$ voor de integratieregels

De fout die veroorzaakt wordt bij de trapeziumregel gedraagt zich als $O(h^2)$. De verklaring hiervoor is dat de integratiefout bij de trapeziumregel te schrijven is als



$$F_n = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f^{(2)}(\eta)$$

voor een $\eta \in (a, b)$. De fout gedraagt zich bijgevolg als $O(n^{-2})$. Wat hetzelfde is als $O(h^2)$, per definitie van h .

De fout veroorzaakt door de regel van Simpson gedraagt zich als $O(h^4)$. We kunnen immers de integratiefout bij de Simpsonregel schrijven als

$$F_n = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} f^{(4)}(\eta)$$

voor een $\eta \in (a, b)$. De fout gedraagt zich dan als $O(n^{-4})$. Dit is, per definitie van h , hetzelfde als $O(h^4)$.




$\int_{-1}^1 e^x dx$ het gedrag van de trapeziumbenadering met een blauwe stippellijn en het gedrag van de simpsonbenadering met een rode stippellijn. $\int_{-5}^5 \frac{1}{1+x^2}$ het gedrag van de trapeziumbenadering met een blauwe stippellijn en het gedrag van de simpsonbenadering met een rode stippellijn.

1.2 Adaptieve Routine

(b) Het probleem bij $\int_{-1}^1 \sin(2\pi x)^2 dx$

(c) Het probleem bij $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

(d) De uitvoeringstijd in functie van e




De uitvoeringstijden van trapezium, Simpson en quad in respectievelijke kleuren blauw, rood en geel

2 Deel 2: Kleinste kwadraten benadering van een functie

2.1 Veeltermbenadering in monomiaalbasis

(d) De fout $\|f - g\|$ in functie van de graad




We hebben hier gekozen voor een semilogy-plot, omdat op deze figuur de lijnen het meest recht liepen.

(e) Benaderings- of afbrekingsfout?


Het eerste, dalende deel is te wijten aan de benaderingsfouten. Dit stuk daalt, want als de graad stijgt kunnen we de functie steeds beter en beter benaderen. Vanaf een bepaald moment (hier bij een fout van 10^{-6}) nemen echter de afrondingsfouten de overhand en gaat de totale fout weer stijgen. Het stijgende tweede deel is dus te wijten aan afrondingsfouten.

(f) Convergentiesnelheid



De convergentiesnelheid gedraagt zich als $O(8^{-n})$ met n de graad van g .


(h) Perturbaties op A en b



Perturbaties op A(rood), b(blauw)

De groene lijn geeft aan waar 10^{-8} . We kunnen dus duidelijk zien dat op veelvoud na 10^{-8} zijn. Met andere woorden ze zijn van grootorde 10^{-8} .

(i) perturbatie op a



Perturbaties op a (geel) en tol vermenigvuldigd met het conditiegetal(groen) bijgevoegd