

El Método Kardex: Organización Segura de Medicamentos

El **Kardex** es una hoja de registro vital que indica qué medicamento debe tomar el paciente, la dosis exacta y el horario correspondiente. Es esencial para evitar errores médicos, especialmente cuando el cuidador principal se ausenta y otro familiar debe quedar a cargo.

CIRROSIS 360 | DR. JULIO SANTIAGO MARCELO

Reglas de Oro del Kardex

Visibilidad

Pegar la hoja en un lugar visible — sala, cuarto o refrigeradora — para que toda la familia conozca los horarios.

No duplicar dosis

Si el paciente olvidó una toma, **nunca compensar con dosis doble**. Solo continuar con la toma que corresponde en ese momento.

Respetar la receta

Administrar únicamente los medicamentos indicados por el médico. No omitir ni añadir pastillas por recomendaciones externas.

La Alerta Roja: Medicamentos Prohibidos

⊗ ⚠ **NO AINEs** — Esta frase debe estar escrita en grande y en rojo en la hoja del Kardex.

El paciente con cirrosis tiene **estrictamente prohibido** tomar analgésicos comunes como **ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco**. Tener esto anotado de forma visible puede salvar vidas si un cuidador sustituto intenta administrar un analgésico sin conocer el daño que puede causar al hígado.

CIRROSIS 360 | DR. JULIO SANTIAGO MARCELO



¿Cómo Llenar el Kardex Correctamente?



Teléfono de Emergencia

Anotar el número local (ej. **106 SAMU**) en la parte superior para traslados inmediatos.



El Registro

Completar: nombre del medicamento (Propranolol, Furosemida, Espironolactona, Lactulosa), dosis y horario exacto.



Medicamentos Temporales

Anotar duración y tachar los días conforme pasen para saber cuándo suspender (ej. hioscina por 5 días).



Próxima Cita

Registrar fechas de consultas (Gastroenterología, Nutrición) para que la familia no pierda los turnos médicos.

Recomendaciones Clave sobre los Horarios

Diuréticos

Furosemida y Espironolactona deben tomarse por la **mañana**. Al promover la eliminación de líquidos, tomarlos temprano evita que el paciente se levante durante la madrugada, permitiéndole descansar de corrido.

Propranolol - Carvedilol

Si la dosis es dividida, se recomienda que la **dosis mayor se tome por la noche**. Este medicamento reduce la frecuencia cardíaca, efecto que se acopla mejor cuando el cuerpo está relajado y descansando. Si se toma Carvedilol se debe vigilar que la presión arterial sea mayor o igual a 90/60

