

FRUTÍFERAS ORGÂNICAS

Multiplicação de Mudas

na prática — estaquia, alporque e enxertia



por **Washington Carlos Frade**

canal Frutíferas Orgânicas

Multiplicação de Mudas na Prática

Por Washington Carlos Frade — canal Frutíferas Orgânicas

Sobre este material



Uva carregada no pé: uma das frutíferas que enraízam com mais facilidade por estaquia

Este é o módulo imersivo de multiplicação do guia **Cultivo de Frutíferas Orgânicas em Vasos**. Aqui você aprende, passo a passo, a **fazer as suas próprias mudas** — e a nunca mais depender de comprar planta.

Quem domina a multiplicação muda de patamar: um único pé vira dez, você escolhe as melhores plantas para reproduzir, troca mudas com amigos e ainda pode vender o excedente.

Vamos ver os quatro caminhos — **estaquia, alporque, enxertia e sementes** — e, o mais importante, **qual usar em cada espécie e em cada situação**.

Por que multiplicar

- **Economia:** uma muda de frutífera custa de R\$ 30 a R\$ 200. Você faz de graça.
- **Qualidade:** você reproduz exatamente a planta que já sabe que produz bem.
- **Autonomia:** não fica preso ao que a loja tem no dia.
- **Renda extra:** mudas de qualidade vendem fácil em grupos e feiras locais.

O princípio que vale para todos os métodos: **reproduzir uma planta que já provou que dá fruto**. Não adianta multiplicar a planta bonita que nunca produziu nada.

As quatro formas de multiplicar

Método	O que é	Frutifica em	Dificuldade
Estaquia	Enraizar um galho cortado	1 a 3 anos	Fácil
Alporque	Enraizar um galho ainda na planta-mãe	1 a 2 anos	Média
Enxertia	Unir um ramo produtivo a um cavalo resistente	1 a 3 anos	Avançada
Semente	Plantar a semente do fruto	5 a 10 anos	Fácil (mas lenta)

Regra prática: para a maioria das frutíferas de vaso, **estaquia** e **alporque** resolvem. A enxertia é para quem quer produzir em escala ou salvar uma planta.

Estaquiando: o método mais fácil

A estaquia é enraizar um pedaço de galho. Simples, barato e funciona com muitas espécies.

O que você precisa

- Tesoura **bypass** afiada e limpa
- Substrato leve: **areia grossa + vermiculita** (ou fibra de coco)
- Recipiente pequeno com furos de drenagem
- Água limpa
- Opcional: hormônio de enraizamento (ou caseiro, veja adiante)

Passo a passo

1. **Escolha a época.** Fim do inverno ou início da primavera, quando a planta está começando a crescer. Evite a floração e o frio intenso.
2. **Corte um galho saudável de 10 a 20 cm**, com **2 a 3 nós** (os "olhinhos" de onde saem as folhas). Use um galho do ano, nem muito novo (mole) nem muito velho (lenhoso demais).
3. **Corte a base em ângulo**, logo abaixo de um nó — é de lá que saem as raízes.
4. **Remova as folhas de baixo**, deixando só 2 ou 3 folhas no topo (ou nenhuma, em espécies de folha grande). Folha demais faz a estaca perder água e murchar.
5. **Mergulhe a base** em hormônio de enraizamento, se tiver. Se não, passe direto.
6. **Plante a base no substrato** (2 a 3 cm enterrados). Aperte de leve.
7. **Regue e cubra** com uma garrafa PET cortada ou saco plástico, criando uma mini-estufa.
8. **Mantenha na meia-sombra**, com substrato **úmido, mas nunca encharcado**.
9. **Espere de 3 a 8 semanas.** Puxe de leve: se resistir, enraizou.

Hormônios de enraizamento caseiros

- **Água de salgueiro:** galhos de salgueiro de molho em água por 48 h. Contém ácido salicílico natural, que estimula raízes.
- **Mel:** passe um pouco de mel puro na base cortada antes de plantar. Tem ação antisséptica.
- **Canela em pó:** mesma função — protege o corte de fungos e estimula.

Nenhum deles substitui um bom hormônio comercial, mas ajudam bastante e são de graça.

Espécies que pegam fácil por estaquia

Acerola, amora, figo, uva, romã, pitanga, seriguela, groselha, hibisco, maracujá (por estaca semilenhosa) e a maioria das mirtáceas.

Espécies difíceis por estaquia

Jabuticaba, manga, abacate, lichia e a maioria dos citros — para essas, prefira **alporque** ou **enxertia**.


Alporque: enraizar no próprio pé

O alporque (ou alporquia) é enraizar um galho **ainda ligado à planta-mãe**. Vantagem enorme: a muda recebe água e nutrientes o tempo todo, então praticamente não tem risco de perder.

É o método tradicional para **jabuticaba, lichia, citros e manga**.

Passo a passo

Alporque — o anelamento





Alporque real: o substrato úmido envolve o trecho anelado do galho, protegido por plástico até sair a raiz

1. **Escolha um galho** do ano, de 1 a 2 cm de espessura, com boa exposição ao sol.
2. **Anelar a casca:** com uma faca limpa, faça dois cortes paralelos (1,5 a 2 cm de distância) e remova a casca e a camada verde entre eles, deixando o **lenho branco à mostra**. É esse ferimento que estimula a raiz.
3. **Raspe o lenho de leve** (opcional), para aumentar a área de enraizamento.
4. **Aplique hormônio** em pó na região anelada, se tiver.
5. **Envolva com substrato úmido** (esfagno ou fibra de coco + vermiculita) formando um "bolo".
6. **Cubra com plástico transparente** e amarre bem nas duas pontas, deixando o substrato sempre úmido.
7. **Proteja do sol forte** com papel alumínio ou saco, se necessário.
8. **Aguarde de 1 a 4 meses**. Quando você vir raízes pela transparência, está pronto.
9. **Separe da planta-mãe** com um corte abaixo do bolo e plante a muda já enraizada.

Quando fazer

Início da primavera é o melhor momento, quando a planta está em pleno crescimento.

Erros comuns

- **Anelar de menos:** se sobrar casca, a planta "refaz" o caminho e não enraíza.
 - **Deixar secar:** substrato seco no bolo = raiz nenhuma. Verifique a umidade semanalmente.
 - **Separar cedo:** só separe quando houver raiz visível e firme.
-

Enxertia: produzir rápido e em qualquer solo

A enxertia une um pedaço de planta produtiva (**copa**) a uma muda resistente (**cavalo** ou porta-enxerto). É o método da fruticultura comercial, porque garante fruta igual à da planta-mãe e produção mais cedo.

Quando vale a pena


- Espécies que não pegam por estaquia (manga, abacate, jabuticaba de qualidade).
- Quando você quer uma planta com **raiz forte** e **copa produtiva**.
- Para recuperar uma planta que perdeu a copa.
- Para ter **várias variedades** num mesmo pé (enxertia múltipla).



Enxerto de citros já pegado: a fita protege a união e os brotos novos saem acima dela

Garfagem (o mais indicado para iniciantes)

Enxertia por garfagem — o encaixe em "V"





Macro de um enxerto já pegado: no meio, o calo de cicatrização — é ali que o câmbio (a camada verde) das duas partes se une

1. Escolha o **cavalo** (muda de 1 cm de diâmetro) e o **garfo** (ramo da planta produtiva, com 2 a 3 gemas).
2. Corte o cavalo na horizontal e faça um **entalhe em "V"** no topo.
3. Corte a base do garfo em **cunha**, do mesmo ângulo.
4. **Encaixe** de forma que as cascas (câmbio) se **toquem** de um lado.
5. **Amarre** firmemente com fita de enxertia ou plástico.
6. **Cubra** o garfo com saco plástico para não secar.
7. **Mantenha na meia-sombra** até brotar (2 a 4 semanas).

Borbulhia

Usada principalmente em **citros**. Consiste em encaixar uma **gema** (borbulha) retirada da planta produtiva sob a casca do cavalo. Mais técnica, mas de ótimo resultado.

Encostia

Une dois ramos que se tocam, ainda ligados às plantas. Simples e eficaz, mas exige duas plantas próximas.

Segredo da enxertia

- **Ferramenta limpa e corte perfeito** — sem rebarba.
 - **Câmbio no câmbio:** a camada verde das duas partes precisa se tocar.
 - **Amarração firme e sem entrar água.**
 - **Rapidez:** o corte oxida; faça tudo em minutos.
-

Sementes: quando vale a pena

Sementes são divertidas e gratuitas, mas têm limitações:

- Demoram de **5 a 10 anos** para frutificar.
- **Não repetem** a qualidade da fruta (a planta-mãe pode ser enxertada; a semente dá outra coisa).
- Algumas nem germinam bem (citros e manga até vão; jabuticaba demora anos).

Use sementes para: experimentar, fazer porta-enxerto para enxertia, ou criar variedades novas.

Dica: plante sementes de frutas que você provou e gostou — pelo menos a chance de sair algo bom existe, e você aprende observando.

Substrato e ambiente para enraizar

- **Substrato leve:** areia grossa + vermiculita, ou fibra de coco + perlita. Terra pesada compacta e apodrece o corte.
 - **Umidade constante, sem encharcar.** O maior inimigo é o excesso de água.
 - **Meia-sombra.** Sol direto desidrata a estaca antes de ela enraizar.
 - **Temperatura amena.** Frio atrasa; calor extremo desidrata.
 - **Paciência.** Cada espécie tem seu tempo — não fique mexendo para ver se enraizou.
-

Depois de enraizar: o transplante

Quando a muda tem **raízes firmes e novas folhas**, é hora de transferir para o vaso definitivo.

1. **Escolha um vaso pequeno** para começar (1 a 3 L) — vaso grande demais encharca e apodrece raiz.
2. Use substrato **leve e fértil**, com húmus.
3. **Não adube** nas primeiras 3 semanas.
4. **Aclimatize** à luz aos poucos, ao longo de 1 a 2 semanas.
5. **Aumente o vaso** conforme a planta cresce — sem pressa.

Erro comum: colocar a muda recém-enraizada direto num vaso de 50 litros. A raiz não dá conta do volume de água e apodrece.

Método por espécie

Frutífera	Melhor método	Época ideal	Dificuldade
Acerola	Estaquia	Primavera	Fácil
Amora	Estaquia (ponta)	Fim do inverno	Fácil
Figo	Estaquia (lenhosa)	Inverno	Fácil
Uva	Estaquia (lenhosa)	Inverno	Fácil
Romã	Estaquia	Primavera	Fácil
Pitanga	Estaquia / alporque	Primavera	Fácil
Seriguela	Estaquia	Primavera	Média
Groselha	Estaquia	Primavera	Fácil
Jabuticaba	Alporque / enxertia	Primavera	Média
Lichia	Alporque	Primavera	Média
Citros (limão, laranja)	Enxertia (borbulhia)	Primavera	Avançada
Manga	Enxertia (garfagem)	Primavera	Avançada
Abacate	Enxertia	Primavera	Avançada
Goiaba	Estaquia / alporque	Primavera	Média
Pitaya	Estaquia (cladódio)	Qualquer época quente	Fácil
Maracujá	Estaquia semilenhosa	Primavera	Fácil
Morango	Estolão (muda natural)	Outono	Fácil
Banana	Divisão de rebento	Primavera	Fácil
Mirtilo	Estaquia semilenhosa	Verão	Avançada
Atemoia / Pinha	Enxertia	Primavera	Avançada

Guia: escolher a frutífera →

Erros que fazem perder a muda

1. **Cortar galho doente ou sem vigor.** Escolha sempre o melhor material.
 2. **Deixar folha demais na estaca.** A estaca perde água e murcha.
 3. **Encharcar o substrato.** Apodrece o corte antes de enraizar.
 4. **Deixar no sol forte.** Desidrata e mata.
 5. **Mandar a estaca de cabeça para baixo.** A base vai no substrato, o topo para cima.
 6. **Anelar de menos no alporque.** A casca precisa sair toda.
 7. **Deixar o bolo de alporque secar.** Verifique a umidade toda semana.
 8. **Separar a muda cedo demais.** Espere raiz firme.
 9. **Enxertar com ferramenta suja.** Contamina e mata o garfo.
 10. **Transplantar para vaso grande demais.** A raiz apodrece.
 11. **Mexer toda hora para ver se enraizou.** Quebra as raízes novas.
 12. **Adubar a muda recém-enraizada.** Queima a raiz nova.
-

Perguntas frequentes

Qual a forma mais fácil de começar? Estaquia de acerola, amora, figo ou uva. Pegam fácil, em qualquer varanda.

Posso fazer estaquia em qualquer época? O ideal é fim do inverno e primavera. Fora disso, o enraizamento é mais lento e incerto.

Preciso de hormônio para enraizar? Ajuda, mas não é obrigatório. Água de salgueiro, mel e canela funcionam como apoio caseiro.

Por que minha estaca murchou? Quase sempre excesso de folha, sol direto ou substrato encharcado.

Jabuticaba dá por estaquia? Muito difícil. Use alporque ou enxertia.

Quanto tempo até a muda dar fruto? Depende do método: estaquia e alporque, 1 a 3 anos; enxertia, 1 a 3 anos; semente, 5 a 10 anos.

Posso vender as mudas que fizer? Pode. Só cuide da sanidade das plantas e use substrato limpo.

Como sei que enraizou? Puxe de leve: se resistir, tem raiz. Ou levante o torrão com cuidado e observe.

Posso fazer enxertia em planta pequena? Pode, desde que o cavalo tenha espessura suficiente (a partir de 0,8 a 1 cm).

Checklist do multiplicador

Antes de cortar - ☐ Escolher planta-mãe que já produz bem - ☐ Escolher a época certa (primavera / fim do inverno) - ☐ Separar tesoura limpa, substrato leve e recipiente

Na estaquia - ☐ Galho de 10-20 cm com 2-3 nós - ☐ Base em ângulo, abaixo de um nó - ☐ Remover folhas de baixo - ☐ Meia-sombra e substrato úmido (não encharcado)

No alporque - ☐ Anelar até o lenho, sem sobra de casca - ☐ Substrato úmido e plástico bem amarrado - ☐ Verificar umidade semanalmente - ☐ Separar só com raiz firme

Na enxertia - ☐ Cavalo e garfo de diâmetro parecido - ☐ Câmbio no câmbio - ☐ Amarração firme e sem água - ☐ Meia-sombra até brotar

Depois de enraizar - ☐ Vaso pequeno primeiro - ☐ Sem adubo por 3 semanas - ☐ Aclimação gradual à luz

Continue com a gente

Multiplicar é o passo que transforma quem cultiva em quem **produz**. No canal **Frutíferas Orgânicas** você vê enxertias, alporques e colheitas acontecendo de verdade.

[Canal no YouTube →](#)

[Site Frutíferas Orgânicas →](#)

Dúvida? Deixe um comentário em qualquer vídeo. Eu leio e respondo.

Créditos das imagens

As fotografias de enxertia e alporque usadas neste módulo vêm do Wikimedia Commons e são de uso livre, com atribuição:

- **Alporque** — foto de Drenisa, licença CC BY-SA 4.0.
 - **Enxerto já pegado (citros)** — foto de Dr. Chinchu C., licença CC BY-SA 4.0.
 - **Macro do calo de cicatrização** — Wikimedia Commons, licença GFDL.
-

Frutíferas Orgânicas — uma planta vira um pomar.