

FRUTÍFERAS ORGÂNICAS

MATERIAL COMPLEMENTAR

Adubação Orgânica

Descomplicada — receitas, doses e calendário



por **Washington Carlos Frade**

canal Frutíferas Orgânicas

Adubação Orgânica Descomplicada

Por Washington Carlos Frade — canal Frutíferas Orgânicas

Sobre este material



Nêspera carregada, colhida no meu pomar: em vaso, a diferença entre sobreviver e produzir é adubação em dia

Este é o complemento prático do guia **Cultivo de Frutíferas Orgânicas em Vasos**. Aqui a gente aprofunda o que, na prática, separa uma planta que só sobrevive de uma planta que **produz**.

Se você já entendeu que adubar em vaso é reposição — e não luxo — este material vai te dar o **como**: as receitas, as doses, a frequência e, principalmente, como não queimar a sua planta.

Não precisa comprar nada caro. Quase tudo o que você precisa já está na sua cozinha, na composteira ou na loja de jardinagem mais próxima.

Por que adubar em vaso é diferente de adubar no chão

No solo, a planta explora um volume enorme de terra. Em vaso, ela vive num espaço fechado: a cada rega, parte dos nutrientes é **lavada para fora** pelos furos de drenagem. O que sobra é consumido pela própria planta.

O resultado é simples: em vaso, **a comida acaba**. E acaba rápido — em poucas semanas sem reposição, você começa a ver folha clara, crescimento parado e fruto pequeno.

Três verdades que mudam tudo:

1. **Adubar é repor, não engordar.** A planta precisa do que foi perdido, não de "mais".
 2. **Pouco e sempre vence muito e de uma vez.** Excesso queima raiz e mata mais que a falta.
 3. **A fase manda.** Crescer pede nitrogênio; florar e frutificar pedem fósforo e potássio.
-

O que a planta come: N, P, K e os coadjuvantes

Os três macro nutrientes

Nutriente	Para que serve	Sinal de falta	Sinal de excesso
Nitrogênio (N)	Folha, caule e crescimento	Folhas amarelas por baixo, planta parada	Muita folha, pouca flor e fruto
Fósforo (P)	Raiz, flor e fruto	Pouca flor, raiz fraca	Bloqueia absorção de outros nutrientes
Potássio (K)	Fruto firme, doce e resistente	Borda de folha seca, fruto sem sabor	Desequilíbrio geral

Os coadjuvantes que ninguém comenta

- **Cálcio** — fortalece a parede da célula; falta causa fruto rachado e ponta de broto queimada.
- **Magnésio** — é o coração da clorofila; falta dá folha com nervura verde e miolo amarelo.
- **Enxofre** — ajuda no sabor e no aroma do fruto.
- **Micronutrientes** (ferro, zinco, boro, manganês) — em quantidades mínimas, mas a falta trava a frutificação. Em vaso, aparecem com o tempo, porque são os primeiros a serem lavados.

Regra prática: em vaso, o orgânico cobre bem os macros. A cada 6 meses, uma colher de cinza de madeira ou de farinha de osso resolve boa parte dos micronutrientes.

As matérias-primas orgânicas

Húmus de minhoca

O melhor amigo de quem cultiva em vaso. Rico em microrganismos, não queima a raiz e melhora a estrutura do substrato. Use **no plantio** (misturado) e em **cobertura** (por cima).

Bokashi

Adubo fermentado, rico em microrganismos e de ação mais rápida que o húmus. É a sua base de **manutenção**. Aplique na borda do vaso, longe do caule, a cada 30 a 45 dias.

Composto de composteira

Ótimo, desde que **bem curtido**. Composto "verde" (recente) rouba nitrogênio da planta para terminar de decompor. Se estiver com cheiro forte, ainda não está pronto.

Estereque curtido

Potente e barato, mas use com moderação e **sempre curtido** (mínimo 60 dias). Estereque fresco queima raiz e atrai mosca.

Casca de ovo

Fonte de cálcio, mas de liberação **lentíssima**. Só funciona bem se torrada e moída fina. Serve mais como complemento do que como adubação principal.

Cinza de madeira

Fonte de potássio e cálcio, e ajuda a corrigir a acidez. Use **pouco**: uma colher de sopa por vaso médio, a cada 2 a 3 meses. Excesso alcaliniza o substrato e trava a absorção de ferro.

Borra de café

Melhora a vida do solo e ajuda na drenagem, mas é **levemente ácida** e pobre em nutrientes. Use no máximo uma colher por mês, sempre seca, misturada ao substrato.

Farinha de osso

Fonte de fósforo e cálcio de liberação lenta. Excelente para a **fase de floração**. Uma colher de sopa por vaso, a cada 2 meses.

O adubo líquido caseiro (passo a passo)

Este é o adubo que você faz em casa, com o que já tem, e que dá resultado visível em poucas semanas.

Receita base — "chá de húmus"

1. Coloque **1 xícara de húmus de minhoca** (ou composto bem curtido) em um balde com **5 litros de água limpa**.
2. Mexa bem e deixe de molho por **24 a 48 horas**, mexendo de vez em quando.
3. Coe com um pano fino ou peneira.
4. **Dilua o caldo em água limpa:** 1 parte de caldo para 5 a 10 partes de água.
5. Regue o substrato já úmido, na base, a cada **15 dias**.

Variação — "chorume de composteira"

Se você tem composteira, o líquido que escorre no fundo é ouro. Ele é **muito concentrado**: dilua 1 parte em 10 a 20 partes de água e use a cada 15 dias. Nunca use puro.

Variação — "adubo de casca de banana"

Rico em potássio, ótimo na frutificação. Pique 3 cascas de banana, deixe de molho em 1 litro de água por 48 horas, coe e dilua em 5 litros de água. Use na fase de floração e frutificação.

Regras de ouro do adubo líquido

- **Sempre dilua.** Adubo líquido concentrado queima raiz em horas.
 - **Aplique em substrato úmido.** Nunca em terra seca — a raiz absorve rápido demais e queima.
 - **Nunca no sol forte.** Regue no fim da tarde ou pela manhã.
 - **Não guarde por semanas.** Faça, use, descarte o que sobrar.
 - **Cheiro forte = não use.** Se fermentou demais, pode ter virado patógeno.
-

Bokashi: como usar sem errar

O bokashi é o adubo orgânico mais prático para manutenção, mas tem um detalhe que muita gente erra.

Nunca encoste o bokashi no caule. Ele é rico e concentrado; em contato direto, atrai fungos e pode apodrecer o colo da planta.

Como aplicar:

1. Faça um sulco raso na borda do vaso, a 3 a 5 cm do caule.
2. Distribua de **1 a 2 colheres de sopa** (vaso médio) a **4 colheres** (vaso grande de 40 L+).
3. Cubra com substrato e regue em seguida.
4. Repita a cada **30 a 45 dias**, no período de crescimento.

Não use em planta recém-transplantada (espere 3 semanas) nem no período de repouso.

O calendário por fase

Esta é a parte que mais gente ignora — e que mais muda o resultado. **A adubação certa na fase errada não funciona.**

Fase	O que a planta precisa	Produto	Frequência
Plantio	Enraizar e pegar	Húmus misturado ao substrato	1 vez
Crescimento	Folha e estrutura	Bokashi + adubo líquido (N alto)	Bokashi 30-45 dias · líquido 15 dias
Floração	Formar botão e flor	Farinha de osso + cinza (P e K)	30 dias antes da florada
Frutificação	Engrossar e adoçar	Adubo de casca de banana + organomineral (K)	A cada 15-20 dias
Colheita	Recuperar a planta	Bokashi leve	1 vez após a safra
Repouso (frio)	Descansar	Suspender ou só húmus	—

A troca de adubo na virada de fase

Quando a planta começa a **florar**, reduza o nitrogênio e aumente fósforo e potássio. Continuar com adubo nitrogenado nessa hora é o erro que dá "pé de folha bonito e zero fruto".

Como aplicar sem queimar a planta

- **Nunca** adube planta seca — regue antes.
- **Nunca** adube no sol forte do meio-dia.
- **Sempre** respeite a dose. Mais não é melhor.
- **Sempre** afaste o adubo do caule.
- **Espere** 3 semanas após o transplante.
- **Pare** ao primeiro sinal de queima (borda de folha seca).

Se você exagerou: regue abundantemente (sem adubo) por 2 a 3 dias, para lavar o excesso pelos furos. Não adube de novo por um mês.

Diagnóstico: o que a folha está dizendo

O que você vê	Provável causa	O que fazer
Folhas amarelas por baixo, planta parada	Falta de nitrogênio	Adubo líquido ou bokashi
Folha nova amarela com nervura verde	Falta de magnésio	Cinza de madeira ou sulfato de magnésio
Borda das folhas seca e queimada	Excesso de adubo ou de sal	Lavar o substrato, suspender adubo
Muita folha, nenhuma flor	Excesso de nitrogênio	Trocar para adubo com P e K
Fruto pequeno e sem sabor	Falta de potássio	Adubo de casca de banana, cinza
Fruto rachado	Rega irregular ou falta de cálcio	Constância na rega + casca de ovo moída
Planta murcha com terra úmida	Excesso de água / raiz doente	Suspender rega, melhorar drenagem
Ponta de broto queimada	Falta de cálcio ou excesso de sal	Farinha de osso, lavar substrato

Guia: problemas comuns →

Adubação por espécie

Frutífera	Necessidade especial	Observação
Citros (limão, laranja)	Nitrogênio na primavera, K na frutificação	Não passe adubo perto do tronco
Jabuticaba	Muita matéria orgânica	Gosta de solo ácido; evite cinza em excesso
Acerola	Adubação constante	Produz quase o ano todo — repõe rápido
Pitaya	Pouco nitrogênio, muito K	Excesso de N dá haste e nenhuma flor
Goiaba	N e K equilibrados	Responde muito bem a bokashi
Amora	N no crescimento, K na frutificação	Podar e adubar depois da safra
Manga	P e K na floração	Evite N na época de florada
Pitanga	Pouco exigente	Bokashi a cada 45 dias basta
Morango	K alto na frutificação	Adubo líquido diluído, a cada 15 dias
Mirtilo	Solo ácido	Nunca use cinza; prefira húmus e pinus

Guia: adubação orgânica →

Erros que matam por excesso

1. **Adubar planta recém-plantada.** Espere 3 semanas.
 2. **Encostar o adubo no caule.** Sempre na borda do vaso.
 3. **Usar adubo líquido puro.** Dilua sempre.
 4. **Adubar todo dia "um pouquinho".** Respeite a frequência.
 5. **Seguir com nitrogênio na floração.** Troque para P e K.
 6. **Usar composto fresco.** Só composto curtido.
 7. **Ignorar o inverno.** No frio, a planta quase não come.
 8. **Adubar planta doente ou seca.** Trate primeiro, adube depois.
 9. **Achar que cinza é adubo completo.** É complemento, não base.
 10. **Nunca repor micronutrientes.** Em vaso, eles somem primeiro.
-

Perguntas frequentes

Posso usar só húmus e nada mais? No começo sim. Com o tempo, o húmus sozinho não repõe potássio e micronutrientes. Complemente com bokashi, cinza e farinha de osso.

Adubo orgânico demora para fazer efeito? O bokashi e o líquido agem em dias. O húmus e a farinha de osso, em semanas. Por isso a base orgânica é contínua, e não pontual.

Posso misturar orgânico e mineral? Pode, e funciona muito bem. O orgânico é a base; o mineral é o ajuste fino na frutificação.

Meu vaso tem formiga. Tem a ver com adubo? Muito. Estereque fresco e composto mal curtido atraem formiga. Use sempre material curtido.

Quanto de adubo por litro de substrato? Referência prática: 1 a 2 colheres de sopa de bokashi por cada 10 litros de vaso, a cada 30 a 45 dias.

Adubo vencido faz mal? Orgânico bem armazenado dura meses. Se mofou ou azedou, descarte — pode trazer fungo para o vaso.

Posso adubar na chuva? Melhor não. A chuva lava o adubo antes de a planta absorver. Adube e regue você mesmo.

Checklist do adubador

No plantio - ☐ Misturar húmus ao substrato - ☐ Não adubar nas 3 primeiras semanas

Todo mês - ☐ Bokashi na borda do vaso (30-45 dias) - ☐ Adubo líquido diluído (15 dias)
- ☐ Checar se há sinal de queima

Na floração - ☐ Reduzir nitrogênio - ☐ Aplicar farinha de osso e cinza

Na frutificação - ☐ Adubo de casca de banana ou organomineral com K - ☐ Manter a rega constante

No inverno - ☐ Suspender ou reduzir drasticamente - ☐ Só húmus, se a planta estiver ativa

Continue com a gente

Este material é um complemento do guia principal. No canal **Frutíferas Orgânicas** você vê as adubações acontecendo na prática, e no site encontra os guias completos de cada etapa.

[Canal no YouTube →](#)

[Site Frutíferas Orgânicas →](#)

Dúvida? Deixe um comentário em qualquer vídeo. Eu leio e respondo.

Frutíferas Orgânicas — a planta agradece na colheita.