

២០១៩

facebook: Hing Vothy

វិញ្ញាសាគ្រឿង
បាក់ឌុប

Gmail: hingvuthy300@gmail.com

បង្រៀនដោយ៖ ហ៊ីង ថុន

វិញ្ញាសាទី០១: គ្រឿងប្រលងបាត់ខ្មុបឆ្នាំ២០១៩

នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន: _____

I. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = (\sqrt{6} - \sqrt{2}) - (\sqrt{6} + \sqrt{2})i$ ។

១. គណនា z^2 ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

២. សរសេរ z^2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចទាញរកម៉ូឌុល និង អាគុយម៉ង់នៃ Z ។

៣. គណនាឫសទី ៣ នៃ Z ។

II. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y'' - 3y' + 2y = 0$ (E) ។ រកចម្លើយនៃសមីការ (E)

បើគេដឹងថាអនុគមន៍ចម្លើយមានអតិបរមាស្មើ ១ ត្រង់ $x = 1$ ។

III. គណនាលីមីត

១. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^7 - 2x^5 + 1}{x^3 - 3x^2 + 2}$

២. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{1 - \cos 6x}}{\sqrt{2} \left(\frac{\pi}{3} - x \right)}$

៣. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos x}}{\sin^2 x}$

IV. គេមានអាំងតេក្រាល: $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x \cos^4 x dx$ និង $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 x \sin^4 x dx$ ។

គណនា $I + J$; $I - J$ រួចទាញរក I និង J ។

V. គេឲ្យ f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = -x - 2 + \frac{4e^x}{1 + e^x}$ ហើយមានក្រាប C ។

១. គណនា $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C កាលណា $x \rightarrow -\infty$ ។

២. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ ។ គណនា $f'(0), f(0)$ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

៣. បង្ហាញថាគល់ ០ ជាចំណុចរបត់ និងជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប C ។

៤. គណនា $f(3)$ ហើយសង់ក្រាប C គេឲ្យ ($e^3 = 20$) ។

VI. នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមានមួយ គេមានចំណុច

$A(0, 0, 1); B(-1, -2, 0)$ និង $C(2, 1, -1)$ ។

១. គណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចបង្ហាញថា A, B, C រត់មិនត្រង់ជួរ ។

២. សរសេរសមីការប្លង់ ABC ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។

៣. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាម A ហើយកែងប្លង់ ABC ។

៤. គណនា $(\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}$ រួចទាញរកមាឌចតុមុខ $OABC$ ។

ដំណោះស្រាយ

I. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = (\sqrt{6} - \sqrt{2}) - (\sqrt{6} + \sqrt{2})i$ ។

១. គណនា z^2 ជាទម្រង់ពីជគណិត

$$\begin{aligned}\text{គេបាន} \quad z^2 &= [(\sqrt{6} - \sqrt{2}) - (\sqrt{6} + \sqrt{2})i]^2 \\ &= (\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 - 2(\sqrt{6} - \sqrt{2})(\sqrt{6} + \sqrt{2})i + (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 i^2, \quad i^2 = -1 \\ &= (\sqrt{6})^2 - 2\sqrt{12} + (\sqrt{2})^2 - 2[(\sqrt{6})^2 - (\sqrt{2})^2]i - (\sqrt{6})^2 - 2\sqrt{12} - (\sqrt{2})^2\end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } z^2 = -8\sqrt{3} - 8i$$

២. សរសេរ z^2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចទាញរកម៉ូឌុល និង អាគុយម៉ង់នៃ Z ។

$$\begin{aligned}\text{គេបាន} \quad z^2 &= 16 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right) \\ &= 16 \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) \\ \text{នាំឲ្យ} \quad z &= \sqrt{z} = \sqrt{16} \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right) \\ &= 4 \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right)\end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } |z| = 4, \quad \arg(z) = \frac{7\pi}{12} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

៣. គណនាឫសទី ៣ នៃ Z

$$\begin{aligned}\text{គេបាន} \quad \sqrt[3]{z} &= \sqrt[3]{4} \left(\cos \frac{\frac{7\pi}{12} + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{7\pi}{12} + 2k\pi}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2 \\ \text{ចំពោះ } k = 0 &\Rightarrow z_1 = \sqrt[3]{4} \left(\cos \frac{7\pi}{36} + i \sin \frac{7\pi}{36} \right) \\ \text{ចំពោះ } k = 1 &\Rightarrow z_1 = \sqrt[3]{4} \left(\cos \frac{31\pi}{36} + i \sin \frac{31\pi}{36} \right) \\ \text{ចំពោះ } k = 2 &\Rightarrow z_1 = \sqrt[3]{4} \left(\cos \frac{55\pi}{36} + i \sin \frac{55\pi}{36} \right)\end{aligned}$$

II. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y'' - 3y' + 2y = 0 \quad (E)$ ។

$$\text{គេមានសមីការសំគាល់} \quad \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = 2$$

$$\text{គេបាន } y = Ae^x + Be^{2x}, \quad A, B \in \mathbb{R}$$

រកចម្លើយនៃសមីការ (E) បើគេដឹងថាអនុគមន៍ចម្លើយមានអតិបរមាស្មើ 1 ត្រង់ $x = 1$

$$\text{មានន័យថា } y'(1) = 0, y(1) = 1$$

គេមាន

$$y = Ae^x + Be^{2x} \Rightarrow y(1) = Ae + Be = 1 \quad (I)$$

$$y' = A^x + 2Be^{2x} \Rightarrow y'(1) = Ae + 2Be = 1 \quad (II)$$

$$\text{យក } (II) - (I) : Be = 0 \Rightarrow \begin{cases} B = 0 \\ Ae = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{e} \end{cases}$$

$$\text{ដូចនេះ } y = \frac{1}{e}e^x = e^{x-1}$$

III. គណនាលីមីត

$$\begin{aligned} ១. \quad & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^7 - 2x^5 + 1}{x^3 - 3x^2 + 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^7 - x^6 + x^6 - x^5 - x^5 + x^4 - x^4 + x^3 - x^3 + x^2 - x^2 + x - x + 1}{x^3 - x^2 - 2x^2 + 2x - 2x + 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^6(x-1) + x^5(x-1) - x^4(x-1) - x^3(x-1) - x^2(x-1) - x(x-1) - (x-1)}{x^2(x-1) - 2x(x-1) - 2(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^6 + x^5 - x^4 - x^3 - x^2 - x - 1)}{(x-1)(x^2 - 2x - 2)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ២. \quad & \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{1 - \cos 6x}}{\sqrt{2} \left(\frac{\pi}{3} - x \right)} \\ & \text{តាង } t = x - \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = t + \frac{\pi}{3} \text{ បើ } t \rightarrow 0 \text{ នោះ } x \rightarrow \frac{\pi}{3} \\ & \text{គេបាន } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos 6(t + \frac{\pi}{3})}}{\sqrt{2} \left(\frac{\pi}{3} - (t + \frac{\pi}{3}) \right)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos 6t}}{-\sqrt{2}t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} \sin^2 3t}{-\sqrt{2}t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} |\sin 3t|}{-\sqrt{2}t} \\ &= \pm \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{3t} \times 3 \\ &= \pm 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ៣. \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos x}}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos x})(\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos x})}{\sin^2 x (\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 1 - \cos x}{\sin^2 x (\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x (\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 x (\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\left(\frac{x}{2} \right)^2} \times \frac{x^2}{\sin^2 x} \times \frac{2}{4(\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos x})} \right) \\ &= 1 \times 1 \times \frac{2}{4(2\sqrt{2})} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{8} \end{aligned}$$

IV . គេមានអាំងតេក្រាល: $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x \cos^4 x dx$ និង $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 x \sin^4 x dx$ ។

$$\begin{aligned} \text{គណនា } I + J &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x \cos^4 x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 x \sin^4 x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin^2 x \cos^4 x + \cos^2 x \sin^4 x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x \cos^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin x \cos x)^2 dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\sin 2x}{2} \right)^2 dx \\ &= \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \cos 4x) dx \\ &= \frac{1}{8} \left[x - \frac{1}{4} \sin 4x \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{1}{8} \left[\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\sin \pi}{4} \right) - \left(0 - \frac{\sin 0}{4} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\text{គេបាន } I + J = \frac{\pi}{32} \quad (I)$$

$$\begin{aligned} \text{គណនា } I - J &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x \cos^4 x dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 x \sin^4 x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin^2 x \cos^4 x - \cos^2 x \sin^4 x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x \cos^2 x (\cos^2 x - \sin^2 x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin x \cos x)^2 \cos 2x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 2x \frac{1}{2} \cos 2x dx \end{aligned}$$

$$\text{តាង } t = \sin 2x \Rightarrow dt = \frac{1}{2} \cos 2x dx$$

$$\text{គេបាន } I - J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{3} [\sin^3 2x]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$\text{គេបាន } I - J = \frac{1}{3} \quad (II)$$

$$\text{យក (I)+(II): } 2I = \frac{\pi}{32} + \frac{1}{3} = \frac{3\pi - 32}{96} \Rightarrow I = \frac{3\pi - 32}{192} \Rightarrow J = \frac{1}{6}$$

V . គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = -x - 2 + \frac{4e^x}{1 + e^x}$ ហើយមានក្រាប C

$$១ . \text{ គណនា } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-x - 2 + \frac{4e^x}{1 + e^x} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x - 2 + \frac{4e^x}{1 + e^x} \right) = +\infty$$

$$\text{ដោយ } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x - 2)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x - 2 + \frac{4e^x}{1 + e^x} - (-x - 2) \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4e^x}{1 + e^x} = 0$$

នាំឲ្យ $y = -x - 2$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C កាលណា $x \rightarrow -\infty$

២ . គណនាដេរីវេ $f'(x)$

$$\begin{aligned}
 \text{គេបាន } f'(x) &= \left(-x - 2 + \frac{4e^x}{1+e^x} \right)' \\
 &= -1 + 4 \cdot \frac{(e^x)'(1+e^x) - (1+e^x)e^x}{(1+e^x)^2} \\
 &= \frac{-(1+e^x)^2 + 4e^x(1+e^x - e^x)}{(1+e^x)^2} \\
 &= \frac{-1 - 2e^x - e^{2x} + 4e^x}{(1+e^x)^2} \\
 &= \frac{-[(e^x)^2 - 2e^x + 1]}{(1+e^x)^2} \\
 &= -\frac{(e^x - 1)^2}{(e^x + 1)^2} < 0 \quad \text{ព្រោះ: } (1+e^x)^2 > 0, (e^x - 1)^2 > 0
 \end{aligned}$$

នាំឲ្យ f ជាអនុគមន៍ចុះ $\forall x \in \mathbb{R}$

សញ្ញានៃ $f'(x)$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	-	

$$\text{គណនា } f'(0) = \frac{-e^0 + 2e^0 - 1}{(1+e^0)^2} = 0$$

$$f(0) = -0 - 2 + \frac{4e^0}{1+e^0} = -2 + \frac{4}{2} = 0$$

សង់តារាងអថេរភាពនៃ f

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	-
$f(x)$	$+\infty$	0	$-\infty$

៣. បង្ហាញថាគល់ 0 ជាចំណុចរបត់កាលណា $f''(0) = 0$

$$\begin{aligned}
 \text{គេបាន } f''(x) &= -\left[\frac{(e^x - 1)^2}{(1+e^x)^2} \right]' \\
 &= -\frac{[(e^x - 1)^2]'(1+e^x)^2 - [(1+e^x)^2]'(e^x - 1)^2}{(1+e^x)^4} \\
 &= -\frac{2(e^x - 1)'(e^x - 1)(1+e^x)^2 - 2(e^x + 1)'(e^x + 1)(e^x - 1)^2}{(e^x + 1)^4} \\
 &= -\frac{2e^x(e^x - 1)(1+e^x) - 2e^x(e^x - 1)^2}{(e^x + 1)^3} \\
 \text{នាំឲ្យ } f''(0) &= -\frac{2e^0(e^0 - 1)(1+e^0) - 2e^0(e^0 - 1)^2}{(e^0 + 1)^3}
 \end{aligned}$$

$$f''(0) = 0$$


បង្ហាញថា 0 ជាច្រើននៃក្រាប C

$$\begin{aligned}
 \text{ចំពោះ } \forall x \in \mathbb{R}, \exists -x \in \mathbb{R} \text{ គេបាន } f(-x) &= -(-x) - 2 + \frac{4e^{-x}}{1+e^{-x}} \\
 &= -\left[-x + 2 - \frac{\frac{4}{e^x}}{1+\frac{1}{e^x}}\right] \\
 &= -\left[-x - 2 + 4 - \frac{4}{e^x} \times \frac{e^x}{e^x+1}\right] \\
 &= -\left[-x - 2 + \frac{4(e^x+1)-4}{1+e^x}\right] \\
 &= -\left[-x - 2 + \frac{4e^x}{1+e^x}\right]
 \end{aligned}$$

$$f(-x) = -f(x)$$

នាំឲ្យ f ជាអនុគមន៍សេសដែលមានផ្ចិតឆ្លុះ ០

៤. គណនា $f(3) = -3 - 2 + \frac{4e^3}{1+e^3} = -5 + \frac{4 \times 20}{1+20} = \frac{-21(5) + 80}{21} = -\frac{25}{21}$
សង់ក្រាប C



VI. នៅក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(0, 0, 1); B(-1, -2, 0)$ និង $C(2, 1, -1)$ ។

១. គណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{AB} \times \vec{AC}$

$$\text{ដោយ } \vec{AB} = (-1 - 0, -2 - 0, 0 - 1) = (-1, -2, -1)$$

$$\vec{AC} = (2 + 1, 1 + 2, -1 - 0) = (3, 3, -1)$$

$$\begin{aligned}
 \text{គេបាន } \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -2 & -1 \\ 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} \vec{k} \\
 &= (2+3)\vec{i} - (1+3)\vec{j} + (-3+6)\vec{k} \\
 &= 5\vec{i} - 4\vec{j} + 3\vec{k}
 \end{aligned}$$

ដោយ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \neq 0$ នោះ A, B, C រត់មិនត្រង់ជួរ ។

២ . សរសេរសមីការប្លង់ ABC

$$\text{គេបាន } (ABC) : 5(x-0) - 4(y-0) + 3(z-1) = 0$$

$$\text{ដូចនេះ សមីការប្លង់ } (ABC) : 5x - 4y + 3z - 3 = 0$$

គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC

$$\text{គេបាន } S_{\triangle ABC} = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2} = \frac{\sqrt{5^2 + (-4)^2 + 3^2}}{2} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \text{ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា}$$

៣ . សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាម A ហើយកែងប្លង់ ABC

នាំឲ្យ វ៉ិចទ័រប្រាប់នៃបន្ទាត់ L ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ ABC នោះ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (5, -4, 3)$

$$\text{គេបាន } L : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}, t \in \mathbb{R} \quad \text{សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់គឺ } (L) : \begin{cases} x = 5t \\ y = -4t \\ z = 1 + 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

៤ . គណនា $(\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}$

$$\text{ដោយ } \overrightarrow{OA} = A(0, 0, 1), \overrightarrow{OB} = B(-1, -2, 0), \overrightarrow{OC} = C(2, 1, -1)$$

$$\text{គេបាន } (\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 + 4 = 3$$

$$\text{នាំឲ្យមាឌចតុមុខ } OABC \text{ គឺ } V_{OABC} = \frac{|(\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}|}{6} = \frac{|3|}{6} = \frac{1}{2} \text{ ឯកតាមាឌ ។}$$

វិញ្ញាសាទី០២: គ្រឿងប្រឡងប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន: _____

I. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 + i$ ។ គណនា $\cos \frac{5\pi}{12}$ និង $\sin \frac{5\pi}{12}$ ។

II. គណនាលីមីត

១. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 4x - 16}{x^2 + 3x - 10}$

២. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2\sin^2 x - 3\sin x + 1}{4\sin^2 x - 1}$

III. គណនាអាំងតេក្រាល

១. $I = \int \frac{3x^2 + 5x - 4}{(x-1)(x+1)^2} dx$

២. $J = \int \frac{3(x^2 - 2x + 3)}{(x-1)(x+2)^2} dx$

III. គណនាអាំងតេក្រាល

១. $I = \int \frac{3x^2 + 5x - 4}{(x-1)(x+1)^2} dx$

២. $J = \int \frac{3(x^2 - 2x + 3)}{(x-1)(x+2)^2} dx$

III. គណនាអាំងតេក្រាល

IV. គេឲ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) : $y'' - 3y' + 2y = 4x^3 - 2x$ ។

១. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលអូម៉ូស្យែន $y'' - 3y' + 2y = 0$ ។

២. បើ $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ជាចម្លើយពិសេសនៃសមីការ (E) ចូរកំណត់ចំនួនពិត a, b, c និង d ។ រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

V. គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x) = \sqrt{3x+1}$ កំណត់លើ $\left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$ ។

១. កំណត់តម្លៃអមនៃ $f'(x)$ ចំពោះ $\forall x \in [1, 5]$ ។

២. $\forall x \in [1, 5]$ ចូរបង្ហាញថា $\frac{3}{8}x + \frac{13}{8} \leq \sqrt{3x+1} \leq \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$ ។

VI. f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $y = f(x) = x + e^{1-x}$ ហើយមានក្រាប C ។

ក. គណនា $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេត L នៃក្រាប C ។

ខ. បង្ហាញថា f មានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់ $x = 1$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

គ. សង់ក្រាប C នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ ។ គេយក $e = 2.7$ ។

ឃ. គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកក្នុងកំណត់ដោយក្រាប C អាស៊ីមតូតទ្រេត L បន្ទាត់ឈរ $x = 1$ និង $x = 2$ ។

VII. ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឲ្យបីចំណុច $A(-2, 1, -3), B(1, 2, 3)$ និង $C(2, -2, 1)$ ។

១. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាម A ហើយស្របនឹង $\overrightarrow{BC}$ ។

២. គណនា $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ ។ រកសមីការប្លង់ ABC ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។

III. គណនាអាំងតេក្រាល

III. គណនាអាំងតេក្រាល

ដំណោះស្រាយ

I. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 + i$ ។ គណនា $\cos \frac{5\pi}{12}$ និង $\sin \frac{5\pi}{12}$

$$\text{ដោយ } z_1 = -1 + i\sqrt{3} = 2 \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$z_2 = 1 + i = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\text{គេបាន } \frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{\sqrt{2}} \left[\cos \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) \right]$$

$$\frac{-1 + i\sqrt{3}}{1 + i} = \frac{2}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$$

$$\begin{aligned} \cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} &= \frac{\sqrt{2}(-1 + i\sqrt{3})(1 - i)}{2(1 + i)(1 - i)} \\ &= \frac{\sqrt{2}(-1 + i + i\sqrt{3} - i^2\sqrt{3})}{2(1 - i^2)}, i^2 = -1 \end{aligned}$$

$$\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{-\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} + i \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$$

$$\text{ដូចនេះ នាំឲ្យ } \cos \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \text{ និង } \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$$

II. គណនាលីមីត

$$9. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 4x - 16}{x^2 + 3x - 10} = \frac{2^3 + 4(2) - 16}{2^2 + 3(2) - 10} = \frac{8 + 8 - 16}{4 + 6 - 10} = \frac{0}{0} \text{ រាងមិនកំណត់}$$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 4x - 16}{x^2 + 3x - 10} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 + 2x^2 - 4x + 8x - 16}{x^2 - 2x + 5x - 10} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2(x - 2) + 2x(x - 2) + 8(x - 2)}{x(x - 2) + 5(x - 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 8)}{(x - 2)(x + 5)} \\ &= \frac{2^2 + 2(2) + 8}{2 + 5} = \frac{16}{7} \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 4x - 16}{x^2 + 3x - 10} = \frac{16}{7}$$

$$10. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1}{4 \sin^2 x - 1} = \frac{2 \sin^2 \frac{\pi}{6} - 3 \sin \frac{\pi}{6} + 1}{4 \sin^2 \frac{\pi}{6} - 1} = \frac{2(\frac{1}{2})^2 - 3(\frac{1}{2}) + 1}{4(\frac{1}{2})^2 - 1} = \frac{0}{0} \text{ រាងមិនកំណត់}$$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1}{4 \sin^2 x - 1} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2 \sin^2 x - \sin x - 2 \sin x + 1}{(2 \sin x)^2 - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\sin x(2 \sin x - 1) - (2 \sin x - 1)}{(2 \sin x - 1)(2 \sin x + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{(2 \sin x - 1)(\sin x - 1)}{(2 \sin x + 1)(2 \sin x - 1)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} - 1}{2(\frac{1}{2}) + 1} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1}{4 \sin^2 x - 1} = -\frac{1}{4}$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{x^2} = \frac{1 - 1}{0} = \frac{0}{0} \text{ រាងមិនកំណត់}$$

ដោយប្រើរូបមន្ត $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{2}[\cos 3x + \cos(-x)] \cos 3x}{x^2}, \cos(-x) = \cos x \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{2}(\cos 3x \cdot \cos 3x + \cos x \cdot \cos 3x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{2}[\frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 0) + \frac{1}{2}(\cos 4x + \cos 2x)]}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{4 - \cos 6x - 1 - \cos 4x - \cos 2x}{4}}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x + 1 - \cos 4x + 1 - \cos 2x}{4x^2}, 1 - \cos ax = 2 \sin^2 \frac{ax}{2} \\ &= \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 3x + 2 \sin^2 2x + 2 \sin^2 x}{x^2} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin^2 3x}{(3x)^2} \times 9 + \frac{\sin^2 2x}{(2x)^2} \times 4 + \frac{\sin^2 x}{x^2} \right] \\ &= \frac{1}{2}(9 + 4 + 1) = \frac{14}{2} \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{x^2} = 7}$

III. គណនាអាំងតេក្រាល

១. $I = \int \frac{3x^2 + 5x - 4}{(x-1)(x+1)^2} dx$

គេអាចសរសេរជា រាងកាណូនិច

$$\frac{3x^2 + 5x - 4}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x+1}$$

$$3x^2 + 5x - 4 = A(x^2 + 2x + 1) + B(x-1) + C(x^2 - 1)$$

$$3x^2 + 5x - 4 = Ax^2 + 2Ax + A + Bx - B + Cx^2 - C$$

$$3x^2 + 5x - 4 = (A+C)x^2 + (2A+B)x + (A-B-C)$$

ផ្ទឹមមេគុណនៃអង្គទាំងពីរ គេបាន $\begin{cases} A+C=3 \\ 2A+B=5 \\ A-B-C=-4 \end{cases}$ នាំឲ្យ $\begin{cases} A=1 \\ B=3 \\ C=2 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{នោះគេបាន } I &= \int \frac{3x^2 + 5x - 4}{(x-1)(x+1)^2} dx = \int \left[\frac{1}{x-1} + \frac{3}{(x+1)^2} + \frac{2}{x+1} \right] dx \\ &= \int \frac{dx}{x-1} + 3 \int \frac{dx}{(x+1)^2} + 2 \int \frac{dx}{x+1} \\ &= \ln|x-1| - \frac{3}{x+1} + 2 \ln|x+1| + C \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{I = \int \frac{3x^2 + 5x - 4}{(x-1)(x+1)^2} dx = \ln|x-1| - \frac{3}{x+1} + 2 \ln|x+1| + C}$

២. $J = \int \frac{3(x^2 - 2x + 3)}{(x-1)(x+2)^2} dx$

គេអាចសរសេរជា រាងកាណូនិច

$$\frac{3(x^2 - 2x + 3)}{(x-1)(x+2)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x+2)^2} + \frac{C}{x+2}$$

$$3(x^2 - 2x + 3) = A(x^2 + 4x + 4) + B(x-1) + C(x-1)(x+2)$$

$$3x^2 - 6x + 9 = Ax^2 + 4Ax + 4A + Bx - B + Cx^2 + Cx - 2C$$

$$3x^2 - 6x + 9 = (A+C)x^2 + (4A+B+C)x + (4A-B-2C)$$

$$\text{ផ្តើមមេគុណនៃអង្គទាំងពីរ គេបាន} \begin{cases} A+C=3 \\ 4A+B+C=-6 \\ 4A-B-2C=9 \end{cases} \quad \text{នាំឲ្យ} \begin{cases} A=\frac{2}{3} \\ B=-11 \\ C=\frac{7}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{នោះគេបាន } J &= \int \frac{3(x^2 - 2x + 3)}{(x-1)(x+2)^2} dx = \int \left[\frac{2}{3(x-1)} - \frac{11}{(x+2)^2} + \frac{7}{3(x+2)} \right] dx \\ &= \frac{2}{3} \int \frac{dx}{x-1} - 11 \int \frac{dx}{(x+2)^2} + \frac{7}{3} \int \frac{dx}{x+2} \\ &= \frac{2}{3} \ln|x-1| + \frac{11}{x+2} + \frac{7}{3} \ln|x+2| + C \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{J = \int \frac{3(x^2 - 2x + 3)}{(x-1)(x+2)^2} dx = \frac{2}{3} \ln|x-1| + \frac{11}{x+2} + \frac{7}{3} \ln|x+2| + C}$$

$$\text{៣. } K = \int \cos^3 x dx = \int \cos x (\cos^2 x) \text{ ដោយ } \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \text{ នោះ } \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

$$\text{គេបាន } K = \int \cos x (1 - \sin^2 x) dx = \int \cos x dx - \int \sin^2 x \cos x dx$$

$$\text{តាង } t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx$$

$$\text{គេបាន } K = \int \cos x dx - \int t^2 dt = \sin x - \frac{t^3}{3} + C = \sin x + \frac{\sin^3 x}{3} + C$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{K = \sin x + \frac{\sin^3 x}{3} + C}$$

$$\text{IV. គេឲ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E): } y'' - 3y' + 2y = 4x^3 - 2x$$

$$\text{១. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលអូម៉ូស្យែន } y'' - 3y' + 2y = 0$$

$$\text{សមីការសំគាល់ } \lambda^2 - 3\lambda + 5 = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$$

$$\text{ដូចនេះ: ចម្លើយទូទៅនៃសមីការគឺ } \boxed{y_c = Ae^x + Be^{2x}}$$

$$\text{២. កំណត់ចំនួនពិត } a, b, c \text{ និង } d$$

$$\text{បើ } g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \text{ ជាចម្លើយពិសេសនៃសមីការ (E)}$$

$$\text{នោះ } g'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \Rightarrow g''(x) = 6ax + 2b \text{ ជំនួសចូលសមីការ (E)}$$

$$\text{គេបាន } g''(x) - 3g'(x) + 2g(x) = 4x^3 - 2x$$

$$6ax + 2b - 3(3ax^2 + 2bx + c) + 2(ax^3 + bx^2 + cx + d) = 4x^3 - 2x$$

$$2ax^3 + (-9a + 2b)x^2 + (6a - 6b + 2c)x + (2b - 3c + 2d) = 4x^3 - 2x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a &= 4 \\ -9a + 2b &= 0 \\ 6a - 6b + 2c &= 2 \\ 2b - 3c + 2d &= 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a &= 2 \\ b &= 9 \\ c &= 22 \\ d &= 24 \end{cases}$$

ដូចនេះ ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ $y = y_c + g(x) = Ae^x + Be^x + 2x^3 + 9x^2 + 22x + 24$, $A, B \in \mathbb{R}$

V. គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x) = \sqrt{3x+1}$ កំណត់លើ $\left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$

១. កំណត់តម្លៃអមនៃ $f'(x)$ ចំពោះ $\forall x \in [1, 5]$

$$\text{ដោយ } f'(x) = \frac{(3x+1)'}{2\sqrt{3x+1}} = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}} \Rightarrow f'(1) = \frac{3}{2\sqrt{4}} = \frac{3}{4}, f'(5) = \frac{3}{2\sqrt{16}} = \frac{3}{8}$$

ចំពោះ $\forall x \in [1, 5]$ និង $f'(1) > f'(5)$ នោះគេបាន $f'(5) \leq f'(x) \leq f'(1)$

ដូចនេះ តម្លៃអមនៃ $f'(x)$ គឺ $\frac{3}{8} \leq f'(x) \leq \frac{3}{4}$

២. បង្ហាញថា $\frac{3}{8}x + \frac{13}{8} \leq \sqrt{3x+1} \leq \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$ ចំពោះ $\forall x \in [1, 5]$

ដោយ $\frac{3}{8} \leq f'(x) \leq \frac{3}{4}$ តាមវិសមភាពកំណើនមានកំណត់

$$\text{គេបាន } \frac{3}{8}(x-1) \leq f(x) - f(1) \leq \frac{3}{4}(x-1)$$

$$\frac{3}{8}x - \frac{3}{8} \leq \sqrt{3x+1} - \sqrt{3(1)+1} \leq \frac{3}{4}x - \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{8}x - \frac{3}{8} + 2 \leq \sqrt{3x+1} \leq \frac{3}{4}x - \frac{3}{4} + 2$$

ដូចនេះ $\frac{3}{8}x + \frac{13}{8} \leq \sqrt{3x+1} \leq \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}, \forall x \in [1, 5]$

VI. f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $y = f(x) = x + e^{1-x}$ ហើយមានក្រាប C ។

ក. គណនា $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^{1-x}) = +\infty + e^{-\infty} = +\infty + 0 = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + e^{1-x}) = -\infty + e^{+\infty} = +\infty - \infty$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x + \frac{e}{e^x}\right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} \left(\frac{x}{e^{-x}} + e\right) = +\infty(0 + e) = +\infty$$

ដោយ $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{1-x} = 0$ នោះគេបាន $L: y = x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C

ខ. បង្ហាញថា f មានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់ $x = 1$

$$\text{គេបាន } f'(x) = (x + e^{1-x})' = 1 + (1-x)'e^{1-x} = 1 - e^{1-x}$$

$$\text{បើ } f'(x) = 0 \text{ នោះ } 1 - e^{1-x} = 0 \Leftrightarrow e^{1-x} = e^0 \Leftrightarrow 1-x = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$\text{បើ } f'(x) > 0 \text{ នោះ } 1 - e^{1-x} > 0 \Leftrightarrow e^{1-x} < e^0 \Leftrightarrow 1-x < 0 \Rightarrow x > 1$$

$$\text{បើ } f'(x) < 0 \text{ នោះ } 1 - e^{1-x} < 0 \Leftrightarrow e^{1-x} > e^0 \Leftrightarrow 1-x > 0 \Rightarrow x < 1$$

តារាងសញ្ញានៃ $f'(x)$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$


ដោយ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី $-$ ទៅ $+$ ត្រង់ $x = 1$ នោះ f មានអតិបរមាត្រង់ $x = 1$ គឺ $f(1) = 1 + e^0 = 2$

សង់តារាងអថេរភាពនៃ f

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	2	$-\infty$

គ . សង់ក្រាប C នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ គេយក $e = 2.7$

បើ $x = 0$ នោះ $y(0) = e$



ឃ . គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្បងកំណត់ដោយក្រាប C អាស៊ីមតូតទ្រេត L បន្ទាត់ឈរ $x = 1$ និង $x = 2$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } S &= \int_1^2 [f(x) - x] dx = \int_1^2 (x + e^{1-x} - x) dx = \int_1^2 e^{1-x} dx = e \int_1^2 e^{-x} dx \\ &= -e [e^{-x}]_1^2 = -e(e^{-2} - e^{-1}) = -e^{-1} + e^0 = 1 - \frac{1}{e} = \frac{e-1}{e} \end{aligned}$$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡា $S = \frac{e-1}{e}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា

VII . ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឲ្យបីចំណុច $A(-2, 1, -3)$, $B(1, 2, 3)$ និង $C(2, -2, 1)$

១ . រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាម A ហើយស្របនឹង $\overrightarrow{BC}$

នោះ $\overrightarrow{BC} = (2 - 1, -2 - 2, 1 - 3) = (1, -4, -2)$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ L

$$\text{គេបានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ } L : \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 - 4t \\ z = -3 - 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

២. គណនា $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$

$$\text{ដោយ } \overrightarrow{AB} = (1 + 2, 2 - 1, 3 + 3) = (3, 1, 6)$$

$$\overrightarrow{AC} = (2 + 2, -2 - 1, 1 + 3) = (4, -3, 4)$$

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 1 & 6 \\ 4 & -3 & 4 \end{vmatrix} = (4 + 18)\vec{i} - (12 - 24)\vec{j} + (-9 - 4)\vec{k} = 22\vec{i} + 12\vec{j} - 13\vec{k}$$

រកសមីការប្លង់ ABC

$$\text{គេបាន សមីការប្លង់ } ABC : 22(x + 2) + 12(y - 1) - 13(z + 3) = 0$$

$$22x + 44 + 12y - 12 - 13z - 39 = 0$$

$$22x + 12y - 13z - 7 = 0$$

គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC

$$\text{គេបាន ក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ } ABC \text{ គឺ } S = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{22^2 + 12^2 + 13^2} = \sqrt{797} \text{ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា}$$

៣. រកមាឌនៃតេត្រាអែត $OABC$

$$\text{ដោយ } \overrightarrow{AO} = (0 + 2, 0 - 1, 0 + 3) = (2, -1, 3) \text{ និង } \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (22, 12, -13)$$

$$\text{នាំឲ្យ } \overrightarrow{AO} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) = (2)(22) + (-1)(12) + (3)(-13) = -7$$

$$\text{គេបាន មាឌតេត្រាអែត } OABC \text{ គឺ } V = \frac{1}{6} |\overrightarrow{AO} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC})| = \frac{|-7|}{6} = \frac{7}{6} \text{ ឯកតាមាឌ}$$

វិញ្ញាសាទី០៣: គ្រឿងប្រឡងប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ: _____

I. ១. ដោះស្រាយសមីការ $z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$ (E) ក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច ។

រកម៉ូឌុល និង អាក្យូម៉ង់នៃឫសនីមួយៗរបស់សមីការ (E) ។

២. សរសេរ $w = \left(\frac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{\sqrt{2} - i\sqrt{2}} \right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

II. គណនាលីមីត៖

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{1 - \cos x}$$

$$B = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt{x+1} - \sqrt{1-x}}$$

$$C = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1}$$

III. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $2y'' + 3y' + y = 0$ តាមលក្ខខណ្ឌដើម $y(0) = 1, y'(0) = 2$ ។

IV. គណនាអាំងតេក្រាល

$$A = \int \frac{2x+7}{x^2-1} dx$$

$$B = \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x}$$

$$C = \int x e^x dx$$

V. ក្នុងចំណោមចំណុច ១៥ ដែលចែកជា ប៊ូលពណ៌បៃតងចំនួន ៧ និងសរសេរលើប៊ូលទាំង ៧ ប៊ូលខៀវចំនួន ៥ និង ប៊ូលពណ៌ក្រហមចំនួន ៣ ។ គេចាប់ប៊ូលបីចេញពីក្នុងចំណោមចំណុចទាំងនេះ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង

B: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌ក្រហមចំនួនពីរ និងបៃតងមួយ

C: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌ខុសគ្នា ។

VI. អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $y = f(x) = \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right)$ ហើយមានក្រាប C ។

១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f រួចបង្ហាញថាជាអនុគមន៍សេស ។

២. គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់ រួចទាញរកអាស៊ីមតូតនៃអនុគមន៍ ។

៣. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

៤. សង់តារាងអថេរភាពនៃ អនុគមន៍ f និងសង់ខ្សែកោង C ។ គេឲ្យ ($e = 2.7$)

៥. ដោយប្រើក្រាប (C) ចូរពិភាក្សាតាមតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m នូវចំនួននឹងសញ្ញានៃឫសសមីការ $\ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) = m$ ។

VII. ក្នុងតម្រុយអរតូនរ័ាល់ ($O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមានមួយ គេឲ្យបីចំណុច $A(3, 1, 4), B(-1, 2, 5), C(5, -2, 3)$

១. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត និង សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (D) ដែលកាត់តាមចំណុច C និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AB}$ ។
២. រកសមីការប្លង់ (P) ដែលមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{AC}$ ហើយកាត់តាមចំណុច B ។ រកសមីការស្វ៊ែរ (S) ដែលមានអង្កត់ធ្នឹត $[AB]$ ។
៣. គណនា $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចសរសេរសមីការប្លង់ ABC ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។
 M ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (D) និងប្លង់ (P) គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច M ។

ដំណោះស្រាយ

- I. ១. ដោះស្រាយសមីការ $z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$ (E) ក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច ។

$$\Delta' = (b')^2 - ac = (-\sqrt{2})^2 - (1)(4) = 2 - 4 = -2 < 0$$

$$\text{គេបាន } z_1 = \frac{-(-\sqrt{2}) + \sqrt{2}i}{1} = \sqrt{2} + i\sqrt{2} \text{ នាំឲ្យ } z_2 = \bar{z}_1 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{2}, z_2 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}}$$

$$\text{រក } |z_1|, |z_2| \text{ និង } \arg(z_1), \arg(z_2)$$

$$\text{ដោយ } |z_1| = |z_2| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\text{គេបាន } z_1 = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$z_2 = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2 \left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right]$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{|z_1| = |z_2| = 2, \arg(z_1) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \arg(z_2) = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ដែល } k \in \mathbb{Z}}$$

២. សរសេរ $w = \left(\frac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{\sqrt{2} - i\sqrt{2}} \right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

$$\text{ដោយ } \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{\sqrt{2} - i\sqrt{2}} = \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{4}\right)$$

$$\text{នាំឲ្យ } w = \left[\cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{4}\right) \right]^2 = \cos\left(\frac{4\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{4}\right)$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{w = \cos \pi + i \sin \pi}$$

II. គណនាលីមីត៖

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{1 - \cos x} \text{ រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}$$

$$\text{គេបាន } A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 2x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = 16 \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin^2 2x}{(2x)^2} \times \frac{\frac{x^2}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2}} \right] = 16$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{A = 16}$$

$$B = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt{x+1} - \sqrt{1-x}} \text{ រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}$$

$$\text{តាង } A(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{1-x} \Rightarrow A(0) = 2$$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } B &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot A(x)}{(\sqrt{x+1} - \sqrt{1-x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{1-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot A(x)}{(\sqrt{x+1})^2 - (\sqrt{1-x})^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{A(x) \sin x}{x+1-1+x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{A(x)}{2} \times \frac{\sin x}{x} \right] = \frac{A(0)}{2} \times 1 = \frac{2}{2} = 1 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $B = 1$

$$C = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1} \text{ រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}$$

$$\text{គេបាន } C = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x + 2x - 2}{x^2 - x + x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1) + 2(x-1)}{x(x-1) + (x-1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x+1} = \frac{3}{2}$$

ដូចនេះ $C = \frac{3}{2}$ III. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $2y'' + 3y' + y = 0$ តាមលក្ខខណ្ឌដើម $y(0) = 1, y'(0) = 2$

$$\text{មានសមីការសម្គាល់ } 2\lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0 \Leftrightarrow (\lambda + 1)(2\lambda + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x + 1 = 0, 2x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow x = -1, x = -\frac{1}{2}$$

$$\text{គេបាន ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ } y = Ae^{-x} + Be^{-\frac{1}{2}x}, A, B \in \mathbb{R} \Rightarrow y(0) = A + B = 1 \quad (1)$$

$$y' = -Ae^{-x} - \frac{1}{2}Be^{-\frac{1}{2}x} \Rightarrow y'(0) = -A - \frac{1}{2}B = 2 \quad (2)$$

$$\text{យកសមីការ (1) + (2) គេបាន } A - A + B - \frac{1}{2}B = 1 + 2 \Leftrightarrow \frac{1}{2}B = 3 \Rightarrow B = 6$$

$$\text{ជំនួសចូលសមីការ (1) នាំឲ្យ } A = 1 - B = 1 - 6 = -5$$

$$\text{ដូចនេះ សមីការមានចម្លើយ } y = -5e^{-x} + 6e^{-\frac{1}{2}x}$$

IV. គណនាអាំងតេក្រាល

$$A = \int \frac{2x+7}{x^2-1} dx$$

$$\text{ដោយ } \frac{2x+7}{x^2-1} = \frac{2x+7}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} = \frac{A(x+1) + B(x-1)}{(x-1)(x+1)}$$

$$\text{សមូល } 2x+7 = Ax + A + Bx - B = (A+B)x + A - B$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A+B = 2 & (1) \\ A-B = 7 & (2) \end{cases}$$

$$\text{យក (1) + (2) គេបាន } 2A = 9 \Rightarrow A = \frac{9}{2} \text{ ជំនួសចូល (1) នោះ } B = 2 - A = 2 - \frac{9}{2} = -\frac{5}{2}$$

$$\text{គេបាន } A = \int \left(\frac{9}{2(x-1)} - \frac{5}{2(x+1)} \right) dx = \frac{9}{2} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{5}{2} \int \frac{dx}{x+1} = \frac{9}{2} \ln|x-1| - \frac{5}{2} \ln|x+1| + C$$

$$\text{ដូចនេះ } A = \frac{9}{2} \ln|x-1| - \frac{5}{2} \ln|x+1| + C, C \in \mathbb{R}$$

$$B = \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x}$$

$$\text{តាង } t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{dx}{x}$$

$$\text{គេបាន } B = \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x} = \int_e^{e^2} \frac{dt}{t} = [\ln|t|]_e^{e^2} = [\ln|\ln x|]_e^{e^2} = |\ln|\ln e^2|| - |\ln|e|| = \ln 2 - 1$$

$$\text{ដូចនេះ } B = \ln 2 - 1$$

$$C = \int xe^x dx$$

តាង $u = x \Rightarrow du = dx$ និង $dv = e^x dx \Rightarrow v = \int e^x dx = e^x$

គេបាន $C = uv - \int v du = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$

ដូចនេះ $C = xe^x - e^x + c, c \in \mathbb{R}$

v. គេចាប់ប៊ូល 3 ចេញពីក្នុងថង់ដែលមានប៊ូលសរុបចំនួន 15 ដោយចៃដន្យ

នោះករណីអាចគឺ $n(S) = C(15, 3) = \frac{15!}{(15-3)!3!} = \frac{12!.13.14.15}{12!3!} = 450$

រក $P(A)$

A: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង នាំឲ្យ $n(A) = C(7, 3) = \frac{7!}{(7-3)!3!} = \frac{4!.5.6.7}{4!3!} = 5 \times 7 = 35$

ដូចនេះ $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{35}{450} = \frac{7}{90}$

រក $P(B)$

B: ប៊ូលដែលចាប់បានពណ៌ក្រហមចំនួន 2 និង បៃតង 1 នាំឲ្យ $n(B) = C(3, 2).C(7, 1) = 3 \times 7 = 21$

ដូចនេះ $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{21}{450} = \frac{7}{150}$

រក $P(C)$

C: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌ខ្ពស់គ្នា នាំឲ្យ $n(C) = C(7, 1).C(5, 1).C(3, 1) = 7 \times 5 \times 3 = 150$

ដូចនេះ $P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{150}{450} = \frac{1}{3}$

VI. អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $y = f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ ហើយមានក្រាប C

១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f

អនុគមន៍ f មានន័យកាលណា $\frac{x+1}{x-1} > 0$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	0	$+$
$\frac{x+1}{x-1}$	$+$	$-$	$+$	$+$

តាមតារាងសញ្ញា ដោយ $\frac{x+1}{x-1} > 0 \Rightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

ដូចនេះ ដែនកំណត់ $\mathcal{D} = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

បង្ហាញថា f ជាអនុគមន៍សេស

$$\begin{aligned}
 \forall x \in \mathcal{D}, \exists -x \in \mathcal{D} \text{ គេបាន } f(-x) &= \ln\left(\frac{-x+1}{-x-1}\right) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \\
 &= \ln(x-1) - \ln(x+1) \\
 &= -[\ln(x+1) - \ln(x-1)] \\
 &= -\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \\
 &= -f(x)
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ f ជាអនុគមន៍សេស

២. គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់

$$\text{គេបាន } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \ln \left(\frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \right) = \ln 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) = \ln \left(\frac{-1+1}{-1-1} \right) = \ln 0^+ = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) = \ln \left(\frac{1+1}{1-1} \right) = \ln +\infty = +\infty$$

គេបាន $y = 0$ ជាអាស៊ីមតូតដេក និង $x = -1, x = 1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃអនុគមន៍ f

៣. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } f'(x) &= \left[\ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) \right]' = [\ln(x+1)]' - [\ln(x-1)]' = \frac{(x+1)'}{x+1} - \frac{(x-1)'}{x-1} \\ &= \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} = \frac{x-1-x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{-2}{(x-1)(x+1)} \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } f'(x) = \frac{-2}{(x-1)(x+1)}$$

ដោយ $(x-1)(x+1) > 0, \forall x \in \mathcal{D} \Rightarrow f'(x) < 0$ នោះអនុគមន៍ f ចុះដាច់ខាតលើ $\mathcal{D}$

៤. តារាងអថេរភាពនៃ អនុគមន៍ f

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f(x)$	$-$			$-$
$f(x)$	0	$-\infty$	$+\infty$	0

សង់ខ្សែកោង C

បើ $y = 1$ នោះ


$$1 = \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right)$$

$$\Leftrightarrow e = \frac{x+1}{x-1}$$

$$\Leftrightarrow ex - e = x + 1$$

$$\Leftrightarrow x(e-1) = 1+e$$

$$\Rightarrow x = \frac{3.7}{1.7} = 2.17$$



៥. ពិភាក្សាតម្លៃ m នៃសមីការ $\ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) = m \quad (I)$

(I) ជាសមីការអាប៉ូស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាង ខ្សែកោង (C) និង បន្ទាត់ $y = m$ តាមក្រាប

គេបាន $m \in (-\infty, 0)$ សមីការ (I) មានឫសតែមួយគត់ជាចំនួនពិតអវិជ្ជមាន

$$\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = m \Leftrightarrow \frac{x+1}{x-1} = e^m \Rightarrow x = \frac{e^m + 1}{e^m - 1}$$

$m \in (0, +\infty)$ សមីការ (I) មានឫសតែមួយគត់ជាចំនួនវិជ្ជមានគឺ $x = \frac{e^m + 1}{e^m - 1}$

$m = 0$ សមីការ (I) គ្មានឫស

VII. ក្នុងតម្រុយអរតូនរ៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមានមួយ គេឲ្យបីចំណុច $A(3, 1, 4), B(-1, 2, 5), C(5, -2, 3)$

១. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (D) ដែលកាត់តាមចំណុច C និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{AB}$

ដោយ $\vec{AB} = (-1 - 3, 2 - 1, 5 - 4) = (-4, 1, 1)$

គេបាន សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (D) :
$$\begin{cases} x = 5 - 4t \\ y = -2 + t \\ z = 3 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

សមីការឆ្លុះនៃ (D) : $\frac{x-5}{-4} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{1}$

២. រកសមីការប្លង់ (P) ដែលមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{AC}$ ហើយកាត់តាមចំណុច B

ដោយ $\vec{AC} = (5 - 3, -2 - 1, 3 - 4) = (2, -3, -1)$

គេបាន (P) : $2(x+1) - 3(y-2) - (z-5) = 0$

$$2x + 2 - 3y + 6 - z + 5 = 0$$

ដូចនេះ សមីការប្លង់ (P) : $2x - 3y - z + 13 = 0$

រកសមីការស្វ៊ែរ (S) ដែលមានអង្កត់ធ្នឹត [AB]

ដោយ $[AB] = |\vec{AB}| = \sqrt{4^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ នាំឲ្យ $r = \frac{[AB]}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

និងផ្ចិត $\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right) = \left(\frac{3-1}{2}, \frac{1+2}{2}, \frac{4+5}{2}\right) = \left(1, \frac{3}{2}, \frac{9}{2}\right)$

គេបានសមីការស្វ៊ែរ $S : (x-1)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{9}{2}\right)^2 = \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2$

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 - 3y + \frac{9}{4} + z^2 - 9z + \frac{81}{4} = \frac{9}{2}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 3y - 9z + \frac{45}{2} - \frac{9}{2} = 0$$

ដូចនេះ សមីការស្វ៊ែរ S : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 3y - 9z + 18 = 0$

៣. គណនា $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}$ រួចសរសេរសមីការប្លង់ ABC

$$\begin{aligned}\text{គេបាន } \vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -4 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (-1+3)\vec{i} - (4-2)\vec{j} + (12-2)\vec{k} \\ \vec{n} &= 2\vec{i} - 2\vec{j} + 10\vec{k}\end{aligned}$$

$$\text{គេបានសមីការប្លង់ } ABC : 2(x-3) - 2(y-1) + 10(z-4) = 0$$

$$2x - 6 - 2y + 2 + 10z - 40 = 0$$

$$2x - 2y + 10z - 44 = 0$$

$$x - y + 5z - 22 = 0$$

គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC

$$\begin{aligned}\text{គេបាន } S_{\triangle ABC} &= \frac{|n|}{2} = \frac{\sqrt{2^2 + 2^2 + 10^2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{4+4+100}}{2} = \frac{\sqrt{108}}{2} = \sqrt{27} \\ &= 3\sqrt{3} \text{ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា}\end{aligned}$$

គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច $M(x, y, z)$

M ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ $(D) : x = 5-4t, y = -2+t, z = 3+t$ និងប្លង់ $(P); 2x-3y-z+13=0$

$$\text{គេបាន } 2(5-4t) - 3(-2+t) - (3+t) + 13 = 0$$

$$10 - 8t + 6 - 3t - 3 - t + 13 = 0$$

$$\begin{aligned}-12t &= -26 \Rightarrow t = \frac{13}{6} \\ \text{នាំឲ្យ } x &= 5 - \frac{4(13)}{6} = \frac{30-52}{6} = -\frac{11}{3}, y = -2 + \frac{13}{6} = \frac{-12+13}{6} = \frac{1}{6}, z = 3 + \frac{13}{6} = \frac{18+13}{6} = \frac{31}{6} \\ \text{ដូនេះ ចំណុចប្រសព្វ } M &\left(-\frac{11}{3}, \frac{1}{6}, \frac{31}{6}\right)\end{aligned}$$

វិញ្ញាសាទី០៤: គ្រឿងប្រលងប្រឡងប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន: _____

I. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $A = (\sqrt{3} - 1) + i(\sqrt{3} + 1)$ និង $B = \frac{x + iy}{1 + i}$ ដែល x, y ជាចំនួនពិត ។

១. សរសេរ A^2 ជាទម្រង់ពីជគណិត ហើយជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

២. សរសេរ B ជាទម្រង់ពីជគណិត ។ រកតម្លៃ x, y ដោយដឹងថា $2\bar{B} - A^2 = 0$ ($\bar{B}$ ជាកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ B) ។

II. គណនាលីមីតខាងក្រោម៖

១. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - x - 3}{x^3 + 2x^2 + 6x + 5}$

៣. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\pi - 2x}{\cos x}$

២. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + e^x - 1}{x^2 + x}$

៤. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{2x - 1}}{\sqrt{x + 2} - \sqrt{x^2 + 2x - 4}}$

III. ១. ដោះស្រាយសមីការ $(E) : y'' + 5y' + 6y = 0$ ។

២. រកចម្លើយនៃសមីការ (E) បើគេដឹងថាបន្ទាត់ $(D) : y = x - 1$ ប៉ះក្រាបនៃចម្លើយត្រង់ $x = 0$ ។

IV. រកសមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានអ័ក្សឆ្លុះស្របអ័ក្សអរដោនេ ហើយក្រាបវាភាគតាមចំណុច $(-2, -3), (2, 5)$ និង $(1, 6)$ ។ កំណត់កូអរដោនេ កំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស រួចសង់ប៉ារ៉ាបូល ។

V. គេឲ្យអនុគមន៍ g កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x) = e^{2x} - 2e^x + \frac{1}{2}x + 1$ មានក្រាប (C) ។

១. គណនា $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ ។ រកសមីការបន្ទាត់ (D) ជាអាស៊ីមតូតនៃ (C) ។

២. បង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍កើន ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ g ។

៣. សរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ទៅនឹងខ្សែកោង (C) ត្រង់ $x = 0$ ។

៤. សង់ក្រាប $(T), (D)$ និង (C) ក្នុងតម្រុយតែមួយ ។

VI. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(2, 0, 1), B(3, 1, 5)$ និង $C(1, 4, 4)$

១. គណនា $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។

២. គណនា $\vec{N} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃ $\triangle ABC$ ។

៣. រកសមីការប្លង់ (ABC) ។ បង្ហាញថាចំណុច $D(2, 0, 2)$ មិននៅក្នុងប្លង់ (ABC) ។

៤. រកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) រួចគណនាមាឌតេត្រាអែត $ABCD$ ។

៥. សរសេរសមីការស្វ៊ែរ (S) ដែលមានអង្កត់ធ្នឹម $[AB]$ ។

ដំណោះស្រាយI. ១. សរសេរ A^2 ជាទម្រង់ពីជគណិត

$$\text{គេមាន } A = (\sqrt{3} - 1) + i(\sqrt{3} + 1)$$

$$\text{គេបាន } A^2 = [(\sqrt{3} - 1) + i(\sqrt{3} + 1)]^2$$

$$= (\sqrt{3} - 1)^2 + 2(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)i + i^2(\sqrt{3} + 1)^2, i^2 = -1$$

$$= 3 - 2\sqrt{3} + 1 + 4i - (3 + 2\sqrt{3} + 1)$$

$$\text{ដូចនេះ } A^2 = -4\sqrt{3} + 4i$$

សរសេរ A^2 ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

$$\text{គេបាន } A^2 = -4\sqrt{3} + 4i$$

$$= 8 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right)$$

$$\text{ដូចនេះ } A^2 = 8 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

២. សរសេរ B ជាទម្រង់ពីជគណិត

$$\text{គេមាន } B = \frac{x + iy}{1 + i} \quad \text{ដែល } x, y \in \mathbb{R}$$

$$= \frac{(x + iy)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)}$$

$$= \frac{x - xi + iy - i^2y}{1 - i^2}, i^2 = -1$$

$$= \frac{(x + y) + (y - x)i}{2}$$

$$\text{ដូចនេះ } B = \frac{x + y}{2} + \frac{y - x}{2}i$$

$$\text{រកតម្លៃ } x, y \text{ ដោយដឹងថា } 2\overline{B} - A^2 = 0 \text{ (}\overline{B} \text{ ជាកំរិតឆ្លាស់នៃ } B \text{) នោះ } \overline{B} = \frac{x + y}{2} - \frac{y - x}{2}i$$

$$\text{គេបាន } 2\overline{B} - A^2 = 0$$

$$2\overline{B} = A^2$$

$$x + y - (y - x)i = -4\sqrt{3} + 4i$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = -4\sqrt{3} & (1) \\ y - x = 4 & (2) \end{cases}$$

$$\text{យក (1) + (2) នោះ } 2y = 4 - 4\sqrt{3} \Rightarrow y = 2 - 2\sqrt{3}$$

$$\text{ជំនួសចូល (1) នោះ } x = -4\sqrt{3} - y = -4\sqrt{3} - 2 + 2\sqrt{3} = -2 - 2\sqrt{3}$$

$$\text{ដូចនេះ } x = -2 - 2\sqrt{3}, y = 2 - 2\sqrt{2}$$

II. គណនាលីមីត

$$9. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - x - 3}{x^3 + 2x^2 + 6x + 5} \text{ រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}$$

$$\begin{aligned}
 \text{គេបាន } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - x - 3}{x^3 + 2x^2 + 6x + 5} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + 2x - 3x - 3}{x^3 + x^2 + x^2 + x + 5x + 5} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x(x+1) - 3(x+1)}{x^2(x+1) + x(x+1) + 5(x+1)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(2x-3)}{(x+1)(x^2+x+5)} \\
 &= \frac{2(-1) - 3}{(-1)^2 + (-1) + 5}
 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - x - 3}{x^3 + 2x^2 + 6x + 5} = -1$$

$$\text{២. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + e^x - 1}{x^2 + x} \text{ រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}$$

$$\begin{aligned}
 \text{គេបាន } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + e^x - 1}{x^2 + x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x(x+1)} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x(x+1)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \times \frac{1}{x+1} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \times \frac{1}{x+1} \\
 &= 1 \times 1 + 1 \times 1
 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + e^x - 1}{x^2 + x} = 2$$

$$\text{៣. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\pi - 2x}{\cos x} \text{ រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}$$

$$\text{តាង } t = x - \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = t + \frac{\pi}{2} \text{ បើ } x \rightarrow \frac{\pi}{2} \text{ នោះ } t \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned}
 \text{គេបាន } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\pi - 2(t + \frac{\pi}{2})}{\cos(t + \frac{\pi}{2})} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-2t}{-\sin t} \\
 &= 2 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} \\
 &= 2 \times 1
 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\pi - 2x}{\cos x} = 1$$

$$\text{៤. } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{2x - 1}}{\sqrt{x + 2} - \sqrt{x^2 + 2x - 4}} \text{ រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}$$

$$\text{តាង } A(x) = \sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{2x - 1} \Rightarrow A(2) = \sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{និង } B(x) = \sqrt{x + 2} - \sqrt{x^2 + 2x - 4} \Rightarrow B(2) = 2 - 2 = 0$$

$$\begin{aligned}
 \text{គេបាន } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{2x - 1}}{\sqrt{x + 2} - \sqrt{x^2 + 2x - 4}} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{2x - 1})A(x).B(x)}{(\sqrt{x + 2} - \sqrt{x^2 + 2x - 4})B(x).A(x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{[x^2 - 1 - (2x - 1)]B(x)}{[x + 2 - (x^2 + 2x - 4)]A(x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 2x)B(x)}{-(x^2 + x - 6)A(x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x - 2)B(x)}{-(x - 2)(x + 3)A(x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{xB(x)}{-(x + 3)A(x)} \\
 &= \frac{2.B(2)}{-5.A(2)} = \frac{2 \times 0}{-5 \times 2\sqrt{3}} = -\frac{4\sqrt{3}}{15}
 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{2x - 1}}{\sqrt{x + 2} - \sqrt{x^2 + 2x - 4}} = -\frac{4\sqrt{3}}{15}$$

$$\text{III. ១. ដោះស្រាយសមីការ (E) : } y'' + 5y' + 6y = 0$$

$$\text{មានសមីការសំគាល់ } \lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 + 2\lambda + 3\lambda + 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda(\lambda + 2) + 3(\lambda + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\lambda + 3)(\lambda + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -2, x = -3$$

$$\text{គេបាន } y = Ae^{\lambda_1} + Be^{\lambda_2} = Ae^{-2x} + Be^{-3x}$$

ដូចនេះ ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ $y = Ae^{-2x} + Be^{-3x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

២. រកចម្លើយនៃសមីការ (E) បើគេដឹងថាបន្ទាត់ (D) : $y = x - 1$ ប៉ះក្រាបនៃចម្លើយត្រង់ $x = 0$

$$\text{នោះ } y(0) = 0 - 1 = -1 \text{ និង } y' = (x - 1)' = 1 \Rightarrow y'(0) = 1$$

$$\text{ដោយ } y = Ae^{-2x} + Be^{-3x} \Rightarrow y(0) = Ae^0 + Be^0$$

$$\Leftrightarrow -1 = A + B \quad (1)$$

$$\text{និង } y = Ae^{-2x} + Be^{-3x} \Rightarrow y' = (-2x)'Ae^{-2x} + (-3x)'Be^{-3x}$$

$$= -2Ae^{-2x} - 3Be^{-3x}$$

$$\Rightarrow y'(0) = -2Ae^0 - 3Be^0$$

$$\Leftrightarrow 1 = -2A - 3B \quad (2)$$

$$\text{យក } 2(1) + (2) \text{ គេបាន } 2(-1) + 1 = 2(A + B) - 2A - 3B$$

$$-1 = 2A + 2B - 2A - 3B$$

$$-1 = -B$$

$$B = 1$$

$$\text{ជំនួលចូល (1) នោះ } -1 = A + 1 \Rightarrow A = -2$$

$$\text{ដូចនេះ ចម្លើយនៃសមីការ (E) គឺ } y = -2e^{-2x} + e^{-3x}$$

IV . រកសមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូល

ដោយប៉ារ៉ាបូលមានអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សឈរ ហើយក្រាបវាកាត់តាមចំណុច $(-2, -3)$, $(2, 5)$ និង $(1, 6)$

សមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូលមានអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សឈរគឺ $(x - h)^2 = 4p(y - k)$

កាត់តាមចំណុច $(-2, -3)$ នោះ $(-2 - h)^2 = 4p(-3 - k)$

$$4 + 4h + h^2 = -12p - 4pk$$

$$h^2 + 4pk = -12p - 4h - 4 \quad (1)$$

កាត់តាមចំណុច (2, 5) នោះ $(2 - h)^2 = 4p(5 - k)$

$$4 - 4h + h^2 = 20p - 4pk$$

$$h^2 + 4pk = 20p + 4h - 4$$

$$-12p - 4h - 4 = 20p + 4h - 4$$

$$32p + 8h = 0$$

$$4p + h = 0 \quad (2)$$

កាត់តាមចំណុច (1, 6) នោះ $(1 - h)^2 = 4p(6 - k)$

$$1 - 2h + h^2 = 24p - 4pk$$

$$h^2 + 4pk = 24p + 2h - 1$$

$$-12p - 4h - 4 = 24p + 2h - 1$$

$$36p + 6h = -3$$

$$12p + 2h = -1 \quad (3)$$

យក $2(1) - (2)$ គេបាន $2(4p + h) - (12p + 2h) = 0 - (-1)$

$$8p + 2h - 12p - 2h = 1$$

$$-4p = 1$$

$$p = -\frac{1}{4}$$

ជំនួសចូល (2) នោះ $h = -4p = -4\left(-\frac{1}{4}\right) = 1$

ជំនួសចូល (1) គេបាន $4 + 4h + h^2 + 12p = -4pk$

$$4 + 4(1) + 1^2 - 3 = k$$

$$6 = k$$

ដូចនេះ រកសមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូលគឺ $P : (x - 1)^2 = -(y - 6)$


កំណត់កូអរដោនេ កំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស

គេបាន កំពូល $V(h, k) = V(1, 6)$

កំណុំ $F(h, k + p) = F\left(1, 6 - \frac{1}{4}\right) = F\left(1, \frac{23}{4}\right)$

សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $\Delta : y = k - p = 6 + \frac{1}{4} = \frac{25}{4}$

សង់ប៉ារ៉ាបូល



v . គេឲ្យអនុគមន៍ g កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x) = e^{2x} - 2e^x + \frac{1}{2}x + 1$ មានក្រាប (C)

១ . គណនា $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

$$\text{គេបាន } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(e^{2x} - 2e^x + \frac{1}{2}x + 1 \right)$$

$$= -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(e^{2x} - 2e^x + \frac{1}{2}x + 1 \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} \left(1 - \frac{2}{e^x} + \frac{x}{2e^{2x}} + \frac{1}{e^{2x}} \right)$$

$$= +\infty$$

រកសមីការបន្ទាត់ (D) ជាអាស៊ីមតូតនៃ (C)

ដោយ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{2x} - 2e^x) = 0$ នាំឲ្យ $D : y = \frac{1}{2}x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតខាង $-\infty$

២ . បង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍កើន

$$\text{យើងមាន } g(x) = e^{2x} - 2e^x + \frac{1}{2}x + 1 \Rightarrow g'(x) = 2e^{2x} - 2e^x + \frac{1}{2}$$

$$= 4e^{2x} - 4e^x + 1$$

$$= (2e^x - 1)^2 > 0$$

ដោយ $g'(x) > 0$ នោះ g ជាអនុគមន៍កើន

តារាងអថេរភាពនៃ g

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

៣. សរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ទៅនឹងខ្សែកោង (C) ត្រង់ $x = 0$

គេបាន $T : y - g(0) = g'(0)(x - x_0)$


$$y - (e^0 - 2e^0 + 0 + 1) = (2e^0 - 1)^2(x - 0)$$

$$y = x$$

ដូចនេះ បន្ទាត់ប៉ះ $T : y = x$

៤. សង់ក្រាប (T), (D) និង (C) ក្នុងតម្រុយតែមួយ

x	$T : y = x$	$D : y = \frac{1}{2}x + 1$	$C : y = e^{2x} - 2e^x + \frac{1}{2}x + 1$
0	0	1	0
1	1	$\frac{3}{2}$	3.4



VI. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(2, 0, 1)$, $B(3, 1, 5)$ និង $C(1, 4, 4)$

១. គណនា $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$

គេបាន $\overrightarrow{AB} = (3 - 2, 1 - 0, 5 - 1) = (1, 1, 4)$

$$\overrightarrow{AC} = (1 - 2, 4 - 0, 4 - 1) = (-1, 4, 3)$$

២. គណនា $\vec{N} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$

$$\text{គេបាន } \vec{N} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 4 \\ -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \vec{i}(3 - 16) - \vec{j}(3 + 4) + \vec{k}(4 + 1) = -13\vec{i} - 7\vec{j} + 5\vec{k}$$

គណនាត្រីកោណ $\triangle ABC$

$$\text{គេបាន } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|\vec{N}| = \frac{1}{2}\sqrt{13^2 + 7^2 + 5^2} = \frac{1}{2}\sqrt{169 + 49 + 25} = \frac{1}{2}\sqrt{243} = \frac{9\sqrt{3}}{2} \text{ ឯកតាផ្ទៃ}$$

៣. រកសមីការប្លង់ (ABC)

$$\text{គេបាន } (ABC) : a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

$$-13(x - 2) - 7(y - 0) + 5(z - 1) = 0$$

$$-13x + 26 - 7y + 5z - 5 = 0$$

$$-13x - 7y + 5z + 21 = 0$$

$$13x + 7y - 5z - 21 = 0$$

បង្ហាញថាចំណុច $D(2, 0, 2)$ មិននៅក្នុងប្លង់ (ABC)

$$\text{គេបាន } 13x_D + 7y_D - 5z_D - 21 = 13(2) + 7(0) - 5(2) - 21$$

$$= 26 - 10 - 21$$

$$= -5 \neq 0$$

៤. រកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC)

$$\text{គេបាន } d[D, (ABC)] = \frac{|13x_D + 7y_D - 5z_D - 21|}{\sqrt{13^2 + 7^2 + 5^2}} = \frac{|-5|}{9\sqrt{3}}$$

$$= \frac{5\sqrt{3}}{27} \text{ ឯកតាប្រវែង}$$

គណនាមាឌតេត្រាអែត $ABCD$

$$\text{គេបាន មាឌតេត្រាអែត} = \frac{1}{3} \text{ ត្រីកោណបាទ} \times \text{កំពស់}$$

$$V_{ABCD} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}|\vec{N}| \times d[D, (ABC)]$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{9\sqrt{3}}{2} \times \frac{5\sqrt{3}}{27}$$

$$= \frac{3 \times 5}{18} = \frac{5}{6} \text{ ឯកតាមាឌ}$$

៥. សរសេរសមីការស្វ៊ែរ (S) ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$

$$\text{ដោយ } [AB] \text{ ជាអង្កត់ផ្ចិតនោះ } I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right) = I\left(\frac{2+3}{2}, \frac{0+1}{2}, \frac{1+5}{2}\right) = I\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}, 3\right)$$

$$\text{និងមានកាំ } r = \frac{|\vec{AB}|}{2} = \frac{\sqrt{1^2 + 1^2 + 4^2}}{2} = \frac{\sqrt{20}}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}$$

$$\text{គេបាន } S : \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + (z - 3)^2 = (\sqrt{5})^2$$

$$x^2 - 5x + \frac{25}{4} + y^2 - y + \frac{1}{4} + z^2 - 6z + 9 - 5 = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 5x - y - 6z + \frac{21}{2} = 0$$

វិញ្ញាសាទី០៥: គ្រឿងប្រលងបាត់ខ្មុបឆ្នាំ២០១៩

នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន: _____

I. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}$ ។

១. គណនា z^2 រួចសរសេរ z^2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ៣. ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{\pi}{8}$ និង $\sin \frac{\pi}{8}$
 ២. ចូរសរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

II. គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E) : 2y'' - 3y' + y = x^2$ ។

១. កំណត់រកចំនួនពិត a, b និង c ដើម្បីឲ្យអនុគមន៍ g កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x) = ax^2 + bx + c$ ជាចម្លើយពិសេសនៃ (E)
 ២. បើ h ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ $2y'' - 3y' + y = 0$ បង្ហាញថា $f = h + g$ ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)
 ៣. រកចម្លើយ h នៃសមីការ $2y'' - 3y' + y = 0$ រួចទាញរកចម្លើយទូទៅ f នៃសមីការ (E)

III. គេរៀបឆ្នោត 150 សន្លឹកដើម្បីលក់ឲ្យអស់មុនពេលចេញផ្ទៀង ដែលក្នុងនោះមានឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ 5 សន្លឹក ។ មនុស្សម្នាក់ទិញឆ្នោត 10 សន្លឹក ។ រកប្រូបាបដែល

១. គ្មានត្រូវរង្វាន់សោះ ២. ត្រូវរង្វាន់យ៉ាងតិច 1 សន្លឹក ៣. ត្រូវរង្វាន់ 3 សន្លឹកគត់ ។

IV. អេលីបសូលមានសមីការទូទៅ $12x^2 + 20y^2 - 12x + 40y - 37 = 0$ ។

១. បង្កើនសមីការនេះជាសមីការស្តង់ដា ។ ២. រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និង កំណុំ ។

V. គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះ $x > 0$ ដោយ $y = f(x) = 1 - \frac{2 \ln x}{x}$ ហើយមានក្រាប C ។

១. រក $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប C ។
 ២. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ ហើយសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។
 ៣. សង់ក្រាប C នៅក្នុងតម្រុយអរដោនេមួយ ។ គេឲ្យ $(e = 2.7, \frac{2}{e} = 0.7)$ ។
 ៤. គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់កំណត់ដោយក្រាប C អាស៊ីមតូតដេក បន្ទាត់ឈរ $x = 1$ និង $x = e$ ។

VI. ក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ មានទិសដៅវិជ្ជមាន គេឲ្យចំណុច $A(1, 0, 2), B(1, 1, 3)$ និង $C(2, 1, 2)$ ។

១. គណនា $\vec{AB} \times \vec{AC}$ រួចទាញរកផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។
 ២. គណនា $\vec{AO} \cdot (\vec{AB} \times \vec{AC})$ រួចទាញរកមាឌនៃប្រលេពីប៉ែតដែលមានវ៉ិចទ័រ $\vec{AB}, \vec{AC}$ និងមាឌនៃចតុមុខ $OABC$ ។

ដំណោះស្រាយ

១. តើមាន $z = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}$

១. គណនា z^2

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } z^2 &= \left(\sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}} \right)^2 \\ &= \left(\sqrt{2 + \sqrt{2}} \right)^2 + i^2 \left(\sqrt{2 - \sqrt{2}} \right)^2 + 2i\sqrt{2 + \sqrt{2}}\sqrt{2 - \sqrt{2}}, i^2 = -1 \\ &= 2 + \sqrt{2} - 2 + \sqrt{2} + 2i\sqrt{2} \\ &= 2\sqrt{2} + 2i\sqrt{2} \end{aligned}$$

សរសេរ z^2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } z^2 &= 4 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= 4 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

២. សរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

• រៀបរៀង

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } z &= \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}} \\ &= \sqrt{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}} + i\sqrt{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{4}} + i\sqrt{1 - \cos \frac{\pi}{4}} \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\sqrt{2 \cos^2 \frac{\pi}{8}} + i\sqrt{2 \sin^2 \frac{\pi}{8}} \right) \\ &= 2 \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right) \end{aligned}$$

• រៀបរៀង

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } z &= \sqrt{z^2} = \sqrt{4} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{2} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{2} \right), k = 0, 1 \\ &= 2 \left[\cos \left(\frac{\pi}{8} + k\pi \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{8} + k\pi \right) \right] \\ \text{បើ } k &= 0 \text{ នោះ } z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right) \\ \text{បើ } k &= 1 \text{ នោះ } z = 2 \left(\cos \frac{9\pi}{8} + i \sin \frac{9\pi}{8} \right) \text{ មិនយកព្រោះ } \cos \frac{9\pi}{8} < 0 \text{ និង } \sin \frac{9\pi}{8} < 0 \\ \text{ដូចនេះ } z &= 2 \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right) \end{aligned}$$

៣. ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{\pi}{8}$ និង $\sin \frac{\pi}{8}$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}} &= 2 \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right) = 2 \cos \frac{\pi}{8} + i2 \sin \frac{\pi}{8} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \cos \frac{\pi}{8} &= \sqrt{2 + \sqrt{2}} \\ 2 \sin \frac{\pi}{8} &= \sqrt{2 - \sqrt{2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \frac{\pi}{8} &= \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2} \\ \sin \frac{\pi}{8} &= \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

II . គេមាន $(E) : 2y'' - 3y' + y = x^2$

១ . រកចំនួនពិត a, b និង c

គេមាន $g(x) = ax^2 + bx + c \Rightarrow g'(x) = 2ax + b \Rightarrow g''(x) = 2a$ ដោយ $g(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E)

នោះគេបាន $2g''(x) - 3g'(x) + g(x) = x^2$

$$2(2a) - 3(2ax + b) + ax^2 + bx + c = x^2$$

$$4a - 6ax - 3b + ax^2 + bx + c = x^2$$

$$ax^2 - (6a - b) + 4a - 3b + c = x^2$$

$$\Leftrightarrow a = 1, 6a - b = 0 \Rightarrow b = 6a = 6, 4a - 3b + c = 0 \Rightarrow c = -4(1) + 3(6) = 14$$

ដូចនេះ $a = 1, b = 6, c = 14$

២ . បើ h ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ $2y'' - 3y' + y = 0$ បង្ហាញថា $f = h + g$ ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)

គេបាន $2f'' - 3f' + f = x^2$, ដែល $g(x) = x^2 + 6x + 14, g'(x) = 2x + 6, g''(x) = 2$

$$2(h + g)'' - 3(h + g)' + h + g = x^2$$

$$2h'' + 2g'' - 3h' - 3g' + h + g = x^2$$

$$2h'' + 2(2) - 3(2x + 6) - 3h' + h + x^2 + 6x + 14 = x^2$$

$$2h'' - 3h' + h = 0$$

ដូចនេះ $f + g$ ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)

III . រកចម្លើយ h នៃសមីការ $2y'' - 3y' + y = 0$

គេមានសមីការសម្គាល់ $2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$

$$(2\lambda - 1)(\lambda - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}, \lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

ដូចនេះ $h : h(x) = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

គេបានចម្លើយទូទៅ f នៃសមីការ (E)

គឺ f ដែល $f(x) = h(x) + g(x) = 2x^2 + 12x + 28 + Ae^x + B^{\frac{1}{2}x}$

ដូចនេះ f គឺ $f(x) = 2x^2 + 12x + 28 + Ae^x + B^{\frac{1}{2}x}, A, B \in \mathbb{R}$

III . មនុស្សម្នាក់ទិញឆ្នោត 10 សន្លឹក ចេញពីចំនួនឆ្នោតសរុប 150 សន្លឹក

$$\text{នោះករណីអាច } n(S) = C(150, 10) = \frac{150!}{(150-10)!10!} = \frac{150!}{140!10!}$$

១ . រកប្រូបាបដែលគ្មានត្រូវរង្វាន់សោះ

ចំនួនដែលគ្មានត្រូវរង្វាន់មានចំនួន $150 - 5 = 145$ សន្លឹក នោះចំនួនរបៀបដែលជ្រើសរើសឆ្នោតគ្មានរង្វាន់ 10

$$\text{សន្លឹកគឺ } n(A) = C(145, 10) = \frac{145!}{(145-10)!10!} = \frac{145!}{135!10!}$$

$$\text{គេបាន } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{145!}{135!10!} \times \frac{140!10!}{150!} = \frac{136 \times 137 \times 138 \times 139 \times 139 \times 140}{146 \times 147 \times 148 \times 149 \times 150} = 0.7048$$

២ . រកប្រូបាបដែលត្រូវរង្វាន់យ៉ាងតិច 1 សន្លឹក

ព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវរង្វាន់យ៉ាងតិច 1 សន្លឹកជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយនឹងគ្មានត្រូវរង្វាន់សោះ ។

គេបាន ប្រូបាបដែលត្រូវរង្វាន់យ៉ាងតិច 1 សន្លឹកគឺ $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.7048 = 0.2952$

៣ . រកប្រូបាបដែលត្រូវរង្វាន់ 3 សន្លឹកគត់

ដោយរបៀបដែលជ្រើសរើសឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ 3 សន្លឹកក្នុងចំណោមឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ 5 សន្លឹកគឺ $C(5, 3)$ ឯឆ្នោតដែលទិញ 7 សន្លឹកទៀតជាឆ្នោតគ្មានរង្វាន់រើសចេញពីឆ្នោត 145 សន្លឹកដែលគ្មានរង្វាន់ ។ ចំនួនរបៀបដែលជ្រើសរើសឆ្នោត 7 សន្លឹកនេះគឺ $C(145, 7)$

នោះ ចំនួនករណីស្របនៃព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវរង្វាន់ 3 សន្លឹកគឺ $n(B) = C(5, 3)C(145, 7)$

គេបាន $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{C(5, 3)C(145, 7)}{C(150, 10)} = \frac{5!}{2!3!} \times \frac{145!}{138!7!} \times \frac{140!10!}{150!} = 0.002$

IV . ១ . បម្លែងសមីការអេលីប៊ីបជាសមីការស្តង់ដា

គេបាន $12x^2 + 20y^2 - 12x + 40y - 37 = 0$

$$12 \left(x^2 - 2x \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) + 20(y^2 + 2y + 1) - 60 = 0$$

$$12 \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + 20(y + 1)^2 = 60$$

$$\text{ដូចនេះ } \frac{(x - \frac{1}{2})^2}{5} + \frac{(y + 1)^2}{3} = 1 \text{ ឬ } \frac{(x - \frac{1}{2})^2}{(\sqrt{5})^2} + \frac{(y + 1)^2}{(\sqrt{3})^2} = 1$$

២ . រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និង កំណុំ

ដោយ $a = \sqrt{5}, b = \sqrt{3}, h = \frac{1}{2}, k = -1$ និង $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{5 - 3} = \sqrt{2}$

គេបាន ផ្ចិត $I(h, k) = I\left(\frac{1}{2}, -1\right)$, កំពូល $V_1(h-a, k) = V_1\left(\frac{1}{2} - \sqrt{5}, -1\right)$, $V_2(h+a, k) = V_2\left(\frac{1}{2} + \sqrt{5}, -1\right)$

កំណុំ $F_1(h-c, k) = F_1\left(\frac{1}{2} + \sqrt{2}, -1\right)$ និង $F_2(h+c, k) = F_2\left(\frac{1}{2} - \sqrt{2}, -1\right)$

V . គេមាន $f : y = f(x) = 1 - \frac{2 \ln x}{x}$ ហើយមានក្រាប C

ដោយ f កំណត់ចំពោះ $x > 0$ ដូចនេះ ដែនកំណត់ $\mathcal{D}_f = (0, +\infty)$

១ . គណនា $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

គេបាន $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2 \ln x}{x} \right) = 1$ ព្រោះ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 - \frac{2 \ln x}{x} \right) = +\infty$$

នាំឲ្យ $x = 0$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប C

និង $y = 1$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប C ព្រោះ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x}{x} = 0$

២ . គណនាដេរីវេ $f'(x)$

$$\text{គេបាន } f'(x) = -\frac{2(x \cdot (\ln x)' - x' \cdot \ln x)}{x^2} = -\frac{2(x \cdot \frac{1}{x} - \ln x)}{x^2} = \frac{2 \ln x - 2}{x^2}$$

ដោយ $x^2 > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f$ នោះ f' មានសញ្ញាដូច $2 \ln x - 2$

$$\text{បើ } 2 \ln x - 2 > 0 \Leftrightarrow \ln x > \ln e \Rightarrow x > e$$

$$2 \ln x - 2 < 0 \Leftrightarrow \ln x < \ln e \Rightarrow x < e$$

$$2 \ln x - 2 = 0 \Leftrightarrow \ln x = \ln e \Rightarrow x = e$$

នាំឲ្យ f' ប្តូរសញ្ញាពី $(-)$ ទៅ $(+)$ ត្រង់ $x = e$ ត្រង់ $x = e$ នោះ $f(e) = 1 - \frac{2 \ln e}{e} = 1 - \frac{2}{e} = 1 - 0.7 = 0.3$


ជាអប្បបរមាធៀបត្រង់ $x = e$

សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f

x	0	e	$+\infty$	
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		$+\infty$	0.3	1

៣ . សង់ក្រាប C

បើ $x = 1 \Rightarrow f(1) = 1 - 0 = 1$ ជាចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប (C) និង អាស៊ីមតូតដេក



៤ . គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃក្នុងបង្កប់កំណត់ដោយក្រាប C អាស៊ីមតូតដេក បន្ទាត់ឈរ $x = 1$ និង $x = e$

$$\text{គេបាន } S = \int_1^e \left[1 - \left(1 - \frac{2 \ln x}{x} \right) \right] dx = 2 \int_1^e \ln x \cdot d(\ln x) = \ln^2 x \Big|_1^e = \ln^2 e - \ln^2 1 = 1$$

ដូចនេះ ក្រឡាផ្ទៃ $S = 1$ ឯកត្តាផ្ទៃក្រឡា ។

VI. គេមានចំណុច $A(1, 0, 2)$, $B(1, 1, 3)$ និង $C(2, 1, 2)$

១. គណនា $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$

$$\text{ដោយ } \overrightarrow{AB} = (1 - 1, 1 - 0, 3 - 2) = (0, 1, 1)$$

$$\overrightarrow{AC} = (2 - 1, 1 - 0, 2 - 2) = (1, 1, 0)$$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -\vec{i} + \vec{j} - \vec{k} \end{aligned}$$

ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC

$$\text{គេបាន } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3} \text{ ឯកតាក្រឡាផ្ទៃ}$$

២. គណនា $\overrightarrow{AO} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC})$

$$\text{ដោយ } \overrightarrow{AO} = (0 - 1, 0 - 0, 0 - 2) = (-1, 0, -2)$$

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{AO} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) = (-1)(-1) + (0)(1) + (-2)(-1)$$

$$= 1 + 0 + 2 = 3$$

មាឌនៃប្រលេពីប៉ែតដែលមានវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$

$$\text{គេបាន } V_{OABC} = |\overrightarrow{AO} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC})| = |3| = 3 \text{ ឯកតាមាឌ}$$

មាឌនៃចតុមុខ $OABC$

$$\text{គេបាន } W_{OABC} = \frac{1}{6} |\overrightarrow{AO} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC})| = \frac{1}{6} \times 3 = \frac{1}{2} \text{ ឯកតាមាឌ}$$