

BACCALAURÉAT — SÉRIE D
Mathématiques — Session 2019
Corrigé détaillé

Exercice 1

1. **a.** $Z^2 - 4Z + 8 = 0$ a pour discriminant réduit $\Delta' = (-2)^2 - 8 = -4 = (2i)^2$. Racines : $Z_1 = 2 - 2i$ et $Z_2 = 2 + 2i$.
- b.** $|Z_1| = 2\sqrt{2}$, d'où $Z_1 = 2\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i\sin(-\frac{\pi}{4}))$.
2. **a.** $U = \frac{Z_B}{Z_A} = \frac{2+2i}{2-2i} = \frac{1+i}{1-i} = i$.
- b.** $\left| \frac{Z_B - Z_O}{Z_A - Z_O} \right| = |i| = 1$, donc $OA = OB$. $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \equiv \arg(i) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$. Le triangle OAB est rectangle isocèle en O .
3. **a.** $Z' = e^{i\frac{\pi}{3}} Z$ avec $Z_O = 0$: f est la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
- b.** $Z_A = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$, d'où $Z_{A'} = e^{i\frac{\pi}{3}} Z_A = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}} = 2\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{12} + i\sin \frac{\pi}{12})$. Forme algébrique : $Z_{A'} = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(2 - 2i) = (1 + \sqrt{3}) + i(-1 + \sqrt{3})$.
- c.** Par identification : $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$ et $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$.

Exercice 2

1. $f(\vec{i}) = 2\vec{i} - \vec{j}$ et $f(\vec{j}) = 3\vec{i} - 2\vec{j}$.
2. Matrice de f dans $(\vec{i}, \vec{j})$: $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$.
3. $f(\vec{V})$ pour $\vec{V}(3, -4)$: $x' = 2(3) + 3(-4) = -6$, $y' = -3 - 2(-4) = 5$, soit $\vec{V}'(-6, 5)$.
4. $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$: f est bijectif (automorphisme).
5. **a.** $f \circ f(\vec{i}) = \vec{i}$ et $f \circ f(\vec{j}) = \vec{j}$.
- b.** $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base et $f \circ f = \text{id}$: f est une symétrie vectorielle.
- c.** Base : $f(\vec{u}) = \vec{u} \Leftrightarrow x + 3y = 0$. Direction : $f(\vec{u}) = -\vec{u} \Leftrightarrow x + y = 0$.

Exercice 3

Partie I

1. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $g'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$.
2. Avec $\lim_{0^+} g = +\infty$, $\lim_{+\infty} g = 0$:


x	0	$+\infty$
$g'(x)$	$\parallel$	$-$
g	$+\infty$	$\searrow$ 0

Partie II

1. **a.** $f(x) = g(x) \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x} = 0 \Leftrightarrow x = 1$.
- b.** Sur $]0; 1[$, $f(x) - g(x) = \frac{\ln x}{x} < 0$: $(\mathcal{C})$ est en dessous de $(\mathcal{C}')$. Sur $]1; +\infty[$, $\frac{\ln x}{x} > 0$: $(\mathcal{C})$ est au-dessus de $(\mathcal{C}')$.
2. **a.** $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
- b.** $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} - \frac{1}{x^2} = -\frac{\ln x}{x^2}$, du signe de $-\ln x$ (s'annule en $x = 1$).

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
f	$-\infty$	$\nearrow$	1 $\searrow$ 0

3. Asymptote verticale $x = 0$ ($\lim_{0^+} f = -\infty$) et asymptote horizontale $y = 0$ ($\lim_{+\infty} f = 0$).



Partie III

1. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $h'(x) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{1}{x} \cdot \ln x = \frac{\ln x}{x} = k(x)$: h est une primitive de k sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. $\int_1^e (f(x) - g(x)) dx = \int_1^e h'(x) dx = [h(x)]_1^e = \frac{1}{2} \text{ u.a} = 2 \text{ cm}^2$.

Exercice 4

1. $E(X) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + a \cdot \frac{3}{8} + 3b = \frac{3}{8}(1 + a + 8b)$.

2. a. $E(X) = \frac{3}{2} \Leftrightarrow a + 8b = 3$. Comme $\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + b = 1$, on a $b = \frac{1}{8}$, puis $a = 2$.

b. $\text{Var}(X) = 0^2 \cdot \frac{1}{8} + 1^2 \cdot \frac{3}{8} + 2^2 \cdot \frac{3}{8} + 3^2 \cdot \frac{1}{8} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$; $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = 0,86$.

3. Fonction de répartition :

X	$] - \infty; 0[$	$[0; 1[$	$[1; 2[$	$[2; 3[$	$[3; +\infty[$
$F(X)$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{7}{8}$	1