

บัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข

กลุ่มยา 1 Gastro-intestinal system

1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Aluminium hydroxide | chewable tab, tab, susp,
susp (hosp) | b |
| 2. | Compound Cardamom Mixture (Mist Carminative)
เฉพาะสูตรที่ไม่มี sodium bicarbonate | mixt, mixt (hosp) | b |
| 3. | Simeticone (Simethicone) | chewable tab, susp | b |
| 4. | Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide | chewable tab, tab, susp,
susp (hosp) | b |
| 5. | Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide
+ Simeticone 25-50 mg | chewable tab, tab, susp | b |

1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | Dicycloverine hydrochloride (Dicyclomine hydrochloride) | tab | b |
| 2. | Domperidone | tab (as base/maleate),
susp (as base/maleate) | b |

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยอายุมากกว่า 80 ปี และไม่ใช้ยาขนาดเกินกว่า 30 mg ต่อวัน ในผู้ใหญ่ และไม่เกิน 0.75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน ในเด็ก
 2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ prolonged QT และห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีผลทำให้เกิด prolonged QT
- | | | | |
|----|---|-----------------------|---|
| 3. | Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide) | tab, syr, sterile sol | b |
| 4. | Mebeverine hydrochloride | tab | b |
| 5. | Metoclopramide | tab, syr, sterile sol | b |

คำเตือนและข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้ยาดังกล่าวระยะยาวในเด็ก

1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding

- | | | | |
|----|-------------------|------------------|---|
| 1. | Omeprazole | EC cap (as base) | b |
| 2. | Omeprazole sodium | sterile pwdr | b |

คำเตือนและข้อควรระวัง

ห้ามให้ทางหลอดเลือดดำนานเกินกว่า 30 นาที

- | | | | |
|----|------------|-------------------|---|
| 3. | Famotidine | tab (เฉพาะ 20 mg) | b |
|----|------------|-------------------|---|

คำแนะนำ

1. ใช้กรณีผู้ป่วย functional dyspepsia (FD)
 2. ใช้เสริมยาลดกรดมาตรฐานเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของกรดไหลย้อน
- | | | | |
|----|---------------------|--------------|---|
| 4. | Pantoprazole sodium | sterile pwdr | s |
|----|---------------------|--------------|---|

5. Sucralfate tab, susp s
เงื่อนไข
ใช้เฉพาะกรณีหญิงตั้งครรภ์
6. Bismuth subsalicylate tab ex
เงื่อนไข
 1. ใช้เป็น second-line drug ในการกำจัด *Helicobacter pylori*
 2. ห้ามใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี
7. Lansoprazole orodispersible tab (เฉพาะ 15 mg) ex
เงื่อนไข
ใช้สำหรับโรคแผลในกระเพาะอาหารในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่ไม่สามารถกลืนยาแคปซูลได้ ในกรณีข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 1. โรคแผลในกระเพาะอาหาร ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยการส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยให้การรักษาด้วยยา lansoprazole เป็นเวลานาน 4 ถึง 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องรักษาสาเหตุของแผลในกระเพาะอาหารไปพร้อมกันด้วย
 - ขนาดยาสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี: 1-2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน วันละ 1 ครั้ง
 - ขนาดยาสำหรับเด็กอายุมากกว่า 1 ปี ถึง 6 ปี: 15 มิลลิกรัมต่อวัน วันละ 1 ครั้ง
 - ระยะเวลาการรักษา: 4 สัปดาห์ใน duodenal ulcer และ 8 สัปดาห์ใน gastric ulcer
 2. โรคติดเชื้อ *H.pylori* ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยการส่องกล้องทางเดินอาหารและพบแผลในกระเพาะอาหารหรือ дуодитินัม ให้การรักษาด้วยยา lansoprazole ร่วมกับยาปฏิชีวนะ ตามมาตรฐานการรักษาเป็นเวลา 14 วัน
 - ขนาดยาสำหรับเด็กอายุมากกว่า 1 ปี ถึง 6 ปี: 15 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
 - ระยะเวลาการรักษา: 14 วัน
 3. ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่มีอาการ upper GI bleeding ที่สงสัยเกิดจากแผลในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารอักเสบรุนแรง ควรปรึกษาแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารเพื่อพิจารณาการส่องกล้องทางเดินอาหาร หากไม่สามารถส่งต่อได้ แนะนำให้การรักษาด้วยยา lansoprazole ชนิดรับประทาน ในระยะเปลี่ยนจาก proton pump inhibitor ชนิดฉีด โดยระยะเวลาการรักษา รวมกันไม่เกิน 4 ถึง 8 สัปดาห์กรณีไม่ได้ส่องกล้อง
 - ขนาดยาสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี: 1-2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน วันละ 1 ครั้ง*
 - ขนาดยาสำหรับเด็กอายุมากกว่า 1 ปี ถึง 6 ปี: 15 มิลลิกรัมต่อวัน วันละ 1 ครั้ง***หมายเหตุ**
 1. * หากส่องกล้องพบว่า เป็นแผลที่มีความเสี่ยงสูง ให้เพิ่มยาเป็นวันละ 2 ครั้ง ในช่วง 14 วันแรก
 2. ระยะเวลาการรักษา รวมทั้งสิ้น: 4 สัปดาห์ใน duodenal ulcer และ 8 สัปดาห์ใน gastric ulcer
8. Lauromacrogol 400 (Polidocanol) sterile sol ex
เงื่อนไข
 1. ใช้ช่วยห้าม variceal bleeding ผ่านทาง endoscopy และใช้สำหรับ sclerotherapy
 2. ใช้สำหรับ varicose vein และ hemorrhoid
9. Octreotide acetate sterile sol (เฉพาะ 0.1 mg/1 ml) ex
ยกเว้นชนิดออกฤทธิ์นาน
เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับ high output pancreatic fistula
 2. ใช้สำหรับ variceal bleeding โดยใช้ร่วมกับ therapeutic endoscopic intervention
 3. ใช้ในกรณี bleeding ที่มีหลักฐานว่าเป็นภาวะเลือดออกจาก portal hypertensive gastropathy
 4. ใช้สำหรับ neuroendocrine tumors

1.4 Drugs used in acute diarrhea

1. Loperamide hydrochloride cap, tab b

เงื่อนไข

ไม่ใช้กับเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี

2. Oral rehydration salts (ORS) oral powdr, oral powdr (hosp) b

เมื่อผสมน้ำแล้วมีตัวยาสําคัญต่อลิตร ดังนี้

- Sodium chloride 2.6 g - Trisodium citrate dihydrate 2.9 g

- Potassium chloride 1.5 g - Glucose 13.5 g

และมี molar concentration ต่อลิตรดังนี้

- Glucose 75 mEq - Sodium 75 mEq

- Chloride 65 mEq - Potassium 20 mEq

- Citrate 10 mmol - Osmolarity 245 mOsm

คำแนะนำ

การชดเชยสารน้ำและเกลือแร่เป็นเป้าหมายสำคัญในการรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลัน การใช้ยาด้านแบคทีเรียในผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและควรหลีกเลี่ยง

3. Zinc sulfate oral sol (hosp) b

คำแนะนำ

พิจารณาให้ธาตุสังกะสี ขนาด 20 mg ต่อวัน เป็นการรักษาเสริมในโรคท้องร่วงเฉียบพลัน ในทารกและเด็กอายุมากกว่า 6 เดือน ถึง 5 ปี ที่สงสัยมีภาวะพร่องธาตุสังกะสีหรือมีภาวะทุพโภชนาการอยู่ก่อน เป็นเวลานาน 10-14 วัน

1.5 Drugs used in chronic bowel disorders

1. Mesalazine (Mesalamine) EC tab, SR tab, enema, rectal supp s

เงื่อนไข

1. ชนิดเม็ด ใช้เป็นทางเลือกของ sulfasalazine ในกรณีผู้ป่วยแพ้ยากลุ่มซัลฟา หรือต้องการลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา

2. ชนิดเหน็บทวารหนัก (suppository) ใช้สำหรับ mild to moderate ulcerative proctitis และ radiation proctitis

3. ชนิดสวนทวารหนัก (enema) ใช้สำหรับ mild to moderate ulcerative colitis บริเวณ left-sided colon

2. Sulfasalazine tab, EC tab s

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ chronic inflammatory bowel disease

3. Infliximab sterile powdr (เฉพาะ 100 mg) R2

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับผู้ป่วย Crohn's disease (CD) ในผู้ใหญ่หรือเด็ก ที่รักษาด้วยยาพื้นฐานไม่ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

2. ใช้สำหรับผู้ป่วย ulcerative colitis (UC) ในผู้ใหญ่หรือเด็ก ที่รักษาด้วยยาพื้นฐานไม่ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

- | | | | |
|----|-------------|-----------------------------|----|
| 4. | Vedolizumab | sterile pwdr (เฉพาะ 300 mg) | R2 |
|----|-------------|-----------------------------|----|

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับผู้ป่วย Crohn's disease (CD) ในผู้ใหญ่ที่ไม่ตอบสนองต่อยาหรือมีผลไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา infliximab โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
2. ใช้สำหรับผู้ป่วย ulcerative colitis (UC) ในผู้ใหญ่ที่ไม่ตอบสนองต่อยาหรือมีผลไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา infliximab โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

หมายเหตุ

ยา vedolizumab รูปแบบ sterile pwdr ขนาด 300 mg มีราคาที่ต้องรองได้ไวแอลละ 17,751.30 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้

1.6 Laxatives

- | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|
| 1. | Bisacodyl | EC tab, rectal sup | b |
| 2. | Castor oil | oil | b |
| 3. | Glycerol | rectal sup | b |
| 4. | Ispaghula Husk (Psyllium Husk) | pwdr for oral susp, granules for oral susp | b |
| 5. | Magnesium hydroxide | tab, susp, susp (hosp) | b |
| 6. | Magnesium sulfate | mixt, mixt (hosp), sol, sol (hosp) | b |
| 7. | Senna | tab | b |
| 8. | Sodium phosphates | enema | b |
| | มีตัวยาสำคัญต่อ 100 ml ดังนี้ | | |
| | - Sodium biphosphate | 15.2 - 16.8 g | |
| | - Sodium phosphate | 5.7 - 6.3 g | |
| 9. | Lactulose | syr | b |

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ hepatic encephalopathy
 2. ใช้สำหรับ chronic constipation ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี
 3. ใช้เป็นทางเลือกในหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ยาระบายอื่นไม่ได้
 4. ใช้เป็นทางเลือกในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ magnesium
- | | | | |
|-----|--------------------------------------|------------------|---|
| 10. | Macrogols (Polyethylene glycol, PEG) | oral pwdr (hosp) | s |
| | with electrolytes | | |

เงื่อนไข

ใช้สำหรับเตรียมลำไส้ใหญ่ก่อนการผ่าตัดหรือตรวจลำไส้

หมายเหตุ

ไม่ใช่เป็นยาระบายหรือยาถ่าย

- | | | |
|------------------------------|----------|---|
| 11. Sodium phosphates | oral sol | s |
| มีตัวยาสําคัญต่อ 5 ml ดังนี้ | | |
| - Sodium biphosphate | 0.9 g | |
| - Sodium phosphate | 2.4 g | |

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับเตรียมลำไส้ใหญ่ก่อนการผ่าตัดหรือตรวจลำไส้
2. ไม่ใช้ยานี้เพื่อทดแทนการขาดฟอสเฟต หรือใช้เป็นยาระบายหรือยาถ่าย

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. รับประทานไม่เกินครั้งละ 45 มิลลิลิตร และไม่เกิน 90 มิลลิลิตร ภายใน 24 ชั่วโมง
2. ให้ระวังในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคไตวาย และผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว

1.7 Local preparations for anal and rectal disorders

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 1. Local anaesthetic + Corticosteroid | cream, oint, rectal sup | b |
| with/without astringent | | |

เงื่อนไข

1. หนึ่งรูปแบบให้เลือก 1 สูตร
2. ใช้ไม่เกิน 7 วัน

1.8 Drugs affecting intestinal secretions

- | | | |
|---|--------------------------|----|
| 1. Colestyramine (Cholestyramine) | oral powdr | b |
| เงื่อนไข | | |
| ใช้สำหรับ bile-acid diarrhea และ short bowel syndrome | | |
| 2. Pancreatic enzymes | cap, tab, EC cap, EC tab | ex |
| ต้องมี lipase activity ไม่น้อยกว่า 7,000 USP units/cap หรือ tab | | |

เงื่อนไข

ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เป็น pancreatic insufficiency เท่านั้น

คำแนะนำ

1. ปริมาณของยาน้ำย่อยตับอ่อนทดแทนในผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะพร่องน้ำย่อยตับอ่อน ตามคำแนะนำควรพิจารณาให้กำหนดปริมาณ lipase activity 20,000 ถึง 50,000 units ต่อ 1 มื้อ
 2. แนะนำให้ใช้ยาลดกรดรวมด้วยเพื่อป้องกันการทำลาย lipase ในน้ำย่อยตับอ่อน โดยอาจใช้ยากลุ่ม H2-receptor antagonists หรือ Proton pump inhibitor (PPI) ร่วมด้วย
- | | | |
|------------------------------------|-----|----|
| 3. Ursodeoxycholic acid (Ursodiol) | cap | ex |
|------------------------------------|-----|----|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ cholestatic liver disease

กลุ่มยา 2 Cardiovascular system

2.1 Positive inotropic drugs

- | | | |
|------------|--------------------------|---|
| 1. Digoxin | tab, elixir, sterile sol | b |
|------------|--------------------------|---|

- | | | | |
|----|-------------------|-------------|----|
| 2. | Milrinone lactate | sterile sol | ex |
|----|-------------------|-------------|----|
- เงื่อนไข**
1. ใช้เพิ่มการบีบตัวของหัวใจในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจ
 2. ใช้ทดแทนหรือเสริม dopamine หรือ dobutamine ใน advanced heart failure
 3. ใช้เพื่อเพิ่มการบีบตัวของหัวใจในผู้ป่วย advanced heart failure ที่เคยใช้ beta blocker มาก่อน

2.2 Diuretics

- | | | | |
|----|--|-----------------------|---|
| 1. | Furosemide | tab, sterile sol | b |
| 2. | Hydrochlorothiazide (HCTZ) | tab | b |
| 3. | Mannitol | sterile sol | b |
| 4. | Spironolactone | tab | b |
| 5. | Amiloride hydrochloride + Hydrochlorothiazide (HCTZ) | tab (เฉพาะ 5 + 50 mg) | b |

2.3 Anti-arrhythmic drugs

- | | | | |
|----|-----------|-------------|---|
| 1. | Adenosine | sterile sol | b |
|----|-----------|-------------|---|
- เงื่อนไข**
1. ใช้สำหรับรักษา supraventricular tachycardia
 2. ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดหัวใจเพื่อรักษาภาวะ no reflow ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ Percutaneous Coronary Intervention (PCI) เมื่อมีข้อห้ามใช้ยา verapamil หรือไม่มียา verapamil ให้ใช้
 3. ใช้สำหรับการตรวจพิเศษทางหัวใจ
- | | | | |
|----|------------------|-------------|---|
| 2. | Atropine sulfate | sterile sol | b |
|----|------------------|-------------|---|
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับ symptomatic bradycardia และการตรวจพิเศษทางหัวใจ
- | | | | |
|----|---|--|---|
| 3. | Lidocaine hydrochloride (preservative free) | sterile sol (เฉพาะ 1% และ 2%),
ยากำพร้า
sterile sol (hosp) | b |
|----|---|--|---|
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับ ventricular arrhythmias
- | | | | |
|----|--------------------------|------------------|----|
| 4. | Magnesium sulfate | sterile sol | b |
| 5. | Amiodarone hydrochloride | tab, sterile sol | ex |
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับ supraventricular และ ventricular arrhythmias
- | | | | |
|----|--------------------|-----|----|
| 6. | Flecainide acetate | tab | ex |
|----|--------------------|-----|----|
- เงื่อนไข**
- ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยาอื่นควบคุมจังหวะการเต้นผิดปกติของหัวใจไม่ได้หรือไม่ได้ผล
- | | | | |
|----|---------------------------|-----|----|
| 7. | Propafenone hydrochloride | tab | ex |
|----|---------------------------|-----|----|
- เงื่อนไข**
- ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยาอื่นควบคุมจังหวะการเต้นผิดปกติของหัวใจไม่ได้หรือไม่ได้ผล

2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs

- | | | | |
|----|---------------------|-----------------------|---|
| 1. | Atenolol | tab | b |
| 2. | Metoprolol tartrate | immediate release tab | b |

- | | | | |
|----|---------------------------|-----|---|
| 3. | Propranolol hydrochloride | tab | b |
| 4. | Carvedilol | tab | s |

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ heart failure with reduced ejection fraction

- | | | | |
|----|-----------------------|-------------|----|
| 5. | Esmolol hydrochloride | sterile sol | ex |
|----|-----------------------|-------------|----|

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับรักษาภาวะที่หัวใจมีการเต้นเร็วผิดปกติ (supraventricular tachycardia, non-compensatory sinus tachycardia) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด ทั้งในระหว่างและหลังการผ่าตัด
2. ใช้สำหรับควบคุมการเต้นของหัวใจให้ช้ากว่าปกติ หรือไม่ให้เต้นเร็ว ทั้งในระหว่างและหลังการผ่าตัด หรือ ในระหว่างการระงับความรู้สึก หรือ ทำหัตถการ เช่น การตรวจวินิจฉัย computed tomography (CT) heart เป็นต้น
3. สั่งใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิสัญญีวิทยา สาขาอายุรศาสตร์ ศาสตราจารย์ทรวงอก และสาขา ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

หมายเหตุ

ใช้ยานี้ในระยะสั้นไม่เกิน 24 ชั่วโมง

- | | | | |
|----|-------------------------|-------------|----|
| 6. | Labetalol hydrochloride | sterile sol | ex |
|----|-------------------------|-------------|----|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ hypertensive emergencies

2.5 Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs

2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs

- | | | | |
|----|---------------------------|-------------------|---|
| 1. | Hydralazine hydrochloride | tab, sterile pwdr | b |
|----|---------------------------|-------------------|---|

ยากำพรัญเฉพาะรูปแบบ sterile pwdr

เงื่อนไข

ชนิดฉีดใช้สำหรับ hypertensive emergencies* ในหญิงตั้งครรภ์

- | | | | |
|----|----------------------|--------------|---|
| 2. | Sodium nitroprusside | sterile pwdr | b |
|----|----------------------|--------------|---|

ยากำพรัญ

เงื่อนไข

ใช้เป็นมาตรฐานการรักษาใน hypertensive emergencies (ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์)

2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs

- | | | | |
|----|------------|-----|---|
| 1. | Methyldopa | tab | b |
|----|------------|-----|---|

2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs

- | | | | |
|----|------------------------|-----------------------|---|
| 1. | Prazosin hydrochloride | tab | b |
| 2. | Doxazosin mesilate | immediate release tab | s |

* hypertensive emergencies หมายถึง ภาวะที่มี target organ damage (TOD) เช่น hypertensive encephalopathy, acute pulmonary edema, eclampsia เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีความดัน diastolic ตั้งแต่ 120-130 mmHg และควรใช้ยาฉีดในการรักษา

2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors

- | | | | |
|----|-------------------|-----|---|
| 1. | Enalapril maleate | tab | b |
| 2. | Captopril | tab | b |

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ hypertensive urgency*

หมายเหตุ

กรณีที่สถานพยาบาลไม่มียาฉีดหรือไม่สามารถใช้ยาฉีดในการรักษา hypertensive emergencies อาจพิจารณาใช้ captopril เป็นทางเลือกในการรักษา

- | | | | |
|----|------------|-----|---|
| 3. | Lisinopril | tab | s |
|----|------------|-----|---|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ post myocardial infarction

2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists

- | | | | |
|----|--------------------|---------------------------|---|
| 1. | Losartan potassium | tab (เฉพาะ 50 และ 100 mg) | b |
|----|--------------------|---------------------------|---|

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยาในกลุ่ม Angiotensin-converting enzyme inhibitors ไม่ได้ เนื่องจากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว

2.6 Nitrates, calcium-channel blockers and other vasodilators

2.6.1 Nitrates

- | | | | |
|----|---------------------|-------------|---|
| 1. | Glyceryl trinitrate | sterile sol | b |
|----|---------------------|-------------|---|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ hypertensive emergencies ในกรณีที่มี coronary ischemia

- | | | | |
|----|------------------------|---------------------|---|
| 2. | Isosorbide dinitrate | tab, sublingual tab | b |
| 3. | Isosorbide mononitrate | tab | b |

2.6.2 Calcium-channel blockers

ยาในกลุ่มนี้ชนิดที่เป็น short-acting dihydropyridine (เช่น nifedipine immediate release) ไม่แนะนำให้ใช้รักษา essential hypertension, hypertensive emergencies, hypertensive urgency และ angina pectoris เนื่องจากมียาอื่นที่ปลอดภัยกว่า

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------------|---|
| 1. | Amlodipine besilate | tab | b |
| 2. | Diltiazem hydrochloride | SR cap/SR tab (เฉพาะ 120 mg) | b |

ไม่รวมชนิด controlled release

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ ischemic heart disease (IHD)

- | | | | |
|----|-------------------------|-----------------------|---|
| 3. | Diltiazem hydrochloride | immediate release tab | b |
|----|-------------------------|-----------------------|---|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ ischemic heart disease (IHD) ไม่แนะนำให้ใช้ในการรักษา essential hypertension

* hypertensive urgency หมายถึง ภาวะที่มีความดันเลือดสูงรุนแรง (severe elevated blood pressure) ที่ไม่มีภาวะ target organ damage (TOD) โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีความดัน diastolic ตั้งแต่ 120-130 mmHg ผู้ป่วยเหล่านี้ควรใช้ยาบรรเทาประทุกันในการรักษา

4. Diltiazem hydrochloride sterile powdr b
เงื่อนไข
ใช้สำหรับ supraventricular tachyarrhythmia ซึ่งรวมทั้งการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจในภาวะ atrial fibrillation ที่ต้องการฤทธิ์ของยานาน 4 - 6 ชั่วโมง และไม่มีข้อห้ามใช้ calcium channel blockers
5. Lercanidipine hydrochloride tab (เฉพาะ 20 mg) b
เงื่อนไข
ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่ทนต่อผลข้างเคียงของยา amlodipine ไม่ได้
6. Manidipine hydrochloride tab (เฉพาะ 20 mg) b
เงื่อนไข
ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่ทนต่อผลข้างเคียงของยา amlodipine ไม่ได้
7. Verapamil hydrochloride tab, SR tab (เฉพาะ 240 mg) b
เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับ ischemic heart disease (IHD)
 2. ใช้สำหรับ essential hypertension
8. Nicardipine hydrochloride sterile sol s
เงื่อนไข
 1. ใช้กับผู้ป่วย hypertensive emergencies ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ
 2. ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยา sodium nitroprusside หรือ glyceryl trinitrate (nitroglycerin) ได้
9. Nifedipine SR cap/SR tab (เฉพาะ 20 mg) ex
เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับความดันเลือดสูงในหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ methyldopa และ hydralazine แล้วไม่ได้ผล
 2. ใช้สำหรับ intractable Raynaud's phenomenon
10. Nimodipine tab, sterile sol ex
เงื่อนไข
ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ สำหรับป้องกันพยาธิสภาพของระบบประสาทที่อาจดำเนินต่อไปจากการหดตัวของหลอดเลือด ภายหลังการเกิด subarachnoid hemorrhage

2.6.3 Other vasodilators

1. Sildenafil (as citrate) tab ex
เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับผู้ป่วยภาวะ pulmonary arterial hypertension (PAH) ที่เกิดจากโรคหัวใจแต่กำเนิด (CHD) ชนิด systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmonary arterial hypertension (IPAH) หรือ PAH associated with connective tissue disease (CNTD) และ
 2. อยู่ใน WHO functional classification of PAH $\geq$ II และ
 3. ได้รับการตรวจวินิจฉัยตามขั้นตอนวิธีที่ปรากฏในแนวทางเวชปฏิบัติ
 4. แนะนำให้หยุดยาเมื่อผลการประเมินทุก 3 เดือนมีอาการทรุดลงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน เกณฑ์อาการทรุดลงหมายถึงการตรวจพบอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้ คือ
 - 4.1. ตรวจร่างกายมีอาการแสดงของ progressive right heart failure
 - 4.2. WHO functional classification เพิ่มขึ้นกว่าเดิม

4.3. 6-Minute Walk Test (6 MWT) ลดลงกว่าเดิม 25%

4.4. Echocardiography พบลักษณะที่บ่งชี้ว่าอาการทรุดลงเช่น right atrium และ right ventricle โตขึ้นกว่าเดิม, right ventricular systolic pressure (RVSP) สูงขึ้นกว่าเดิม, RV dysfunction, TAPSE < 1.5 cm, RAP > 15 mmHg, CI $\leq$ 2 L/min/m², pericardial effusion

2.7 Sympathomimetics

2.7.1 Inotropic sympathomimetics

- | | | |
|--|-------------|---|
| 1. Dopamine hydrochloride | sterile sol | b |
| 2. Dobutamine hydrochloride | sterile sol | b |
| 3. Isoprenaline hydrochloride
(Isoproterenol hydrochloride) | sterile sol | b |

2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Norepinephrine (Noradrenaline) | sterile sol
(as bitartrate or hydrochloride) | b |
| 2. Phenylephrine hydrochloride | sterile sol (50 mcg/ml) | s |

เงื่อนไข

- ผู้ป่วยผ่าตัดคลอดที่ได้รับ spinal anaesthesia ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ และหัวใจเต้นเร็ว
 - ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อาจเกิดผลเสียจากการลดลงของความต้านทานหลอดเลือดส่วนปลาย (systemic vascular resistance; SVR) ขณะให้การระงับความรู้สึก อาทิเช่น aortic stenosis, hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM)
 - ใช้เพิ่มความดันโลหิตของผู้ป่วยขณะที่อยู่ในเครื่องปอดหัวใจเทียมระหว่างการผ่าตัดหัวใจ
 - ใช้รักษาภาวะเขียวเฉียบพลัน (cyanotic spell) ในผู้ป่วยโรค Tetralogy of Fallot (โดยไม่จำเป็นต้องมีภาวะความดันโลหิตต่ำ)
- | | | |
|---|-------------|----|
| 3. Ephedrine hydrochloride | sterile sol | ex |
| วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 | | |
| 4. Midodrine Hydrochloride | tab | ex |
| ยากำพรัว | | |

เงื่อนไข

ใช้สำหรับลดอาการ orthostatic hypotension ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| 1. Epinephrine (Adrenaline) | sterile sol, sterile sol (hosp) | b |
| หมายเหตุ | | |
| ไม่รวมยา epinephrine (adrenaline) ชนิด auto-injectors | | |

2.8 Anticoagulants

- | | | |
|----------------------|-------------|---|
| 1. Warfarin sodium | tab | b |
| 2. Heparin sodium | sterile sol | b |
| 3. Enoxaparin sodium | sterile sol | s |

หมายเหตุ

ในกรณี ACS ที่มีแผนการรักษาแบบ conservative ให้ใช้ fondaparinux แทน

4. Apixaban tab (เฉพาะ 2.5 และ 5 mg) ex
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับผู้ป่วย non-valvular atrial fibrillation ที่ใช้ warfarin อยู่ และเกิดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. มีประวัติการเกิด major bleeding ในระหว่างที่มีค่า INR 2-3 และไม่สามารถรักษาต้นเหตุการเกิดเลือดออกเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำได้
 2. มีประวัติการเกิด thromboembolic events ในระหว่างที่มีค่า INR 2-3
 3. ไม่สามารถปรับขนาดยา warfarin ให้อยู่ใน therapeutic range (INR 2-3) ได้ภายใน 12 เดือน และมี time in therapeutic range (TTR) < 50%
 4. มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ แบบ acute coronary syndrome หรือ chronic coronary disease และเข้ารับการรักษาด้วย percutaneous coronary intervention (PCI) โดยมีระยะเวลาการใช้ไม่เกิน 1 ปี
 5. ใช้ในกรณีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาอื่นที่เกิด major drug interaction กับ warfarin ซึ่งเป็นการใช้ยาในระยะยาวโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนเป็นยาอื่นได้

หมายเหตุ

ยา apixaban รูปแบบ tab ขนาด 2.5 mg มีราคาที่ต้องรองได้เม็ดละไม่เกิน 3 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขนาด 5 mg มีราคาที่ต้องรองได้เม็ดละไม่เกิน 5 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยื่นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้

5. Fondaparinux sodium sterile sol (2.5 mg/0.5 ml) ex
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับ acute coronary syndrome ที่ไม่ต้องทำ Percutaneous Coronary Intervention (conservative management)

2.9 Antiplatelet drugs

1. Aspirin (Acetylsalicylic acid) tab/EC tab (เฉพาะ 75-325 mg) b
2. Clopidogrel bisulfate tab s

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ aspirin ไม่ได้ หรือไม่ได้ผล (aspirin failure) เฉพาะกรณีที่ใช้ป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือสมองแบบทุติยภูมิ (secondary prevention)
2. ให้ร่วมกับ aspirin หลังการใส่ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด (stent) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
3. ใช้ในกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับ aspirin แล้วยังเกิด acute coronary syndrome หรือ recurrent thrombotic events
4. ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็น non-ST elevated acute coronary syndrome (NSTEMI-ACS) ให้ใช้ clopidogrel ร่วมกับ aspirin เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

หมายเหตุ

ระมัดระวังการใช้ยา clopidogrel ร่วมกับ aspirin เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการเลือดออกได้มากกว่าการใช้ aspirin หรือ clopidogrel เพียงชนิดเดียว

3. Eptifibatide sterile sol ex
- เงื่อนไข**

ใช้ร่วมกับการรักษาด้วยสายสวนขยายหลอดเลือดหัวใจเท่านั้น

- | | | |
|---------------|-------------------|----|
| 4. Ticagrelor | tab (เฉพาะ 90 mg) | ex |
|---------------|-------------------|----|
- เงื่อนไข**

ใช้ ticagrelor ร่วมกับ aspirin ขนาด 75-100 มก. โดยให้ใช้ ticagrelor เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี ในผู้ป่วย high-risk acute coronary syndrome (ACS) ที่รักษาด้วยวิธี Percutaneous Coronary Intervention (PCI) และเป็นไปตามเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งข้อ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ป่วย ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) ที่ได้รับการทำ Primary PCI
2. ผู้ป่วย NSTEMI-ACS ที่มี Grace risk score มากกว่า 140
3. ผู้ป่วยที่แพ้หรือไม่ตอบสนองต่อ clopidogrel เช่น เกิด ACS หรือ stent thrombosis ในขณะที่ได้รับยา aspirin ร่วมกับ clopidogrel

2.10 Fibrinolytic drugs

- | | | |
|--|---------------|----|
| 1. Streptokinase | sterile powdr | b |
| 2. Alteplase (Recombinant tissue - type plasminogen activator) | sterile powdr | ex |

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันที่เกิดจากลิ่มเลือด ในกรณีที่ผู้ป่วยแพ้ streptokinase หรือเคยได้รับ streptokinase ภายใน 6 เดือน
2. ใช้สำหรับ acute arterial ischemic stroke โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา หรือประสาทศัลยแพทย์ หรือ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำหรับอายุรแพทย์ทั่วไปและแพทย์ทั่วไปสามารถสั่งได้ในโรงพยาบาลที่มี stroke unit ที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ ได้รับการฝึกอบรม หรืออยู่ภายใต้เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเท่านั้น
3. ใช้สำหรับ massive pulmonary embolism ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด massive bleeding และมี hemodynamic instability
4. ใช้ในกรณีที่ มี acute vascular access thrombosis (หมายถึง A-V fistula หรือ A-V graft สำหรับทำ hemodialysis)

- | | | |
|-----------------|---------------|----|
| 3. Tenecteplase | sterile powdr | ex |
|-----------------|---------------|----|
- เงื่อนไข**

1. ใช้สำหรับ ST elevation myocardial infarction (STEMI) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา Streptokinase หรือเคยได้ Streptokinase มาภายใน 6 เดือน
2. ผู้ป่วยที่มีภาวะ anterior wall STEMI ร่วมกับมีภาวะ hemodynamic instability* ที่ไม่สามารถส่งทำ primary percutaneous coronary intervention (PCI) ภายใน 120 นาที

***ภาวะ Hemodynamic instability หมายถึงข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้**

1. Systolic blood pressure $\leq$ 90 mmHg หรือมีอาการ อาการแสดงของเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ไม่เพียงพอ
2. มีภาวะ acute decompensated heart failure ที่เกิดจาก extensive anterior wall myocardial infarction

2.11 Hemostatics

1. Tranexamic acid sterile sol b
คำเตือนและข้อควรระวัง
ใช้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและมีภาวะเลือดออกรุนแรง การให้ยาภายใน 3 ชั่วโมงมีประสิทธิภาพในการลดอัตราการเสียชีวิต แต่การให้ยาหลังจาก 3 ชั่วโมงอาจเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากภาวะเลือดออก
หมายเหตุ
การใช้ tranexamic acid ไม่สามารถทดแทนการรักษาที่จำเป็นอื่น ๆ ได้ เช่น การให้เลือด เป็นต้น
2. Tranexamic acid cap b
เงื่อนไข
 1. ใช้ห้ามเลือดในกรณีผู้ป่วยมี mucosal bleeding
 2. ใช้ก่อนทำการหัตถการในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเลือดออกแล้วหยุดยาก
3. Human thrombin + Calcium chloride sterile sol ex
+ Fibrinogen + Tranexamic acid
เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับภาวะเลือดออกจากอุบัติเหตุ การถอนฟัน การผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกแล้วหยุดยาก เช่น hemophilia, thrombocytopenia, platelet dysfunction, von Willebrand's disease และ congenital factor VII deficiency เป็นต้น
 2. ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดซึ่งไม่สามารถห้ามเลือดด้วยวิธีปกติได้ เช่น การผ่าตัดตับ การผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัดปอด เป็นต้น
4. Emicizumab sterile sol R1
เงื่อนไข
ใช้สำหรับโครงการยาเอมิซิซูแมบในการป้องกันอาการเลือดออกในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เอ ที่ไม่มีและมีสารต้านของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5. Activated prothrombin complex concentrate (APCC) sterile pwdr (เฉพาะ 500 IU) R2
(factor VIII inhibitor bypassing activity)
เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับภาวะเลือดออกรุนแรง ในผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่มี high-titer inhibitor โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 2. ใช้สำหรับรักษาภาวะเลือดออก ในผู้ป่วย non-hemophiliacs ที่มีตัวยับยั้งต่อปัจจัยการแข็งตัวของเลือด factors VIII, IX, XI ที่เกิดขึ้นภายหลัง (acquired hemophilia) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
6. Coagulation factor VIII sterile preparation for intravenous use R2
เงื่อนไข
ใช้สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
7. Coagulation factor IX sterile preparation for intravenous use R2
เงื่อนไข
ใช้สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

8. Factor IX complex (Coagulation factors II, VII, IX, X) sterile preparation for intravenous use R2
concentrate, dried

เงื่อนไข

ใช้สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

9. 4-Factor prothrombin complex concentrate sterile pwdr (เฉพาะ 500 และ 600 IU) R2
(Coagulation factors II, VII, IX, X)

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับรักษาภาวะเลือดออกรุนแรง ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิด warfarin โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
2. ใช้สำหรับรักษาภาวะเลือดออกรุนแรง ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิด anti-Xa โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

หมายเหตุ

ยา 4-Factor prothrombin complex concentrate รูปแบบ sterile pwdr ขนาด 500 IU มีราคาที่ต้องรองได้ ไวแอลละ 4,920 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขนาด 600 IU มีราคาที่ต้องรองได้ ไวแอลละ 5,904 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้

2.12 Lipid-regulating drugs

1. Gemfibrozil cap (เฉพาะ 300 และ 600 mg), b
tab (เฉพาะ 600 mg)
2. Nicotinic acid immediate release tab b
3. Simvastatin tab (เฉพาะ 10, 20 และ 40 mg) b

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. กรณีผู้ป่วยรายใหม่ไม่ควรให้ยา simvastatin เกินวันละ 40 mg สำหรับผู้ป่วยที่เคยใช้มานานเกิน 1 ปี โดยไม่เกิดผลข้างเคียงให้ใช้ยาในขนาดเดิมต่อไปได้
2. ห้ามใช้ยา simvastatin ร่วมกับ gemfibrozil, cyclosporine, danazol หรือ ยาในกลุ่ม strong CYP3A4 inhibitors เช่น itraconazole, ketoconazole, erythromycin, clarithromycin, telithromycin, HIV protease inhibitors เป็นต้น หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หยุดยา simvastatin ระหว่างใช้ยาดังกล่าว
3. หลีกเลี่ยงการใช้ยา simvastatin
 - 3.1 ในขนาดเกินวันละ 20 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา amlodipine หรือ amiodarone
 - 3.2 ในขนาดเกินวันละ 10 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา diltiazem หรือ verapamil
4. Atorvastatin tab (เฉพาะ 40 mg) b

เงื่อนไข

Atorvastatin 40 mg เป็น high intensity statin ที่มีข้อบ่งใช้ในกรณีต่อไปนี้

1. ผู้ป่วยที่ใช้ยา simvastatin ในขนาด 40 mg ติดต่อกัน 3 – 6 เดือน แล้วยังไม่สามารถควบคุมระดับ LDL-C ได้ถึงค่าเป้าหมาย
2. Familial hypercholesterolemia (เป้าหมาย LDL-C <100 มก./ดล.)
3. ผู้ป่วยที่กำลังเกิด acute vascular events เช่น acute coronary syndrome หรือผู้ป่วย clinical ASCVD ที่มี acute vascular events ภายในระยะ เวลา 12 เดือน (เป้าหมาย LDL-C <70 มก./ดล.)

- ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดหรือสมองขาดเลือดชั่วคราวที่ไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดจากหัวใจและมีระดับ LDL-C ≥ 100 มก./ดล. (เป้าหมาย LDL-C < 70 มก./ดล.)
- ผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ simvastatin ได้ กล่าวคือมีผลข้างเคียง ได้แก่ มีค่า alanine aminotransferase (ALT) เพิ่มขึ้น 3 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ (upper limit of normal) หรือค่า creatine phosphokinase (CPK) เพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ หรือมีการใช้ยาที่ทำให้เกิดอันตรกิริยากับ simvastatin จนอาจทำให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง

คำเตือนและข้อควรระวัง

- หลีกเลี่ยงการใช้ยา atorvastatin ร่วมกับ cyclosporine, HIV protease inhibitor (tipranavir + ritonavir), hepatitis C protease inhibitor (telaprevir)
- หลีกเลี่ยงการใช้ยา atorvastatin
 - 1 ในขนาดเกินวันละ 40 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา nelfinavir
 - 2 ในขนาดเกินวันละ 20 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา clarithromycin, itraconazole, HIV protease inhibitor (saquinavir + ritonavir, darunavir + ritonavir, fosamprenavir, fosamprenavir + ritonavir)
- ระมัดระวังการใช้ยา atorvastatin ร่วมกับยา lopinavir + ritonavir โดยให้ใช้ยา atorvastatin ในขนาดต่ำสุดเท่าที่จำเป็น
- Colestyramine (Cholestyramine) oral powdr b
- Fenofibrate cap (เฉพาะ 100 และ 200 mg) s
- Ezetimibe tab (เฉพาะ 10 mg) s

เงื่อนไข

- ใช้เป็นยาขนานแรกของการรักษา (first-line treatment) สำหรับผู้ป่วยโรค sitosterolemia
- ใช้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงทางด้าน cardiovascular disease สูงหรือสูงมาก ที่ใช้ยาในกลุ่ม statin เต็มที่แล้ว และยังไม่สามารถควบคุม LDL-C ลงมาถึงเป้าหมาย เช่น LDL-C มากกว่าหรือเท่ากับ 55 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ในระยะ follow up 4-6 สัปดาห์ ภายหลัง acute coronary syndrome, LDL-C มากกว่าหรือเท่ากับ 70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร สำหรับ chronic coronary disease

กลุ่มยา 3 Respiratory system

3.1 Bronchodilators

3.1.1 Adrenoceptor agonists

- Procaterol hydrochloride syr b
- Salbutamol sulfate tab, aqueous sol, DPI, MDI, sol for nebulizer b
- Terbutaline sulfate tab, syr, sterile sol b
- Terbutaline sulfate sol for nebulizer b
- Procaterol hydrochloride tab b

3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators

- Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide MDI, sol for nebulizer b
- Tiotropium bromide DPI (เฉพาะ 18 mcg) s

- | | | | |
|----|---|----------------------------|---|
| 3. | Vilanterol trifenate + Umeclidinium bromide | DPI (เฉพาะ 22+55 mcg/dose) | s |
|----|---|----------------------------|---|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง group B (mMRC≥2 และ CAT score ≥10)

หมายเหตุ

ยาพ่น vilanterol trifenate + umeclidinium bromide รูปแบบ DPI ความแรง 22+55 ไมโครกรัมต่อโดส ขนาดบรรจุ 30 โดสต่อกล่อง ชนิดรวมอุปกรณ์ มีราคาที่ต้องรองได้ โดยจัดซื้อยา 3 กล่อง ในราคาไม่เกิน 1,020 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยื่นราคา 730 วัน นับจากวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567

- | | | | |
|----|---|----------------|----|
| 4. | Olodaterol hydrochloride + Tiotropium bromide | inhalation sol | ex |
|----|---|----------------|----|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง group B (mMRC≥2 และ CAT score ≥10) ที่เคยได้รับการรักษาด้วยยา tiotropium DPI (ขนาด 18 ไมโครกรัม) แต่ยังไม่สามารถควบคุมอาการได้

หมายเหตุ

ยาสารละลายสำหรับพ่นสูด olodaterol hydrochloride + tiotropium bromide ความแรง (2.5 ไมโครกรัม + 2.5 ไมโครกรัม) ต่อโดส ขนาดบรรจุ 60 โดสต่อกล่อง ชนิดพร้อมกระบอกสำหรับสูดพ่น มีราคาที่ต้องรองได้ กล่องละไม่เกิน 540 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ ชนิดไม่มีกระบอกสำหรับสูดพ่น (refill) มีราคาที่ต้องรองได้ หลอดละไม่เกิน 486 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยื่นราคา 730 วัน นับจากวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567

3.1.3 Theophylline

- | | | | |
|----|-------------------------------------|------------------------|---|
| 1. | Aminophylline | tab, sterile sol | b |
| 2. | Theophylline | SR cap, SR tab | b |
| 3. | Theophylline + Glyceryl guaiacolate | syr (50+30 mg in 5 ml) | b |

หมายเหตุ

จะนำออกจากบัญชี เมื่อจัดหา theophylline syr ได้ เพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนเหตุผลในการใช้ยา สูตรผสม

3.2 Corticosteroids

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------------|---|
| 1. | Budesonide | DPI, MDI, susp for nebulizer | b |
| 2. | Fluticasone propionate | MDI | b |
| 3. | Budesonide + Formoterol | DPI | b |

หมายเหตุ

ใช้สำหรับบรรเทาอาการ และ ควบคุมอาการ ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----------|---|
| 4. | Fluticasone propionate + Salmeterol | DPI, MDI | b |
|----|-------------------------------------|----------|---|

หมายเหตุ

ใช้สำหรับควบคุมอาการ ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

3.3 Leukotriene receptor antagonists

- | | | | |
|----|--------------------|--|---|
| 1. | Montelukast sodium | chewable tab (เฉพาะ 5 mg),
film coated tab (เฉพาะ 10 mg),
oral granules (เฉพาะ 4 mg) | s |
|----|--------------------|--|---|

เงื่อนไข

ใช้ยาชนิด oral granules กับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี

คำเตือนและข้อควรระวัง

ควรติดตามอาการไม่พึงประสงค์ทาง neuropsychiatric จากการใช้อย่างต่อเนื่อง

3.4 Antihistamines

ไม่ควรใช้ antihistamines เป็นประจำ (routinely) ในโรคหวัด (common cold) เนื่องจากมีประสิทธิผลไม่แตกต่างจากยาหลอก (placebo)

1. Brompheniramine maleate	tab, syr	b
2. Cetirizine hydrochloride	tab, syr	b
3. Chlorpheniramine maleate (Chlorphenamine maleate)	cap, tab, syr, syr (hosp), sterile sol	b
4. Diphenhydramine hydrochloride	cap, sterile sol	b
5. Hydroxyzine hydrochloride	tab, syr	b
6. Loratadine	tab, syr	b

3.5 Pulmonary surfactants

1. Phospholipids (ชนิด Poractant alfa หรือ Beractant) เจือปนไข	sterile intratracheal susp	ex
1. ให้เลือกหนึ่งรายการที่จัดซื้อได้ถูกกว่าระหว่าง Poractant alfa กับ Beractant		
2. ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์		

3.6 Cough preparations

3.6.1 Cough suppressants

1. Dextromethorphan hydrobromide	tab, syr	b
2. Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound (Brown Mixture ; Mist. Tussis)	mixt (hosp)	b
3. Squill and Ammonia Mixture	mixt (hosp)	b
4. Codeine phosphate + Glyceryl guaiacolate	tab/cap (เฉพาะ 10+ 100 mg)	s

3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations

ยาละลายเสมหะ (mucolytics) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากไม่มีประสิทธิผลทางคลินิกที่ชัดเจน

1. Ammonium carbonate and senega mixture	mixt (hosp)	b
2. Glyceryl guaiacolate	tab, syr, syr (hosp)	b

3.7 Systemic nasal decongestants

1. Pseudoephedrine hydrochloride วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	tab, syr	b
---	----------	---

3.8 Other respiratory preparations

1. Aromatic Ammonia Spirit	spirit, spirit (hosp)	b
2. Caffeine citrate	sterile sol, oral sol (hosp)	b

เจือปนไข

ใช้รักษาอาการหยุดหายใจขั้นปฐมภูมิ (primary apnea) ในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด (premature newborns)

หมายเหตุ

ยา caffeine citrate รูปแบบ sterile sol มีราคาที่ต้องรองได้ไม่เกิน 316 บาทต่อปริมาณยา 10 mg (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยี่นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้

กลุ่มยา 4 Central nervous system

4.1 Hypnotics and anxiolytics

ยานอนหลับ (hypnotics) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากควรรักษาที่ต้นเหตุของการนอนไม่หลับ การใช้ยาเกินความจำเป็นมักนำไปสู่ปัญหาการติดยา

1. Chloral hydrate วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	oral sol (hosp)	b
2. Chlordiazepoxide วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	cap, tab	b
3. Clonazepam วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	tab	b
4. Diazepam วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	cap, tab, sterile sol	b
5. Lorazepam วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	tab	b
6. Dipotassium clorazepate วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	cap, tab	b
7. Hydroxyzine hydrochloride	tab, syr	b

4.2 Drugs used in psychoses and related disorders

4.2.1 Antipsychotic drugs

1. Chlorpromazine hydrochloride	tab, sterile sol	b
2. Fluphenazine	tab (as hydrochloride), sterile sol (as decanoate)	b
3. Haloperidol	tab (as base), oral sol (as base), sterile sol (as base or decanoate)	b
4. Perphenazine	tab	b
5. Risperidone	tab (ไม่รวมชนิดละลายในปาก), oral sol, oral sol (hosp), syr (hosp)	b

คำเตือนและข้อควรระวัง

ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ

6. Trifluoperazine hydrochloride	tab	b
7. Clozapine	tab	s

เงื่อนไข

- เริ่มใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์
- ใช้ในผู้ป่วยกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
 - ตอบสนองไม่เป็นที่น่าพอใจต่อการใช้อาติpsychotics อื่นมาแล้วอย่างน้อย 2 ชนิด โดยอย่างน้อย 1 ชนิดเป็น atypical antipsychotic
 - มีพฤติกรรมก้าวร้าวที่แม้จะได้รับการรักษาอื่น

2.3. มีความเสี่ยงสูงของการพยายามฆ่าตัวตาย หรือมีประวัติฆ่าตัวตายแม้จะได้รับการรักษาอื่น

หมายเหตุ

ทั้งนี้ ให้มีการตรวจติดตาม complete blood count เป็นระยะตามความเหมาะสม

- | | | | |
|----|----------------------------|---|---|
| 8. | Flupentixol (Flupenthixol) | tab (as hydrochloride),
sterile sol (as decanoate) | s |
|----|----------------------------|---|---|

เงื่อนไข

ใช้ในกรณีใช้ยาอื่นไม่ได้ผล

- | | | | |
|----|----------|-----|---|
| 9. | Pimozide | tab | s |
|----|----------|-----|---|

เงื่อนไข

1. ไม่ใช่เป็นยาตัวแรกในการรักษา
2. ควรได้รับการวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์

- | | | | |
|-----|----------------------------|---|---|
| 10. | Thioridazine hydrochloride | tab | s |
| 11. | Quetiapine fumarate | immediate release tab
(เฉพาะ 200 mg) | s |

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ schizophrenia ที่ไม่ตอบสนองหรือไม่สามารถใช้ยา risperidone หรือ clozapine ได้
2. ใช้สำหรับ bipolar disorder ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่น

- | | | | |
|-----|---------------------|-----|----|
| 12. | Quetiapine fumarate | tab | ex |
|-----|---------------------|-----|----|

เงื่อนไข

1. ใช้เป็น augmentation treatment ในการรักษา treatment-resistant depression (TRD) โดยมีเกณฑ์ดังนี้
 - 1.1. ได้รับการวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์
 - 1.2. ใช้ antidepressant อื่นมาแล้วอย่างน้อย 2 ชนิด ในระยะเวลาและขนาดยาที่เหมาะสมแล้ว ยังควบคุมอาการไม่ได้
2. ใช้สำหรับ behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) ที่ไม่ตอบสนองหรือไม่สามารถใช้ยา risperidone ได้*

หมายเหตุ

* ให้ยาในขนาดไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อวัน

- | | | | |
|-----|--------------|-----------------------|----|
| 13. | Aripiprazole | Inj (ชนิดออกฤทธิ์นาน) | R1 |
|-----|--------------|-----------------------|----|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับโครงการนำร่องและติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยจิตเภท และผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental illness with High Risk to Violence: SMI-V) ของกรมสุขภาพจิตและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- | | | | |
|-----|------------------------|-----------------------|----|
| 14. | Paliperidone palmitate | inj (ชนิดออกฤทธิ์นาน) | R1 |
|-----|------------------------|-----------------------|----|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับโครงการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ยาฉีดต้านโรคจิตชนิดออกฤทธิ์เนิ่นกลุ่มใหม่ ในผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental illness with High Risk to Violence: SMI-V) ของกรมสุขภาพจิตและกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

4.2.2 Antimanic drugs and Mood stabilizers

1. Carbamazepine	tab, SR tab	b
2. Lithium carbonate	cap, tab	b
3. Sodium valproate	EC tab, oral sol, SR tab	b
4. Lamotrigine	tab (เฉพาะ 25, 50 และ 100 mg)	s

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ rapid cycling mood disorder หรือ recurrent mood disorder ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่น
2. ใช้ในกรณีป้องกัน depression ใน bipolar disorder ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่น

4.3 Antidepressant drugs

1. Amitriptyline hydrochloride	tab	b
2. Fluoxetine hydrochloride	cap, tab	b
3. Imipramine hydrochloride	tab	b
4. Mianserin hydrochloride	tab	b
5. Nortriptyline hydrochloride	tab	b
6. Sertraline	tab (เฉพาะ 50 mg)	b
7. Clomipramine hydrochloride	cap, tab	s
8. Trazodone hydrochloride	tab	s
9. Escitalopram oxalate	tab (เฉพาะ 10, 20 mg)	ex

เงื่อนไข

ใช้เป็น antidepressant ที่เป็นยาหลัก ในการรักษา treatment-resistant depression (TRD) โดยมีเกณฑ์ดังนี้

1. ได้รับการวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์
2. ใช้ antidepressant อื่นมาแล้วอย่างน้อย 2 ชนิด ในระยะเวลาและขนาดยาที่เหมาะสมแล้ว ยังควบคุมอาการไม่ได้

4.4 Central nervous system stimulants

1. Methylphenidate	tab (เฉพาะ 10 mg)	s
--------------------	-------------------	---

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
2. ใช้สำหรับ narcolepsy

4.5 Drugs used in nausea and vertigo

4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting

1. Domperidone	tab (as base/maleate), susp (as base/maleate)	b
2. Metoclopramide	tab, syr, sterile sol	b
3. Ondansetron	tab (as base or hydrochloride), sterile sol (hydrochloride)	b

- | | | | |
|----|------------|---|----|
| 4. | Olanzapine | tab (เฉพาะ 5 และ 10 mg
ไม่รวมชนิดเม็ดละลายในปาก) | ex |
|----|------------|---|----|

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับป้องกันหรือรักษาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัดที่กระตุ้นให้อาเจียนสูง (highly emetogenic)
2. ใช้สำหรับป้องกันหรือรักษาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัด กรณี resistance หรือ intractable nausea/vomiting

4.5.2 Drugs used in vestibular disorders

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | Betahistine mesilate (Betahistine mesylate) | tab (เฉพาะ 6 และ 12 mg) | b |
| 2. | Dimenhydrinate | compressed tab, film coated tab,
syr, sterile sol | b |

4.6 Analgesics and antipyretics

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1. | Aspirin (Acetylsalicylic acid) | compressed tab/film coated tab
(เฉพาะขนาด 300 mg ขึ้นไป) | b |
|----|--------------------------------|---|---|

คำเตือนและข้อควรระวัง

ห้ามใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี สำหรับลดไข้ แก้ปวด เพราะเสี่ยงต่อการเกิด Reye's syndrome

หมายเหตุ

Aspirin ชนิด EC tab ดูดซึมได้ช้าจึงมีการเริ่มต้นออกฤทธิ์ช้า ไม่เหมาะจะนำมาใช้ในข้อบ่งใช้นี้

- | | | | |
|----|-----------|-----------------------|---|
| 2. | Ibuprofen | film coated tab, susp | b |
|----|-----------|-----------------------|---|

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ไม่ควรใช้ ibuprofen ระยะยาวในผู้ป่วยที่ใช้ low dose aspirin เนื่องจากอาจมีผลต่อต้านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจของยาแอสไพริน
2. ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
3. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ไข้เลือดออก

- | | | | |
|----|-----------------------------|----------------------|---|
| 3. | Paracetamol (Acetaminophen) | tab, syr, syr (hosp) | b |
|----|-----------------------------|----------------------|---|

หมายเหตุ

แนะนำให้ใช้เป็น first-line drug สำหรับ osteoarthritis

4.7 Analgesics

4.7.1 Opioid analgesics

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|
| 1. | Fentanyl
ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 | sterile sol (as citrate), transdermal
therapeutic system (as base) | b |
|----|------------------------------------|---|---|

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยโรคกระเพาะที่มีความเจ็บปวดรุนแรง

- | | | | |
|----|---|-------------|---|
| 2. | Pethidine hydrochloride
ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 | sterile sol | b |
|----|---|-------------|---|

- | | | | |
|----|---|-----------------------------|---|
| 3. | Buprenorphine hydrochloride
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 | sublingual tab, sterile sol | s |
|----|---|-----------------------------|---|

4.	Codeine phosphate ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	tab	s
5.	Methadone hydrochloride ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	tab, oral sol	s
6.	Morphine sulfate ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	cap, tab, SR cap, SR tab, oral sol, sterile sol	s
7.	Nalbuphine hydrochloride	sterile sol	s
8.	Tramadol hydrochloride	cap, tab, SR cap, SR tab, sterile sol	s

4.7.2 Drugs for neuropathic pain

1.	Amitriptyline hydrochloride	tab	b
2.	Nortriptyline hydrochloride	tab	b
3.	Carbamazepine	tab, SR tab	b
4.	Gabapentin	cap (เฉพาะ 100, 300 และ 400 mg), tab (เฉพาะ 600 mg)	ex

เงื่อนไข

ใช้บรรเทาอาการปวดซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทเท่านั้น

หมายเหตุ

ไม่มีหลักฐานว่ามีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อพังผืด กระดูกและข้อ

4.7.3 Antimigraine drugs

4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack

1.	Aspirin (Acetylsalicylic acid)	compressed tab/film coated tab (เฉพาะขนาด 300 mg ขึ้นไป)	b
----	--------------------------------	---	---

คำเตือนและข้อควรระวัง

ดูรายละเอียดหัวข้อ 4.6 Analgesics and antipyretics

หมายเหตุ

ดูรายละเอียดหัวข้อ 4.6 Analgesics and antipyretics

2.	Ibuprofen	film coated tab	b
3.	Paracetamol (Acetaminophen)	tab	b
4.	Ergotamine tartrate + Caffeine	compressed tab/film coated tab (เฉพาะ 1 + 100 mg)	s

5.	Dihydroergotamine mesylate ยากำพรัว	sterile sol (เฉพาะ 1 mg/ml)	ex
----	--	-----------------------------	----

เงื่อนไข

- ใช้สำหรับรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนเฉียบพลันชนิดรุนแรง (status migrainosus)
- ใช้สำหรับรักษาอาการปวดศีรษะจากการใช้ยา (medication overuse headache หรือ rebound headache) ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน
- ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis of migraine

1.	Amitriptyline hydrochloride	tab	b
2.	Cyproheptadine hydrochloride	tab	b
3.	Propranolol hydrochloride	tab	b
4.	Sodium valproate	EC tab, SR tab	ex

เงื่อนไข

ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเท่านั้น

5.	Topiramate	tab	ex
----	------------	-----	----

เงื่อนไข

- ห้ามใช้เป็นยาตัวแรกในการป้องกันไมเกรน
- ใช้ในกรณีใช้ยาอื่นแล้วไม่ได้ผล

4.8 Antiepileptics

4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy

1.	Carbamazepine	tab, syr, susp, SR tab	b
2.	Clonazepam	tab	b
	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
3.	Magnesium sulfate	sterile sol	b
4.	Phenobarbital (Phenobarbitone)	tab (as base), sterile pwdr,	b
	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
5.	Phenytoin base	chewable tab, susp (เฉพาะ 125 mg/5 mL)	b

หมายเหตุ

ยา phenytoin base รูปแบบ susp ความแรง 125 mg/5 mL ขนาด 237 mL มีราคาที่ต้องรองได้ขวดละ 428 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้

6.	Phenytoin sodium	cap, SR cap, sterile sol	b
7.	Sodium valproate	EC tab, SR tab, oral sol, sterile pwdr, sterile sol	b

หมายเหตุ

ยา sodium valproate รูปแบบ sterile sol ความแรง 400 mg/4 mL มีราคาต่ำสุดที่ต้องรองได้ไวแอลละ 290 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้

8.	Lamotrigine	tab (เฉพาะ 25, 50 และ 100 mg)	s
----	-------------	-------------------------------	---

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้อยู่อื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท*

9.	Levetiracetam	tab (เฉพาะ 250 และ 500 mg), oral sol	s
----	---------------	--------------------------------------	---

เงื่อนไข

- ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้อยู่อื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล
- ชนิดน้ำใช้ในผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้

* แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท ในบัญชีหมายถึง สาขาประสาทวิทยา สาขากุมารประสาทวิทยา และประสาทศัลยศาสตร์

- | | | | |
|-----|---|----------|----|
| 10. | Clobazam | tab | ex |
| | วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 | | |
| | เงื่อนไข | | |
| | 1. ใช้เป็นยากันชักแบบเสริม (adjunctive treatment) ในโรคลมชัก | | |
| | 2. สั่งใช้ยาโดยประสาทแพทย์ หรือกุมารแพทย์ระบบประสาท หรือประสาทศัลยแพทย์เท่านั้น | | |
| 11. | Nitrazepam | tab | ex |
| | วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 | | |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้สำหรับ epileptic spasms โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา | | |
| 12. | Topiramate | cap, tab | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้อื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท* | | |
| 13. | Vigabatrin | tab | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | 1. ใช้ในการควบคุมอาการชัก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท* | | |
| | 2. ใช้สำหรับ epileptic spasms โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารประสาทวิทยา | | |

4.8.2 Drugs used in status epilepticus

- | | | | |
|----|---|---------------------------|---|
| 1. | Diazepam | sterile sol | b |
| | วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 | | |
| 2. | Lorazepam | inj | b |
| | ยากำพรั้ว | | |
| | วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 | | |
| 3. | Phenobarbital sodium (Phenobarbitone sodium) | sterile pwdr, sterile sol | b |
| | วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 | | |
| | หมายเหตุ | | |
| | จัดเป็นบัญชี ex เมื่อใช้บำบัดอาการชักจากยา ดูข้อ 16.9 Drug poisoning | | |
| 4. | Phenytoin sodium | sterile sol | b |
| 5. | Midazolam hydrochloride | sterile sol | s |
| | วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 | | |
| | เงื่อนไข | | |
| | 1. ใช้สำหรับ refractory status epilepticus | | |
| | 2. สั่งใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา สาขากุมารประสาทวิทยา และประสาทศัลยศาสตร์ เท่านั้น | | |
| | ในกรณีที่ไม่สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ และอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) อนุญาตให้ | | |
| | อายุรแพทย์ และกุมารแพทย์รักษาได้ | | |
| 6. | Sodium valproate | sterile pwdr, sterile sol | s |
| | หมายเหตุ | | |
| | ยา sodium valproate รูปแบบ sterile sol ความแรง 400 mg/4 mL มีราคาต่ำสุดที่ต่อรองได้ไวแอลละ 290 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ | | |

7. Levetiracetam concentrate for solution for infusion ex
เงื่อนไข
 1. ไม่ใช่เป็นยาตัวแรกในการรักษาภาวะชักต่อเนื่อง ยกเว้นมีประวัติแพ้ยาหรือไม่ตอบสนองต่อยาในกลุ่ม first-generation คือ diazepam, lorazepam, phenytoin sodium, phenobarbital sodium และ sodium valproate
 2. สั่งใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา สาขากุมารประสาทวิทยา และประสาทศัลยศาสตร์ เท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ และอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) อนุญาตให้อายุรแพทย์ และกุมารแพทย์รักษาได้
8. Lacosamide sterile sol R2
เงื่อนไข
 ภาวะ refractory status epilepticus ที่ไม่ตอบสนองต่อยากันชักพื้นฐานอย่างน้อย 3 ชนิด โดยมีแนวทาง กำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

4.9 Drugs used in movement disorders

- | | | |
|--|--|----|
| 1. Baclofen | tab | b |
| 2. Clonazepam | tab | b |
| วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 | | |
| 3. Diazepam | cap, tab | b |
| วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 | | |
| 4. Propranolol hydrochloride | tab | b |
| เงื่อนไข | | |
| ใช้สำหรับ essential tremor | | |
| 5. Trihexyphenidyl hydrochloride | tab | b |
| 6. Levodopa + Benserazide as hydrochloride (Co-beneldopa) | cap/tab (200+50 mg),
CR cap/dispersible tab (100+25 mg) | b |
| 7. Levodopa + Carbidopa as monohydrate (Co-careldopa) | tab (100+25 mg, 250+25 mg) | b |
| 8. Absolute alcohol | inj | ex |
| ยากำพรั้ว | | |
| เงื่อนไข | | |
| ใช้สำหรับภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) หรือ ภาวะ dystonia | | |
| 9. Amantadine hydrochloride | tab (เฉพาะ 100 mg) | ex |
| ยากำพรั้ว | | |
| เงื่อนไข | | |
| ใช้สำหรับลดอาการของโรคพาร์กินสันและอาการ levodopa-induced dyskinesia | | |
| 10. Entacapone | tab | ex |
| เงื่อนไข | | |
| ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่ใช้อื่นไม่ได้ผล | | |

- | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|----|
| 11. | Phenol (Phenyl Alcohol)
ยาแก้ปวด
เงื่อนไข
ใช้สำหรับภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) | inj | ex |
| 12. | Ropinirole
เงื่อนไข
ใช้ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะที่ตอบสนองต่อยา Levodopa ไม่สม่ำเสมอ และรบกวนต่อชีวิตประจำวัน โดยมี total disabling off time มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน | SR tab | ex |
| 13. | Tetrabenazine
ยาแก้ปวด
เงื่อนไข
ใช้สำหรับ chorea ที่สัมพันธ์กับ Huntington's disease | tab (เฉพาะ 12.5 mg และ 25 mg) | ex |
| 14. | Botulinum A toxin
เงื่อนไข <ol style="list-style-type: none"> ใช้สำหรับโรคคอบิด (cervical dystonia) ชนิดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 ใช้สำหรับโรคใบหน้าที่กระตุกครึ่งซีก (hemifacial spasm) ชนิดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 ใช้สำหรับโรค spasmodic dysphonia โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 ใช้สำหรับโรค blepharospasm โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศกำหนด หมายเหตุ
การจัดหายาฉีด botulinum A toxin เงื่อนไขใช้สำหรับโรค blepharospasm เป็นไปตามที่กองทุนในระบบประกันสุขภาพกำหนด | sterile pwdr (เฉพาะ 100 และ 500 IU) | R2 |

4.10 Drugs used in substance dependence

4.10.1 Drugs used in alcohol dependence

- | | | | |
|----|--|-----------|---|
| 1. | Acamprosate
ยาแก้ปวด
เงื่อนไข
ใช้สำหรับ alcohol dependence และ maintenance of abstinence | oral form | b |
| 2. | Naltrexone
ยาแก้ปวด
เงื่อนไข
ใช้สำหรับ alcohol dependence และ maintenance of abstinence ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยา acamprosate ได้ หรือมีการทำงานของไตที่ผิดปกติระดับรุนแรง | oral form | b |

- | | | | |
|----|------------|-----|---|
| 3. | Disulfiram | tab | s |
|----|------------|-----|---|
- เงื่อนไข**
- ใช้กับผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์ที่ยินยอมจะใช้ยานี้ร่วมกับวิธีจิตสังคมบำบัดเพื่อเป็นการควบคุมตนเองไม่ให้กลับไปดื่มซ้ำ
- คำเตือนและข้อควรระวัง**
- การกินยา disulfiram ร่วมกับแอลกอฮอล์ จะทำให้เกิดอาการไม่สบายเนื่องมาจากการสะสมของ acetaldehyde ในเลือด

4.10.2 Drugs used in smoking cessation

- | | | | |
|----|--------------------------|-----|---|
| 1. | Cytisinicline (Cytisine) | tab | b |
|----|--------------------------|-----|---|

4.10.3 Drugs used in opioid dependence

- | | | | |
|----|-------------------------|-----|---|
| 1. | Clonidine hydrochloride | tab | b |
|----|-------------------------|-----|---|
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับ heroin withdrawal
- | | | | |
|----|-------------------------|----------|----|
| 2. | Methadone hydrochloride | oral sol | ex |
|----|-------------------------|----------|----|
- ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับผู้ป่วยติดเฮโรอีน

4.11 Drugs used in dementia

- | | | | |
|----|-------------------------|--|----|
| 1. | Donepezil hydrochloride | tab (เฉพาะ 5 mg และ 10 mg),
oral disintegration tab (เฉพาะ 5 mg
และ 10 mg) | ex |
|----|-------------------------|--|----|
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง
- หมายเหตุ**
- ใช้ยาในขนาดไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อวัน

กลุ่มยา 5 Infections

5.1 Antibacterial drugs

5.1.1 Penicillins

- | | | | |
|----|---|---------------------------------------|---|
| 1. | Amoxicillin trihydrate | cap, dry syr | b |
| 2. | Ampicillin sodium | sterile pwdr | b |
| 3. | Benzathine benzylpenicillin (Penicillin G benzathine) | sterile pwdr | b |
| 4. | Benzylpenicillin (Penicillin G) | sterile pwdr (as sodium or potassium) | b |
| 5. | Cloxacillin sodium | sterile pwdr | b |
| 6. | Dicloxacillin sodium | cap, dry syr | b |
| 7. | Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V) | cap, tab, dry syr | b |
| 8. | Procaine benzylpenicillin (Penicillin G procaine) | sterile sol, sterile susp | b |

9.	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate (Co-amoxiclav)	tab (เฉพาะ 500 + 125, 875 + 125 mg), dry syr (เฉพาะ 400 + 57 mg)	b
10	Amoxicillin sodium + Potassium clavulanate (Co-amoxiclav)	sterile pwdr	b
11.	Ampicillin sodium + Sulbactam sodium	sterile pwdr	s
12.	Piperacillin sodium + Tazobactam sodium	sterile pwdr	s

เงื่อนไข

1. ใช้ในกรณีที่จ่ายากลุ่ม third generation cephalosporins ไม่ได้ โดยให้พิจารณาเลือกใช้ก่อนจ่ายากลุ่ม carbapenems ทั้งใน empiric และ specific therapy สำหรับ nosocomial infection เช่น pneumonia, complicated skin and soft tissue infection, intra-abdominal infection และ febrile neutropenia
2. ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

5.1.2 Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams

1.	Cefalexin (Cephalexin)	cap, dry syr	b
----	------------------------	--------------	---

หมายเหตุ

ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง *Staphylococcus aureus* ในผู้ป่วยที่แพ้ penicillin แบบไม่รุนแรงและการติดเชื้อในชุมชนจากแบคทีเรียแกรมลบบางชนิด เช่น *Escherichia coli* เป็นต้น

2.	Cefazolin sodium	sterile pwdr	b
----	------------------	--------------	---

หมายเหตุ

ใช้ก่อนการผ่าตัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ (preoperative antibiotic prophylaxis)

3.	Cefuroxime axetil	tab, dry syr	b
----	-------------------	--------------	---

หมายเหตุ

1. ใช้สำหรับการติดเชื้อ *Haemophilus influenzae* ที่ดื้อต่อ ampicillin และ *Moraxella catarrhalis*
2. ใช้กับผู้ป่วยที่แพ้หรือไม่สามารถจ่าย co-amoxiclav ได้ หรือแพ้ยาในกลุ่ม penicillins ชนิดไม่รุนแรง

4.	Ceftriaxone sodium	sterile pwdr	b
----	--------------------	--------------	---

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ serious community acquired bacterial infection ยกเว้นการติดเชื้อ *Pseudomonas aeruginosa*
2. ใช้สำหรับ gram-negative meningitis ยกเว้นในเด็กอายุน้อยกว่า 1 เดือน
3. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Penicillin Resistant *Streptococcus pneumoniae* (PRSP)
4. ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบบางกรณี ในผู้ป่วยที่ไตทำงานบกพร่อง หรือมีข้อห้ามซึ่งไม่สามารถจ่ายากลุ่ม aminoglycosides ได้
5. ใช้สำหรับการติดเชื้อ *Neisseria gonorrhoeae*
6. ใช้กับผู้ป่วยซีฟาลิสที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ ซึ่งใช้ benzathine penicillin หรือ doxycycline ไม่ได้

5.	Cefotaxime sodium	sterile pwdr	s
----	-------------------	--------------	---

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับการติดเชื้อในทารกแรกเกิด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด kernicterus จากการจ่าย ceftriaxone
2. ใช้สำหรับโรคติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางที่เกิดจากแบคทีเรียแกรมลบ ในเด็กอายุน้อยกว่า 1 เดือน
3. ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ของ ceftriaxone

6. Ceftazidime sterile pwdr s
เงื่อนไข
ใช้เป็น empiric/specific therapy สำหรับการติดเชื้อ *Pseudomonas aeruginosa* และ melioidosis
7. Cefixime cap, dry syr ex
เงื่อนไข
1. ใช้เป็น switch therapy ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ
2. ใช้เป็นยาทางเลือกหลังจาก ceftriaxone ในการรักษาหนองในแท้เฉพาะที่อวัยวะเพศและทวารหนัก
3. ใช้รักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ในกรณีที่ใช้ยาในกลุ่ม fluoroquinolone แล้วดื้อยาหรือไม่ได้ผล
8. Cefoperazone sodium + Sulbactam sodium sterile pwdr ex
เงื่อนไข
ใช้สำหรับ nosocomial infection จากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ โดยเฉพาะการติดเชื้อ *Acinetobacter* sp.
9. Cefoxitin sodium sterile pwdr ex
เงื่อนไข
1. ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ของยามาตรฐานในการป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดในช่องท้อง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัด
2. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Non-tuberculous mycobacteria (NTM) สำหรับกลุ่ม rapid growers เท่านั้น
หมายเหตุ
ไม่แนะนำให้ใช้รักษาโรคติดเชื้ออื่น ๆ เพราะเป็น beta-lactamase inducer
10. Ertapenem sodium sterile pwdr ex
เงื่อนไข
ใช้เป็น documented therapy สำหรับเชื้อ Enterobacterales ที่สร้าง Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) หรือเชื้อ Enterobacterales ที่ดื้อต่อยา cephalosporins รุ่นที่ 3 (ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime) และไวต่อยากลุ่ม carbapenems
11. Imipenem + Cilastatin sodium sterile pwdr ex
เงื่อนไข
1. ใช้สำหรับโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เกิดจากแบคทีเรียรูปแท่งแกรมลบที่ดื้อยาหลายชนิด (Multiple-Drug-Resistant, MDR) ซึ่งควรมีผลการทดสอบความไวทางห้องปฏิบัติการมายืนยัน
2. ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
12. Meropenem sterile pwdr ex
เงื่อนไข
เช่นเดียวกับ Imipenem + Cilastatin sodium
13. Ceftazidime + Avibactam sterile pwdr (เฉพาะ 2 g + 500 mg) R2
เงื่อนไข
ใช้รักษาการติดเชื้อ Carbapenem-Resistant Enterobacterales (CRE) ที่ไวต่อยา ceftazidime + avibactam ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ colistimethate sodium ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

5.1.3 Tetracyclines

1. Doxycycline hyclate (Doxycycline hydrochloride) cap, tab b
2. Tetracycline hydrochloride cap, tab b

5.1.4 Aminoglycosides

ยา streptomycin sulfate และ amikacin sulfate ดูเพิ่มเติมที่ 5.1.9 Antimycobacterial drugs

- | | | |
|---------------------|-------------|---|
| 1. Amikacin sulfate | sterile sol | b |
|---------------------|-------------|---|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบชนิดที่ดื้อต่อ gentamicin และ/หรือ netilmicin

หมายเหตุ

จัดเป็นบัญชี s เมื่อใช้รักษา drug-resistant tuberculosis, ใช้ในกรณีไม่สามารถทนต่อยาวัณโรคหลักได้, ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ non-tuberculous mycobacteria (NTM) ดูข้อ 5.1.9 Antimycobacterial drugs

- | | | |
|-----------------------|-------------|----|
| 2. Gentamicin sulfate | sterile sol | b |
| 3. Netilmicin sulfate | sterile sol | ex |

เงื่อนไข

ใช้เฉพาะการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ดื้อต่อยา gentamicin และ amikacin ซึ่งต้องมีผลการทดสอบความไวทางห้องปฏิบัติการมายืนยัน

5.1.5 Macrolides

- | | | |
|--------------------------|---------------|---|
| 1. Erythromycin estolate | susp, dry syr | b |
|--------------------------|---------------|---|

เงื่อนไข

ใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

หมายเหตุ

ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคตับ

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 2. Erythromycin stearate or succinate | dry syr | b |
| 3. Roxithromycin | cap/tab (เฉพาะ 100 และ 150 mg) | b |
| 4. Azithromycin | cap (ไม่รวมชนิดออกฤทธิ์นาน),
dry syrup (ไม่รวมชนิดของ และชนิด
ออกฤทธิ์นาน) | s |

หมายเหตุ

- | | | |
|--|---------------|---|
| 1. ใช้รักษาภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง กรณีใช้ยาอื่นไม่ได้ หรือไม่ได้ผล | | |
| 2. ใช้รักษาการติดเชื้อ non-tuberculous mycobacterium (NTM) | | |
| 3. ใช้รักษา early syphilis (หมายถึง primary, secondary หรือ early latent syphilis) กรณีไม่สามารถใช้ยา penicillin หรือ doxycycline หรือ ceftriaxone ได้ (ขนาดยา 2 กรัม รับประทานครั้งเดียว) | | |
| 4. ใช้รักษาโรค rickettsiosis ประเภทยาการไม่รุนแรง ที่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยา doxycycline ได้ เนื่องจากมีข้อห้าม หรือทนผลข้างเคียงไม่ได้ | | |
| 5. Azithromycin | sterile powdr | s |

เงื่อนไข

- | | |
|---|--|
| 1. ใช้รักษาภาวะติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนล่างที่รุนแรงและอาจเกิดจากเชื้อกลุ่ม atypical pathogen เช่น legionellosis เป็นต้น | |
| 2. ใช้รักษาโรค rickettsiosis ประเภทยาการรุนแรง | |

- | | | | |
|----|----------------|--------------|---|
| 6. | Clarithromycin | tab, dry syr | s |
|----|----------------|--------------|---|

หมายเหตุ

1. ใช้รักษาภาวะติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนล่าง ในกรณีใช้ยาอื่นไม่ได้ หรือไม่ได้ผล
2. ใช้รักษาโรคติดเชื้อ non-tuberculous mycobacteria (NTM)
3. ใช้กำจัดเชื้อ *Helicobacter pylori* หลังจากได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อแล้ว

5.1.6 Quinolones

- | | | | |
|----|-------------|----------------------------|---|
| 1. | Norfloxacin | tab | b |
| 2. | Ofloxacin | tab (เฉพาะ 100 และ 200 mg) | b |

เงื่อนไข

ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า

- | | | | |
|----|-----------------------------|-----|---|
| 3. | Ciprofloxacin hydrochloride | tab | s |
|----|-----------------------------|-----|---|

เงื่อนไข

ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ เช่น ใช้ต่อเนื่องจากยาฉีด (sequential therapy หรือ switch therapy)

- | | | | |
|----|-----------------------|-------------|---|
| 4. | Ciprofloxacin lactate | sterile sol | s |
|----|-----------------------|-------------|---|

เงื่อนไข

ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ เช่น ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าแกรมลบที่ไม่สามารถให้ยาในกลุ่ม beta-lactam และ/หรือยาในกลุ่ม aminoglycoside ได้

- | | | | |
|----|---------------------------|----------------------------|---|
| 5. | Levofloxacin hemihydrates | tab (เฉพาะ 500 และ 750 mg) | s |
|----|---------------------------|----------------------------|---|

เงื่อนไข

ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ เช่น ใช้รักษาแบบผู้ป่วยนอก ในกรณี moderate to severe community-acquired pneumonia และ lower respiratory tract infection ที่สงสัย Drug-Resistant *Streptococcus pneumoniae* (DRSP) หรือ pathogen ที่ทำให้เกิด atypical pneumonia ที่ใช้ macrolide ไม่ได้หรือไม่ได้ผล หรือ ใช้ต่อเนื่องจากยาฉีด (sequential therapy)

หมายเหตุ

1. ผู้ป่วย community-acquired pneumonia (CAP) ที่มี comorbidities หรือ เคยใช้ยาปฏิชีวนะในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา แนะนำให้ใช้ levofloxacin ในขนาด 750 mg วันละครั้ง อย่างน้อย 5 วัน หรือในขนาด 500 mg วันละครั้ง อย่างน้อย 7 วัน
2. จัดเป็นบัญชี ex เมื่อใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy หรือใช้รักษาวัณโรคในผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม first-line ได้ ดูข้อ 5.1.9 Antimycobacterial drugs

- | | | | |
|----|---------------------------|-------------|---|
| 6. | Levofloxacin hemihydrates | sterile sol | s |
|----|---------------------------|-------------|---|

เงื่อนไข

ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ เช่น ใช้รักษาแบบผู้ป่วยใน ในกรณี moderate to severe community-acquired pneumonia และ lower respiratory tract infection ที่สงสัย Drug-Resistant *Streptococcus pneumoniae* (DRSP) หรือ pathogen ที่ทำให้เกิด atypical pneumonia

หมายเหตุ

จัดเป็นบัญชี ex เมื่อใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy หรือใช้รักษาวัณโรคในผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่สามารถใช้ยากลุ่ม first-line ได้ ดูข้อ 5.1.9
Antimycobacterial drugs

5.1.7 Some other antibacterials

- | | | |
|------------------|--|---|
| 1. Metronidazole | cap/tab (as base), susp (as benzoate), sterile sol (as base) | b |
| 2. Clindamycin | cap (as hydrochloride), sterile sol (as phosphate) | b |

เงื่อนไข

- ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียชนิด anaerobes, แบคทีเรียแกรมบวกชนิดรุนแรงในผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่ม beta-lactam แบบ type I (anaphylaxis หรือ urticaria) หรือการติดเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียแกรมบวก และ anaerobes
 - ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในการป้องกันหรือรักษา *Pneumocystis jirovecii* pneumonia (PCP) ในผู้ป่วยเอดส์
 - ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ก่อนการผ่าตัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ (pre-operative prophylaxis) ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา penicillin หรือยาในกลุ่ม beta-lactam อย่างรุนแรง
 - ไม่ควรใช้รักษาโรคติดเชื้อนอกเหนือไปจากข้อ 1 ถึงข้อ 3 เนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิด *Clostridioides difficile* infection (CDI)
- | | | |
|-------------------|-----|---|
| 3. Nitrofurantoin | tab | b |
|-------------------|-----|---|

หมายเหตุ

- ใช้รักษาการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง
 - ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างที่กลับเป็นซ้ำในหญิงตั้งครรภ์
- | | | |
|--|---------------|----|
| 4. Colistimethate sodium
(Sodium Colistinmethanesulphonate) | sterile powdr | ex |
|--|---------------|----|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับการติดเชื้อกรั่มลบที่ดื้อต่อยาในกลุ่ม carbapenems

- | | | |
|----------------------|---------------|----|
| 5. Fosfomycin sodium | sterile powdr | ex |
|----------------------|---------------|----|

เงื่อนไข

ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ เนื่องจาก การใช้ยานี้เป็นยาเดี่ยวอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้

- | | | |
|--------------------|-----|----|
| 6. Sodium fusidate | tab | ex |
|--------------------|-----|----|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับการติดเชื้อ Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) ที่มีอาการไม่รุนแรงถึงรุนแรงปานกลางหรือใช้เป็น switch therapy ต่อจากยาชนิดอื่น โดยใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อป้องกันการดื้อยา

หมายเหตุ

แนะนำให้ใช้ในการรักษาการติดเชื้อที่บริเวณกระดูกหรือผิวหนัง

- | | | | |
|-----|---|--------------------------|----|
| 7. | Sulbactam sodium | sterile pwdr (เฉพาะ 2 g) | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้ร่วมกับยาต้านจุลชีพอื่นในการรักษาการติดเชื้อ <i>Acinetobacter baumannii</i> ที่ดื้อต่อยาหลายขนาน | | |
| 8. | Vancomycin hydrochloride | cap (เฉพาะ 125 mg) | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อ <i>Clostridioides difficile</i> infection | | |
| 9. | Vancomycin hydrochloride | sterile pwdr | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่ดื้อยา หรือในผู้ป่วยที่แพ้ยาในกลุ่ม beta-lactam อย่างรุนแรง | | |
| 10. | Linezolid | tab | R2 |
| | เงื่อนไข | | |
| 1. | ใช้สำหรับโรคติดเชื้อ Methicillin resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 | | |
| 2. | ใช้สำหรับโรคติดเชื้อ Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 | | |
| 3. | ใช้สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อ <i>Mycobacterium abscessus</i> โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 | | |
| | หมายเหตุ | | |
| | จัดเป็นบัญชี ex เมื่อใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), pre-extensively drug-resistant tuberculosis (pre-XDR-TB), extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) ดูข้อ 5.1.9 Antimycobacterial drugs | | |
| 11. | Linezolid | sterile sol | R2 |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อ Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE) ที่ไม่สามารถใช้ยา linezolid แบบรับประทานได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 | | |

5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim

- | | | | |
|----|---|-----------------------------|---|
| 1. | Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole) | cap, tab, susp, sterile sol | b |
| 2. | Trimethoprim | tab | b |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้รักษาโรคติดเชื้อที่อาจไวต่อ trimethoprim ในผู้ป่วยที่แพ้ยาในกลุ่ม sulfonamides | | |

5.1.9 Antimycobacterial drugs

- | | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|---|
| 1. | Ethambutol hydrochloride | film coated tab | b |
| 2. | Isoniazid | tab | b |
| 3. | Pyrazinamide | tab | b |
| 4. | Rifampicin | cap, tab, dry syr, syr, susp | b |

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 5. | Rifapentine
ยาคำพรั้า | oral form | b |
| เงื่อนไข | | | |
| ใช้สำหรับการรักษาวัณโรคระยะแฝง และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรคระยะแฝง ตามแนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝง ของกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปัจจุบัน | | | |
| 6. | Tuberculin Purified Protein Derivative
(Tuberculin PPD) | inj | b |
| 7. | Isoniazid + Rifapentine
ยาคำพรั้า | oral form | b |
| เงื่อนไข | | | |
| ใช้สำหรับการรักษาวัณโรคระยะแฝง และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรคระยะแฝง ตามแนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝง ของกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปัจจุบัน | | | |
| 8. | Isoniazid + Rifampicin | cap/tab (เฉพาะ 100+150 mg และ 150+300 mg) | b |
| 9. | Isoniazid + Rifampicin
ยาคำพรั้า | oral form (for pediatric use) | b |
| 10. | Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide + Ethambutol hydrochloride | tab (เฉพาะ 75 + 150 + 400 + 275 mg) | b |
| 11. | Amikacin sulfate | sterile sol | s |
| เงื่อนไข | | | |
| 1. ใช้รักษา drug-resistant tuberculosis | | | |
| 2. ใช้ในกรณีไม่สามารถทนต่อยาวัณโรคหลักได้ | | | |
| 3. ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ non-tuberculous mycobacteria (NTM) | | | |
| หมายเหตุ | | | |
| ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 5.1.4 Aminoglycosides | | | |
| 12. | Cycloserine | cap | s |
| เงื่อนไข | | | |
| 1. ใช้รักษา drug-resistant tuberculosis | | | |
| 2. ใช้ในกรณีไม่สามารถทนต่อยาวัณโรคหลักได้ | | | |
| 13. | Ethionamide | tab | s |
| เงื่อนไข | | | |
| 1. ใช้รักษา drug-resistant tuberculosis | | | |
| 2. ใช้ในกรณีไม่สามารถทนต่อยาวัณโรคหลักได้ | | | |
| 14. | Para-aminosalicylic acid (PAS) | EC tab | s |
| เงื่อนไข | | | |
| 1. ใช้รักษา drug-resistant tuberculosis | | | |
| 2. ใช้ในกรณีไม่สามารถทนต่อยาวัณโรคหลักได้ | | | |

- | | | | |
|-----|---|--|----|
| 15. | Streptomycin sulfate | sterile powdr | s |
| | เงื่อนไข | | |
| | 1. ใช้รักษา drug-resistant tuberculosis | | |
| | 2. ใช้ในกรณีไม่สามารถทนต่อยาวัณโรคหลักได้ | | |
| | 3. ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ non-tuberculous mycobacteria (NTM) | | |
| 16. | Bedaquiline fumarate | tab | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), pre-extensively drug-resistant tuberculosis (pre-XDR-TB), extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) | | |
| 17. | Clofazimine | cap | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | 1. ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), pre-extensively drug-resistant tuberculosis (pre-XDR-TB), extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) | | |
| | 2. ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ non-tuberculous mycobacteria (NTM) | | |
| 18. | Delamanid | tab | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), pre-extensively drug-resistant tuberculosis (pre-XDR-TB), extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) | | |
| 19. | Levofloxacin hemihydrate | tab (เฉพาะ 500 และ 750 mg),
sterile sol | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy หรือใช้รักษาวัณโรคในผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่สามารถใช้ยากกลุ่ม first-line ได้ | | |
| | หมายเหตุ | | |
| | ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 5.1.6 Quinolones | | |
| 20. | Linezolid | tab | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), pre-extensively drug-resistant tuberculosis (pre-XDR-TB), extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) | | |
| | หมายเหตุ | | |
| | จัดเป็นบัญชี R2 สำหรับโรคติดเชื้อ Methicillin Resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE), <i>Mycobacterium abscessus</i> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 5.1.7 Some other antibacterials | | |
| 21. | Moxifloxacin hydrochloride | tab | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | 1. ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), pre-extensively drug-resistant tuberculosis (pre-XDR-TB), extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) | | |
| | 2. ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ non-tuberculous mycobacteria (NTM) | | |

22. Pretomanid tab (เฉพาะ 200 mg) ex
เงื่อนไข
 ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), pre-extensively drug-resistant tuberculosis (pre-XDR-TB) โดยให้ใช้เป็นองค์ประกอบของสูตรยาที่มี bedaquiline + linezolid ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการใช้ยา moxifloxacin ร่วมด้วย
23. Protionamide tab ex
เงื่อนไข
 ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), pre-extensively drug-resistant tuberculosis (pre-XDR-TB), extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB)

5.1.10 Antileprotic drugs

1. Clofazimine cap b
หมายเหตุ
 จัดเป็นบัญชี ex เมื่อใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), pre-extensively drug-resistant tuberculosis (pre-XDR-TB), extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB), โรคติดเชื้อ non-tuberculous mycobacteria (NTM) ดูข้อ 5.1.9 Antimycobacterial drugs
2. Dapsone tab b

5.2 Antifungal drugs

1. Fluconazole cap b
เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับ invasive fungal infection บางชนิด
 2. ใช้สำหรับ dermatomycoses
2. Griseofulvin tab b
3. Nystatin oral susp b
4. Saturated solution of potassium iodide (SSKI) sol (hosp) b
5. Amphotericin B sterile pwdr (เฉพาะ conventional formulations) s
เงื่อนไข
 ใช้สำหรับการรักษา invasive fungal infections
6. Fluconazole sterile sol s
เงื่อนไข
 ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ของ amphotericin B ในการรักษา cryptococcosis หรือ candidiasis เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถใช้ amphotericin B ได้
7. Itraconazole cap s
เงื่อนไข
 ใช้สำหรับโรคติดเชื้อ talaromycosis, histoplasmosis, cryptococcosis, vaginal candidiasis และ dermatomycoses

8. Flucytosine (5-fluorocytosine) oral form ex
ยาแก้ปว้า
- เงื่อนไข**
ใช้เสริมฤทธิ์ยาด้านเชื้อราอื่น ๆ ในผู้ป่วย *Cryptococcal meningitis*
9. Itraconazole oral sol ex
เงื่อนไข
1. ใช้กับผู้ป่วยที่รับประทานยาแคปซูลไม่ได้
 2. เป็นยาแทน (alternative drug) สำหรับโรคติดเชื้อ talaromycosis, histoplasmosis, cryptococcosis, vaginal candidiasis และ dermatomycoses
 3. ใช้สำหรับป้องกัน invasive fungal infection ในผู้ป่วยเด็กที่มี profound, protracted neutropenia เช่น ผู้ป่วย Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation ช่วง pre-engraftment หรือ มี graft versus host disease หรือ ผู้ป่วย acute myeloid leukemia เป็นต้น
10. Liposomal amphotericin B sterile pwdr R2
เงื่อนไข
1. ใช้รักษา invasive fungal infections (ยกเว้น aspergillosis) ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยา conventional amphotericin B โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 2. ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่มีภาวะ persistent febrile neutropenia ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด หรือเคยเกิดพิษต่อไตหรืออาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่มีความรุนแรงระดับ 3 ขึ้นไป จากยา amphotericin B และไม่สามารถควบคุมด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศกำหนด
- หมายเหตุ**
1. การจัดหายาฉีด Liposomal amphotericin B รูปแบบ sterile pwdr เงื่อนไขใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่มีภาวะ persistent febrile neutropenia ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดหรือเคยเกิดพิษต่อไตหรืออาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่มีความรุนแรงระดับ 3 ขึ้นไป จากยา amphotericin B และไม่สามารถควบคุมด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้เป็นไปตามที่กองทุนในระบบประกันสุขภาพกำหนด
 2. ยาฉีด liposomal amphotericin B รูปแบบ sterile pwdr มีราคาที่ต้องรองได้ไวแอลละไม่เกิน 4,692 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้
11. Micafungin sodium sterile pwdr (เฉพาะ 50 mg) R2
เงื่อนไข
ใช้รักษา invasive candidiasis ที่ดื้อต่อยา fluconazole หรือไม่สามารถใช้ conventional amphotericin B ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
12. Posaconazole tab (เฉพาะ 100 mg) R2
เงื่อนไข
ใช้รักษา invasive mucormycosis ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองหรือไม่สามารถทนต่อยา amphotericin B ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
13. Voriconazole tab, sterile pwdr R2
เงื่อนไข
1. ใช้รักษา invasive aspergillosis โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

2. ใช้รักษา invasive fungal infection จากเชื้อ *Fusarium* spp., *Scedosporium* spp. และ *Trichosporon* spp. โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
3. ใช้สำหรับการป้องกัน invasive fungal infection ในผู้ป่วย acute myeloid leukemia ที่มีภาวะ neutropenia ตามหลังการได้เคมีบำบัดระยะ induction โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 (เฉพาะรูปแบบ tab)

5.3 Antiviral drugs

5.3.1 Non-antiretrovirals

Aciclovir ชนิด topical (Aciclovir cream) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากมีประสิทธิผลต่ำ

1. Aciclovir (Acyclovir) tab, oral susp, oral susp (hosp) b

หมายเหตุ

ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กที่เป็นโรคอีสุกอีใส (Chicken pox) ชนิดไม่รุนแรง

2. Oseltamivir phosphate cap, dry syr b

หมายเหตุ

1. ใช้สำหรับการรักษาโรคไขหวัดใหญ่ ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินโรครุนแรง หรือแพร่กระจายเชื้อให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินโรครุนแรง
2. ใช้สำหรับรักษาโรคไขหวัดใหญ่ที่มีอาการไม่เกิน 48 ชั่วโมง
3. ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อการป้องกันก่อนการสัมผัส หรือป้องกันหลังการสัมผัส

3. Aciclovir sodium (Acyclovir sodium) sterile powdr, sterile sol s

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับการติดเชื้อไวรัส varicella-zoster และ herpes simplex ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและในทารกแรกเกิด
2. ใช้สำหรับการติดเชื้อไวรัส varicella-zoster และ herpes simplex ที่มีการแพร่กระจาย หรือเป็นการติดเชื้อของอวัยวะภายใน หรือในผู้ป่วยที่เข้ารับประทุกันไม่ได้
3. ใช้กับทารกแรกเกิดที่มารดาป่วยเป็นโรคอีสุกอีใสในช่วง 5 วันก่อนคลอดและในช่วง 2 วันหลังคลอด เพื่อป้องกันโรคอีสุกอีใสในทารกแรกเกิด (neonatal varicella)
4. ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

4. Cidofovir sterile sol ex

ยากำพร้า

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ adenovirus ในเลือดหรืออวัยวะอื่นที่มีอาการรุนแรงที่ไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย (terminally ill) โดยมีอาการทางคลินิกที่เข้าได้ ร่วมกับการตรวจวินิจฉัยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - 1.1 การตรวจพบ adenovirus ในเลือดด้วยวิธีทางอนุพันธุศาสตร์ (molecular detection)
 - 1.2 การตรวจพบ adenovirus จากสิ่งส่งตรวจของอวัยวะที่มีอาการสงสัย ด้วยวิธีทางอนุพันธุศาสตร์ (molecular detection) เช่น ปัสสาวะ สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจส่วนล่าง น้ำล้างจากถุงลมปอด (bronchoalveolar lavage fluid)
 - 1.3 การตรวจพบลักษณะทางพยาธิวิทยาที่เข้าได้กับการติดเชื้อ adenovirus (cytopathological change) หรือการตรวจพบไวรัสจากการตรวจด้วยกล้อง electron microscope
2. ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

- | | | | |
|----|---|--------------------|----|
| 5. | Ganciclovir sodium | sterile powdr | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | 1. ใช้สำหรับ cytomegalovirus disease | | |
| | 2. ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ | | |
| 6. | Peramivir | sterile sol | ex |
| | ยากำพร้า | | |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้กับผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงและไม่สามารถใช้ยาชนิดรับประทาน หรือชนิดสูดพ่นได้ | | |
| 7. | Valganciclovir hydrochloride | tab (เฉพาะ 450 mg) | R2 |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้สำหรับการรักษา cytomegalovirus disease โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศกำหนด | | |
| | หมายเหตุ | | |
| | 1. การจัดหายา valganciclovir hydrochloride รูปแบบ tab ความแรง 450 mg เงื่อนไขใช้สำหรับการรักษา cytomegalovirus disease เป็นไปตามที่กองทุนในระบบประกันสุขภาพกำหนด | | |
| | 2. ยา valganciclovir hydrochloride รูปแบบ tab ความแรง 450 mg มีราคาต่ำสุดที่ต่อรองได้เม็ดละ 513.64 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ | | |

5.3.2 Antiretrovirals

ยากลุ่มนี้เป็นยาตามนโยบายเอดส์แห่งชาติของกรมควบคุมโรค สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง

- | | | | |
|----|--|--------------------------|---|
| 1. | Efavirenz (EFV) | cap, tab | b |
| 2. | Lamivudine (3TC) | tab, syr | b |
| 3. | Nevirapine (NVP) | susp | b |
| 4. | Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) | tab | b |
| 5. | Tenofovir disoproxil fumarate + Emtricitabine (TDF + FTC) | tab (300 + 200 mg) | b |
| 6. | Tenofovir disoproxil fumarate + Emtricitabine + Efavirenz (TDF + FTC + EFV) | tab (300 + 200 + 600 mg) | b |
| 7. | Tenofovir disoproxil fumarate + Lamivudine + Dolutegravir sodium (TDF + 3TC + DTG) | tab (300 + 300 + 50 mg) | b |

หมายเหตุ

ให้ใช้ยานี้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาสูตร TAF/FTC/DTG ได้

- | | | | |
|-----|--|------------------------|---|
| 8. | Tenofovir alafenamide + Emtricitabine (TAF + FTC) | tab (25 + 200 mg) | b |
| 9. | Tenofovir alafenamide + Emtricitabine + Dolutegravir (TAF + FTC + DTG) | tab (25 + 200 + 50 mg) | b |
| 10. | Zidovudine (AZT) | cap, oral sol | b |
| 11. | Zidovudine + Lamivudine (AZT + 3TC) | tab (เฉพาะ 300+150 mg) | b |

- | | | |
|-----------------------|-----|---|
| 12. Rilpivirine (RPV) | tab | b |
|-----------------------|-----|---|

หมายเหตุ

ใช้ยานี้ตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน

- | | | |
|------------------------|-------------------|---|
| 13. Dolutegravir (DTG) | tab (เฉพาะ 50 mg) | s |
|------------------------|-------------------|---|

หมายเหตุ

1. ใช้ยานี้ตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน
2. ผู้ป่วยเดิมที่ดื้อยาควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนสั่งใช้ยานี้

- | | | |
|------------------------|--------------------|---|
| 14. Dolutegravir (DTG) | orodispersible tab | s |
|------------------------|--------------------|---|

เงื่อนไข

เป็นสูตรยาต้านเอชไอวีสำหรับรักษาในเด็กอายุตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวมากกว่าหรือเท่ากับ 3 กิโลกรัม

- | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|
| 15. Lopinavir + Ritonavir (LPV + RTV) | tab, oral sol | s |
|---------------------------------------|---------------|---|

- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| 16. Ritonavir (RTV) | tab, oral sol | s |
|---------------------|---------------|---|

- | | | |
|--------------------|---------------|---|
| 17. Abacavir (ABC) | tab, oral sol | s |
|--------------------|---------------|---|

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir หรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir ได้ (ยา tenofovir ผลข้างเคียงที่สำคัญคือ ผลต่อไต และผลต่อ bone density)
2. ใช้เป็น nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) ในสูตรยาต้านไวรัสดื้อยา ในกรณีที่การรักษาล้มเหลวจากเชื้อดื้อยาด้านไวรัสสูตรก่อน โดยต้องมีผลการตรวจ genotypic resistance ที่ไวกับยา abacavir และเชื้อไวต่อยาอื่นในสูตรอย่างน้อย 2 ชนิด
3. ใช้กับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ 3 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ

1. ผู้ป่วยที่ได้รับยา abacavir อาจมีภาวะ hypersensitivity ได้โดยเฉพาะใน 6 สัปดาห์แรก อาการส่วนใหญ่มักจะมีหลายระบบร่วมกัน หากพบอาการอย่างน้อย 2 ข้อดังต่อไปนี้
 - 1.1 ไข้
 - 1.2 ผื่น
 - 1.3 คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
 - 1.4 อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (arthralgia)
 - 1.5 หอบเหนื่อย ไอ เจ็บคอ
 ให้หยุดยา abacavir ทันที และห้ามให้ยา abacavir อีก (ห้าม rechallenge) เพราะอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
2. การตรวจ HLA B*5701 ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์
3. ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ยาสูตร dolutegravir based ผู้ป่วยที่จะใช้ยานี้เป็นสูตรแรกควรมีค่า baseline HIV-1 RNA viral load น้อยกว่า 100,000 copies/ml (เนื่องจากยามีประสิทธิภาพน้อยกว่า tenofovir เมื่อให้ในผู้ป่วยที่มี baseline HIV-1 RNA viral load มากกว่า 100,000 copies/ml) หรือเป็นไปตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| 18. Abacavir + Lamivudine (ABC + 3TC) | tab (600 + 300 mg) | s |
|---------------------------------------|--------------------|---|

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir หรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir ได้ (ยา tenofovir ผลข้างเคียงที่สำคัญคือ ผลต่อไต และผลต่อ bone density)

- ใช้เป็น nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) ในสูตรยาต้านไวรัสดื้อยา ในกรณีที่การรักษาล้มเหลวจากเชื้อดื้อยาต้านไวรัสสูตรก่อน โดยต้องมีผลการตรวจ genotypic resistance ที่ไวกับยา abacavir และเชื้อไวต่อยาอื่นในสูตรอย่างน้อย 2 ชนิด
- ใช้กับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ 3 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ

- ผู้ป่วยที่ได้รับยา abacavir อาจมีภาวะ hypersensitivity ได้โดยเฉพาะใน 6 สัปดาห์แรก อาการส่วนใหญ่มักจะมีหลายระบบร่วมกัน หากพบอาการอย่างน้อย 2 ข้อดังต่อไปนี้
 - ไข้
 - ผื่น
 - คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
 - อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (arthralgia)
 - หอบเหนื่อย ไอ เจ็บคอ
 ให้หยุดยา abacavir ทันที และห้ามให้ยา abacavir อีก (ห้าม rechallenge) เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
 - การตรวจ HLA B*5701 ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์
 - ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ยาสูตร dolutegravir based ผู้ป่วยที่จะใช้นี้เป็นสูตรแรกควรมีค่า baseline HIV-1 RNA viral load น้อยกว่า 100,000 copies/ml (เนื่องจากยามีประสิทธิภาพน้อยกว่า tenofovir เมื่อให้ในผู้ป่วยที่มี baseline HIV-1 RNA viral load มากกว่า 100,000 copies/ml) หรือเป็นไปตามแนวทางการตรวจวินิจฉัยรักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน
19. Darunavir (DRV) tab (เฉพาะ 300, 600 และ 800 as base) s

เงื่อนไข

ใช้รักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาสูตรพื้นฐาน และสูตรที่สอง โดยเป็นไปตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน

5.3.3 Viral hepatitis

- Tenofovir alafenamide (TAF) tab (เฉพาะ 25 mg) ex

เงื่อนไข

- ใช้ในผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นยาลำดับแรก (first line therapy) ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังรายใหม่ ซึ่งไม่เคยรักษามาก่อน โดยมีเกณฑ์ดังนี้
 - ในกรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังชนิด HBeAg positive หรือ HBeAg negative มี alanine aminotransferase (ALT) สูงกว่าหรือเท่ากับ 1.5 เท่าของค่าปกติ และมี HBV DNA มากกว่า 10,000 copies/ml (หรือ 2,000 IU/ml)
 - ในกรณีผู้ป่วยมีระดับ ALT น้อยกว่า 1.5 เท่าของค่าปกติ ต้องมีผล liver histology ที่แสดงว่ามีภาวะตับอักเสบตามเกณฑ์ The Knodell histology activity index (HAI) scoring system โดยมี necroinflammatory score มากกว่าหรือเท่ากับ 4 หรือตามเกณฑ์ METAVIR scoring system มีระดับ moderate หรือ severe necroinflammation (A มากกว่าหรือเท่ากับ 2) หรือ มีพังผืดในตับอย่างชัดเจนตามเกณฑ์ METAVIR scoring system โดยมี fibrosis stage มากกว่าหรือเท่ากับ 2 หรือผลการตรวจ non-invasive fibrosis markers เช่น liver elastography, The aspartate aminotransferase to platelet ratio index (APRI) หรือ Fibrosis-4 score (FIB-4) เป็นต้น บ่งชี้ว่ามี fibrosis stage มากกว่าหรือเท่ากับ 2

2. ใช้เป็น switch therapy ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังรายเดิมที่เคยได้รับการรักษาด้วยยา lamivudine หรือ entecavir หรือ tenofovir disoproxil fumarate (TDF) มาก่อน
3. ใช้สำหรับ compensated หรือ decompensated cirrhosis ที่ตรวจพบ HBV DNA
4. ใช้เป็น prophylactic therapy ในผู้ป่วยที่จะได้รับยาเคมีบำบัดโดยใช้ยาในระยะสั้นหรือยากดภูมิคุ้มกัน ในกรณีข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 - 4.1 ตรวจพบ HBsAg positive หรือ
 - 4.2 ตรวจพบ anti-HBc positive และ HBsAg-negative ที่ได้รับการรักษาด้วยยา monoclonal antibody to CD20 ได้แก่ Rituximab หรือ ได้รับปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่ตรวจพบ HBsAg-positive หรือตรวจพบ anti-HBc positive ร่วมกับ HBsAg-negative
5. ใช้เป็น rescue therapy สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี ที่ดื้อยา entecavir หรือ lamivudine

คำแนะนำ

1. ให้ตรวจ HIV serology negative 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือนก่อนเริ่มการรักษา ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (ผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย: hepatic decompensation) ให้มีผล HIV serology negative ในครั้งแรก
2. ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV อย่างต่อเนื่อง ให้ตรวจ anti-HIV อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ

1. ระดับ ALT ที่ผิดปกติต้องวินิจฉัยแยกโรคอื่น ๆ ที่ทำให้ ALT สูงกว่าปกติ เช่น fatty liver, drug-induced hepatitis, autoimmune hepatitis
 2. แนะนำให้ติดตามการทำงานของไต ตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในประเทศไทย
 3. ต้องมีการประเมินและให้การรักษาผู้ป่วยถึงภาวะแทรกซ้อนอย่างเหมาะสม เช่น ตับแข็ง มะเร็งตับ
2. Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) tab ex

เงื่อนไข

1. ใช้รักษาหรือควบคุมการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (chronic hepatitis B virus infection) ในหญิงตั้งครรภ์
2. ใช้สำหรับ decompensated cirrhosis (Child–Pugh score B or C) ที่ตรวจพบ HBV DNA
3. ใช้เป็น rescue therapy ในผู้ป่วยอายุ 2-18 ปี ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง กรณีที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน nucleoside analogs เช่น lamivudine, telbivudine, หรือ entecavir เป็นต้น และไม่สามารถใช้ tenofovir alafenamide (TAF) ได้

คำแนะนำ

1. ให้ตรวจ HIV serology negative 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือนก่อนเริ่มการรักษา ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (ผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย: hepatic decompensation) ให้มีผล HIV serology negative ในครั้งแรก
2. ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV อย่างต่อเนื่อง ให้ตรวจ anti-HIV อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ

1. แนะนำให้ติดตามการทำงานของไต ตามแนวทางการรักษาโรคตับอักเสบบีเรื้อรังของประเทศไทย
 2. ต้องมีการประเมินและให้การรักษาผู้ป่วยถึงภาวะแทรกซ้อนอย่างเหมาะสม เช่น ตับแข็ง มะเร็งตับ
3. Lamivudine (3TC) syd ex

เงื่อนไข

ใช้เป็น prophylactic therapy ในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ที่จะได้รับยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมิคุ้มกันโดยใช้ยาในระยะสั้น หรือใช้ในเด็กที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่ตรวจพบ HBsAg-positive หรือตรวจพบ anti-HBc positive ร่วมกับ HBsAg-negative

4. Entecavir (ETV)

tab (เฉพาะ 0.5 mg)

ex

เงื่อนไข

1. ใช้เป็น alternative first line therapy ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (chronic hepatitis B) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir alafenamide (TAF) หรือ tenofovir disoproxil fumarate (TDF) ได้ โดย
 - 1.1 ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตผิดปกติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 - 1.1.1 มี serum creatinine มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ในผู้ใหญ่) หรือ มากกว่า 2 เท่าของค่าปกติ (ในเด็ก) หรือ
 - 1.1.2 มี creatinine clearance (CrCl) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 มิลลิตรต่อนาที (ในผู้ใหญ่) หรือ 60 มิลลิตรต่อนาทีต่อ 1.73 ตารางเมตร (ในเด็ก) หรือ
 - 1.1.3 ผู้ป่วยมีภาวะ proximal tubular dysfunction ร่วมกับความผิดปกติดังนี้ ได้แก่ hypokalemia หรือ hypophosphatemia หรือ glucosuria (ที่ไม่ได้เกิดจากภาวะ hyperglycemia) หรือ proteinuria มากกว่าหรือเท่ากับ 1 กรัมต่อวัน
 - 1.2 ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคกระดูกบางหรือกระดูกพรุน
2. ใช้ในผู้ป่วยเด็กอายุมากกว่า 6 ปีที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (chronic hepatitis B) กรณีที่กลืนยาเม็ดได้ ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 - 2.1 ใช้เป็นยาลำดับแรก (first line therapy) ในผู้ป่วยซึ่งไม่เคยรักษามาก่อน
 - 2.2 ใช้เป็น switch therapy เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่รักษาได้ดีด้วยยา lamivudine มาก่อน
 - 2.3 ใช้เป็น rescue therapy ที่ต่อเนื่องการรักษาด้วยยา lamivudine แต่มีข้อห้ามในการใช้ยา tenofovir disoproxil fumarate (TDF)
 - 2.4 ใช้เป็น prophylactic therapy กับผู้ป่วยที่จะได้รับยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมิคุ้มกัน ในกรณีข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 - 2.4.1 ตรวจพบ HBsAg positive หรือ
 - 2.4.2 ตรวจพบ anti-HBc positive และ HBsAg-negative ที่ได้รับการรักษาด้วยยา monoclonal antibody to CD20 ได้แก่ rituximab หรือ
 - 2.4.3 ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่ตรวจพบ HBsAg-positive หรือตรวจพบ anti-HBc positive ร่วมกับ HBsAg-negative

หมายเหตุ

รูปแบบ oral sol ใช้ในเด็กอายุ 2-6 ปี และรูปแบบ tab ใช้ในเด็กอายุมากกว่า 6 ปีและในผู้ใหญ่

5. Entecavir (ETV)

oral sol

ex

เงื่อนไข

- ใช้ในผู้ป่วยเด็กอายุ 2-6 ปี ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (chronic hepatitis B) ซึ่งยังไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ใช้เป็นยาลำดับแรก (first line therapy) ในผู้ป่วยซึ่งไม่เคยรักษามาก่อน
 2. ใช้เป็น switch therapy เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่รักษาได้ดีด้วยยา lamivudine มาก่อน
 3. ใช้เป็น rescue therapy ที่ต่อเนื่องการรักษาด้วยยา lamivudine แต่มีข้อห้ามในการใช้ยา tenofovir disoproxil fumarate (TDF)
 4. ใช้เป็น prophylactic therapy กับผู้ป่วยที่จะได้รับยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมิคุ้มกัน ในกรณีข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 - 4.1 ตรวจพบ HBsAg positive หรือ
 - 4.2 ตรวจพบ anti-HBc positive และ HBsAg-negative ที่ได้รับการรักษาด้วยยา monoclonal antibody to CD20 ได้แก่ rituximab หรือ

4.3 ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่ตรวจพบ HBsAg-positive หรือตรวจพบ anti-HBc positive ร่วมกับ HBsAg-negative

หมายเหตุ

รูปแบบ oral sol ใช้ในเด็กอายุ 2-6 ปี และรูปแบบ tab ใช้ในเด็กอายุมากกว่า 6 ปีและในผู้ใหญ่

- | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------|----|
| 6. | Sofosbuvir + Velpatasvir | tab (เฉพาะ 400 mg + 100 mg) | ex |
|----|--------------------------|-----------------------------|----|

เงื่อนไข

1. ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีทุกสายพันธุ์ชนิดเฉียบพลัน ในผู้ป่วยน้ำหนักตั้งแต่ 30 กิโลกรัมขึ้นไป โดยใช้ระยะเวลาการรักษา 12 สัปดาห์
2. ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีทุกสายพันธุ์ชนิดเรื้อรัง ทั้งกรณีที่ไม่มียับยั้ง และมีดื้อยับยั้ง (ใช้ร่วมกับ ribavirin) ในผู้ป่วยน้ำหนักตั้งแต่ 30 กิโลกรัมขึ้นไป โดยใช้ระยะเวลาการรักษา 12 สัปดาห์ ทั้งนี้หากไม่ตอบสนองต่อการรักษาในครั้งแรก ให้เพิ่มระยะเวลาเป็น 24 สัปดาห์ (ใช้ร่วมกับ ribavirin) ในการรักษาครั้งที่สอง

คำเตือนและข้อควรระวัง

ควรระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีค่า eGFR น้อยกว่า 30 มิลลิลิตรต่อนาทีและยังไม่ได้รับการบำบัดทดแทนไต

- | | | | |
|----|-----------|------------------------|----|
| 7. | Ribavirin | cap/tab (เฉพาะ 200 mg) | ex |
|----|-----------|------------------------|----|

เงื่อนไข

1. ใช้ ribavirin ร่วมกับ sofosbuvir + velpatasvir ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ กรณีมีดื้อยับยั้ง ในผู้ป่วยน้ำหนัก 30 กิโลกรัมขึ้นไป และใช้ระยะเวลาการรักษา 12 สัปดาห์
2. ใช้ ribavirin ร่วมกับ sofosbuvir + velpatasvir ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ ทั้งกรณีมีดื้อยับยั้งและไม่มีดื้อยับยั้งในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาในครั้งแรก (12 สัปดาห์) โดยให้ยาเพิ่มอีกเป็นเวลา 24 สัปดาห์

5.4 Antiprotozoal drugs

5.4.1 Antimalarials

ยากลุ่มนี้ให้ใช้ได้ตามข้อกำหนดในแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย ฉบับปัจจุบันของกองโรคติดต่อภายในโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เป็นยารักษาโรคไข้มาลาเรียเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Chloroquine phosphate | tab | b |
| 2. | Primaquine phosphate | tab | b |
| 3. | Quinine | compressed/film coated tab (as sulfate), sterile sol (as dihydrochloride) | b |
| 4. | Arteminol (Dihydroartemisinin) + Piperaquine | tab | b |

หมายเหตุ

ยารายการนี้เป็นยาตามนโยบายและแนวทางการใช้ยารักษาโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดหาและกระจายยา

- | | | | |
|----|---------------------------|-----|---|
| 5. | Artesunate + Pyronaridine | tab | b |
|----|---------------------------|-----|---|

หมายเหตุ

ยารายการนี้เป็นยาตามนโยบายและแนวทางการใช้ยารักษาโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดหาและกระจายยา

- | | | | |
|----|------------|---|---|
| 6. | Artesunate | tab (ไม่รวม lactab และ rectocap), sterile powdr | s |
|----|------------|---|---|

7.	Mefloquine hydrochloride	tab	s
----	--------------------------	-----	---

5.4.2 Other antiprotozoal drugs

1.	Metronidazole	cap/tab (as base), susp (as benzoate), sterile sol (as base)	b
2.	Pyrimethamine	tab	b
3.	Sulfadiazine	tab	b
4.	Pentamidine isethionate (Pentamidine isethionate)	sterile pwdr	ex

ยากำพรั้ว

เงื่อนไข

ใช้สำหรับป้องกันหรือรักษาปอดอักเสบที่เกิดจาก *Pneumocystis jirovecii* หลังจากการรักษาด้วยยา Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole) และ Clindamycin + Primaquine แล้วไม่ได้ผล หรือไม่สามารถทนต่อยาได้

5.5 Anthelmintics

1.	Albendazole	tab, susp	b
2.	Diethylcarbamazine citrate	tab	b
3.	Mebendazole	tab, susp, susp (hosp)	b
4.	Niclosamide	tab	b
5.	Praziquantel	tab	b
6.	Ivermectin	tab	b

หมายเหตุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 13.1.3 Parasitocidal preparations

7.	Ivermectin	sterile sol	ex
----	------------	-------------	----

ยากำพรั้ว

เงื่อนไข

ใช้รักษาการติดเชื้อพยาธิสตรองจิลอยด์ (strongyloidiasis) ในผู้ที่รับประทานยาแบบเม็ดไม่ได้

หมายเหตุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 13.1.3 Parasitocidal preparations

5.6 Antiseptics

1.	Chlorhexidine gluconate	sol (aqueous) (เฉพาะ 2%, 4% และ 5%), sol/sol (hosp) (เฉพาะ 2%, 4% in 70% alcohol)	b
----	-------------------------	---	---

หมายเหตุ

Chlorhexidine gluconate 5% เป็นชนิดเข้มข้นที่ใช้เตรียม Chlorhexidine แบบ freshly prepared

2.	Ethyl alcohol	sol, sol (hosp), gel (hosp)	b
3.	Gentian violet	sol (paint)	b
4.	Hydrogen peroxide	sol	b
5.	Nitrofurazone (Nitrofurazone)	oint (hosp)	b
6.	Potassium permanganate	pwdr (hosp)	b

7.	Povidone-iodine	sol, sol (hosp), scrub (hosp)	b
8.	Iodine + Potassium iodide (Tincture of Iodine)	sol (hosp)	b

กลุ่มยา 6 Endocrine system

6.1 Drugs used in diabetes

6.1.1 Insulins

1.	Biphasic isophane insulin (Soluble insulin + Isophane insulin)	sterile susp	b
2.	Isophane insulin (NPH; Isophane protamine insulin)	sterile susp	b
3.	Soluble insulin (Neutral insulin; insulin injection)	sterile sol	b
4.	Insulin aspart	sterile sol	ex

เงื่อนไข

1. ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เกิด hypoglycemia บ่อยเมื่อใช้ conventional insulin
2. ใช้สำหรับควบคุมภาวะ postprandial hyperglycemia

5.	Insulin aspart + Insulin aspart protamine	sterile susp (เฉพาะ 30% + 70%)	ex
----	---	--------------------------------	----

เงื่อนไข

เช่นเดียวกับ Insulin aspart

6.	Insulin lispro	sterile sol	ex
----	----------------	-------------	----

เงื่อนไข

1. ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เกิด hypoglycemia บ่อยเมื่อใช้ conventional insulin
2. ใช้สำหรับควบคุมภาวะ postprandial hyperglycemia

7.	Insulin lispro + Insulin lispro protamine	sterile susp (เฉพาะ 25% + 75%)	ex
----	---	--------------------------------	----

เงื่อนไข

เช่นเดียวกับ Insulin lispro

8.	Insulin glargine	sterile sol (cartridge เฉพาะ 100 IU/ml) (3 mL)/(pre-filled pen เฉพาะ 100 IU/ml) (3 mL)	ex
----	------------------	--	----

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 โดยใช้ร่วมกับ prandial insulin อย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป
2. สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ให้ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรง (severe hypoglycemia) จากการใช้ conventional insulin

คำแนะนำ

ผู้ป่วยควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การใช้ยา insulin glargine เกิดประโยชน์สูงสุด

หมายเหตุ

ยาฉีด insulin glargine ความแรง 100 IU/ml ขนาด 3 ml รูปแบบ cartridge มีราคาต่ำสุดที่ต่อรองได้หลอดละ 220 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และยาฉีด Insulin glargine ความแรง 100 IU/ml ขนาด 3 ml รูปแบบ pre-filled pen มีราคาต่ำสุดที่ต่อรองได้ด้ามละ 278.20 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 นับจากวันที่ 24 มีนาคม 2567

6.1.2 Oral antidiabetic drugs

- | | | |
|------------------|--------------------------|---|
| 1. Glibenclamide | tab (เฉพาะ 2.5 และ 5 mg) | b |
|------------------|--------------------------|---|

คำเตือนและข้อควรระวัง

พึงระมัดระวังในผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| 2. Glipizide | tab | b |
| 3. Metformin hydrochloride | tab | b |
| 4. Pioglitazone hydrochloride | tab (เฉพาะ 15 และ 30 mg) | b |

เงื่อนไข

ใช้เป็นยาทางเลือก ภายหลังการใช้ยา Metformin หรือยากกลุ่ม Sulfonylureas

คำเตือนและข้อควรระวัง

- | | | |
|--|-----------------------------|----|
| 1. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีหัวใจล้มเหลวในระดับที่รุนแรง (NYHA ในระดับ 3 และ 4) ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว | | |
| 2. ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่กำลังเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ | | |
| 5. Repaglinide | tab (เฉพาะ 0.5, 1 และ 2 mg) | ex |

เงื่อนไข

- ใช้สำหรับลด postprandial hyperglycemia
- ใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อ hypoglycemia สูง

6.1.3 Treatment of hypoglycemia

- | | | |
|--------------|-----|----|
| 1. Diazoxide | tab | ex |
|--------------|-----|----|

ยากำพรั้ว

เงื่อนไข

- | | | |
|---|--------------|----|
| 1. ใช้สำหรับ persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy (PHHI หรือ nesidioblastosis) | | |
| 2. ใช้สำหรับ insulinoma ที่ผ่าตัดไม่ได้ | | |
| 2. Glucagon, human | sterile pwdr | ex |

ยากำพรั้ว

เงื่อนไข

ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่มีภาวะ hypoglycemia บ่อยครั้ง (มากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์) หรือ เกิดภาวะ severe hypoglycemia หมายถึง hypoglycemia รุนแรงมากจนต้องมาห้องฉุกเฉิน หรือรับไว้ในโรงพยาบาลปีละ 1 ครั้ง

6.2 Thyroid and antithyroid drugs

6.2.1 Thyroid hormones

- | | | |
|--|-----|----|
| 1. Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium) | tab | b |
| 2. Liothyronine sodium | tab | ex |

ยากำพรั้ว

เงื่อนไข

ใช้แทน levothyroxine sodium ชั่วคราวระหว่างรอทำ total body scan ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์

6.2.2 Antithyroid drugs

- | | | |
|--|-----------------|---|
| 1. Lugol's solution (Aqueous iodine oral solution, Strong iodine solution) | oral sol (hosp) | b |
|--|-----------------|---|

2.	Propylthiouracil	tab	b
3.	Saturated solution of potassium iodide (SSKI)	oral sol (hosp)	b
4.	Thiamazole (Methimazole)	tab	b
5.	Octreotide acetate	sterile pwdr (ชนิดออกฤทธิ์นาน เฉพาะ 20 และ 30 mg/vial)	R2

เงื่อนไข

สำหรับผู้ป่วย thyrotropin secreting pituitary adenoma โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. การใช้ยาก่อนการผ่าตัดเพื่อให้ฮอร์โมนไทรอยด์เข้าสู่ภาวะปกติก่อนการผ่าตัด หรือกรณีมีแนวโน้มที่ก้อนจะไม่สามารถผ่าตัดออกได้หมด เช่น มีการลามเข้า cavernous sinus โดยมีระยะเวลาให้ยา 1-3 เดือน
2. การให้ยาระหว่างรอการตอบสนองต่อการรักษาด้วยการฉายแสงหลังผ่าตัดในกรณีที่ก้อนไม่สามารถผ่าตัดออกได้หมด โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

6.3 Corticosteroids

1.	Dexamethasone	cap/tab (as base), sterile sol (as sodium phosphate or acetate)	b
2.	Hydrocortisone ชนิดเม็ดเป็นยากำพรั้ว	tab (as base), sterile pwdr (as sodium succinate), sterile susp (as acetate)	b
3.	Prednisolone	cap, tab	b
4.	Fludrocortisone acetate ยากำพรั้ว	tab	b

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ replacement therapy ใน adrenocortical insufficiency

5.	Methylprednisolone	sterile pwdr/sterile susp (as hemisuccinate or sodium succinate or acetate)	s
6.	Triamcinolone acetonide	sterile susp	s

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ควรระวังการฉีดในตำแหน่งหรือรอยโรคที่มีการติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อ
2. กรณีฉีดเข้าข้อ โดย
 - 2.1 ไม่ควรฉีดเข้าข้อใหญ่ในคราวเดียวกันเกิน 2 ข้อ ยกเว้นผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง
 - 2.2 การฉีดยาเข้าข้อเดียวกันควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 เดือน
3. กรณีฉีดเข้ารอยโรค (intralesional injection) สำหรับโรคผิวหนัง ควรฉีดเข้าในชั้นหนังแท้ หลีกเลี่ยงการฉีดเข้าในชั้นหนังกำพรั้วหรือไขมันใต้ผิวหนัง เพราะทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ผิวหนังบาง เป็นต้น

6.4 Sex hormones

6.4.1 Female sex hormones

1.	Conjugated estrogens	tab	b
2.	Estradiol (17 β -estradiol)	gel (เฉพาะ 0.06%)	b
3.	Estradiol hemihydrate	vaginal gel (hosp)	b
4.	Estradiol valerate	tab	b

5.	Medroxyprogesterone acetate	tab (เฉพาะ 2.5, 5 และ 10 mg)	b
6.	Norethisterone	tab	b
7.	Conjugated estrogens	sterile powdr	s
8.	Dydrogesterone	film-coated tab (เฉพาะ 10 mg)	ex

เงื่อนไข

ใช้ในหญิงตั้งครรภ์รายที่มีอาการแท้งซ้ำซาก (recurrent abortion)

9.	Micronized progesterone	cap (เฉพาะ 100 mg และ 200 mg)	ex
----	-------------------------	-------------------------------	----

เงื่อนไข

1. ใช้ป้องกัน preterm birth ในหญิงตั้งครรภ์เดี่ยวที่มีประวัติการคลอดก่อนกำหนด (หลัง 16 สัปดาห์ เป็นต้นไป)
2. ใช้ป้องกัน preterm birth ในหญิงตั้งครรภ์เดี่ยวที่มี short cervical length (transvaginal) น้อยกว่า 25 mm

6.4.2 Male sex hormones and antagonists

1.	Testosterone enantate (Testosterone enanthate)	sterile oily sol for inj	s
2.	Cyproterone acetate	tab	ex

เงื่อนไข

ใช้ผู้ป่วย moderate to severe hirsutism ที่มีข้อห้ามใช้ หรือมีผลข้างเคียงจากการใช้ยา combined oral contraceptive หรือ spironolactone

คำเตือนและข้อควรระวัง

อาการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพิษของตับ (ดีซ่าน ตับอักเสบ ตับวาย) มักเกิดขึ้นหลังการใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายเดือน ควรติดตามการทำงานของตับและพิจารณาหยุดยา หากพบหลักฐานการเกิดพิษต่อตับ

6.5 Hypothalamic and pituitary hormones

6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones

1.	Chorionic gonadotrophin (Human Chorionic Gonadotrophin ; HCG)	sterile powdr	ex
----	--	---------------	----

เงื่อนไข

ใช้สำหรับกระตุ้นการเคลื่อนตัวของอสุจิ ในผู้ป่วยเด็กที่มี undescended testis และใช้ทดสอบการทำงานของอสุจิ (HCG test)

2.	Tetracosactide (Cosyntropin)	sterile powdr	ex
----	------------------------------	---------------	----

ยากำพร้า

เงื่อนไข

ใช้สำหรับวินิจฉัยโรคทางต่อมไร้ท่อ

3.	Octreotide acetate	sterile powdr (ชนิดออกฤทธิ์นาน เฉพาะ 20 และ 30 mg/vial)	R2
----	--------------------	--	----

เงื่อนไข

ใช้ผู้ป่วย Acromegaly ที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเนื้องอกหรือการฉายแสงแล้ว ระดับ Growth Hormone (GH) และ Insulin-like Growth Factor (IGF) ยังสูงอยู่ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

4.	Somatropin	sterile sol, sterile powdr	R2
----	------------	----------------------------	----

เงื่อนไข

ใช้สำหรับผู้ป่วย growth hormone deficiency ในทารกแรกเกิดหรือเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 2 ปี ร่วมกับมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

5. Thyrotropin alfa sterile powdr R2
เงื่อนไข

ใช้สำหรับ differentiated thyroid cancer (papillary and/or follicular thyroid carcinoma) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

6.5.2 Posterior pituitary hormones and antagonists

1. Desmopressin acetate (DDAVP) tab, nasal sol (nasal drop/ nasal spray), ex
sterile sol

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ diabetes insipidus
2. ชนิดเม็ดใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาทางจมูกได้เท่านั้น

6.6 Drugs affecting bone metabolism

1. Alendronate sodium tab (เฉพาะ 70 mg) ex

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เมื่อมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. ชายและหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป
 - 1.1. มีประวัติกระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังหัก หรือ
 - 1.2. มีประวัติกระดูกหักที่บริเวณปลายแขน (distal forearm), ต้นแขน (humerus) หรือ เซิงกราน (pelvis) โดยมีค่า BMD T-score ที่กระดูกสันหลัง หรือ กระดูกสะโพก น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2.5
 2. ชายและหญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยมีประวัติกระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังหัก แต่ได้รับการตรวจพบข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - 2.1. มีค่า BMD T-score ที่กระดูกสันหลัง หรือ กระดูกสะโพก น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2.5
 - 2.2. มีค่า BMD T-score ที่กระดูกสันหลัง หรือ กระดูกสะโพก อยู่ระหว่าง -1.0 และ -2.5 และมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกสะโพกหักในช่วงเวลา 10 ปี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 (FRAX สำหรับประเทศไทย)
2. Calcitonin-salmon sterile sol ex

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วย severe hypercalcemia

คำเตือนและข้อควรระวัง

ใช้ยานี้ในระยะเวลาสั้นที่สุด ในขนาดต่ำสุดที่มีประสิทธิผลการรักษา

หมายเหตุ

1. มีหลักฐานที่เป็น Randomize controlled trial หลายฉบับที่แสดงว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา calcitonin ชนิดรับประทานและชนิดพ่นจมูก มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก
 2. ยา calcitonin ชนิดพ่นจมูกมีข้อมูลชัดเจนว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง และข้อมูลด้านประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ จึงไม่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
3. Disodium pamidronate sterile powdr, sterile sol ex

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ severe osteogenesis imperfecta ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกหัก

4. Zoledronic acid sterile sol (เฉพาะ 4 mg/5 ml) ex
- เงื่อนไข**
1. ใช้สำหรับภาวะ hypercalcemia ที่เกิดจากโรคมะเร็ง
 2. ใช้สำหรับป้องกันโรคแทรกซ้อนทางกระดูกซึ่งมี osteolytic lesion จากภาพรังสี (plain X-ray หรือ CT scan) และเกิดจากโรคมะเร็งดังต่อไปนี้
 - 2.1 โรคมะเร็ง multiple myeloma โดยให้ zoledronic acid เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี
 - 2.2 โรคมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดที่ดื้อต่อฮอร์โมน (castration resistant prostate cancer) โดยให้ zoledronic acid เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี
 3. ใช้สำหรับ severe osteogenesis imperfecta ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกหัก
- หมายเหตุ**
- ให้หยุดยาเมื่อไม่มีการรักษาที่จำเพาะสำหรับโรคมะเร็ง

6.7 Other endocrine drugs

6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic drugs

1. Bromocriptine mesilate tab s
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับ prolactinoma , acromegaly, amenorrhea ทั้งที่มีและไม่มี galactorrhea

6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins

1. Leuporelin acetate sterile pwdr (เฉพาะ 11.25 mg) R2
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับภาวะ central (gonadotrophin dependent) precocious puberty โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
- หมายเหตุ**
- ยาฉีด leuporelin acetate ขนาด 11.25 mg ที่ต้องรองได้เข็มละไม่เกิน 7,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ 24 มีนาคม 2567
2. Triptorelin pamoate sterile pwdr (เฉพาะ 11.25 mg) R2
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับภาวะ central (gonadotrophin dependent) precocious puberty โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
- หมายเหตุ**
- ยาฉีด triptorelin pamoate ขนาด 11.25 mg ที่ต้องรองได้ไวแอลละไม่เกิน 7,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ 24 มีนาคม 2567

6.7.3 Drugs used in endogenous glucocorticoid and androgen overproduction

1. Ketoconazole tab ex
- เงื่อนไข**
1. ใช้สำหรับ Cushing's syndrome ที่รอกการผ่าตัด หรือไม่ตอบสนองต่อการผ่าตัด และ/หรือ การฉายแสง
 2. ใช้สำหรับรักษาภาวะ androgen overproduction ในกรณี testotoxicosis
- หมายเหตุ**
- สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากชนิด castration resistance ดูข้อ 8.3.2 Prostate cancer

กลุ่มยา 7 Obstetrics, gynaecology and urinary-tract disorders

7.1 Drugs used in obstetrics

7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics

- | | | | |
|----|----------------------------|---------------------|---|
| 1. | Methyleergometrine maleate | sterile sol | b |
| 2. | Misoprostol | tab (เฉพาะ 200 mcg) | b |

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับเตรียมปากมดลูกในการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีทางศัลยกรรม
2. ใช้สำหรับยุติการตั้งครรภ์กรณีที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ร่วมกับยา misoprostol (200 ไมโครกรัม) + mifepristone (200 มิลลิกรัม) tablet ชนิด combination pack ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 มาตรา 301 และ 305

หมายเหตุ

ใช้ยา misoprostol รูปแบบ tablet ขนาด 200 ไมโครกรัม เป็น repeated dose ภายหลังจากการใช้ยา misoprostol + mifepristone รูปแบบ tablet (200 ไมโครกรัม+ 200 มิลลิกรัมชนิด combination pack

- | | | | |
|----|----------------------------|---|---|
| 3. | Misoprostol + Mifepristone | tab (200 mcg + 200 mg
ชนิด combination pack) | b |
|----|----------------------------|---|---|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับการยุติการตั้งครรภ์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 มาตรา 301 และ 305

- | | | | |
|----|--------------|-------------------------------|----|
| 4. | Oxytocin | sterile sol | b |
| 5. | Alprostadiol | sterile sol (เฉพาะ 0.5 mg/ml) | ex |

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิดที่ต้องพึ่ง ductus arteriosus

- | | | | |
|----|--------------------------------|--------------|----|
| 6. | Indometacin sodium
ยากำพรัว | sterile pwdr | ex |
|----|--------------------------------|--------------|----|

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยเด็กเพื่อปิด patent ductus arteriosus

7.1.2 Myometrial relaxants

- | | | | |
|----|---------------------|------------------|---|
| 1. | Terbutaline sulfate | tab, sterile sol | b |
|----|---------------------|------------------|---|

7.1.3 Premature labor

- | | | | |
|----|------------|-----------------------|----|
| 1. | Nifedipine | immediate release tab | ex |
|----|------------|-----------------------|----|

เงื่อนไข

ใช้ใน uncomplicated premature labor ที่มีอายุครรภ์ 24-33 สัปดาห์

7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions

- | | | | |
|----|----------------------|---------------|---|
| 1. | Clotrimazole | vaginal tab | b |
| 2. | Nystatin | vaginal tab | b |
| 3. | Conjugated estrogens | vaginal cream | b |

7.3 Contraceptives

- | | | | |
|----|----------------|--|---|
| 1. | Etonogestrel | implant 1 rod (68 mg/rod) | b |
| 2. | Levonorgestrel | tab (เฉพาะ 750 mcg), implant
2 rods (75 mg/rod) | b |

เงื่อนไข

Levonorgestrel รูปแบบยาเม็ดใช้สำหรับคุมกำเนิดกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

- | | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------------|---|
| 3. | Lynestrenol | tab (เฉพาะ 0.5 mg) | b |
| 4. | Medroxyprogesterone acetate | sterile susp | b |
| 5. | Ethinylestradiol + Desogestrel | tab (เฉพาะ 20 + 150 mcg) | b |
| 6. | Ethinylestradiol + Levonorgestrel | tab (เฉพาะ 30 + 150 mcg) | b |

7.4 Drugs for genito-urinary disorders

7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia

- | | | | |
|----|-------------------------|---|---|
| 1. | Doxazosin mesilate | immediate release tab
(เฉพาะ 2 และ 4 mg) | b |
| 2. | Alfuzosin hydrochloride | SR tab (เฉพาะ 10 mg) | s |

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา หรือ ไม่สามารถทนต่ออาการไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยากลุ่ม non-uroselective alpha-1 adrenergic blockers

- | | | | |
|----|-------------|------------------|----|
| 3. | Finasteride | tab (เฉพาะ 5 mg) | ex |
|----|-------------|------------------|----|

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตที่มีอาการผิดปกติในการปัสสาวะระดับปานกลางถึงรุนแรง และมีขนาดของต่อมลูกหมากมากกว่า 40 ml หรือมีระดับ prostate specific antigen (PSA) concentrations มากกว่า 1.4 ng/ml

หมายเหตุ

finasteride ขนาด 1 mg ที่ใช้รักษาศีรษะล้านไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

7.4.2 Drugs for urinary frequency enuresis, and incontinence

- | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------|---|
| 1. | Oxybutynin hydrochloride | immediate release tab | s |
|----|--------------------------|-----------------------|---|

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ neurogenic bladder ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิด (newborn)
2. ใช้ใน overactive bladder (OAB) ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
3. ไม่ใช่สำหรับ nocturnal enuresis (ปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก)

- | | | | |
|----|-------------------|-------------------------------------|---|
| 2. | Trospium chloride | immediate release tab (เฉพาะ 20 mg) | s |
|----|-------------------|-------------------------------------|---|

เงื่อนไข

ใช้ใน overactive bladder (OAB) และ urinary incontinence ในผู้ใหญ่ ยกเว้น stress incontinence

7.4.3 Drugs used in alkalinisation of urine

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Potassium citrate | oral sol (hosp),
dry powdr for oral sol (hosp) | b |
| 2. | Sodium citrate + Citric acid (Shohl's solution) | oral sol (hosp) | b |
| 3. | Sodium citrate + Potassium citrate | oral sol (hosp) | b |

กลุ่มยา 8 Malignant disease and immunosuppression

8.1 Cytotoxic drugs

8.1.1 Alkylating drugs

- | | | |
|---------------------|------------------------|---|
| 1. Busulfan | tab | b |
| 2. Chlorambucil | tab | b |
| 3. Cyclophosphamide | tab, cap, sterile pwdr | b |
| 4. Ifosfamide | sterile pwdr | b |

เงื่อนไข

- ใช้เป็น second-line treatment สำหรับ lymphoma ชนิด relapse หรือ refractory
- ใช้สำหรับการรักษามะเร็งในเด็ก ได้แก่ Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL), retinoblastoma, anaplastic large cell lymphoma และ relapsed/refractory solid tumors

- | | | |
|---------------|--------------|----|
| 5. Ifosfamide | sterile pwdr | ex |
|---------------|--------------|----|

เงื่อนไข

- ใช้กับผู้ป่วยที่เป็น sarcoma
- ใช้สำหรับ Wilms' tumor และ neuroblastoma
- ใช้สำหรับ germ cell tumor

- | | | |
|---------------|--------------|----|
| 6. Melphalan | tab | b |
| 7. Carmustine | sterile pwdr | ex |

ยากำพร้า

เงื่อนไข

ใช้เป็น conditioning regimen ในการรักษา Hodgkin's และ non-Hodgkin's lymphoma ด้วยวิธี hematopoietic stem cell transplantation

- | | | |
|-------------------------------|----------|----|
| 8. Procarbazine hydrochloride | cap, tab | ex |
|-------------------------------|----------|----|

ยากำพร้า

เงื่อนไข

- ใช้เป็น adjuvant หรือ neo-adjuvant therapy สำหรับ anaplastic oligodendroglioma
- ใช้สำหรับ recurrent anaplastic oligodendroglioma
- ใช้สำหรับ Hodgkin's lymphoma

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|----|
| 9. Bendamustine hydrochloride | sterile pwdr (เฉพาะ 25 และ 100 mg) | R2 |
|-------------------------------|------------------------------------|----|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับผู้ป่วย small lymphocytic lymphoma/chronic lymphocytic leukemia และ B-cell lymphoma ที่มีการดำเนินโรคช้า ได้แก่ follicular lymphoma, mantle cell lymphoma, lymphoplasmacytic lymphoma /Waldenstrom macroglobulinemia โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

หมายเหตุ

ยา bendamustine hydrochloride รูปแบบ sterile pwdr ขนาด 25 mg มีราคาต่ำสุดที่ต่อรองได้ไวแอลละ 749 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขนาด 100 mg มีราคาต่ำสุดที่ต่อรองได้ไวแอลละ 2,996 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้

8.1.2 Cytotoxic antibiotics

- | | | | |
|----|---------------------------|--|---|
| 1. | Bleomycin | sterile pwdr
(as sulfate or as hydrochloride) | b |
| 2. | Dactinomycin | sterile pwdr | b |
| 3. | Doxorubicin hydrochloride | sterile pwdr, sterile susp, sterile sol | b |

คำเตือนและข้อควรระวัง

ไม่ใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และผู้ป่วยที่มี cardiomyopathy ที่มี left ventricular ejection fraction น้อยกว่า 50%

- | | | | |
|----|----------------------------|---------------------------|---|
| 4. | Idarubicin hydrochloride | sterile pwdr, sterile sol | b |
| 5. | Mitomycin | sterile pwdr, sterile sol | b |
| 6. | Mitoxantrone hydrochloride | sterile pwdr, sterile sol | s |

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ acute myeloid leukemia และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
2. ใช้กับผู้ป่วยเด็กที่เป็น relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia (ALL)

8.1.3 Antimetabolites

- | | | | |
|----|---------------------------|--|----|
| 1. | Cytarabine | sterile pwdr, sterile sol | b |
| 2. | Fludarabine phosphate | sterile pwdr (เฉพาะ 50 mg) | b |
| 3. | Fluorouracil (5-FU) | sterile sol | b |
| 4. | Gemcitabine hydrochloride | sterile pwdr, sterile sol | b |
| 5. | Mercaptopurine (6-MP) | tab | b |
| 6. | Methotrexate | tab (as base or sodium),
sterile pwdr / sterile sol (as sodium) | b |
| 7. | Thioguanine (6-TG) | tab | b |
| 8. | Capecitabine | tab | ex |

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ advanced breast cancer โดยใช้เป็น second หรือ third-line drug หลังการใช้ anthracycline และ/หรือ taxane มาแล้ว
2. ใช้ร่วมกับรังสีรักษาในการรักษาเสริม ก่อน หรือ หลัง การผ่าตัดในมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
3. ใช้เป็นการรักษาเสริมหลังการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ stage II-III
 - 3.1 ใช้เป็นยาเดี่ยวใน colorectal cancer stage II-III หรือ
 - 3.2 ใช้ร่วมกับ oxaliplatin ใน stage III colorectal cancer ในผู้ป่วยที่มี Eastern Co-operative Oncology Group (ECOG) performance status ตั้งแต่ 0-1
4. ใช้ร่วมกับ oxaliplatin ในผู้ป่วย advanced colorectal cancer (CRC)
5. ใช้เป็นการรักษาเสริมหลังผ่าตัดแบบ D2 lymphadenectomy ในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร pathological stage II-III โดยใช้ร่วมกับยา oxaliplatin
6. ใช้เป็นการรักษาเสริมหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านมระยะแรกชนิด triple negative ในผู้ป่วยที่มีรอยโรคทางพยาธิวิทยาหลงเหลือ (residual tumor) ภายหลังจากได้รับ neoadjuvant chemotherapy ที่มียา anthracycline และ taxane
7. ใช้เป็นการรักษาเสริมหลังผ่าตัด (adjuvant therapy) ในผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma) และมะเร็งถุงน้ำดี (Gallbladder Cancer) โดยให้ยาไม่เกิน 8 cycles (1 คอร์ส ของการรักษา)

8. ใช้เป็นการรักษาก่อนการผ่าตัดในมะเร็งลำไส้ตรงระยะลุกลามเฉพาะที่ (ระยะที่ II, III)
9. ใช้ในการรักษาเสริมหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนระยะแรกๆ ที่ผ่าตัดออกจนไม่มีร่องรอยของโรคเหลืออยู่แบบเห็นได้ (post R0 or R1 resection) โดยใช้ร่วมกับ gemcitabine

หมายเหตุ

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ส่วนตรง (colorectal cancer) ด้วยยาเคมีบำบัด fluorouracil (5-FU), leucovorin, capecitabine, oxaliplatin และ irinotecan มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. กรณี adjuvant chemotherapy for colorectal cancer stage II & III (stage II and III poor performance status)

1.1 Stage II high risk

- fluoropyrimidine monotherapy (5-FU + leucovorin, or capecitabine) 6 เดือน

1.2 Stage III low risk (T1-3 และ N1)

- fluoropyrimidine monotherapy (5-FU + leucovorin, or capecitabine) 6 เดือน หรือ
- XELOX (CapeOx) เป็นระยะเวลา 4 cycles หรือ
- FOLFOX เป็นระยะเวลา 12 cycles

1.3 Stage III high risk T4 or N2

- fluoropyrimidine monotherapy (5-FU + leucovorin, or capecitabine) 6 เดือน หรือ
- XELOX (CapeOx) เป็นระยะเวลา 8 cycles หรือ
- FOLFOX เป็นระยะเวลา 12 cycles (6 เดือน)

2. กรณี concurrent chemoradiotherapy in rectal cancer

- capecitabine 825 mg/m² PO twice daily x 5 days/week + XRT x 5 weeks หรือ
- 5-FU 400 mg/m² IV Bolus + leucovorin 20 mg/m² day 1-4 ทุก 28 วัน (2 cycles)

3. กรณี advanced colorectal cancer

- fluoropyrimidine monotherapy (5-FU + leucovorin, or capecitabine) 6 เดือน หรือ
- XELOX (CapeOx) เป็นระยะเวลา 8 cycles หรือ
- FOLFOX เป็นระยะเวลา 12 cycles หรือ
- FOLFIRI เป็นระยะเวลา 12 cycles เมื่อไม่ตอบสนองต่อยาขนานแรก

9. Oxaliplatin sterile pwdr, sterile sol ex

เงื่อนไข

1. ใช้ในการรักษา colorectal cancer stage III-IV โดยใช้ร่วมกับ fluorouracil (5-FU) + leucovorin based-regimen หรือ capecitabine ในคนไข้ที่มี Eastern Co-operative Oncology Group (ECOG) performance status ตั้งแต่ 0 – 1
2. ใช้รักษาเสริมหลังผ่าตัดแบบ D2 lymphadenectomy ในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ที่มี pathological stage II-III โดยใช้ร่วมกับยา capecitabine
3. ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจายหรือโรคกลับเป็นซ้ำที่ผ่าตัดไม่ได้ (ระยะที่ IV) และสภาพร่างกายแข็งแรง (ECOG PS 0-2) โดยให้เป็นยาขนานแรก และใช้ร่วมกับยาในกลุ่ม fluoropyrimidine
4. ใช้รักษาเสริมหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนระยะแรกๆ ที่ผ่าตัดออกจนไม่มีร่องรอยของโรคเหลืออยู่แบบเห็นได้ (post R0 or R1 resection) โดยใช้ร่วมกับ irinotecan และ fluorouracil (5-FU)
5. ใช้ในการรักษาโดยเป็นยาสูตรแรก (first-line regimen) ในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนระยะที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้และ/หรือระยะแพร่กระจาย (unresectable pancreatic cancer and/or advanced pancreatic cancer) ร่วมกับ irinotecan และ fluorouracil (5-FU)
6. ใช้เป็นการรักษาก่อนการผ่าตัดในมะเร็งลำไส้ตรงระยะลุกลามเฉพาะที่ (ระยะที่ II, III)

หมายเหตุ

1. มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปว่ายาสสูตร FOLFOX มีประสิทธิผลในการเพิ่มระยะเวลาการรอดชีพ (survival benefit) ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะที่ 3 ที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
2. กรณีใช้ร่วมกับยา capecitabine ให้ดูหมายเหตุยา capecitabine

10. Pemetrexed sterile pwdr ex

เงื่อนไข

ใช้ร่วมกับยา cisplatin ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเยื่อหุ้มปอดชนิดที่ไม่สามารถผ่าตัดออกไปได้ โดยผู้ป่วยไม่เคยได้รับยาเคมีบำบัดมาก่อน

8.1.4 Vinca alkaloids and etoposide

1. Etoposide cap (as base), sterile sol (as base) b
2. Vinblastine sulfate sterile pwdr, sterile sol b
3. Vincristine sulfate sterile pwdr, sterile sol b
4. Vinorelbine tartrate sterile sol, cap (เฉพาะ 20 และ 30 mg) ex

เงื่อนไข

ใช้เป็น adjuvant therapy ใน non-small cell lung cancer stage II-IIIa

หมายเหตุ

ยา vinorelbine tartrate รูปแบบ cap ขนาด 20 mg มีราคาที่ต้องรองได้เม็ดละ 1,605.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขนาด 30 mg มีราคาที่ต้องรองได้เม็ดละ 2,493.10 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้

8.1.5 Other antineoplastic drugs

1. Arsenic trioxide sterile sol, sterile sol (hosp) b
ยากำพร้า
2. Asparaginase sterile pwdr b
3. Calcium folinate (Leucovorin calcium) cap, tab, sterile pwdr, sterile sol b

หมายเหตุ

กรณีใช้รักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ส่วนตรง ให้ดูหมายเหตุยา capecitabine

4. Carboplatin sterile pwdr, sterile sol b
5. Cisplatin sterile pwdr, sterile sol b
6. Dacarbazine sterile pwdr b
ยากำพร้า
7. Hydroxycarbamide (Hydroxyurea) cap b
8. Paclitaxel sterile sol b
9. Tretinoin (all-trans-Retinoic acid) cap b
10. Docetaxel sterile sol ex

เงื่อนไข

1. ใช้ร่วมกับ cyclophosphamide ในการรักษาเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่มีปัญหาโรคหัวใจ หรือ เคยได้รับยา doxorubicin แล้ว

2. ใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามหลังจากได้รับ doxorubicin และ paclitaxel แล้ว หรือ มีปัญหาโรคหัวใจ
 3. ใช้เป็น second-line drug สำหรับโรคมะเร็งปอด ชนิด non-small cell ระยะลุกลาม
 4. ใช้สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย
 5. ใช้เป็นยาขนานที่สองในการรักษามะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน (soft tissue sarcoma) ระยะแพร่กระจาย หรือผ่าตัดไม่ได้ที่เคยได้ยากกลุ่ม anthracycline และ ifosfamide มาแล้วโดยให้ร่วมกับ gemcitabine
 6. ใช้เป็นการรักษาเสริมก่อนการผ่าตัดหรือรังสีรักษาสำหรับมะเร็งศีรษะและลำคอ non nasopharyngeal squamous cell carcinoma ระยะลุกลามเฉพาะที่ (ระยะที่ III และ IV) ที่ไม่มีการแพร่กระจายของมะเร็งไปที่บริเวณอื่น
 7. ใช้ในการรักษาเสริมในมะเร็งเต้านมระยะแรก (early breast cancer) หลังการผ่าตัด โดยให้ร่วมกับยา cyclophosphamide ในผู้ป่วย triple negative (TNBC) ที่มีขนาด 0.5 เซนติเมตรขึ้นไปที่ไม่มีการกระจายในต่อมน้ำเหลืองได้รั้งไม่เกิน 3 ต่อมน
11. Interferon alfa-2b (Interferon alpha-2b) sterile pwdr ex

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรค polycythemia vera หรือ essential thrombocythemia ที่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ cytoreductive therapy
 2. ใช้โดยแพทย์สาขาโลหิตวิทยาและอายุรศาสตร์โรคเลือด
12. Irinotecan hydrochloride sterile sol ex

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับรักษา metastatic colorectal cancer โดยใช้ร่วมกับ fluorouracil (5-FU) + leucovorin
2. ใช้รักษาเสริมหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนระยะแรกที่ไม่มีการกระจายของโรคเหลืออยู่แบบเห็นได้ (post R0 or R1 resection) โดยใช้ร่วมกับ oxaliplatin และ fluorouracil (5-FU)
3. ใช้ในการรักษาโดยเป็นยาสูตรแรก (first-line regimen) ในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนระยะที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้และ/หรือระยะแพร่กระจาย (unresectable pancreatic cancer and/or advanced pancreatic cancer) ร่วมกับ oxaliplatin และ fluorouracil (5-FU)

หมายเหตุ

กรณีใช้รักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ส่วนตรง ให้ดูหมายเหตุยา capecitabine

13. Isotretinoin (13-cis Retinoic acid) cap ex

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ high-risk neuroblastoma ในผู้ป่วยเด็ก

14. Mitotane tab (เฉพาะ 500 mg) ex

ยากำพร้า

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ adrenocortical carcinoma ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
2. ใช้สำหรับ adrenocortical carcinoma ระยะแพร่กระจาย

15. Topotecan sterile pwdr ex

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วย neuroblastoma ที่มีความเสี่ยงสูง
2. ใช้กับผู้ป่วย retinoblastoma
3. ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

16. Bevacizumab sterile sol R2
เงื่อนไข
 ใช้สำหรับโรคมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว (epithelial ovarian cancer), มะเร็งเยื่อบุท่อนำไข่ (fallopian tube cancer) หรือมะเร็งเยื่อบุช่องท้องชนิดปฐมภูมิ (primary peritoneal cancer) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
หมายเหตุ
 ยาฉีด bevacizumab รูปแบบ sterile sol ความแรง 100 มิลลิกรัม ขนาด 4 มิลลิลิตร มีราคาต่ำสุดที่ต่อรองได้ ไวแอลละ 2,551.95 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567
17. Bortezomib sterile pwdr (เฉพาะ 3.5 mg) R2
เงื่อนไข
 ใช้สำหรับ multiple myeloma ในผู้ป่วย transplant candidate โดยใช้เป็น first-line treatment โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
18. Erlotinib tab (เฉพาะ 150 mg) R2
เงื่อนไข
 ใช้เป็น first-line drug สำหรับโรคมะเร็งปอด ชนิด non-small cell lung carcinoma (NSCLC) ระยะลุกลามถึงแพร่กระจายที่มีผลตรวจการกลายพันธุ์ของยีน Epidermal growth factor receptor (EGFR) เป็นบวก โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
19. Imatinib mesylate tab (เฉพาะ 100 และ 400 mg) R2
เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับ chronic myeloid leukemia (CML) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 2. ใช้สำหรับ gastrointestinal stromal tumors (GISTs) ระยะลุกลามหรือมีการกระจายของโรค โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 3. ใช้เป็น first-line treatment สำหรับ Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukemia (Ph + ALL) โดยใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัด โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
20. Nilotinib hydrochloride cap (เฉพาะ 200 mg) R2
เงื่อนไข
 ใช้เป็น second line treatment หรือ third line treatment สำหรับรักษา chronic myeloid leukemia (CML) ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ imatinib ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
21. Dasatinib tab (เฉพาะ 50 mg และ 70 mg) R2
เงื่อนไข
 1. ใช้เป็น second line treatment หรือ third line treatment สำหรับรักษา chronic myeloid leukemia (CML) ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ imatinib ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 2. ใช้เป็น second-line treatment สำหรับ Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukemia (Ph + ALL) ที่ไม่สามารถใช้ยา imatinib ได้ โดยใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัด โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
22. Rituximab sterile sol R2
เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับ non-Hodgkin lymphoma ชนิด diffused large b-cell lymphoma (DLBCL) ในเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

2. ใช้สำหรับ non-Hodgkin lymphoma ชนิด diffuse large B-cell lymphoma ในผู้ใหญ่ที่มีโรคกลับซ้ำ (relapsed DLBCL) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 3. ใช้สำหรับ non-Hodgkin lymphoma ชนิด advanced follicular lymphoma โดยใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดสูตร R-CHOP และ R-CVP โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 4. ใช้สำหรับ non-Hodgkin lymphoma ชนิด burkitt lymphoma (BL) ในเด็ก โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 5. ใช้สำหรับ non-Hodgkin lymphoma ชนิด burkitt lymphoma (BL) ในผู้ใหญ่ที่ไม่เคยได้รับการรักษาใดมาก่อน โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 6. ใช้สำหรับ non-Hodgkin lymphoma ชนิด small lymphocytic lymphoma/chronic lymphocytic leukemia ที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาและยังไม่ได้เคยได้รับการรักษาด้วย rituximab มาก่อน โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 7. ใช้สำหรับ non-Hodgkin lymphoma ชนิด mantle cell lymphoma ระยะที่ 3-4 ที่มีอาการจากโรค หรือระยะที่ 2 ที่มีก้อนขนาดใหญ่ ที่ไม่เคยได้รับการรักษาด้วย rituximab มาก่อน โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 8. ใช้สำหรับ non-Hodgkin lymphoma ชนิด lymphoplasmacytic lymphoma ระยะที่ 3-4 ที่มีอาการจากโรคและยังไม่ได้เคยได้รับการรักษาด้วย rituximab มาก่อน โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 9. ใช้สำหรับ non-Hodgkin lymphoma ชนิด marginal zone lymphoma ระยะที่ 3-4 ที่มีอาการจากโรคและยังไม่ได้เคยได้รับการรักษาด้วย rituximab มาก่อน โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
23. Thalidomide cap R2
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับผู้ป่วย multiple myeloma ที่เป็น transplant candidate โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
24. Trastuzumab sterile powdr R2
- (เฉพาะ 150 mg และ 440 mg)
- เงื่อนไข**
- ใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น (early stage breast cancer) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

8.2 Drugs affecting the immune response

1. Dexamethasone cap (as base) , tab (as base) , b
sterile sol (as sodium phosphate
or acetate)
2. Prednisolone cap, tab b
3. Methylprednisolone sterile powdr/sterile susp b
(as hemisuccinate or sodium
succinate or acetate)

4.	Azathioprine	tab	s
5.	Ciclosporin (Cyclosporin)	cap, oral sol, oral susp, sterile sol	s
6.	BCG (Bacillus Calmette-Guérin)	freeze-dried pwdr for bladder instillation	ex

เงื่อนไข

ใช้สำหรับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิด superficial bladder cancer

7.	Antithymocyte immunoglobulin, rabbit (ATG)	sterile pwdr, sterile sol	ex
----	--	---------------------------	----

เงื่อนไข

1. ใช้ในระยะ induction สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป ต่อการเกิด acute allograft rejection
2. ใช้รักษาระยะ induction ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด acute allograft rejection ใน solid organ transplantation ที่ไม่ใช้การปลูกถ่ายไต
3. ใช้รักษาภาวะ acute allograft rejection เฉพาะ solid organ transplantation ที่ไม่ตอบสนองต่อ pulse methylprednisolone หรือที่มีพยาธิสภาพรุนแรง
4. ใช้รักษาระยะ induction ในผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจที่ไม่สามารถใช้ basiliximab ได้ หรือ ผู้ป่วยปลูกถ่ายไต-หัวใจ (heart-kidney transplantation)

หมายเหตุ

จัดเป็น บัญชี R2 เมื่อใช้สำหรับ severe aplastic anemia ดูข้อ 9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias

8.	Basiliximab	sterile pwdr	ex
----	-------------	--------------	----

เงื่อนไข

1. ใช้รักษาระยะ induction ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตที่มีความเสี่ยงต่ำ (Low Risk: LR) ขึ้นไป
2. ใช้รักษาระยะ induction ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตที่มีปัญหาไตร่วมด้วย หรือมีความเสี่ยงของการเกิดปัญหาไต ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ป่วยที่มีภาวะ hepatorenal syndrome
 - 2.2 ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันก่อนผ่าตัด
 - 2.3 ผู้ป่วย CKD stage III ขึ้นไป หรือ CKD stage II with acute kidney injury
 - 2.4 ภาวะอื่น ๆ ได้แก่ massive blood loss (มากกว่า 1 blood volume), prolonged hypotension (หรือ shock มากกว่า 3 ชั่วโมง), fulminant /subfulminant hepatic failure , impending primary graft non-function (AST/ALT> 2,000 IU/L ภายใน 24 ชั่วโมงแรกของการผ่าตัด)
3. ใช้รักษาระยะ induction ในผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ ยกเว้นในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตหัวใจ (Heart-Kidney Transplantation)

9.	Everolimus	tab (เฉพาะ 0.25 mg และ 0.5 mg)	ex
----	------------	--------------------------------	----

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตระยะ maintenance therapy ร่วมกับยา tacrolimus เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา tacrolimus ในขนาดสูงและเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา mycophenolate mofetil ได้แก่ ปวดท้อง ท้องเสียเรื้อรัง (มากกว่า 2 สัปดาห์) ภาวะกดไขกระดูก
2. ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ ที่มีภาวะดังต่อไปนี้
 - 2.1 ภาวะ cardiac allograft vasculopathy ที่ยืนยันโดย coronary angiogram หรือ intravascular ultrasound (IVUS) และ/หรือ
 - 2.2 ภาวะไตวายที่มีค่า eGFR (CKD-EPI formula) น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m²

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายตับในระยะ maintenance therapy
2. กรณีผู้ป่วยไตมีเงื่อนไข คือ
 - 2.1 ใช้เป็น alternative drug ในกรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในระยะ maintenance therapy
 - 2.2 ใช้เป็น alternative drug ในกรณีผู้ป่วย severe lupus nephritis (class III-IV) ในกรณี ดังนี้
 - 2.2.1. ระยะ induction therapy* ในกรณีดังนี้
 - 2.2.1.1. กรณีที่ใช้ Intravenous cyclophosphamide (IVCY) อย่างน้อย 6 เดือนแล้วไม่ได้ผล และไม่สามารถทำให้เกิด remission** ได้ หรือ
 - 2.2.1.2. กรณีที่เคยได้รับ Intravenous cyclophosphamide (IVCY) ครบ 1 course แล้ว และมี active lupus nephritis ซ้ำอีก หรือ
 - 2.2.1.3. กรณีผู้ป่วยไม่สามารถรับ Intravenous cyclophosphamide (IVCY) ได้
 - 2.2.2. ในระยะ maintenance therapy ที่ใช้ Azathioprine ไม่ได้หรือใช้แล้วไม่ได้ผล
3. ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจในระยะ maintenance therapy
4. ใช้สำหรับผู้ป่วย Neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) ในกรณีดังนี้
 - 4.1 ใช้ยา prednisolone ร่วมกับยา azathioprine แล้วยังไม่สามารถป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคได้หลังจากได้ยาในปริมาณที่เหมาะสม prednisolone (10-20 mg/day) ร่วมกับ azathioprine (2-3 mg/kg/day) เป็นเวลา 6 เดือน
 - 4.2 ผู้ป่วยมีข้อห้ามใช้ยา prednisolone หรือ azathioprine เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 - 4.2.1. มีภาวะตับอักเสบที่มีค่าเอนไซม์ของตับ (AST และ ALT) เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าปกติ 5 เท่า
 - 4.2.2. มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 3,000 cells/ μ l หรือ มีปริมาณนิวโทรฟิลน้อยกว่า 1,000 cells/ μ l
 - 4.2.3. มีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่นแพ้ยาจากยา azathioprine หรือมีภาวะอื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้ยา prednisolone ได้ เช่น มีภาวะน้ำตาลสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือ ภาวะกระดูกพรุนอย่างรุนแรง หรือ ภาวะ avascular necrosis หรือ ภาวะต่อหีนจากยา หรือมีความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยได้
5. ใช้สำหรับรักษาภาวะ systemic sclerosis-associated interstitial lung disease (SSc-ILD) ที่ไม่ตอบสนองหลังได้รับยา cyclophosphamide ภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือมีข้อห้ามหรือไม่สามารถทนต่ออาการข้างเคียงจากการใช้ยา cyclophosphamide โดยมีการติดตามประเมินผลนาน 1 ปีหลังได้รับยา
6. ใช้สำหรับรักษาโรคปอดอินเตอร์สติเชียลจากโรคกล้ามเนื้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic inflammatory myositis-associated interstitial lung disease, IIM-ILD) ในกรณีดังนี้
 - 6.1 ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา corticosteroids และ ยากดภูมิพื้นฐานอีก 2 ชนิด ได้แก่ cyclophosphamide, azathioprine หรือ calcineurin inhibitors หรือ
 - 6.2 มีผลข้างเคียงหรือมีข้อห้ามของการรักษาด้วยยา corticosteroids และ ยากดภูมิพื้นฐาน
7. ใช้สำหรับผู้ป่วยโรค systemic lupus erythematosus (SLE) ผู้ใหญ่ที่มีอาการของโรคในระบบโลหิตวิทยา⁺ หรือผิวหนัง⁺⁺ โดยผู้ป่วยเข้าได้กับเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
 - 7.1 ไม่ตอบสนองต่อยามาตรฐานในขนาดแนะนำ⁺ อย่างน้อย 2 ชนิด โดยหนึ่งในนั้นเป็นยาด้านมาลาเรีย ได้แก่ ยา hydroxychloroquine หรือยา chloroquine เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 - 7.2 ไม่ตอบสนองต่อยามาตรฐานในขนาดแนะนำ⁺ อย่างน้อย 1 ชนิด เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อห้ามใช้ หรือมีอาการข้างเคียงจากยาด้านมาลาเรีย ได้แก่ ยา hydroxychloroquine หรือยา chloroquine

8. ใช้สำหรับผู้ป่วยโรค childhood-onset systemic lupus erythematosus (cSLE) ที่มีอาการของโรคในระบบโลหิตวิทยา[†] หรืออาการทางระบบประสาท⁺⁺⁺ ที่ไม่สามารถลดขนาดยา prednisolone หรือเทียบเท่า ได้ต่ำกว่า 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ภายใน 6 เดือน ในกรณี ดังนี้
 - 8.1 ในกรณีผู้ป่วยมีอาการของโรคในระบบโลหิตวิทยา และเข้าได้กับเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
 - 8.1.1. ไม่ตอบสนองต่อยามาตรฐานในขนาดแนะนำ⁺⁺ อย่างน้อย 2 ชนิด เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยหนึ่งในนั้นเป็นยาด้านมาลาเรีย ได้แก่ ยา hydroxychloroquine
 - 8.1.2. ไม่ตอบสนองต่อยามาตรฐานในขนาดแนะนำ⁺⁺ อย่างน้อย 1 ชนิด เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อห้ามใช้ หรือมีอาการข้างเคียงจากยาด้านมาลาเรีย ได้แก่ ยา hydroxychloroquine
 - 8.2 ในกรณีผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาท และเข้าได้กับเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
 - 8.2.1. ไม่สามารถให้ยามาตรฐานในขนาดแนะนำ เช่น cyclophosphamide เนื่องจากมีข้อห้ามใช้ หรือมีอาการข้างเคียงจากยาดังกล่าว
 - 8.2.2. ใช้ยามาตรฐานในช่วง maintenance แล้วไม่สามารถควบคุมอาการทางระบบประสาทได้ คือมีอาการกำเริบ

หมายเหตุ

1. *ระยะ induction therapy ควรทำ kidney biopsy เพื่อยืนยันการวินิจฉัย
2. **remission ของ severe lupus nephritis (class III-IV) หมายถึง การมีระดับ serum creatinine ลดลงและมีปริมาณโปรตีนในปัสสาวะน้อยกว่า 1 กรัมต่อวันร่วมกับไม่มีการกำเริบนอกไต
3. ผู้ป่วยไม่ตอบสนองหลังได้รับยา cyclophosphamide ต้องมีลักษณะทางคลินิกแย่งโดยไม่มีสาเหตุ/ภาวะอื่นร่วมกับการตรวจพบต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 - 3.1 FVC ลดลงจากเดิม $\geq 10\%$ (ที่ไม่ได้เกิดจาก severe myositis) หรือ
 - 3.2 FVC ลดลง 5-10% ร่วมกับ DLco ลดลง $> 15\%$ หรือ oxygen desaturation ลดลงจาก baseline $\geq 3\%$ หรือ HRCT มีลักษณะที่บ่งบอกว่ามีการอักเสบเพิ่มขึ้น
4. ผู้ป่วยมีข้อห้ามต่อการใช้ยา cyclophosphamide ดังนี้
 - 4.1 มีภาวะ hypersensitivity ต่อยา cyclophosphamide หรือ
 - 4.2 ผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร หรือ
 - 4.3 ผู้ป่วยมีการติดเชื้อรุนแรงหรือเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับการรักษา หรือ
 - 4.4 ผู้ป่วยมีการกีดขวางหรือการอุดตันของทางเดินปัสสาวะ (urinary outflow obstruction) หรือ
 - 4.5 ขนาดยา Cyclophosphamide ที่ได้รับสะสมมากกว่า 36 กรัม
5. ผู้ป่วยไม่สามารถทนต่ออาการข้างเคียงจากการใช้ยา cyclophosphamide ดังนี้
 - 5.1 ภาวะติดเชื้อรุนแรง (severe infection) หรือ
 - 5.2 คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง แม้ว่าจะได้รับยาลดอาการอาเจียนอย่างเต็มที่แล้ว หรือ
 - 5.3 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (bladder cancer) หรือ
 - 5.4 absolute neutrophil count $< 1500/\text{mm}^3$ หรือ
 - 5.5 severe hemorrhagic cystitis
6. [†]อาการระบบโลหิตวิทยา ได้แก่ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
 - 6.1 เกล็ดเลือดน้อยกว่า $50 \times 10^9/\text{ลิตร}$ หรือ
 - 6.2 hemoglobin น้อยกว่า 9.9 กรัม/เดซิลิตร ร่วมกับมีภาวะ hemolysis
7. ⁺⁺อาการระบบผิวหนัง ได้แก่ มีผื่นจากโรค SLE มากกว่าร้อยละ 9 ของผิวกาย
8. ⁺⁺⁺อาการทางระบบประสาท ได้แก่ seizure, psychosis, headache, cognitive dysfunction, neuropathy, acute confusional state

9. *ยามาตรฐานกรณีผู้ป่วยผู้ใหญ่ เช่น hydroxychloroquine, chloroquine, methotrexate, azathioprine, cyclosporin, cyclophosphamide โดยมีขนาดมาตรฐาน ดังตาราง

ยามาตรฐาน	ขนาดมาตรฐานกรณีผู้ป่วยผู้ใหญ่
hydroxychloroquine	ขนาดสูงสุดไม่เกิน 5 มก./กก./วัน
chloroquine	ขนาดสูงสุดไม่เกิน 2.3 มก./กก./วัน
methotrexate	0.3 มก./กก./สัปดาห์
azathioprine	2-5 มก./กก./วัน
cyclosporin	2-5 มก./กก./วัน
cyclophosphamide	ชนิดรับประทาน 1-2 มก./กก./วัน หรือ ชนิดหยดเข้าหลอดเลือดดำ 0.5-0.75 ต่อตารางเมตรผิวกาย

10. **ยามาตรฐานกรณีผู้ป่วยเด็ก เช่น hydroxychloroquine, methotrexate, azathioprine, cyclosporin, cyclophosphamide โดยมีขนาดมาตรฐาน ดังตาราง

ยามาตรฐาน	ขนาดมาตรฐานกรณีผู้ป่วยเด็ก
hydroxychloroquine	4-5 มก./กก./วัน
methotrexate	10 -25 มก./พื้นที่ผิว/สัปดาห์ หรือ 0.3-1 มก./กก./สัปดาห์ (ขนาดสูงสุด 25 มก./สัปดาห์)
azathioprine	2-3 มก./กก./วัน
cyclosporin	3 มก./กก./วัน
cyclophosphamide	500-1,000 มก./พื้นที่ผิว/เดือน (ขนาดสูงสุด 1,000 มิลลิกรัม)

11.

11. Sirolimus (Rapamycin) oral sol (เฉพาะ 1 mg/ml), ex
tab (เฉพาะ 1 mg)

เงื่อนไข

- ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในระยะ maintenance therapy ที่มีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - ต้องการหลีกเลี่ยงพิษต่อไต หรือผลข้างเคียงอื่น ๆ จากยา cyclosporin หรือ tacrolimus
 - ติดเชื้อ เช่น CMV (Cytomegalovirus) หรือ BKV (BK virus) ภายหลังจากการปลูกถ่ายไต
 - ตรวจพบ หรือมีความเสี่ยงสูง ในการเกิดมะเร็งภายหลังจากการปลูกถ่ายไต
- ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจที่มีภาวะไตวายที่มีค่า eGFR (CKD-EPI formula) ในช่วง 30-50 ml/min/1.73 m²
- ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายตับที่เคยได้รับยา sirolimus มาก่อนและไม่มีปัญหาการตอบสนองต่อยา

12. Tacrolimus cap, sterile sol (concentrate for ex
infusion)

เงื่อนไข

- ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในระยะ maintenance therapy ที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลาง (MR) ขึ้นไป
- ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายไต หลังเกิดภาวะ acute rejection โดยเลือกใช้เป็นตัวแรกเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลาง (MR) ขึ้นไป
- ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายตับในระยะ maintenance therapy

13. Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG) sterile pwdr, sterile sol R2
- เงื่อนไข**
1. ใช้สำหรับโรคควาซากิระยะเฉียบพลัน (acute phase of Kawasaki disease) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 2. ใช้สำหรับโรค Guillain-Barré syndrome ที่มีอาการรุนแรง โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 3. ใช้สำหรับโรค pemphigus vulgaris ที่มีอาการรุนแรง และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 4. ใช้สำหรับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ (primary immunodeficiency diseases) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 5. ใช้สำหรับโรค immune thrombocytopenia ชนิดรุนแรง โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 6. ใช้สำหรับ autoimmune hemolytic anemia (AIHA) ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามขั้นตอนของมาตรฐานการรักษาและมีอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 7. ใช้สำหรับ hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 8. ใช้สำหรับโรค multifocal motor neuropathy with conduction block โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 9. ใช้สำหรับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายระยะวิกฤต (myasthenia gravis, acute exacerbation หรือ myasthenic crisis) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 10. ใช้สำหรับโรค chronic Inflammatory Demyelinating polyneuropathy (CIDP) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 11. ใช้สำหรับโรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ (autoimmune encephalitis) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 12. ใช้สำหรับโรค autoimmune myositis ชนิด necrotizing autoimmune myopathy (NAM) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 13. ใช้เป็น second-line treatment สำหรับ dermatomyositis โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

14. Rituximab sterile sol R2
- เงื่อนไข**
1. ใช้สำหรับโรค idiopathic nephrotic syndrome (INS) ในผู้ป่วยเด็ก โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 2. ใช้สำหรับโรค focal segmental glomerulosclerosis, primary minimal change disease และ IgM nephropathy กรณีโรคไม่ตอบสนองหรือโรคกำเริบป่วยหลังการรักษามาตรฐาน โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 3. ใช้สำหรับโรคหลอดเลือดอักเสบแอนติบอดี (Antineutrophil Cytoplasmic Antibody (ANCA)-associated vasculitis) หรือ AAV โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

4. ใช้สำหรับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีอาการกำเริบที่ไม่ใช่ได้อีกเสบจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
มาตรฐาน (refractory severe non-renal manifestations of SLE) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตาม
รายละเอียดในภาคผนวก 3
 5. ใช้สำหรับกลุ่มโรคนิวโรไมยอิตัสออพติกา (neuromyelitis optica spectrum disorder; NMOSD)
ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา prednisolone + azathioprine หรือมีข้อห้ามในการใช้ยา prednisolone
หรือ azathioprine โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 6. ใช้สำหรับโรคกล้ามเนื้อสเคลอโรสิซชนิดที่มีอาการกำเริบเป็นซ้ำ (relapsing remitting multiple sclerosis; RRMS)
โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 7. ใช้สำหรับโรคกล้ามเนื้อเกร็งที่รุนแรงและไม่ตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ (severe myasthenia gravis) โดย
มีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 8. ใช้สำหรับโรคเส้นประสาทอักเสบเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ (refractory chronic inflammatory
demyelinating polyneuropathy) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 9. ใช้สำหรับโรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ (autoimmune encephalitis) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยา
เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 10. ใช้สำหรับโรค autoimmune myositis ชนิด necrotizing autoimmune myopathy (NAM) โดยมีแนวทาง
กำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 11. ใช้เป็น second-line treatment สำหรับ dermatomyositis โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตาม
รายละเอียดในภาคผนวก 3
15. Lenalidomide cap R2
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับผู้ป่วย myelodysplastic syndrome (MDS) เฉพาะชนิด 5q- syndrome โดยมีแนวทางกำกับการ
ใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease

8.3.1 Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors

1. Tamoxifen citrate tab b
 2. Anastrozole tab (เฉพาะ 1 mg) ex
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับมะเร็งเต้านมที่มี hormone receptor เป็นบวก
3. Letrozole tab (เฉพาะ 2.5 mg) ex
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับมะเร็งเต้านมที่มี hormone receptor เป็นบวก
4. Megestrol acetate tab ex
- เงื่อนไข**
1. ใช้สำหรับ advanced breast cancer ที่มีผลการตรวจ hormone receptor เป็นบวก
 2. ใช้สำหรับ advanced endometrial cancer (endometrioid) โดยให้ยาจนกระทั่งมีการกำเริบของโรค
 3. ใช้สำหรับ early stage endometrial cancer ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี ที่เป็น well-differentiated
endometrioid ซึ่งผลการตรวจ MRI ไม่พบ myometrial invasion และให้ยาไม่เกิน 1 ปี
 4. ใช้สำหรับ low grade endometrial stromal sarcoma (ESS) และให้ยาไม่เกิน 1 ปี

8.3.2 Prostate cancer

1. Bicalutamide tab (เฉพาะ 50 mg) ex
เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย โดยใช้เป็นยาทางเลือกลำดับที่สองต่อการผ่าตัดอัณฑะออกทั้งสองข้าง (bilateral orchiectomy)
 2. ใช้ร่วมกับ GnRH analogue ในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยหรือรักษามาก่อนที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน เช่น มีความเสี่ยงสูงมากต่อ pathological fracture, มี malignant spinal cord compression, หรือมีความผิดปกติทางโลหิตวิทยาที่สงสัยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย (Disseminated intravascular clotting, DIC) โดยพิจารณาให้ยา bicalutamide เป็นเวลา 30 วัน ในระหว่างการรอตรวจชิ้นเนื้อเพื่อยืนยัน

2. Ketoconazole tab ex
เงื่อนไข

ใช้สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากชนิด castration resistance

หมายเหตุ

สำหรับ Cushing's syndrome ที่รอการผ่าตัด หรือไม่ตอบสนองต่อการผ่าตัด และ/หรือ การฉายแสง และสำหรับรักษาภาวะ overproduction ของ androgen ในกรณี testotoxicosis ดูข้อ 6.7.3 Drugs used in endogenous glucocorticoid and androgen overproduction

3. Leuporelin acetate sterile powdr (เฉพาะ 11.25 และ 22.5 mg) ex
เงื่อนไข
 1. ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยงปานกลาง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (2 cycles)
 2. ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (8 cycles)
 3. ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยหรือรักษามาก่อนที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนโดยใช้ร่วมกับยาในกลุ่ม antiandrogens (bicalutamide) เช่น มีความเสี่ยงสูงมากต่อ pathological fracture, มี malignant spinal cord compression, หรือมีความผิดปกติทางโลหิตวิทยาที่สงสัยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย (DIC) โดยพิจารณาให้ยา GnRH analogue เพียง 1 ครั้ง ในระหว่างการรอตรวจชิ้นเนื้อเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ

1. กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลาง (Intermediate risk of recurrence) คือ ผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT2b ถึง cT2c ตาม TNM staging system หรือมีค่า Gleason score เท่ากับ 7 หรือมีค่า serum PSA เท่ากับ 10-20 ng/ml อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (High risk of recurrence) คือ ผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT3a ตาม TNM staging system หรือมีค่า Gleason score เท่ากับ 8-10 หรือมีค่า serum PSA มากกว่า 20 ng/ml อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงสูงมาก (Very High risk of recurrence) คือผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT3b ถึง cT4
3. ยาฉีด leuporelin acetate ขนาด 11.25 mg และ 22.5 mg ที่ต่อรองได้เข็มละไม่เกิน 7,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ 24 มีนาคม 2567

4. Triptorelin pamoate sterile powdr (เฉพาะ 11.25 mg) ex
เงื่อนไข
1. ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยงปานกลาง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (2 cycles)
 2. ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (8 cycles)
 3. ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยหรือรักษามาก่อนที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนโดยใช้ร่วมกับยาในกลุ่ม antiandrogens (bicalutamide) เช่น มีความเสี่ยงสูงมากต่อ pathological fracture, มี malignant spinal cord compression, หรือมีความผิดปกติทางโลหิตวิทยาที่สงสัยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย (DIC) โดยพิจารณาให้ยา GnRH analogue เพียง 1 ครั้งในระหว่างการรอตรวจชิ้นเนื้อเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ

1. กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลาง (Intermediate risk of recurrence) คือ ผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT2b ถึง cT2c ตาม TNM staging system หรือมีค่า Gleason score เท่ากับ 7 หรือมีค่า serum PSA เท่ากับ 10-20 ng/ml อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (High risk of recurrence) คือ ผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT3a ตาม TNM staging system หรือมีค่า Gleason score เท่ากับ 8-10 หรือมีค่า serum PSA มากกว่า 20 ng/ml อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงสูงมาก (Very High risk of recurrence) คือผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT3b ถึง cT4
3. ยาฉีด triptorelin pamoate ขนาด 11.25 mg ที่ต่อรองได้ไวแอสละไม่เกิน 7,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ 24 มีนาคม 2567

กลุ่มยา 9 Nutrition and blood

9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders

9.1.1 Whole blood and blood products

- | | |
|--|---|
| 1. Fresh dried plasma | b |
| 2. Fresh frozen plasma | b |
| 3. Frozen cryoprecipitate | b |
| 4. Leukocyte depleted platelets concentrate | b |
| 5. Leukocyte depleted platelets concentrate, single donor | b |
| 6. Leukocyte depleted pooled platelets concentrate,
random donor (LD-PPC) | b |
| 7. Lyophilized cryoprecipitate | b |
| 8. Packed red cell | b |
| 9. Packed red cell, leukocyte depleted | b |
| 10. Packed red cell, leukocyte depleted single donor 2 units | b |
| 11. Packed red cell, leukocyte poor | b |
| 12. Packed red cell, leukocyte poor, irradiated | b |

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 13. | Platelets concentrate, random donor | b |
| 14. | Platelets concentrate, single donor | b |
| 15. | Platelets concentrate, irradiated | b |
| 16. | Whole blood | b |
| 17. | Packed red cell, irradiated | s |

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

- | | | |
|-----|--|----|
| 18. | Packed red cell, leukocyte depleted irradiated | ex |
|-----|--|----|

9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias

- | | | | |
|----|--|-----------------------------|---|
| 1. | Folic acid | tab (เฉพาะไม่น้อยกว่า 5 mg) | b |
| 2. | Deferiprone | tab (เฉพาะ 500 mg) | b |
| 3. | Oxymetholone | tab | b |
| 4. | Deferoxamine mesilate (Desferrioxamine mesilate) | sterile pwdr | s |

หมายเหตุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มยา 16

- | | | | |
|----|--------------|-------------|---|
| 5. | Iron sucrose | sterile sol | s |
|----|--------------|-------------|---|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับรักษา iron deficiency anemia ในผู้ป่วย chronic kidney disease ที่ไม่ตอบสนองต่อ iron supplement ชนิดรับประทาน

- | | | | |
|----|------------------------------|--|----|
| 6. | Epoetin alfa (epoetin alpha) | sterile pwdr/sterile sol (เฉพาะ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 IU) | ex |
|----|------------------------------|--|----|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษาได้

- | | | | |
|----|--------------|---|----|
| 7. | Epoetin beta | sterile sol (เฉพาะ 2000, 3000, 5000 IU) | ex |
|----|--------------|---|----|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษา

- | | | | |
|----|--|---------------------------|----|
| 8. | Antithymocyte immunoglobulin, rabbit (ATG) | sterile pwdr, sterile sol | R2 |
|----|--|---------------------------|----|

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ severe aplastic anemia โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

หมายเหตุ

จัดเป็นบัญชี ex เมื่อใช้กรณีปลูกถ่ายอวัยวะ ดูข้อ 8.2 Drugs affecting the immune response

- | | | | |
|----|-------------|--------------------|----|
| 9. | Deferasirox | tab (เฉพาะ 250 mg) | R2 |
|----|-------------|--------------------|----|

เงื่อนไข

- Transfusion Dependent Thalassemia ใช้เป็นยารักษาลำดับแรกในผู้ป่วยอายุ 2-6 ปี โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
- ใช้เป็นยารักษาลำดับที่ 2 ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไปที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือมีผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการรักษาด้วยยา deferiprone โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation

1. Filgrastim sterile sol ex
เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด เพื่อเคลื่อนย้าย progenitor cell จากไขกระดูกออกมาในเลือดของผู้ให้หรือผู้ป่วย เพื่อนำไปใช้ทั้งใน allogeneic และ autologous transplantation
 2. ใช้รักษา febrile neutropenia ที่เกิดจากยาเคมีบำบัด ให้พิจารณาในผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร่วมกับการให้ยาต้านเชื้อจุลชีพในผู้ป่วยความเสี่ยงสูง กล่าวคือมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 - 2.1 Profound neutropenia ซึ่งมี absolute neutrophil count น้อยกว่า $100 /\text{mm}^3$
 - 2.2 มีปอดอักเสบชนิด bacterial pneumonia หรือ lobar pneumonia หรือ มีภาวะ septicemia
 3. ใช้ป้องกัน febrile neutropenia แบบปฐมภูมิ (primary prophylaxis) ในกรณีดังต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้ป่วยที่จะได้รับยาเคมีบำบัดด้วยสูตรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด febrile neutropenia มากกว่าร้อยละ 20
 - 3.2 ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด febrile neutropenia ร้อยละ 10 - 20 ร่วมกับการประเมินปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วย กล่าวคือ มีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 - อายุมากกว่า 65 ปี
 - มี performance status ที่ไม่ดี (Eastern Co-operative Oncology Group (ECOG) performance status มากกว่าหรือเท่ากับ 2)
 - มีภาวะ neutropenia (absolute neutrophil count $\leq 1,500/\text{mm}^3$) หรือมีโรคแทรกซ้อนในไขกระดูกที่เกิดจากโรคมะเร็งดังกล่าว
 4. ใช้ป้องกัน febrile neutropenia แบบทุติยภูมิ (Secondary prophylaxis) ในผู้ป่วยที่เคยเกิด febrile neutropenia จากการรับยาเคมีบำบัดในครั้งก่อน และเป็นผู้ป่วยที่มีเป้าหมายการรักษาเพื่อหายขาด (curative aim)

หมายเหตุ

1. ไม่แนะนำให้ใช้ยาในกลุ่ม Granulocyte-Colony Stimulating Factors (G-CSF) ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับเคมีบำบัดโดยไม่ได้หวังผลการรักษาเพื่อหายขาด สำหรับ palliative chemotherapy แนะนำให้ลดขนาดยาเคมีบำบัดลงตามมาตรฐาน
2. Febrile neutropenia หมายถึง ภาวะที่ผู้ป่วยมีไข้ร่วมกับนิวโทรฟิลในเลือดต่ำ โดย
ไข้ คือ 1) ภาวะที่อุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยซึ่งวัดทางปาก ณ เวลาใด ๆ มากกว่าหรือเท่ากับ 38.3°C หรือ
2) ภาวะที่อุณหภูมิร่างกายซึ่งวัดทางปากมากกว่าหรือเท่ากับ 38.0°C นานติดต่อกันเกิน 1 ชั่วโมง
นิวโทรฟิลในเลือดต่ำ คือ 1) จำนวนนิวโทรฟิลในเลือด (absolute neutrophil count) น้อยกว่า $0.5 \times 10^9/\text{L}$ หรือ
2) จำนวนนิวโทรฟิลในเลือดน้อยกว่า $1.0 \times 10^9/\text{L}$ ซึ่งคาดว่าจะลดลงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ $0.5 \times 10^9/\text{L}$ ภายใน 48 ชั่วโมง

9.2 Fluids and electrolytes

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Calcium polystyrene sulfonate | oral pwdr | b |
| 2. Glucose with/without sodium chloride | sterile sol | b |
| 3. Intermittent peritoneal dialysis | sterile sol | b |
| 4. Potassium acetate | sterile sol (hosp) | b |
| 5. Potassium chloride | syr, syr (hosp), elixir, elixir (hosp),
compressed tab, EC tab, sterile sol | b |

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ควรรับประทานยา potassium chloride หลังอาหารทันที ในกรณียาเม็ดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 180 มิลลิลิตร และห้ามเอนตัวนอนลงอย่างน้อย 30 นาทีหลังรับประทานยาเม็ด
 2. ห้ามใช้ยา potassium chloride ชนิด elixir กับผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ เนื่องจากมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
- | | | |
|---|--|----|
| 6. Potassium citrate | oral sol (hosp), dry powdr for oral sol (hosp) | b |
| 7. Sodium acetate | sterile sol (hosp) | b |
| 8. Sodium bicarbonate | tab, sterile sol | b |
| 9. Sodium chloride | tab (เฉพาะ 300 mg), sterile sol | b |
| 10. Water for injection | sterile sol | b |
| 11. Calcium chloride + Potassium chloride + Sodium chloride + Sodium acetate (Ringer's acetate) | sterile sol | b |
| 12. Continuous ambulatory peritoneal dialysis | basic bag sol, double bag sol | s |
| 13. Human albumin | sterile sol (เฉพาะ 20% albumin solution) (50 mL) | ex |

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยโรคตับแข็งที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะ Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP) โดยใช้ในวันที่ 1 และ 3 ของการวินิจฉัยโรค

หมายเหตุ

ให้อัลบูมินทดแทนทางหลอดเลือดขนาด 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัวของผู้ป่วยในวันแรก ตามด้วยขนาด 1 กรัมต่อน้ำหนักตัวของผู้ป่วยในวันที่ 3 โดยควรเลือกพิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด hepatorenal syndrome ได้แก่ มีระดับ bilirubin >4 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือ serum creatinine > 1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือ BUN >30 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ข้อใดข้อหนึ่ง

- | | | |
|---|--|----|
| 14. Hydroxyethyl starch (HES) with electrolytes | balanced salt sterile sol (เฉพาะ Hydroxyethyl starch (HES) 6%) | ex |
|---|--|----|

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ขาดสารน้ำหรือมีการสูญเสียเลือดปริมาณมาก โดยที่ไม่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดและไม่มีประวัติเป็นโรคไตวายมาก่อน เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือการผ่าตัด
2. ขนาดที่ใช้ 30 mL/kg/วัน และทั้งนี้ขนาดสูงสุดไม่เกิน 1,000 mL/วัน

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยกรณีต่าง ๆ ดังนี้
 - 1.1. ผู้ป่วยมีภาวะ bleeding disorder
 - 1.2. ผู้ป่วยมีการติดเชื้อในกระแสเลือด
 - 1.3. ผู้ป่วยมีประวัติเป็นโรคไตวายมาก่อน
2. ห้ามใช้รูปแบบที่มีมันฝรั่งเป็นวัตถุดิบ ในผู้ป่วย severe hepatic impairment
3. ห้ามใช้รูปแบบ unbalanced salt เนื่องจากอาจทำให้เกิด hyperchloremic acidosis ได้

หมายเหตุ

รูปแบบ balanced salt หมายความว่า ยามีปริมาณของ Na^+ ใกล้เคียงกับปริมาณของ Na^+ ในเลือด (plasma) (โดยปกติปริมาณ Na^+ อยู่ระหว่าง 130-145 mmol/L)

9.3 Vitamins

Multivitamins ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีวิตามินเป็นส่วนประกอบเท่านั้น การผสมแร่ธาตุ (mineral) หรือตัวยาลำคัญอื่น ๆ ไม่ถือเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

1. Folic acid cap/tab b
(เฉพาะ 400-1,000 mcg และ 5 mg)

2. Multivitamins drop b

มีวิตามินอย่างน้อย 8 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

- Vitamin A	250 - 600 mcg (832.5 - 1,998 IU)	- Vitamin B ₆	≥ 0.3 mg
- Vitamin D	10 - 37.5 mcg (400 - 1,500 IU)	- Vitamin B ₁₂	≥ 0.5 mcg
- Vitamin B ₁	≥ 0.3 mg	- Niacinamide	≥ 4 mg
- Vitamin B ₂	≥ 0.4 mg	- Vitamin C	≥ 50 mg

หมายเหตุ

1. มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในทารกอายุ 6 - 11 เดือน
2. ปริมาณที่กำหนดนี้เป็นการกำหนดปริมาณยาต่อวัน โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วย (ซีซี) ที่รับประทานต่อครั้ง

3. Multivitamins syr b

มีวิตามินอย่างน้อย 8 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

- Vitamin A	300 - 800 mcg (999 - 2,664 IU)	- Vitamin B ₆	≥ 0.6 mg
- Vitamin D	15 - 62.5 mcg (600 - 2,500 IU)	- Vitamin B ₁₂	≥ 1.2 mcg
- Vitamin B ₁	≥ 0.6 mg	- Niacinamide	≥ 8 - 10 mg
- Vitamin B ₂	≥ 0.6 mg	- Vitamin C	≥ 40 mg

หมายเหตุ

1. มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 1 - 8 ปี
2. ปริมาณที่กำหนดนี้เป็นการกำหนดปริมาณยาต่อวัน โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วย (ซองชา) ที่รับประทานต่อครั้ง

4. Multivitamins dry syr b

มีวิตามินอย่างน้อย 9 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

- Vitamin A	300 - 800 mcg (999 - 2,664 IU)	- Vitamin B ₁₂	≥ 1.2 mcg
- Vitamin D	15 - 62.5 mcg (600 - 2,500 IU)	- Niacinamide	8 - 10 mg
- Vitamin B ₁	≥ 0.6 mg	- folic acid	180 - 300 mcg
- Vitamin B ₂	≥ 0.6 mg	- Vitamin C	≥ 40 mg
- Vitamin B ₆	≥ 0.6 mg		

หมายเหตุ

1. มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 1 - 8 ปี
2. ปริมาณที่กำหนดนี้เป็นการกำหนดปริมาณยาต่อวัน โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วย (ซองชา) ที่รับประทานต่อครั้ง

5. Multivitamins cap, tab b

มีวิตามินอย่างน้อย 9 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

- Vitamin A	550 - 1,500 mcg (1,831.5 - 4,995 IU)	- Vitamin B ₁₂	≥ 2.4 mcg
- Vitamin D	15 - 100 mcg (600 - 4,000 IU)	- Niacinamide	16 - 20 mg
- Vitamin B ₁	≥ 1.2 mg	- Folic acid	300 - 600 mcg
- Vitamin B ₂	≥ 1.3 mg	- Vitamin C	≥ 100 mg
- Vitamin B ₆	≥ 1.7 mg		

หมายเหตุ

1. มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 9 - 12 ปี และผู้ใหญ่
2. ปริมาณที่กำหนดนี้เป็นการกำหนดปริมาณยาต่อวัน โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วย (เม็ด) ที่รับประทานต่อครั้ง

6.	Vitamin A	cap/tab (เฉพาะ 25,000-50,000 IU ต่อ 1 cap/tab)	b
7.	Vitamin B ₁ (Thiamine as hydrochloride or mononitrate)	tab (เฉพาะ 10-100 mg), sterile sol (เฉพาะ 100 mg/ml)	b
8.	Vitamin B ₂	tab (เฉพาะไม่ต่ำกว่า 10 mg)	b
9.	Vitamin B ₆ (Pyridoxine hydrochloride)	tab (เฉพาะ 10-100 mg), sterile sol (เฉพาะ 100 mg/ml)	b

คำเตือนและข้อควรระวัง

การรับประทานวิตามิน B₆ ขนาดตั้งแต่ 200 มิลลิกรัมต่อวัน ขึ้นไปเป็นเวลานาน มีความสัมพันธ์กับการเกิด neuropathy ได้

10.	Vitamin B ₁₂ (Cyanocobalamin หรือ Hydroxocobalamin)	tab (เฉพาะไม่ต่ำกว่า 100 mcg), sterile sol (เฉพาะ 1000 mcg/ml)	b
11.	Vitamin B complex มีวิตามินอย่างน้อย 8 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้	cap, tab	b
	- Vitamin B ₁ ≥ 1.2 mg	- Folic acid 300 - 600 mcg	
	- Vitamin B ₂ ≥ 1.3 mg	- Niacinamide 16 - 20 mg	
	- Vitamin B ₆ ≥ 1.7 mg	- Pantothenic acid ≥ 5 mg	
	- Vitamin B ₁₂ ≥ 2.4 mcg	- Biotin ≥ 30 mcg	

หมายเหตุ

- มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 9 - 12 ปี และผู้ใหญ่
- ปริมาณที่กำหนดนี้เป็นการกำหนดปริมาณยาต่อวัน โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วย (เม็ด) ที่รับประทานต่อครั้ง

12.	Vitamin B complex	sterile sol	b
	ประกอบด้วยวิตามินอย่างน้อย 4 ชนิด ที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้		
	- Vitamin B ₁ ≥ 1.2 mg	- Vitamin B ₆ ≥ 1.7 mg	
	- Vitamin B ₂ ≥ 1.3 mg	- Niacinamide 16 - 20 mg	

หมายเหตุ

มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 9 - 12 ปี และผู้ใหญ่

13.	Vitamin C	tab (เฉพาะ 50 และ 100 mg)	b
14.	Vitamin C	sterile sol	b
15.	Vitamin K1 (Phytomenadione)	sterile sol	b
16.	Vitamin E	syr, emulsion (hosp)	b

เงื่อนไข

- ใช้กับทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยหรือเกิดก่อนกำหนดเท่านั้น
- ใช้ป้องกันและรักษาภาวะขาดวิตามินอีในทารก และเด็กที่มีปัญหาการย่อยไขมันและ/หรือการดูดซึมไขมันบกพร่อง

หมายเหตุ

รูปแบบ syrup เป็นตำรับ water miscible vitamin E

17.	Vitamin E	cap	ex
-----	-----------	-----	----

เงื่อนไข

- ใช้กับทารกและเด็กที่มีโรคตับชนิดน้ำดีคั่ง (chronic cholestasis)
- ใช้ป้องกันและรักษาภาวะขาดวิตามินอีในเด็ก และเด็กที่มีปัญหาการย่อยไขมัน และ/หรือการดูดซึมไขมันบกพร่อง
- ส่งจ่ายยาโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการ หรือกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ หรือกุมารศัลยแพทย์เท่านั้น

18. Vitamin D₂ (Ergocalciferol) cap b
เงื่อนไข
 เป็น first-line drug ในผู้ป่วยที่มีภาวะขาดวิตามินดี
19. Vitamin D₃ (Cholecalciferol) oral sol b
เงื่อนไข
 1. ใช้ป้องกันและรักษาภาวะการขาดวิตามินดีในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด ผู้ป่วยภาวะน้ำตาลคั่ง และผู้ป่วยที่มีปัญหา
 ระบบทางเดินอาหารที่มีผลต่อการดูดซึมวิตามินดี
 2. ใช้รักษาภาวะการขาดวิตามินดีในทารกและเด็กเล็ก
20. Vitamin D₃ (Cholecalciferol) tab ex
เงื่อนไข
 ใช้รักษาภาวะการขาดวิตามินดีในผู้ป่วย ภาวะน้ำตาลคั่ง และผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารที่มีผลต่อการดูด
 ซึมวิตามินดี ที่ได้รับ vitamin D₂ แล้วไม่ได้ผล
21. Alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D₃) cap b
เงื่อนไข
 1. ใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 (chronic kidney disease stage 4) ที่มีภาวะ secondary hyperparathyroidism
 2. ใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 (chronic kidney disease stage 5 หรือ end-stage renal disease) ที่มี
 ภาวะ secondary hyperparathyroidism
ข้อควรระวัง
 ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ที่มีระดับ serum calcium เกิน 10.5 mg/dL หรือ serum phosphate
 เกิน 5.5 mg/dL
หมายเหตุ
 ยา alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D₃) รูปแบบ cap มีราคาที่ต้องรองได้ไม่เกิน 5 บาทต่อปริมาณยา
 1 mcg (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้
22. Calcitriol (1,25-Dihydroxyvitamin D₃) cap b
เงื่อนไข
 1. ใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 (chronic kidney disease stage 4) ที่มีภาวะ secondary hyperparathyroidism
 2. ใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 (chronic kidney disease stage 5 หรือ end-stage renal disease) ที่มี
 ภาวะ secondary hyperparathyroidism
ข้อควรระวัง
 ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ที่มีระดับ serum calcium เกิน 10.5 mg/dL หรือ serum phosphate
 เกิน 5.5 mg/dL
หมายเหตุ
 ยา calcitriol (1,25-Dihydroxyvitamin D₃) รูปแบบ cap มีราคาที่ต้องรองได้ไม่เกิน 5 บาทต่อปริมาณยา
 1 mcg (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้
23. Alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D₃) cap s
เงื่อนไข
 1. ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะขาดฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (primary hypoparathyroidism)
 2. ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ (ชนิดเฉียบพลันรุนแรง)

หมายเหตุ

ยา alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D₃) รูปแบบ cap มีราคาที่ต้องรองได้ไม่เกิน 5 บาทต่อปริมาณยา 1 mcg (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้

24. Calcitriol (1,25-Dihydroxyvitamin D₃) cap s

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะขาดฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (primary hypoparathyroidism)
2. ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ (ชนิดเฉียบพลันรุนแรง)

หมายเหตุ

ยา calcitriol (1,25-Dihydroxyvitamin D₃) รูปแบบ cap มีราคาที่ต้องรองได้ไม่เกิน 5 บาทต่อปริมาณยา 1 mcg (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้

25. Alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D₃) cap ex

เงื่อนไข

1. ใช้ในผู้ป่วย hypophosphatemic rickets/osteomalacia
2. ใช้ในผู้ป่วย pseudohypoparathyroidism
3. ใช้ในผู้ป่วย vitamin D-dependent rickets (VDDR) type I หรือ type II

หมายเหตุ

ยา alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D₃) รูปแบบ cap มีราคาที่ต้องรองได้ไม่เกิน 5 บาทต่อปริมาณยา 1 mcg (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้

26. Calcitriol (1,25-Dihydroxyvitamin D₃) cap ex

เงื่อนไข

1. ใช้ในผู้ป่วย hypophosphatemic rickets/osteomalacia
2. ใช้ในผู้ป่วย pseudohypoparathyroidism
3. ใช้ในผู้ป่วย vitamin D-dependent rickets (VDDR) type I หรือ type II

หมายเหตุ

ยา calcitriol (1,25-Dihydroxyvitamin D₃) รูปแบบ cap มีราคาที่ต้องรองได้ไม่เกิน 5 บาทต่อปริมาณยา 1 mcg (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้

9.4 Intravenous nutrition

การให้อาหารทางหลอดเลือดดำมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

1. Amino acid solution for infants sterile sol b
มีกรดอะมิโนจำเป็นทั้ง 9 ชนิด คือ isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine, histidine และอย่างน้อยต้องมี arginine, cysteine, tyrosine และ taurine โดยต้องไม่มี sugar alcohol ในสูตร
2. Amino acid solution ชนิด high branched chain sterile sol b
amino acid
มีสัดส่วนของ branched chain amino acid 35-45% ของ total amino acid
3. Amino acid solution ชนิด high essential amino acid sterile sol b
มีสัดส่วนของ essential amino acids > 60% ของ total amino acids

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 4. | Amino acid solution with/without minerals | sterile sol | b |
| 5. | Complete water-soluble and fat-soluble vitamin preparation | preparation for intravenous use (sterile powdr, sterile sol, sterile emulsion) | b |

Complete water-soluble and fat-soluble vitamin preparation ที่ได้จากการผสมตำรับที่มี fat-soluble vitamins 4 ชนิด คือ A, D, E, K กับ ตำรับที่มี water soluble vitamins 9 ชนิด คือ B₁, B₂, B₆, B₁₂, niacinamide, folic acid, pantothenic acid, biotin และ vitamin C

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ (parenteral nutrition) และต้องการทั้ง water-soluble และ fat-soluble vitamins

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 6. | Complete water-soluble vitamin preparation | preparation for intravenous use (sterile powdr) | b |
|----|--|---|---|

ที่ประกอบด้วย water soluble vitamins 9 ชนิด คือ B₁, B₂, B₆, B₁₂, niacinamide, folic acid, pantothenic acid, biotin และ vitamin C

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ (parenteral nutrition) และต้องการเฉพาะ water soluble vitamins หรือมีข้อห้ามใช้สำหรับ fat-soluble vitamins

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 7. | Complete fat-soluble vitamin preparation | preparation for intravenous use (sterile powdr, sterile sol, sterile emulsion) | b |
|----|--|--|---|

ที่ประกอบด้วย fat-soluble vitamins 4 ชนิด คือ A, D, E และ K

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ (parenteral nutrition) และต้องการเฉพาะ fat-soluble vitamins หรือมีข้อห้ามใช้สำหรับ water-soluble vitamins

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 8. | Multivitamin injection without vitamin K | preparation for intravenous use (sterile sol, sterile powdr) | b |
|----|--|--|---|

ที่ประกอบด้วย fat-soluble vitamins 3 ชนิด คือ A, D และ E กับ water soluble vitamins 9 ชนิด คือ B₁, B₂, B₆, B₁₂, niacinamide, folic acid, pantothenic acid, biotin และ vitamin C

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ (parenteral nutrition)

- | | | | |
|----|--|-------------|---|
| 9. | Dextrose solution with minerals and electrolytes | sterile sol | b |
|----|--|-------------|---|

มี dextrose ไม่น้อยกว่า 20% และมี minerals อย่างน้อย 2 ชนิด

เงื่อนไข

ยานี้มีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงจึงห้ามให้ทาง peripheral vein ต้องให้ทาง central vein เท่านั้น

- | | | | |
|-----|---------------------------------|------------------------------|---|
| 10. | Fat emulsion | sterile emulsion (เฉพาะ 20%) | b |
| 11. | Multiple trace mineral solution | sterile sol | b |

Fat emulsion ประกอบด้วย long chain triglycerides ซึ่งมีหรือไม่มี medium chain triglycerides (MCT)

อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Zn, Cu และ I

12. Two-in-one parenteral nutrition
ประกอบด้วย glucose และ amino acids

sterile sol

b

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับ parenteral nutrition ที่ไม่จำเป็นต้องได้รับ intravenous lipid emulsion

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในเด็ก
2. ควรระวังในผู้ป่วยโรคไต โรคตับ หรือโรคหัวใจล้มเหลว หรือมีภาวะอื่นซึ่งเสี่ยงต่อภาวะ fluid overload และ/หรือ มีปัญหาความสมดุลของ minerals และ/หรือ electrolytes และ/หรือผู้ป่วยโรคไต ที่ยังไม่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (renal replacement therapy) เนื่องจาก สมดุลของ non protein energy ต่อ gram of nitrogen ไม่เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย
3. ผลิตภัณฑ์ two-in-one parenteral nutrition อาจมี vitamins, trace minerals และ electrolytes บางชนิด ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น ควรให้สารอาหารเหล่านี้ด้วยวิธีการอื่นตามสถานะของผู้ป่วยให้เพียงพอ และเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
4. การให้อาหารทางหลอดเลือดดำมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการเกิดหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ (thrombophlebitis)

13. Three-in-one parenteral nutrition
ประกอบด้วย glucose, amino acid และ fat emulsion

sterile sol

b

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปที่มีภาวะทุพโภชนาการ หรือมีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับ

1. มีข้อห้ามหรือไม่สามารถรับอาหารทางระบบทางเดินอาหาร หรือ
2. สามารถรับอาหารทางระบบทางเดินอาหารได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ควรระวังในผู้ป่วยโรคไต โรคตับ หรือโรคหัวใจล้มเหลว หรือมีภาวะอื่นซึ่งเสี่ยงต่อภาวะ fluid overload และ/หรือ มีปัญหาความสมดุลของ minerals และ/หรือ electrolytes
2. ควรพิจารณาปริมาณพลังงานและสารอาหารหลักให้เหมาะสมกับสถานะและความต้องการตามอายุของผู้ป่วยแต่ละราย
3. ผลิตภัณฑ์ three in one parenteral nutrition ไม่มี multivitamins และ trace minerals และอาจมี electrolytes และ minerals เช่น โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม ไม่เพียงพอ ดังนั้นควรให้สารอาหารเหล่านี้ให้เพียงพอ ตามคำแนะนำการใช้ของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
4. การให้อาหารทางหลอดเลือดดำควรให้ผ่านทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง ในบางกรณีสามารถเลือกให้ผ่านทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนปลาย เช่น กรณีใช้ในระยะสั้น โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการให้ทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องไม่มีข้อจำกัดในการให้สารน้ำปริมาณมากและหลอดเลือดดำส่วนปลายของผู้ป่วยเหมาะสม
5. การให้อาหารทางหลอดเลือดดำมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการเกิดหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ (thrombophlebitis)

9.5 Minerals

- | | | | |
|----|---------------------|------------------------|---|
| 1. | Aluminium hydroxide | tab, susp, susp (hosp) | b |
|----|---------------------|------------------------|---|

คำเตือนและข้อควรระวัง

กรณีที่ใช้รักษา hyperphosphatemia ในผู้ป่วยที่มีไตบกพร่อง ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากอาจเกิดพิษจาก Aluminium

- | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---|
| 2. | Calcium carbonate | cap, tab | b |
| 3. | Calcium gluconate | sterile sol | b |
| 4. | Copper sulfate solution | sterile sol (hosp), oral sol (hosp) | b |
| 5. | Ferrous fumarate | cap, tab, oral sol, susp | b |
| 6. | Ferrous sulfate | cap, tab, oral sol, drop, drop (hosp) | b |
| 7. | Iron (III) hydroxide polymaltose complex
(iron polymaltose complex) | syr | b |

เงื่อนไข

ใช้ในกรณีที่ใช้ ferrous sulfate oral solution หรือ drop แล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์

- | | | | |
|-----|---------------------|--|---|
| 8. | Magnesium hydroxide | tab, susp, susp (hosp) | b |
| 9. | Magnesium sulfate | sterile sol, oral sol, oral sol (hosp) | b |
| 10. | Sodium fluoride | tab, oral sol, oral sol (hosp) | b |

คำเตือนและข้อควรระวัง

ระวังการใช้ในพื้นที่ที่มีฟลูออไรด์สูง เพราะอาจทำให้เกิด fluorosis

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 11. | Trace element solution | oral sol (hosp) | b |
| | อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Zn, Cu, I และ Cr | | |
| 12. | Zinc sulfate | cap, tab, oral sol (hosp), sterile sol (hosp) | b |
| 13. | Dipotassium hydrogen phosphate | sterile sol | b |
| 14. | Oral acidic phosphate solution (Joulie's solution) | oral sol (hosp) | b |
| | มีตัวยาสำคัญ คือ Potassium phosphate และ/หรือ Sodium phosphate monobasic/dibasic | | |
| 15. | Oral neutral phosphate solution | oral sol (hosp) | b |
| | มีตัวยาสำคัญ คือ Potassium phosphate และ/หรือ Sodium phosphate monobasic/dibasic | | |
| 16. | Sodium glycerophosphate | sterile sol | b |

เงื่อนไข

ใช้กับทารกแรกเกิดที่ต้องการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ (total parenteral nutrition)

9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers

- | | | | |
|----|------------------|---------------------------|---|
| 1. | Ferrous fumarate | tab (เฉพาะ 65 mg as iron) | b |
|----|------------------|---------------------------|---|

คำเตือนและข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน
- ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรคธาลัสซีเมีย

2. Ferrous sulfate tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron) b

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน
2. ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรคธาลัสซีเมีย

3. Folic acid cap/tab (เฉพาะ 400-1,000 mcg และ 5 mg) b

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับเสริมโฟเลทตลอดการตั้งครรภ์
2. ใช้สำหรับเสริมโฟเลทในช่วง 6 เดือนแรกของการให้นมบุตร
3. กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่เคยมีประวัติตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรที่มีภาวะ neural tube defect หรือปากแหว่งเพดานโหว่ ควรใช้ความแรง 5 mg

4. Ferrous salt + Folic acid tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron + 400 mcg) b

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับเสริมธาตุเหล็กและโฟเลทตลอดการตั้งครรภ์
2. ใช้สำหรับเสริมธาตุเหล็กและโฟเลทในช่วง 6 เดือนแรกของการให้นมบุตร

คำเตือนและข้อควรระวัง

ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

5. Ferrous salt + Folic acid + Potassium Iodide tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron + 400 mcg + 150 mcg as iodine) b

เงื่อนไข

1. ใช้เสริมธาตุเหล็ก โฟเลท และไอโอดีนตลอดการตั้งครรภ์
2. ใช้สำหรับเสริมธาตุเหล็ก โฟเลท และไอโอดีนในช่วง 6 เดือนแรกของการให้นมบุตร
3. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ควรติดตามเฝ้าระวังภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
2. ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

6. Potassium Iodide tab (เฉพาะ 150 mcg as iodine) b

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับเสริมไอโอดีนตลอดการตั้งครรภ์
2. ใช้เสริมไอโอดีนในช่วง 6 เดือนแรกของการให้นมบุตร
3. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

คำเตือนและข้อควรระวัง

ควรติดตามเฝ้าระวังภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

9.7 Metabolic disorders

1. Penicillamine (D-Penicillamine) cap, tab s

ยากำพรั้ว

เงื่อนไข

ใช้รักษา Wilson's disease

คำเตือนและข้อควรระวัง

ระวังการใช้กับหญิงตั้งครรภ์เพราะเป็นสารก่อวิรูป (teratogen)

2. Carglumic acid oral form R2
 ยากำพรั่ว
เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับผู้ป่วย N-acetylglutamate synthase (NAGS) deficiency ที่มีภาวะ hyperammonemia ทั้งใน acute hyperammonemia และ maintenance for chronic hyperammonemia
 2. ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ acute hyperammonemia crisis ที่สงสัยว่าเป็น organic acidemia ชนิด propionic acidemia (PA) และ methylmalonic acidemia (MMA) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 3. Imiglucerase sterile powdr R2
เงื่อนไข
 ใช้สำหรับ Gaucher's disease type 1 โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 4. Mercaptamine (Cysteamine bitartrate) immediate-release cap R2
 ยากำพรั่ว
เงื่อนไข
 ใช้สำหรับ Nephropathic Cystinosis โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 5. Nitisinone oral form R2
 ยากำพรั่ว
เงื่อนไข
 ใช้สำหรับรักษาโรคไทโรซีนีเมียชนิดที่ 1 (Hereditary Tyrosinemia type 1) โดยใช้เฉพาะการรักษาผู้ป่วยก่อนได้รับการปลูกถ่ายตับ (Liver transplant) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 6. Sapropterin (BH4) oral form R2
 ยากำพรั่ว
เงื่อนไข
 1. ใช้เพื่อทำการทดสอบ BH4 loading test สำหรับวินิจฉัยแยกผู้ป่วยโรค BH4 deficiencies จากโรค Phenylketonuria (PKU) และประเมินการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา sapropterin (BH4)
 2. ใช้สำหรับโรค tetrahydrobiopterin (BH4) deficiencies
 3. ใช้สำหรับโรค Phenylketonuria (PKU) ที่ได้รับการรักษาด้วยการควบคุมอาหารแล้วยังมีระดับ phenylalanine ในเลือดเกินกว่า 360 µmol/L
 4. ส่งจ่ายโดยแพทย์อนุสาขาเวชพันธุศาสตร์เท่านั้น
 โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
- หมายเหตุ**
 กรณีใช้สำหรับโรค tetrahydrobiopterin (BH4) deficiencies ต้องใช้ร่วมกับการรักษามาตรฐานอื่น (เช่น 5-hydroxytryptophan (5-HTP), folinic acid, levodopa (L-dopa) เป็นต้น)

กลุ่มยา 10 Musculoskeletal and joint diseases

10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout

10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

1. Aspirin (Acetylsalicylic acid) tab, EC tab b
2. Diclofenac sodium EC tab, sterile sol b

3.	Ibuprofen	film coated tab, susp	b
คำเตือนและข้อควรระวัง			
1.	ไม่ควรใช้ ibuprofen ระยะยาวในผู้ป่วยที่ใช้ low dose aspirin เนื่องจากอาจมีผลต่อต้านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจของยาแอสไพริน		
2.	ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น		
3.	ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ไข้เลือดออก		
4.	Indometacin	cap	b
5.	Naproxen	tab (as base เฉพาะ 250 mg, sodium เฉพาะ 275 mg), cap (as base เฉพาะ 250 mg, sodium เฉพาะ 275 mg)	b
6.	Piroxicam	cap (as base), compressed tab (as base), film coated tab (as base)	b

10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)

1.	Chloroquine phosphate	compressed tab, film coated tab	b
คำเตือนและข้อควรระวัง			
	การใช้ยาอาจเป็นพิษต่อจอประสาทตา ควรตรวจจอประสาทตาเป็นระยะ ๆ หลังการให้ยา		
2.	Hydroxychloroquine sulfate	tab	b
คำเตือนและข้อควรระวัง			
	การใช้ยาอาจเป็นพิษต่อจอประสาทตา ควรตรวจจอประสาทตาเป็นระยะ ๆ หลังการให้ยา		
3.	Azathioprine	tab	s
คำเตือนและข้อควรระวัง			
	ควรระมัดระวังหากต้องใช้ร่วมกับ allopurinol เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ		
4.	Methotrexate	tab (as base or sodium), sterile pwdr/sterile sol (as sodium)	s
คำเตือนและข้อควรระวัง			
	การใช้ยาอาจเกิดการกดไขกระดูกและเป็นพิษต่อตับ ควรตรวจค่า complete blood count (CBC) และ SGPT ทุก 3-6 เดือน ระหว่างการใช้ยา		
5.	Sulfasalazine	EC tab	s
6.	Ciclosporin (Cyclosporin)	cap, oral sol, sterile sol	ex

เงื่อนไข

- ใช้เป็นยาเสริม (add on) สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีโรคกำเริบ (disease activity score 28 เท่ากับหรือมากกว่า 2.6 ขึ้นไป) หลังได้รับการรักษาด้วย methotrexate ร่วมกับ sulfasalazine หรือ ยาต้านมาลาเรีย (chloroquine, hydroxychloroquine) ในขนาดเต็มที่อย่างน้อย 3 เดือนติดต่อกัน แล้วไม่ตอบสนอง ทั้งนี้ผู้ป่วยมีการทำงานของไตเป็นปกติ และ ไม่มีภาวะความดันเลือดสูง
- ใช้โดยอายุรแพทย์โรคข้อเท่านั้น

7. Leflunomide tab (เฉพาะ 20 mg) ex
- เงื่อนไข**
1. ใช้เป็นยาเสริม (add on) สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีโรคกำเริบ (Disease activity score 28 เท่ากับหรือมากกว่า 2.6 ขึ้นไป) หลังได้รับการรักษาด้วย methotrexate ร่วมกับ sulfasalazine หรือ ยาต้านมาเลเรีย (chloroquine/ hydroxychloroquine) ในขนาดเต็มที่ยอย่างน้อย 3 เดือนติดต่อกัน แล้วไม่ตอบสนอง
 2. ใช้โดยอายุรแพทย์โรคข้อเท่านั้น
8. Adalimumab sterile sol (เฉพาะ 40 mg/0.8 ml และ 20 mg/0.4 ml) R2

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (psoriatic arthritis) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 (เฉพาะ 40 mg/0.8 ml)
2. ใช้สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 (เฉพาะ 40 mg/0.8 ml)
3. ใช้สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็กชนิดไม่มีอาการทาง systemic (Non-sJIA) โดยให้ใช้ไม่เกิน 2 คอร์สการรักษาตลอดชีวิต โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 (เฉพาะ 40 mg/0.8 ml และ 20 mg/0.4 ml)

หมายเหตุ

ยาฉีด adalimumab ความแรง 20 mg/0.4 ml มีราคาต่ำสุดที่ต่อรองได้เข็มละ 2,140 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ 24 มีนาคม 2567

9. Infliximab sterile pwdr (เฉพาะ 100 mg) R2
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับรักษาโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดยึดติด (ankylosing spondylitis) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
10. Secukinumab sterile pwdr (เฉพาะ 150 mg), sterile sol (pre-filled pen เฉพาะ 150 mg/ml) R2

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินในเด็ก (Juvenile Psoriatic Arthritis) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 2. ใช้สำหรับโรคข้ออักเสบเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุในเด็ก ชนิดที่มีจุดเกาะเส้นเอ็นอักเสบ (enthesitis-related arthritis, ERA) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
11. Tocilizumab sterile sol (เฉพาะ 80 mg/4ml) R2
- เงื่อนไข**
- สำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ชนิดที่มีอาการชนิดซิสเต็มิก (Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis : SJIA) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia

1. Allopurinol tab b
คำเตือนและข้อควรระวัง
การลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงต่อการเกิด severe cutaneous adverse reactions (SCAR) จากการใช้ allopurinol ทำได้โดย
 1. ฝ้าระงับอาการอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยทุกรายในช่วง 2-4 สัปดาห์แรกของการให้ยา
 2. ควรเริ่มใช้ยาในขนาดต่ำและค่อย ๆ ปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นช้า ๆ ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
2. Colchicine tab b
คำเตือนและข้อควรระวัง
ยานี้มีผลข้างเคียงทำให้กล้ามเนื้อสลายและอาจทำให้กล้ามเนื้อสลาย (rhabdomyolysis) จึงควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาที่ทำให้กล้ามเนื้อสลายเช่น ยาในกลุ่ม statins เป็นต้น
3. Probenecid film coated tab b
คำเตือนและข้อควรระวัง
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัตินิวไินไต หรือภาวะไตเสื่อม
4. Benzbromarone tab s
คำเตือนและข้อควรระวัง
ใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีรายงานการเกิด cytolytic liver damage ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต หรือต้องเปลี่ยนตับ
5. Febuxostat tab (เฉพาะ 80 mg) ex
เงื่อนไข
ใช้สำหรับภาวะกรดยูริกในเลือดสูงที่มีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
 1. ผู้ป่วยโรคเกาต์ที่แพ้ยา allopurinol ชนิดรุนแรง และมีข้อห้ามในการใช้ยากลุ่ม uricosuric
 2. ผู้ป่วยโรคเกาต์ที่มียีน HLA-B*58:01 และมีข้อห้ามในการใช้ยากลุ่ม uricosuric
 3. ผู้ป่วยโรคเกาต์ที่มีระดับกรดยูริกมากกว่า 6 mg/dL ภายหลังจากการใช้ยากลุ่ม uricosuric ร่วมกับ allopurinol ในขนาดที่เหมาะสม
 4. ผู้ป่วยโรคเกาต์ที่มีระดับกรดยูริกมากกว่า 6 mg/dL ภายหลังจากการใช้ยากลุ่ม uricosuric ในกรณีผู้ป่วยที่แพ้ยา allopurinol ชนิดรุนแรง หรือมียีน HLA-B*58:01
 5. เป็นยาทางเลือกในกรณีที่ใช้ allopurinol แล้วมีเอนไซม์ตับสูงเกิน 3 เท่าของค่าปกติ หรือ เพิ่มขึ้นเกิน 2 เท่าของระดับก่อนให้ยา และมีข้อห้ามใช้ยากลุ่ม uricosuric**คำเตือนและข้อควรระวัง**
ควรระมัดระวังการใช้ febuxostat ในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง

10.2 Drugs used in neuromuscular disorders

10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission

1. Pyridostigmine bromide tab b
2. Neostigmine methylsulfate sterile sol b

10.2.2 Skeletal muscle relaxants

1. ยากลุ่มนี้ใช้บรรเทาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่เป็นรุนแรงในโรคบางชนิด เช่น บาดทะยัก การบาดเจ็บของไขสันหลัง และ multiple sclerosis
2. ไม่ใช้ยากลุ่มนี้กับอาการหดเกร็งกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬาหรือการบาดเจ็บ
3. ควรใช้ยากลุ่มนี้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการลด muscle tone อาจเพิ่ม disability ให้กับผู้ป่วย

1. Baclofen	tab	b
2. Diazepam	cap, tab, sterile sol	b
3. Tizanidine hydrochloride	tab	b

10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflammation

10.3.1 Rubifacients

1. Methyl salicylate cream compound	cream, cream (hosp)	b
2. Methyl salicylate ointment compound (Analgesic Balm)	oint, oint (hosp)	b

กลุ่มยา 11 Eye

11.1 Anti-infective eye preparations

11.1.1 Antibacterials and eye wash solution

1. ใช้เป็นยาสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น
2. ควรใช้ยาให้เหมาะสมกับชนิดของเชื้อ เช่น ชนิดกรัมบวก หรือกรัมลบ

1. Boric acid	eye wash sol	b
2. Chloramphenicol	eye drop, eye oint	b
3. Tetracycline hydrochloride ยากำพรั้ว	eye oint	b
4. Gentamicin sulfate	eye drop, eye oint	b

หมายเหตุ

ประสิทธิภาพของ gentamicin ไม่แตกต่างจาก tobramycin

5. Amikacin	eye drop (hosp) (เฉพาะ 20 mg/mL)	s
-------------	----------------------------------	---

เงื่อนไข

ใช้สำหรับรักษากระจกตา ผนังลูกตาและลูกตาดำติดเชื้อ (หรือสงสัยว่าติดเชื้อ) แบคทีเรียแกรมลบ โดยสามารถให้ได้โดยไม่ต้องรอผลเพาะเชื้อ

6. Cefazolin	eye drop (hosp) (เฉพาะ 50 mg/mL)	s
--------------	----------------------------------	---

เงื่อนไข

ใช้สำหรับรักษากระจกตา ผนังลูกตา ลูกตา ติดเชื้อ (หรือสงสัยว่าติดเชื้อ) แบคทีเรียแกรมบวก โดยสามารถให้ได้โดยไม่ต้องรอผลเพาะเชื้อ

7. Ceftazidime	eye drop (hosp) (เฉพาะ 50 mg/mL)	s
----------------	----------------------------------	---

เงื่อนไข

ใช้สำหรับรักษากระจกตาและลูกตาดำติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ โดยสามารถให้ได้โดยไม่ต้องรอผลเพาะเชื้อ

8. Clindamycin eye drop (hosp) (เฉพาะ 50 mg/mL) s
เงื่อนไข
ใช้สำหรับรักษาโรคกระจกตาติดเชื้อ (หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ) แบคทีเรีย โดยสามารถให้ได้โดยไม่ต้องรอผลเพาะเชื้อ
9. Vancomycin eye drop (hosp) (เฉพาะ 50 mg/mL) s
เงื่อนไข
ใช้สำหรับรักษากระจกตาติดเชื้อและลูกตาติดเชื้อ (หรือสงสัยว่าติดเชื้อ) แบคทีเรียแกรมบวกที่รุนแรงหรือเชื้อ MRSA (Methicilin-Resistant *Staphylococcus Aureus*)
10. Imipenem + Cilastatin eye drop (hosp) (เฉพาะ 5 mg/mL) s
เงื่อนไข
ใช้สำหรับรักษาแผลกระจกตาติดเชื้อที่สงสัยหรือได้ผลเพาะเชื้อว่าเป็นแบคทีเรียแกรมลบหรือสงสัยเชื้อในกลุ่ม mycobacteria
11. Polymyxin B sulfate + Neomycin sulfate + Gramicidin eye drop s
หมายเหตุ
ยาที่มีส่วนผสมของ polymyxin B อาจส่งผลให้เกิดการตีของเชื้อในทาง systemic จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น
12. Cyclosporine eye drop (hosp) ex
เงื่อนไข
ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการตาแห้ง (dry eye syndrome) ร่วมกับอาการอักเสบของพื้นผิวกระจกตา
13. Fusidic acid eye drop (in gel base) ex
เงื่อนไข
ใช้สำหรับหนังตาอักเสบ (blepharitis) ที่ใช้ chloramphenicol หรือ gentamicin แล้วแพ้หรือไม่ได้ผล
หมายเหตุ
ยาเปลี่ยนเป็นของเหลวเมื่อสัมผัสลูกตา
14. Levofloxacin eye drop (เฉพาะ 0.5%) (5 ml) ex
เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับรักษาเยื่อตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (bacterial conjunctivitis)
 2. ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณลูกตาส่วนนอกอื่น ๆ (other external ocular bacterial infections)
15. Levofloxacin eye drop (เฉพาะ 1.5%) (5 ml) ex
เงื่อนไข
ใช้สำหรับรักษากระจกตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (bacterial keratitis)
16. Vancomycin eye drop (hosp) (เฉพาะ 14 mg/mL) ex
เงื่อนไข
ใช้สำหรับป้องกันตาติดเชื้อ (initial prophylaxis) ในช่วงแรกในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่กระจกตาเทียม (Boston keratoprothesis) โดยใช้ร่วมกับยา fluoroquinolone

11.1.2 Antibacterials with corticosteroids

1. การใช้ยากลุ่มนี้ควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพราะยาที่มีใช้จำกัด หากใช้ไม่ถูกต้องอาจไม่ปลอดภัย
2. ห้ามใช้ในอาการตาแดงที่ยังมิได้รับการตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่ชัดเจน เพราะอาจเกิดอันตรายได้ เช่น การใช้ในอาการตาแดงที่เกิดจากเชื้อ herpes simplex virus อาจทำให้เกิดแผลที่กระจกตาไปจนถึงตาบอดได้ เป็นต้น
3. ใช้สำหรับการอักเสบรุนแรงในลูกตาส่วนหน้าหรือหลังผ่าตัด และป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเสี่ยง

- | | | | |
|----|---|----------|---|
| 1. | Dexamethasone sodium phosphate
+ Neomycin sulfate | eye drop | s |
| 2. | Dexamethasone sodium phosphate
+ Chloramphenicol
+ Tetrahydrozoline hydrochloride | eye drop | s |
| 3. | Dexamethasone + Neomycin sulfate
+ Polymyxin B sulfate | eye oint | s |

หมายเหตุ

ยาที่มีส่วนผสมของ polymyxin B อาจส่งผลให้เกิดการดูดซึมของเชื้อในทาง systemic จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง
เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น

11.1.3 Antifungals

- | | | | |
|----|--|---|----|
| 1. | Natamycin
เจือจาง
ใช้สำหรับการติดเชื้อราที่แผลกระจกตา | eye susp | ex |
| 2. | Amphotericin B
เจือจาง
ใช้สำหรับการติดเชื้อราที่แผลกระจกตา ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยา natamycin eye susp ได้ | eye drop (hosp) (เฉพาะ 0.1%),
eye ointment (hosp) (เฉพาะ 0.1%) | ex |
| 3. | Fluconazole
เจือจาง
ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อรา และ/หรือการติดเชื้อ microsporidia ที่กระจกตา | eye drop (hosp) (เฉพาะ 0.2%) | ex |

11.1.4 Antivirals

- | | | | |
|----|-----------------------|----------|---|
| 1. | Aciclovir (Acyclovir) | eye oint | s |
|----|-----------------------|----------|---|

11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations

- | | | | |
|----|--|--------------------|---|
| 1. | Antazoline hydrochloride
+ Tetrahydrozoline hydrochloride | eye drop | b |
| 2. | Fluorometholone
เจือจาง | eye susp (as base) | s |

ใช้รักษาเยื่อตาอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เช่น ภูมิแพ้ การระคายเคือง เป็นต้น

หมายเหตุ

การใช้ยานี้ต้องระวังการติดเชื้อราที่กระจกตา การเกิด steroid glaucoma และการใช้ยาติดต่อกัน
เป็นเวลานานอาจทำให้เกิด steroid cataract

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------|---|
| 3. | Medroxyprogesterone
เจือจาง | eye drop (hosp) (เฉพาะ 1%) | s |
|----|---------------------------------------|----------------------------|---|
1. ใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยากดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive agents) เช่น azathioprine, methotrexate ในการยับยั้ง collagenase ในกระจกตาอักเสบ (peripheral ulcerative keratitis; PUK)
 2. ใช้ลดการทำลาย collagen ใน chemical ocular burn เพื่อป้องกันกระจกตาทะลุ

4. Prednisolone acetate eye susp s
- เงื่อนไข**
1. ใช้รักษาม่านตาอักเสบและ/หรือหลังผ่าตัดตา
 2. ใช้รักษากระจกตาอักเสบหลังจากการติดเชื้อไวรัสที่ชั้น stroma หรือชั้นเยื่อบุโพรงตา (endothelium)
- หมายเหตุ**
- การใช้ยานี้ต้องระวังการติดเชื้อราที่กระจกตา การเกิด steroid glaucoma และการใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิด steroid cataract
5. Sodium cromoglicate (Cromolyn sodium) eye drop s
6. Dexamethasone ชนิด preservative free eye drop (hosp) (เฉพาะ 0.1% และ ex
ยากำพร้า 0.01%)
- เงื่อนไข**
1. ลดการอักเสบที่ผิวตา เยื่อบุตา และกระจกตา
 2. ภาวะตาแห้งในระดับปานกลางถึงรุนแรง
 3. ยูเวียอักเสบ (uveitis)
 4. การอักเสบหลังการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับดวงตา
 5. ผู้ป่วยแพ้สารกันเสียที่ผสมในยาตา ซึ่งไม่สามารถใช้ยาอื่นได้
7. Olopatadine hydrochloride eye drop (เฉพาะ 0.1% และ 0.2%) ex
- เงื่อนไข**
- ใช้สำหรับผู้ป่วยเยื่อบุตาอักเสบที่เกิดจากภูมิแพ้

11.3 Mydriatics and cycloplegics

1. Atropine sulfate eye drop b
2. Cyclopentolate hydrochloride eye drop b
3. Phenylephrine hydrochloride eye drop b
4. Tropicamide eye drop b
5. Phenylephrine hydrochloride + Tropicamide eye drop (เฉพาะ 5% + 0.8%) (5 ml) s

11.4 Drugs for treatment of glaucoma

1. Acetazolamide tab b
2. Glycerol oral sol (hosp) b
3. Pilocarpine eye drop b
(as hydrochloride or nitrate)
4. Timolol maleate eye drop b
5. Brimonidine tartrate eye drop (เฉพาะ 0.2% w/v) s

เงื่อนไข

1. ใช้รักษาต้อหินในกรณีที่มีข้อห้ามใช้ topical beta-blockers หรือ
 2. ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยชนิดอื่นรักษาต้อหินแล้วความดันในลูกตายังไม่ลดลงอยู่ในขั้นที่ปลอดภัย
6. Latanoprost eye drop (เฉพาะ 0.005% w/v) s

เงื่อนไข

1. ใช้รักษาต้อหินในกรณีที่มีข้อห้ามใช้ topical beta-blockers หรือ
2. ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยชนิดอื่นรักษาต้อหินแล้วความดันในลูกตายังไม่ลดลงอยู่ในขั้นที่ปลอดภัย

- | | | | |
|----|--|------------------------------------|----|
| 7. | Brinzolamide | eye susp (เฉพาะ 1%) (5 ml) | s |
| | เงื่อนไข | | |
| | 1. ใช้รักษาต้อหินในกรณีที่มีข้อห้ามใช้ topical beta-blockers หรือ | | |
| | 2. ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยชนิดอื่นรักษาต้อหินแล้วความดันในลูกตายังไม่ลดลงอยู่ในขั้นที่ปลอดภัย | | |
| 8. | Brinzolamide + Timolol maleate | eye susp (เฉพาะ 1% + 0.5%) (5 ml) | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยรักษาต้อหินชนิดอื่นแล้วความดันในลูกตายังไม่ลดลงอยู่ในขั้นที่ปลอดภัย | | |

11.5 Local anaesthetics

- | | | | |
|----|--------------------------|----------|---|
| 1. | Tetracaine hydrochloride | eye drop | b |
| | เงื่อนไข | | |
| | ห้ามให้ผู้ป่วยนำกลับบ้าน | | |

11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents

- | | | | |
|----|--|---------------------------------------|----|
| 1. | Carbomer (with preservative, with/without sorbitol) | eye gel | b |
| 2. | Hypromellose (with preservative) | eye drop | b |
| 3. | White petrolatum + Mineral oil | eye oint | s |
| | + Liquid lanolin anhydrous (preservative free) | | |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้กับผู้ป่วยตาแห้งปานกลางถึงตาแห้งมาก ที่ใช้น้ำตาเทียมที่มี preservative ไม่ได้ | | |
| 4. | Dried protein-free dialysate of calf blood | eye gel | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้เพิ่มการสมานของแผลที่กระจกตา | | |
| 5. | Hypromellose + Dextran 70 (preservative free) | eye drop (เฉพาะ 0.3% + 0.1%) (0.8 ml) | ex |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้เฉพาะกับผู้ป่วยตาแห้งมาก ที่ใช้น้ำตาเทียมที่มี preservative ไม่ได้ | | |

11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment

- | | | | |
|----|---|--|----|
| 1. | Balance salt | sol for ocular irrigation,
sol for intraocular irrigation | s |
| 2. | Carbachol | sterile sol for intraocular use | s |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้หัตถ์มาดาระหว่างการผ่าตัด | | |
| 3. | Diclofenac sodium with preservative | eye drop | s |
| 4. | Fluorescein sodium | sterile sol for inj | s |
| 5. | Indocyanine green | sterile pwdr for inj | ex |
| | ยากำพรั้ว | | |
| 6. | Trypan blue | sterile sol for intraocular use | ex |
| | ยากำพรั้ว | | |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้สำหรับย้อมสีถุงหุ้มเลนส์ระหว่างผ่าตัดต่อกระจกชนิดสุก | | |

7. Bevacizumab sterile sol R2
- เงื่อนไข**
1. ใช้สำหรับ age-related macular degeneration (AMD) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 2. ใช้สำหรับ diabetic macular edema (DME) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 3. ใช้สำหรับ retinal vein occlusion (RVO) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 4. ใช้สำหรับการรักษาโรคจอตาผิดปกติในเด็กเกิดก่อนกำหนด (Retinopathy of Prematurity; ROP) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

หมายเหตุ

ยาฉีด bevacizumab รูปแบบ sterile sol ความแรง 100 มิลลิกรัม ขนาด 4 มิลลิลิตร มีราคาต่ำสุดที่ต่อรองได้ ไวแอลละ 2,551.95 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยื่นราคา 730 วัน นับจากวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567

กลุ่มยา 12 Ear, nose, oropharynx and oral cavity

12.1 Drugs acting on the ear

12.1.1 Otitis externa and otitis media

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Chloramphenicol | ear drop | b |
| 2. Dexamethasone + Framycetin sulfate + Gramicidin | ear drop/ear oint (เฉพาะ 0.5 mg + 5 mg + 0.05 mg in 1 ml or 1 g) | s |
| 3. Hydrocortisone + Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate | ear drop (เฉพาะ 10 mg + 3400 U + 10000 U in 1 ml) | s |

12.1.2 Drugs used in otomycosis

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Acetic acid | ear drop (hosp) (เฉพาะ 2% in aqueous และ 2% in 70% isopropyl alcohol) | b |
|----------------|---|---|

คำเตือนและข้อควรระวัง

ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แก้วหูทะลุ

- | | | |
|---------------|---|---|
| 2. Boric acid | ear drop (hosp) (เฉพาะ 3% in isopropyl alcohol) | b |
|---------------|---|---|

คำเตือนและข้อควรระวัง

ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แก้วหูทะลุ

- | | | |
|-------------------|------------|---|
| 3. Clotrimazole | ear drop | b |
| 4. Gentian violet | sol (hosp) | b |

คำเตือนและข้อควรระวัง

ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แก้วหูทะลุ

12.1.3 Other drugs acting on the ear

- | | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| 1. Ofloxacin | ear drop | b |
| 2. Sodium bicarbonate | ear drop (hosp) | b |

12.2 Drugs acting on the nose

12.2.1 Drugs used in nasal allergy

- | | | | |
|----|------------------------------|-------------|---|
| 1. | Budesonide | nasal spray | b |
| | เจ็อนไข | | |
| | ใช้กับผู้ป่วยอายุ 6 ปีขึ้นไป | | |
| 2. | Fluticasone furoate | nasal spray | b |
| | เจ็อนไข | | |
| | ใช้กับผู้ป่วยอายุ 2 ปีขึ้นไป | | |

12.2.2 Topical nasal decongestants

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Ephedrine hydrochloride | nasal drop (hosp) (เฉพาะ 0.5-3%) | b |
| | <i>วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2</i> | | |
| 2. | Sodium chloride | sterile sol (for irrigation) (เฉพาะ 0.9%) | b |
| 3. | Oxymetazoline hydrochloride | nasal drop, nasal spray | b |

12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity

12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer

- | | | | |
|----|-------------------------|---|---|
| 1. | Borax (in glycerin) | sol, sol (hosp) | b |
| 2. | Chlorhexidine gluconate | mouthwash sol (เฉพาะ 0.12-0.2% w/v) | b |
| 3. | Fluocinolone acetonide | oral paste, oral gel, oral gel (hosp) , sol, sol (hosp) | b |

เจ็อนไข

ใช้ในกรณีที่ใช้ยา triamcinolone acetonide ไม่ได้ผลหรือรอยโรคมีความรุนแรง

หมายเหตุ

รูปแบบยา oral paste ดังกล่าวหมายถึงรวมถึง orabase ด้วย

- | | | | |
|----|-------------------------|------------|---|
| 4. | Iodine Paint, compound | sol (hosp) | b |
| 5. | Iodoform (in ether) | sol (hosp) | b |
| 6. | Talbot's solution | sol (hosp) | b |
| 7. | Triamcinolone acetonide | oral paste | b |

12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs

- | | | | |
|----|--------------------|-----------|---|
| 1. | Clotrimazole | lozenge | b |
| 2. | Miconazole nitrate | oral gel | b |
| 3. | Nystatin | oral susp | b |

12.3.3 Antiseptics for root canal treatment

- | | | | |
|----|------------------------------|-----------------------|---|
| 1. | Camphorated parachlorophenol | sol (hosp) | b |
| 2. | Camphorated phenol | sol (hosp) | b |
| 3. | Chlorhexidine gluconate | sol (hosp) (เฉพาะ 2%) | b |

4.	Clove oil	oil	b
5.	EDTA	sol (hosp) (เฉพาะ 14% หรือ 17%)	b
6.	Formocresol (Cresolated formaldehyde, Formaldehyde and Cresol solution)	sol (hosp)	b
7.	Sodium hypochlorite	sol (hosp)	b

12.3.4 Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries

1.	Chlorhexidine gluconate	mouthwash sol/ mouthwash sol (hosp) (เฉพาะ 0.1-0.2%w/v)	b
2.	Sodium fluoride	tab, oral sol	b

หมายเหตุ

ระวังการใช้ในพื้นที่ที่มีฟลูออไรด์สูง เพราะอาจทำให้เกิด fluorosis

12.3.5 Other dental preparations

1.	Epinephrine (Adrenaline)	sterile sol	b
2.	Artificial saliva (Saliva substitutes)	sol (hosp)	b
3.	Hydrogen peroxide	mouthwash sol (1.5% w/v)	b
4.	Sodium chloride	sterile sol	b
5.	Special mouthwash ที่มีตัวยาคือ chloroxylenol	mouthwash sol (hosp)	b
6.	Zinc oxide	powdr (hosp)	b

หมายเหตุ

ใช้อุดคลองรากฟันที่ซบดเคี้ยวหรือใช้สำหรับอุดฟันชั่วคราวที่ต้องการให้ remove ออกได้ง่าย

7.	Zinc oxide with zinc acetate	powdr (hosp)	b
----	------------------------------	--------------	---

หมายเหตุ

ใช้สำหรับอุดคลองรากฟันและอุดชั่วคราวที่ต้องการความแข็งแรงมาก

8.	Carnoy's solution	sol (hosp)	s
9.	White head varnish	varnish (hosp)	s

กลุ่มยา 13 Skin

13.1 Anti-infective skin preparations

13.1.1 Antibacterial preparations

1.	Fusidic acid	cream	b
2.	Sodium fusidate	oint	b
3.	Sulfadiazine silver (Silver sulfadiazine)	cream, cream (hosp)	b
4.	Mupirocin	oint	b

เงื่อนไข

จำกัดการใช้เฉพาะ Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)

13.1.2 Antifungal preparations

1. Benzoic acid + Salicylic acid (Whitfield's ointment)	oint, oint (hosp)	b
2. Clotrimazole	cream	b
3. Sodium thiosulfate	sol, sol (hosp)	b
4. Ketoconazole	cream	b

13.1.3 Parasiticial preparations

1. Benzyl benzoate	emulsion/lotion (เฉพาะ 25%), lotion (hosp)	b
2. Permethrin ยากำพรั้ว เจือไน ใช้สำหรับรักษาเหา	cream/lotion (เฉพาะ 1%)	b
3. Permethrin ยากำพรั้ว เจือไน ใช้สำหรับรักษาหิด และโลน	cream/lotion (เฉพาะ 5%)	b
4. Sulfur (Sulphur)	oint, oint (hosp) (เฉพาะ 5-10%)	b
5. Ivermectin ยากำพรั้ว เจือไน ใช้สำหรับรักษาหิด ที่ใช้ยาทาไม่ได้หรือไม่ได้ผล หมายเหตุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 5.5 Anthelmintic	tab	b

13.2 Emollient and barrier preparations

1. Aluminium acetate (Aluminium subacetate)	sol (hosp)	b
2. Mineral oil	oil (hosp)	b
3. Olive oil	oil (hosp)	b
4. Urea หมายเหตุ Urea รูปแบบ cream ความแรงต่ำกว่า 10% จัดเป็นเครื่องสำอาง ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	cream, cream (hosp), oint (hosp)	b
5. White petrolatum	oint (hosp)	b
6. Zinc oxide	cream, cream (hosp), oint (hosp), paste (hosp)	b
7. Zinc sulfate	lotion (hosp)	b

13.3 Topical antipruritics

1. Calamine หมายเหตุ หากในสูตรตำรับยามี phenol เป็นส่วนประกอบ ต้องมีความเข้มข้นของ phenol ไม่เกิน 0.5 - 1%	lotion, lotion (hosp)	b
--	-----------------------	---

2. Menthol + Phenol + Camphor	ทุก topical dosage form (hosp)	b
-------------------------------	--------------------------------	---

13.4 Topical corticosteroids

ควรระมัดระวังการใช้ยาทาสเตียรอยด์ที่มีความแรงสูงและสูงมากในเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผิวหนังบริเวณรอบดวงตา ข้อพับต่าง ๆ เยื่อปาก ทวาร และอวัยวะเพศ เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีผิวหนังบางจึงอาจมีผลข้างเคียงต่อผิวหนังบริเวณที่ทายา และยาอาจถูกดูดซึมทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็น systemic side-effect ได้

1. Betamethasone dipropionate	cream, cream (hosp), oint	b
2. Betamethasone valerate	cream, cream (hosp), lotion, sol	b
3. Clobetasol propionate	cream	b
4. Desoximetasone (Desoxymethasone)	cream	b
5. Hydrocortisone acetate	cream, cream (hosp)	b
6. Prednisolone	cream, cream (hosp)	b
8. Triamcinolone acetonide	cream, cream (hosp), lotion, lotion (hosp)	b
9. Clobetasol propionate	ointment	s

เงื่อนไข

ใช้สำหรับโรคผิวหนังเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่น เช่น โรคสะเก็ดเงินที่เล็บซึ่งเป็นบริเวณที่หนาและต้องใช้ยาที่เพิ่มการดูดซึมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษา

10. Betamethasone dipropionate + Salicylic acid	ointment (เฉพาะ 0.05% + 3%)	s
---	-----------------------------	---

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ chronic eczema
2. ใช้สำหรับโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis)

11. Clobetasol propionate	lotion	ex
---------------------------	--------	----

เงื่อนไข

ใช้สำหรับโรคผิวหนังเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่น

12. Mometasone furoate	cream	ex
------------------------	-------	----

เงื่อนไข

ใช้กรณีต้องใช้ยาเป็นเวลานาน

13. Betamethasone dipropionate + Calcipotriol	gel, oint	ex
---	-----------	----

เงื่อนไข

1. ใช้รักษา chronic plaque psoriasis ในผู้ใหญ่ที่ใช้ topical steroid รักษาแล้วไม่ได้ผล
2. ใช้ gel กับรอยโรคที่หนังศีรษะไม่เกิน 4 สัปดาห์ และ ointment กับรอยโรคที่ลำตัวไม่เกิน 8 สัปดาห์
3. ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตจวิทยา

13.5 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)

1. Coal tar	ทุก topical dosage form (hosp)	b
-------------	--------------------------------	---

หมายเหตุ

Coal tar หมายถึง Liquor carbonis detergens; LCD

2. Coal tar + Triamcinolone acetonide	cream (hosp) (เฉพาะ 3% + 0.02% หรือ 5% + 0.02%)	b
---------------------------------------	---	---

3.	Salicylic acid	lotion (hosp), oint (hosp), paste (hosp)	b
4.	Dithranol (Anthralin)	paste (hosp), oint (hosp)	b
5.	Methotrexate	tab (as base or sodium)	b

เงื่อนไข

ใช้สำหรับสะเก็ดเงินชนิดปานกลางถึงรุนแรงที่ติดต่อยาอื่น

6.	Methoxsalen ยากำพรั้	tab, cream (hosp) (เฉพาะไม่เกิน 0.1% w/w), topical sol (paint), topical sol (paint) (hosp) (เฉพาะไม่เกิน 0.1% w/w)	s
7.	Acitretin	cap	ex

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับสะเก็ดเงินชนิดปานกลางถึงรุนแรง ที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่นหรือมีข้อห้ามในการใช้ methotrexate
2. ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตจวิทยา สำหรับรักษาโรคผิวหนังเรื้อรังอื่น ๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทั่วไป

คำเตือนและข้อควรระวัง

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และหลังจากหยุดยานี้แล้วให้คุมกำเนิดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี

8.	Calcipotriol	oint	ex
----	--------------	------	----

เงื่อนไข

ใช้ในกรณีที่ตอบสนองหรือเกิดผลข้างเคียงต่อ coal tar หรือ topical steroid

9.	Ciclosporin (Cyclosporin)	cap, oral sol	ex
----	---------------------------	---------------	----

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับสะเก็ดเงินชนิดปานกลางถึงรุนแรง ที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่นหรือมีข้อห้ามในการใช้ methotrexate
2. ใช้สำหรับ atopic dermatitis ชนิดรุนแรง
3. ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตจวิทยา สำหรับรักษาโรคผิวหนังเรื้อรังอื่น ๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทั่วไป

13.6 Preparations for warts and calluses

1.	Lactic acid	cream (hosp) (เฉพาะไม่เกิน 10% w/w)	b
2.	Podophyllin (Podophyllum resin)	paint, paint (hosp)	b
3.	Salicylic acid	oint (hosp), paste (hosp)	b
4.	Silver nitrate	sol (hosp), crystal (hosp), stick (hosp)	b
5.	Trichloroacetic acid	sol (hosp)	b
6.	Salicylic acid + Lactic acid	colloidal sol	b

13.7 Preparations for hyperhidrosis

1.	Aluminium Chloride	sol (hosp) (เฉพาะ 10-30%)	b
----	--------------------	---------------------------	---

กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines

1.	Anti-D immunoglobulin, human ยากำพรั้	inj	b
----	--	-----	---

- | | | | |
|-----|--|--------------------|---|
| 2. | BCG vaccine (Bacillus Calmette-Guérin) | inj | b |
| 3. | Diphtheria antitoxin (DAT)
ยากำพร้า | inj | b |
| 4. | Diphtheria-Tetanus vaccine
ทั้งชนิด DT (children type) และ dT (adult type) | inj | b |
| 5. | Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine
(whole cell) (DTPw) | inj | b |
| 6. | Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B vaccine
(DTP-HB) | inj | b |
| 7. | Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B-Haemophilus
influenzae type b vaccine (DTP-HB-Hib) | inj | b |
| 8. | Recombinant acellular Pertussis vaccine (aP)
ใช้สำหรับการให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ 1 ครั้ง ทุกการตั้งครรภ์ โดยอายุครรภ์ที่ควรได้รับวัคซีน aP ให้เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และกำหนดการให้วัคซีนให้เป็นไปตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข | Inj (เฉพาะ 0.5 ml) | b |
| 9. | Hepatitis B vaccine (HB) | inj | b |
| 10. | Influenza vaccine ชนิดวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ (trivalent)
ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดในแต่ละปี | | b |

เงื่อนไข

- บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
 - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน
 - บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 - หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 - เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
 - ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 - โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ)
 - ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- | | | | |
|-----|--|---------------------|---|
| 11. | Influenza vaccine ชนิด pandemic influenza
สายพันธุ์ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดในแต่ละปี | | b |
| 12. | Measles-Mumps-Rubella vaccine (MMR) | inj | b |
| 13. | Poliomyelitis vaccine, live attenuated (OPV)
ชนิด bivalent และ trivalent | oral sol, oral susp | b |
| 14. | Inactivated polio vaccine (IPV)
(เฉพาะชนิดที่เป็นวัคซีนเดี่ยว) | inj | b |

เงื่อนไข

ใช้ตามโครงการกวาดล้างโปลิโอของประเทศไทย ตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอในระดับโลก

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|---|
| 15. | Rabies immunoglobulin, horse (ERIG) | inj | b |
|-----|-------------------------------------|-----|---|

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 16. | Rabies vaccines | inj | b |
| | ยกเว้นชนิด human diploid cell vaccine (HDCV) | | |

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ post-exposure protection
2. ใช้สำหรับ pre-exposure protection ในประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 17. | Rubella vaccine | inj | b |
| 18. | Tetanus vaccine (Tetanus toxoid) | inj | b |
| 19. | Japanese encephalitis vaccine, inactivated
(inactivated JE vaccine) | inj | b |

หมายเหตุ

ใช้สำหรับผู้ที่มิชอบห้ามใช้ live attenuated Japanese encephalitis vaccine

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 20. | Japanese encephalitis vaccine, live attenuated
(Live Attenuated JE vaccine) | inj | b |
| 21. | Rabies immunoglobulin, human (HRIG) | inj | b |

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับผู้ที่แพ้ rabies immunoglobulin, horse (ERIG)
2. ใช้สำหรับผู้ที่เคยได้รับเซรุ่มที่ทำจากม้ามาก่อน

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 22. | Tetanus antitoxin, human
Anti-tetanus immunoglobulin, human | inj | b |
| 23. | Hepatitis B immunoglobulin, human (HBIG) | inj | s |

เงื่อนไข

ใช้ร่วมกับการฉีด Hepatitis B vaccine เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

1. ทารกแรกเกิดที่มารดามี HBsAg เป็นบวก
2. บุคคลที่ตรวจพบว่า anti-HBs <10 mIU/mL ที่มีผิวหนังหรือเยื่อเมือกสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งที่มี HBsAg เป็นบวก เช่น บุคลากรทางการแพทย์ที่เกิดอุบัติเหตุสัมผัสโรคจากการทำงานตามแนวปฏิบัติของสถานพยาบาลนั้น ๆ หรือผู้ที่ถูกข่มขืน
3. ป้องกันผู้ป่วยจากการกลับเป็นโรคตับอักเสบบีซ้ำหลังจากได้รับการเปลี่ยนตับแล้ว

หมายเหตุ

ในทารกแรกเกิดซึ่งมารดามีอายุครรภ์ปกติ การให้วัคซีนภายใน 24 ชั่วโมง สามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากอยู่แล้ว การให้ HBIG ไม่ทำให้การป้องกันสูงขึ้น

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 24. | Human papillomavirus vaccine ชนิด 4 สายพันธุ์ | inj | b |
|-----|---|-----|---|

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกรมควบคุมโรคและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. เลือก 1 รายการ ระหว่างรายการที่ 25 หรือ 26 ที่จัดซื้อได้ถูกกว่า

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 25. | Human papillomavirus vaccine
ชนิดที่มีสายพันธุ์ก่อโรคน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 | inj | b |
|-----|--|-----|---|

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกรมควบคุมโรคและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. เลือก 1 รายการ ระหว่างรายการที่ 25 หรือ 26 ที่จัดซื้อได้ถูกกว่า

26. Rotavirus vaccine

oral form (for pediatric use)

b

กลุ่มยา 15 Anaesthesia

15.1 General anaesthesia

15.1.1 Intravenous anaesthetics

- | | | |
|---|------------------|---|
| 1. Propofol | sterile emulsion | b |
| 2. Thiopental sodium (Thiopentone sodium) | sterile pwdr | b |
| 3. Etomidate | sterile emulsion | s |

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2

เงื่อนไข

ใช้สำหรับนำสลบ (Induction of general anaesthesia) ในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหัวใจและหลอดเลือด

- | | | |
|---------------------------|-------------|----|
| 4. Ketamine hydrochloride | sterile sol | ex |
|---------------------------|-------------|----|

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2

เงื่อนไข

1. ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับผู้ป่วยที่หาเส้นเลือดสำหรับให้น้ำเกลือไม่ได้
2. ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความดันเลือดต่ำ
3. ใช้ในการระงับความรู้สึกสำหรับการทำหัตถการที่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ
4. ใช้เป็นยาเสริม (adjunct therapy) เพื่อระงับอาการปวดรุนแรง (intractable pain)

15.1.2 Inhalational anaesthetics

- | | | |
|----------------|--------------------------|---|
| 1. Isoflurane | Inhalation vapour liquid | b |
| 2. Sevoflurane | Inhalation vapour liquid | b |
| 3. Desflurane | Inhalation vapour liquid | s |

เงื่อนไข

ใช้เป็นทางเลือกในการให้ยาระงับความรู้สึกในกรณีต่อไปนี้

1. โรคอ้วน (morbidly obese) ที่มีภาวะ obstructive sleep apnea (OSA) ร่วมด้วย
2. โรคอ้วน (morbidly obese) ที่มี Body Mass Index (BMI) ตั้งแต่ 35 kg/m² ขึ้นไป
3. การผ่าตัดซึ่งต้องการให้ผู้ป่วยตื่นเร็ว ได้แก่ ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การผ่าตัดที่ไม่ต้องรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
4. การผ่าตัดสมอง

15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)

- | | | |
|--|---------------------------|---|
| 1. Atracurium besilate | sterile sol | b |
| 2. Cisatracurium besilate | sterile sol | b |
| 3. Pancuronium bromide | sterile sol | b |
| 4. Rocuronium bromide | sterile sol | b |
| 5. Suxamethonium chloride (Succinylcholine chloride) | sterile pwdr, sterile sol | b |
| 6. Vecuronium bromide | sterile pwdr | b |

15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs

- | | | | |
|----|---|-----------------------|---|
| 1. | Diazepam
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 | cap, tab, sterile sol | b |
| 2. | Fentanyl citrate
ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 | sterile sol | b |
| 3. | Morphine sulfate
ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 | sterile sol | b |
| 4. | Pethidine hydrochloride
ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 | sterile sol | b |
| 5. | Midazolam hydrochloride
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 | sterile sol | s |

เงื่อนไข

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 1. | ใช้เสริมยาระงับความรู้สึก | | |
| 2. | ใช้เพื่อให้ผู้ป่วยสงบ คลายความวิตกกังวลทั้งในระยะ ก่อนระหว่างและหลังทำหัตถการ | | |
| 3. | ใช้ระงับชัก | | |
| 6. | Midazolam maleate
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 | tab | s |

เงื่อนไข

ใช้เตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก (premedication) เท่านั้น

- | | | | |
|----|---|---------------------------------------|----|
| 7. | Dexmedetomidine
เงื่อนไข | sterile sol (เฉพาะ 100 mcg/ml) (2 ml) | ex |
| 1. | สำหรับการสงบประสาทและระงับปวดในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (for sedation and analgesia in Intensive Care Unit patients) เฉพาะกรณีผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี หรือมีความเสี่ยงสูงต่อ delirium โดยโรคประจำตัว หรือมีข้อห้ามใช้ยาอื่นในบัญชียาหลักแห่งชาติ | | |
| 2. | สำหรับการสงบประสาทและระงับปวดสำหรับหัตถการทางการแพทย์ (for procedural sedation and analgesia) | | |
| 3. | ใช้ร่วมกับการระงับความรู้สึก ในระหว่างผ่าตัด (for perioperative adjuvant anaesthetic management) | | |

15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anaesthesia

- | | | | |
|----|---------------------------------------|-------------|---|
| 1. | Atropine sulfate
เงื่อนไข | sterile sol | b |
| | ใช้แก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อ | | |
| 2. | Neostigmine methylsulfate
เงื่อนไข | sterile sol | b |
| | ใช้แก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อ | | |
| 3. | Glycopyrronium bromide
เงื่อนไข | sterile sol | s |

เงื่อนไข

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | ใช้เป็นยาทางเลือกแทนยา atropine โดยใช้ร่วมกับยา neostigmine ในการแก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วย สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาหัวใจเต้นเร็ว | | |
| 2. | ใช้ลดเสมหะหรือน้ำลาย ในการดมยาสลบกรณีที่จะทำหัตถการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ | | |
| 3. | ใช้ลดเสมหะในผู้ป่วยระยะสุดท้าย (end-of-life) | | |

- | | | | |
|----|---|--------------------------------------|----|
| 4. | Edrophonium chloride
<i>ยากำพรั้ว</i>
เจ็อนไฮ
ใช้วินิจฉัยโรค myasthenia gravis | sterile sol (เฉพาะ 10 mg/ml) | ex |
| 5. | Sugammadex
เจ็อนไฮ
ใช้แก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ที่ได้รับยา vecuronium หรือยา rocuronium เป็นยาหย่อนกล้ามเนื้อ ได้แก่
1. ผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่
1.1. โรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (เช่น myasthenia gravis, muscular dystrophy ฯลฯ)
1.2. โรคระบบทางเดินหายใจ (เช่น chronic obstructive pulmonary disease, chronic bronchitis, asthma ฯลฯ)
1.3. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวาย หรือผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย
1.4. โรคหัวใจและหลอดเลือด (เช่น ischemic heart disease, heart failure, tachyarrhythmia, valvular heart disease ฯลฯ)
2. การผ่าตัดที่มีระยะเวลายาวนานกว่า 3 ชั่วโมง หรือการผ่าตัดที่คาดการณ์เวลาทำการผ่าตัดเสร็จได้ยาก โดยที่ผู้ป่วยได้รับยา rocuronium เป็นยาหย่อนกล้ามเนื้อ
3. ผู้ป่วยเกิดภาวะ cannot intubate and cannot ventilate (CICV)
4. ใช้แก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในการนำสลบแบบรวดเร็ว (rapid sequence induction intubation) ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาหายใจได้โดยเร็ว | sterile sol (เฉพาะ 100 mg/ml) (2 ml) | ex |

15.1.6 Drugs for malignant hyperthermia

- | | | | |
|----|---|---------------|----|
| 1. | Dantrolene sodium
<i>ยากำพรั้ว</i>
เจ็อนไฮ
ใช้สำหรับ malignant hyperthermia | sterile powdr | ex |
|----|---|---------------|----|

15.2 Local anaesthesia

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Benzocaine | gel, oint | b |
| 2. | Lidocaine hydrochloride | gel, oint, spray, viscous sol,
sterile sol, sterile sol (dental cartridge) | b |
| 3. | Lidocaine + Prilocaine | cream | b |
| 4. | Lidocaine hydrochloride + Epinephrine | sterile sol,
sterile sol (dental cartridge) | b |
| 5. | Mepivacaine hydrochloride | sterile sol (dental cartridge) | b |
| 6. | Mepivacaine hydrochloride + Epinephrine | sterile sol (dental cartridge) | b |
| 7. | Bupivacaine hydrochloride | sterile sol | b |

คำเตือนและข้อควรระวัง

อาจทำให้เกิดพิษต่อหัวใจ

หมายเหตุ

ใช้ในกรณี local infiltration

- | | | | |
|----|--|-------------|---|
| 8. | Bupivacaine hydrochloride with/without glucose | sterile sol | b |
| | คำเตือนและข้อควรระวัง | | |
| | อาจทำให้เกิดพิษต่อหัวใจ | | |
| 9. | Lidocaine hydrochloride + Epinephrine | sterile sol | s |
| | หมายเหตุ | | |
| | ใช้ในกรณี regional anaesthesia | | |

กลุ่มยา 16 Drugs used in poisoning and toxicology

ยาในกลุ่มนี้หลายชนิดไม่ปรากฏเป็นยาในบัญชีนี เนื่องจากเป็นยากำพร้า (orphan drugs) ที่มีปัญหาการจัดหา และไม่มีทะเบียนตำรับยา แต่ควรส่งเสริมให้มีการจัดหาใช้และควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์พิษวิทยา เช่น ศูนย์พิษวิทยา ร.พ.รามาธิบดี โทร.1367 ศูนย์พิษวิทยา ร.พ.ศิริราช โทร.0 2419 7007 คลินิกพิษจากสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร.0 2252 0161-4 ต่อ 125, 130, 131 (ในกรณีฉุกเฉินที่มีพิษกัด)

16.1 Snakebite poisoning

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 1. | Antivenom sera | inj | b |
| | <ul style="list-style-type: none"> - งูเห่า - งูจงอาง - งูสามเหลี่ยม - งูเขียวหางไหม้ - งูแมวเซา - งูกะปะ - งูทับสมิงคลา | | |
| 2. | Polyvalent antivenom for hematotoxin | inj | b |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้แก้พิษต่อระบบเลือดในรายที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัด | | |
| 3. | Polyvalent antivenom for neurotoxin | inj | b |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้แก้พิษต่อระบบประสาทในรายที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัด | | |

16.2 Mushroom and microbial poisoning

- | | | | |
|----|---|---------------------------|----|
| 1. | Acetylcysteine (N-acetylcysteine) | sterile sol | b |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้รักษาภาวะพิษต่อตับจากเห็ดพิษกลุ่มที่มีอะมาทอกซิน (amatoxin containing mushrooms) | | |
| 2. | Vitamin B ₆ (Pyridoxine hydrochloride) | sterile sol (เฉพาะ 50 mg) | s |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้บำบัดพิษจากเห็ดสมองวัว (Gyromitra spp.) | | |
| 3. | Botulinum antitoxin | inj | ex |
| | <i>ยากำพร้า</i> | | |
| | เงื่อนไข | | |
| | ใช้บำบัดโรค Botulism | | |

16.3 Pesticide & herbicide poisoning

1. Atropine sulfate sterile sol b
 เงื่อนไข
 ใช้ต้านพิษ cholinesterase inhibitors (เช่น organophosphates, carbamates) และภาวะ cholinergic crisis
2. Pralidoxime chloride (2-PAM) sterile pwdr b
 เงื่อนไข
 ใช้บำบัดพิษเฉียบพลันจาก organophosphates
3. Cyclophosphamide sterile pwdr s
 เงื่อนไข
 ใช้บำบัดพิษจากสาร paraquat ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์พิษวิทยา

16.4 Corrosive Poisoning

1. Calcium gluconate sterile sol b
 เงื่อนไข
 ใช้บำบัดพิษจาก hydrofluoric acid
 หมายเหตุ
 ให้ฉีดเข้าหลอดเลือดอย่างช้า ๆ การฉีดเร็วอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

16.5 Methanol poisoning

1. Ethanol sterile sol, sterile sol (hosp) b
 เงื่อนไข
 ยากำพร้าเฉพาะรูปแบบ sterile sol
 ใช้บำบัดพิษเฉียบพลันจาก methanol, ethylene glycol และ diethylene glycol
2. Fomepizole sterile sol b
 เงื่อนไข
 ยากำพร้า
 ใช้บำบัดพิษจาก methanol, ethylene glycol และ diethylene glycol ในกรณีที่不能使用 ethanol ได้
3. Calcium folinate (Leucovorin calcium) cap, tab, sterile pwdr, sterile sol ex
 เงื่อนไข
 ใช้ร่วมกับ ethanol ในการบำบัดพิษจาก methanol

16.6 Heavy metal poisoning

1. Deferoxamine mesilate (Desferrioxamine mesilate) sterile pwdr s
 เงื่อนไข
 ใช้กำจัดพิษจากภาวะธาตุเหล็กสูงผิดปกติเฉียบพลัน
 หมายเหตุ
 กรณีใช้กำจัดพิษจากภาวะธาตุเหล็กสูงผิดปกติเรื้อรัง ให้ดูที่กลุ่มยา 9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias

16.9 Drug poisoning

1. Acetylcysteine (N-acetylcysteine) sterile sol b
เจ็อนไฮ
 ใช้แก้พิษจากการได้รับ paracetamol เกินขนาด
2. Benztropine mesilate (Benztropine mesylate) sterile sol b
เจ็อนไฮ
 ใช้บำบัดภาวะ dystonia เนื่องจากยา
3. Calcium gluconate sterile sol b
เจ็อนไฮ
 ใช้บำบัดพิษจาก calcium channel blockers และ beta blockers
หมายเหตุ
 ให้ฉีดเข้าหลอดเลือดอย่างช้า ๆ การฉีดเร็วอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
4. Diphenhydramine hydrochloride cap, sterile sol b
 ยากำพรั้
เจ็อนไฮ
 ใช้บำบัดภาวะ dystonia จากยา
5. Naloxone hydrochloride sterile sol b
เจ็อนไฮ
 ใช้บำบัดอาการพิษเฉียบพลันจากสารกลุ่ม opioids หรือยา clonidine
6. Sodium bicarbonate sterile sol (เฉพาะ 44.6 mEq) b
เจ็อนไฮ
 ใช้บำบัดภาวะ hyperkalemia หรือพิษเฉียบพลันจากสาร tricyclic antidepressants หรือ antiarrhythmics type I
7. Sodium nitroprusside sterile pwdr b
 ยากำพรั้
เจ็อนไฮ
 ใช้เพื่อยายหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยที่เกิด peripheral arterial spasm จากยากลุ่ม ergot
หมายเหตุ
 กรณีใช้รักษา hypertensive emergencies ให้ดูที่กลุ่มยา 2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs
8. Vitamin K₁ (Phytomenadione) sterile sol b
เจ็อนไฮ
 ใช้บำบัดภาวะยา anticoagulants (coumarin derivatives) เกินขนาด
9. Cyproheptadine hydrochloride tab b
เจ็อนไฮ
 ใช้บำบัดภาวะ acute serotonin syndrome
10. Bromocriptine mesilate tab s
เจ็อนไฮ
 ใช้กับผู้ป่วย neuroleptic malignant syndrome

- | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|----|
| 11. | Protamine sulfate | sterile sol | s |
| | เงื่อนไข
ใช้ในกรณีที่มีเลือดออกมากผิดปกติจากการได้รับ heparin เกินขนาด | | |
| 12. | Vitamin B ₆ (Pyridoxine hydrochloride) | sterile sol (เฉพาะ 50 mg) | s |
| | เงื่อนไข
ใช้บำบัดอาการทางสมองและชักที่เกิดจากยา isoniazid | | |
| 13. | Calcium folinate (Leucovorin calcium) | cap, tab, sterile pwdr, sterile sol | ex |
| | เงื่อนไข
1. ใช้บำบัดพิษจากสาร folic acid antagonists, methotrexate, trimethoprim และ pyrimethamine
2. ใช้ป้องกันพิษจาก methotrexate เฉพาะกรณีใช้ยานี้ในขนาดสูง | | |
| 14. | Flumazenil | sterile sol | ex |
| | เงื่อนไข
ใช้แก้ฤทธิ์จากการใช้ยาในกลุ่ม benzodiazepines กรณีการทำหัตถการทางวิสัญญี | | |
| 15. | Mesna | sterile sol | ex |
| | เงื่อนไข
ป้องกันภาวะเลือดออกในทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่ได้รับยา ifosfamide หรือ cyclophosphamide ขนาดสูง (มากกว่า 1.5 g/m ²) | | |
| 16. | Phenobarbital sodium (Phenobarbitone sodium) | sterile pwdr, sterile sol | ex |
| | วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 | | |
| | เงื่อนไข
ใช้บำบัดอาการชักจากยา | | |
| | หมายเหตุ
จัดเป็นบัญชี b เมื่อใช้ในผู้ป่วย status epilepticus ดูข้อ 4.8.2 Drugs used in status epilepticus | | |

16.10 Drugs used for absorption inhibition and elimination of toxin

- | | | | |
|----|---|------------------------------|---|
| 1. | Bentonite | susp (hosp) | b |
| 2. | Charcoal, activated | pwdr | b |
| | เงื่อนไข
ใช้ดูดซับสารพิษทั่วไปที่ได้รับในทางเดินอาหาร | | |
| 3. | Macrogols (Polyethylene glycol, PEG) with electrolytes | oral pwdr, oral pwdr (hosp) | b |
| | เงื่อนไข
ใช้ทำหัตถการล้างกระเพาะและลำไส้ (whole bowel irrigation) กรณีได้รับสารพิษ หรือลำไส้พอง กรณีสัมผัส phenol | | |
| 4. | Sodium bicarbonate | sterile sol (เฉพาะ 44.6 mEq) | b |
| | เงื่อนไข
ใช้ปรับปัสสาวะให้เป็นด่าง เพื่อเร่งการกำจัดสารพิษ เช่น salicylates เป็นต้น | | |

กลุ่มยา 17 Contrast media and Radiopharmaceuticals

17.1 Water soluble iodinated contrast media

17.1.1 Water soluble non-ionic iodinated contrast media for intravascular administration

17.1.1.1 กรณีทั่วไป

1. lopamidol sterile sol (เฉพาะ 300 mg/ml) ex
(50 ml, 100 ml)

เงื่อนไข

ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือด เช่น intravenous pyelography หรือ excretory urography การตรวจทางด้านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) การตรวจ angiography การตรวจและรักษาทาง interventional radiology เป็นต้น

คำแนะนำ

ให้เลือกใช้รายการใดรายการหนึ่งเป็นหลัก ถ้าผู้ป่วยแพ้รายการใดรายการหนึ่ง สามารถใช้อีกรายการแทนได้

2. lopromide sterile sol (เฉพาะ 300 mg/ml) ex
(50 ml, 100 ml)

เงื่อนไข

ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือด เช่น intravenous pyelography หรือ excretory urography การตรวจทางด้านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) การตรวจ angiography การตรวจและรักษาทาง interventional radiology เป็นต้น

คำแนะนำ

ให้เลือกใช้รายการใดรายการหนึ่งเป็นหลัก ถ้าผู้ป่วยแพ้รายการใดรายการหนึ่ง สามารถใช้อีกรายการแทนได้

17.1.1.2 กรณีตรวจ cardiovascular system และกรณีสงสัย hypervascular tumor

1. lopamidol sterile sol (เฉพาะ 370 mg/ml) ex
(50 ml, 100 ml)

เงื่อนไข

ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือด สำหรับการตรวจ cardiovascular system และกรณีสงสัย hypervascular tumor

คำแนะนำ

ให้เลือกใช้รายการใดรายการหนึ่งเป็นหลัก ถ้าผู้ป่วยแพ้รายการใดรายการหนึ่ง สามารถใช้อีกรายการแทนได้

2. lopromide sterile sol (เฉพาะ 370 mg/ml) ex
(50 ml, 100 ml)

เงื่อนไข

ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือด สำหรับการตรวจ cardiovascular system และกรณีสงสัย hypervascular tumor

คำแนะนำ

ให้เลือกใช้รายการใดรายการหนึ่งเป็นหลัก ถ้าผู้ป่วยแพ้รายการใดรายการหนึ่ง สามารถใช้อีกรายการแทนได้

17.1.2 Water soluble non-ionic iodinated contrast media for intra-cavitary administration

1. lopamidol sterile sol (เฉพาะ 300 mg/ml) ex
(50 ml, 100 ml)

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ intracavitary เช่น hysterosalpingography (HSG), urethrography, voiding cysto-urethrography เป็นต้น

คำแนะนำ

ให้เลือกใช้รายการใดรายการหนึ่งเป็นหลัก ถ้าผู้ป่วยแพ้รายการใดรายการหนึ่ง สามารถใช้อีกรายการแทนได้

2. Iopromide sterile sol (เฉพาะ 300 mgI/ml) ex
(50 ml, 100 ml)

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ intracavitary เช่น hysterosalpingography (HSG), urethrography, voiding cysto-urethrography เป็นต้น

คำแนะนำ

ให้เลือกใช้รายการใดรายการหนึ่งเป็นหลัก ถ้าผู้ป่วยแพ้รายการใดรายการหนึ่ง สามารถใช้อีกรายการแทนได้

17.1.3 Water soluble non-ionic iodinated contrast media for myelography

1. Iopamidol sterile sol (เฉพาะ 300 mgI/ml) ex
(50 ml, 100 ml)

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ myelography

17.2 Non-iodinated gastrointestinal X-ray contrast media

1. Barium sulfate powdr for oral susp b

หมายเหตุ

ต้องเป็น Barium sulfate ที่ใช้ในทางการแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเท่านั้น

17.3 Magnetic resonance contrast media

1. Meglumine gadoterate sterile sol (เฉพาะ 377 mg/ml ex
(0.5 mmol/ml)) (10 ml, 20 ml)
for intravascular or intraarticular

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ Magnetic resonance imaging (MRI)

คำเตือนและข้อควรระวัง

ควรระมัดระวังการใช้นี้ ในผู้ป่วยที่มี Estimated glomerular filtration rate (eGFR) ต่ำกว่า 15 ml/min/1.73 m² และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยวิธีการบำบัดทดแทนไต ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) หรือวิธีการล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal dialysis)

17.4 Drug use for interventional radiology

1. Ethiodized oil (Iodized oil fluid injection) sterile sol (เฉพาะ 4.8 g iodine) ex
(Iodine 38% w/w)

เงื่อนไข

1. ใช้ผสมกับยาเคมีบำบัด สำหรับการทำให้ transarterial chemoembolization (TACE) เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งระดับ (hepatocellular carcinoma) และใช้โดยรังสีแพทย์
2. ใช้ผสมกับ cyanoacrylate glue สำหรับการทำให้หลอดเลือด endovascular treatment เพื่อการอุดหลอดเลือด โรคหลอดเลือดผิดปกติและโรคภัยอันตรายของหลอดเลือดของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง

17.5 Radiopharmaceuticals

1. Tc-99m dextran sterile sol for inj (hosp) ex
เงื่อนไข
 ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคการอุดตันของระบบทางเดินน้ำเหลือง (lymphatic obstruction)
2. Tc-99m diethylene triamine penta acetic acid (DTPA) sterile sol for inj (hosp),
aerosol for inhalation (hosp) ex
เงื่อนไข
 1. ใช้เพื่อกำหนดค่า glomerular filtration rate (GFR)
 2. ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจ (ventilation lung scan)
3. Tc-99m dimercaptosuccinic acid (DMSA) sterile sol for inj (hosp) ex
เงื่อนไข
 1. ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคการอักเสบและแผลเป็นของเนื้อไต
 2. ใช้ประเมินการทำงานของไต
4. Tc-99m dimercaptosuccinic acid V (DMSA [V]) sterile sol for inj (hosp) ex
เงื่อนไข
 ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค medullary thyroid cancer
5. Tc-99m iminodiacetic acid (IDA) sterile sol for inj (hosp) ex
เงื่อนไข
 ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินน้ำดี
6. Tc-99m methylene diphosphonate (MDP) sterile sol for inj (hosp) ex
เงื่อนไข
 ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคกระดูกและข้อ
7. Tc-99m phytate sterile sol for inj (hosp) ex
เงื่อนไข
 1. ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคตับและม้าม
 2. ใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร
 3. ใช้เพื่อการวินิจฉัย
 - 3.1 ภาวะหลอดเลือดดำที่ขาอุดตัน
 - 3.2 ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร (gastrointestinal bleeding)
8. Tc-99m sulfur colloid sterile sol for inj (hosp) ex
เงื่อนไข
 1. ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค reticuloendothelial system
 2. ใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร
 3. ใช้เพื่อการวินิจฉัยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร (gastrointestinal bleeding)

หมายเหตุ อักษรย่อ

cap	=	capsule	mixt	=	mixture
COPD	=	chronic obstructive pulmonary disease	mg	=	milligram
DPI	=	dry powder inhaler	ml	=	milliliter
EC	=	enteric coated	mmol	=	millimole
g	=	gram	mOsm	=	milliosmole
GnRH	=	gonadotrophin-releasing hormone	oint	=	ointment
hosp	=	hospital formulary (เภสัชตำรับโรงพยาบาล)	pwdr	=	powder
inj	=	injection	sol	=	solution
IM	=	intramuscular	SR	=	ยาออกฤทธิ์นาน
IU	=	International unit	supp	=	suppository
mcg	=	microgram	susp	=	suspension
MDI	=	metered dose inhaler	syr	=	syrup
mEq	=	milliequivalent	tab	=	tablet
			U	=	unit
			USP	=	United States Pharmacopeia

ภาคผนวก 2

ตัวอย่างสูตรตำรับรายการยาเภสัชตำรับโรงพยาบาล (ที่เป็นยาแผนปัจจุบัน) และสารช่วยในเภสัชตำรับโรงพยาบาล

หมายเหตุ สูตรตำรับรายการยาเภสัชตำรับโรงพยาบาลต้องเป็นสูตรที่มีสารออกฤทธิ์ (active ingredients) อยู่ในระดับการรักษา (therapeutic dose) สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ทั้งนี้สามารถเพิ่มสารอื่น ๆ (excipients) ในสูตรตำรับได้ตามความเหมาะสม

1. สูตรตำรับยาของเภสัชตำรับโรงพยาบาล

CREAMS		
Betamethasone Dipropionate Cream (0.05%w/w of betamethasone)		
	Betamethasone Dipropionate	0.0643 g
	(equivalent to Betamethasone 0.05 g)	
	Non-ionic Buffered Cream Base q.s.	100.00 g
Group :	13.4 Topical Corticosteroids	
Betamethasone Valerate Cream (0.1%w/w of betamethasone)		
	Betamethasone Valerate (equivalent to Betamethasone 0.1g)	0.1214 g
	Non-ionic Buffered Cream Base q.s.	100.00 g
Group :	13.4 Topical Corticosteroids	
Hydrocortisone Acetate Cream (1%w/w of Hydrocortisone acetate)		
	Hydrocortisone Acetate	1.00 g
	Non-ionic Buffered Cream Base q.s.	100.00 g
Group :	13.4 Topical Corticosteroids	
Methyl Salicylate Cream Compound		
	Methyl Salicylate	15.00 ml
	Menthol	6.00 g
	Eugenol	2.00 ml
	Cajuput Oil	1.20 ml
	Turpentine Oil	1.50 ml
	Cetyl Alcohol	1.75 g
	Stearyl Alcohol	1.75 g
	Glyceryl Stearate and PEG-100 Stearate mixture (Aracel® 165)	2.00 g
	White Beeswax (White Wax)	2.00 g
	Liquid Paraffin	2.00 ml
	Carbomer 940	0.80 g
	Propylene Glycol	5.00 ml
	Sodium Lauril Sulfate (Sodium Lauryl Sulfate)	1.00 g
	Triethanolamine q.s.	
	Preservatives q.s.	
	Purified Water q.s.	100.00 g
Group :	10.3 Drugs for the relief of soft-tissue inflammation	

Prednisolone Cream

	Prednisolone	0.50 g
	Non-ionic Buffered Cream Base q.s.	100.00 g
Group :	13.4 Topical Corticosteroids	

Sulfadiazine Silver (Silver Sulfadiazine) Cream

	Sulfadiazine Silver	1.00 g
	Carbomer 940	0.30 g
	Triethanolamine	0.30 ml
	Propylene Glycol	2.50 ml
	Cetyl Alcohol	7.00 g
	Liquid Paraffin	23.50 ml
	Polysorbate 80	6.50 ml
	Wool Fat	1.00 g
	Paraben Conc	1.00 ml
	Purified Water q.s.	100.00 g
Group :	13.1.1 Antibacterial Preparations	

Triamcinolone Acetonide Cream

	Triamcinolone Acetonide	0.02 หรือ 0.10 g
	Non-ionic Buffered Cream Base q.s.	100.00 g
Group :	13.4 Topical Corticosteroids	

Urea Cream

	Urea	5.00-40.00 g
	Non-ionic Buffered Cream Base q.s.	100.00 g
Group :	13.2 Emollient and Barrier Preparations	

EAR DROPS

Sodium Bicarbonate Ear Drop

	Sodium Bicarbonate	5.00 g
	Glycerol (Glycerin)	30.00 ml
	Purified Water q.s.	100.00 ml
Group :	12.1 Drugs Acting on the Ear	
Note :	ยานี้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส จะมีอายุไม่เกิน 4 สัปดาห์ หลังเตรียมยา	

ELIXIRS

Potassium Chloride Elixir

Potassium Chloride	10.00 g
Ethyl Alcohol 95%	3.20 ml
Aspartame	0.03 g
Cream Soda	0.03 ml
Edicol Apple Green 1%	0.3 ml
Simple Syrup	50.00 ml
Paraben Conc	1.00 ml
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 9.2 Fluids and Electrolytes

Note : 15 ml ประกอบด้วย Potassium 20 mEq

LOTIONS

Benzyl Benzoate Lotion

Benzyl Benzoate	25.00 g
Emulsifying Wax B.P.	2.00 g
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 13.1.3 Parasiticial Preparations

Calamine Lotion

Calamine, in fine powder	15.00 g
Zinc Oxide, in fine powder	5.00 g
Bentonite	3.00 g
Sodium Citrate	0.50 g
Glycerol (Glycerin)	5.00 ml
Flavouring Agent q.s.	
Purified Water q.s.	100.00 ml
ในตำรับอาจเพิ่ม	
Liquified Phenol	0.50 g
Camphor	0.10 g
Menthol	0.10 g

Group : 13.3 Topical Antipruritics

Salicylic Acid Lotion

Salicylic Acid	3.00 g
Ethyl Alcohol 95%	25.00 ml
Purified Water	25.00 ml
Propylene Glycol q.s.	100.00 ml

Group : 13.5 Other Preparations for Psoriasis (excluding Topical Corticosteroids)

Note : อาจเติม Lactic acid, Urea อย่างละ 1 % และยานี้จะมีอายุไม่เกิน 4 สัปดาห์
หลังเตรียมยา

Triamcinolone Acetonide Lotion

Triamcinolone Acetonide	0.10 g
Lactic Acid	10.00 ml
Acetone	1.00 ml
Ethyl Alcohol 95%	5.00 ml
Propylene Glycol	50.00 ml
Paraben Conc	1.00 ml
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 13.4 Topical Corticosteroids

Zinc Sulfate Lotion

Synonyms : White Lotion

Zinc Sulfate	4.00 g
Sulfurated Potash	4.00 g
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 13.2 Emollient and Barrier Preparations

Note : - เขย่าขวดก่อนใช้
- ยานี้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส จะมีอายุไม่เกิน 4 สัปดาห์
หลังเตรียมยา

MIXTURES

Ammonium Carbonate and Senega Mixture

Ammonium Carbonate	0.80 g
Ipecacuanha Tincture	2.00 ml
Senega Tincture	6.66 ml
Methyl Hydroxybenzoate (Methylparaben)	0.10 g
Propyl Hydroxybenzoate (Propylparaben)	0.02 g
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 3.6.2 Expectorant and Demulcent Cough Preparations

Note : ก่อนจ่ายยาให้เจือจางด้วยน้ำเชื่อมในอัตราส่วน 1 : 1

Compound Cardamom Mixture

Synonyms : Compound Cardamom Mixture ; Mist Carminative

Compound Cardamom Tincture	1.20 ml
Capsicum Tincture (Capsic Tincture)	0.40 ml
Ginger Tincture	0.80 ml
Camphor	0.20 ml
Ethyl Alcohol 95%	13.45 ml
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 1.1 Antacids and Other Drugs for Dyspepsia

Magnesium Sulfate Mixture

Synonyms : Mist. Alba ; White Mixture

Magnesium Sulfate	40.00 g
Light Magnesium Carbonate	5.00 g
Peppermint Spirit	2.50 ml
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 1.6 Laxatives

Note : - รมั้ดระวังการใ้ในผู้ป่วยโรคไตและตับ
- ยานี้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส จะมีอายุไม่เกิน 4 สัปดาห์
หลังเตรียมยา

Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound

Synonyms : Brown Mixture ; Mist. Tussis

Glycyrrhiza Fluidextract	12.00 ml
Antimony Potassium Tartrate	24.00 mg
Camphorated Opium Tincture	12.00 ml
Glycerol (Glycerin)	12.00 ml
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 3.6.1 Cough Suppressants

Squill and Ammonia Mixture

Ammonium Carbonate	2.00 g
Squill Tincture	3.40 ml
Camphorated Opium Tincture	13.33 ml
Senega Tincture	12.00 ml
Syrup	6.70 ml
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 3.6.1 Cough Suppressants

NASAL DROPS

Ephedrine Hydrochloride Nasal Drop

Ephedrine Hydrochloride	0.50-3.00 g
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 12.2.2 Topical Nasal Decongestants

Note : ยานี้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส จะมีอายุไม่เกิน 4 สัปดาห์
หลังเตรียมยา

OINTMENTS

Benzoic Acid and Salicylic Acid Ointment

Synonyms : Whitfield's Ointment

Benzoic Acid, fine powder	6.00 g
Salicylic Acid, in fine powder	3.00 g
Hydrophilic Ointment Base q.s.	100.00 g

Group : 13.1.2 Antifungal Preparations

Coal Tar Ointment

Coal Tar	3.00-5.00 g
Polysorbate 80	0.50 g
Hydrophilic Ointment Base q.s.	100.00 g

Group : Other Preparations for Psoriasis (Excluding Topical Corticosteroids)

Dithranol (Anthralin) Ointment

Dithranol	0.10-1.00 g
Lassar's Paste q.s.	100.00 g

Lassar's Paste

Zinc Oxide	24.00 g
Corn Starch	24.00 g
Salicylic Acid	1.00 g
White Soft Paraffin	50.00 g

Group : Other Preparations for Psoriasis (Excluding Topical Corticosteroids)

Methyl Salicylate Ointment Compound

Synonyms : Analgesic Balm

Methyl Salicylate	25.00 ml
Hard Paraffin	15.20 g
White Beeswax (White Wax)	7.00 g
White Vaseline	33.00 g
Menthol	10.00 g
Camphor	5.00 g
Peppermint Oil	0.45 g
Eucalyptus Oil	2.75 g
Clove Oil	0.10 g
Capsicum Tincture (Capsic Tincture)	1.50 g

Group : 10.3 Drugs for the relief of soft-tissue inflammation

Nitrofur (Nitrofurazone) Ointment

Synonyms : Nitrofurazone Soluble Dressing

Nitrofurazone	0.20 g
Polyethylene Glycol 400	66.60 ml
Polyethylene Glycol 4000	33.30 g

Group : 5.6 Antiseptics

Salicylic Acid Ointment

Salicylic Acid	3.00-5.00 g
Hydrophilic Ointment Base q.s.	100.00 g

Group : 13.6 Preparations for Warts and Calluses

Sulfur (Sulphur) Ointment

Precipitated Sulfur	6.00-10.00 g
Luquid paraffin (Mineral Oil)	10.00 ml
White Ointment q.s.	100.00 g

White Ointment

White Beeswax (White Wax)	5.00 g
White Soft Paraffin	95.00 g

Group : 13.1.3 Parasiticial Preparations

Urea Ointment

Urea	20.00-40.00 g
Hydrophilic Ointment Base q.s.	100.00 g

Group : 13.2 Emollient and Barrier Preparations

PAINTS

Iodine Paint, Compound

Synonyms : Mandl's Paint

Iodine	1.25 g
Potassium Iodide	2.50 g
Purified Water	2.50 ml
Peppermint Oil	0.40 ml
Glycerol (Glycerin) q.s.	100.00 ml

Group : 12.3.1 Oropharyngeal Antiseptics

Podophyllin Paint (Podophyllum Resin)

Synonyms : Podophyllin Paint, Compound

Podophyllum Resin	10.00-25.00 g
Compound Benzoin Tincture q.s.	100.00 ml

Group : 13.6 Preparations for Warts and Calluses

PASTES

Salicylic Acid Paste

Salicylic Acid	3.40 g
Glycerol (Glycerin)	5.00 g
Zinc Oxide, fine powder	25.00 g
Starch	25.00 g
White Soft Paraffin q.s.	100.00 g

Group : 13.6 Preparations for Warts and Calluses

Zinc Oxide Paste

Zinc Oxide , fine powder	25.00 g
Starch , fine powder	25.00 g
White Soft Paraffin q.s.	100.00 g

Group : 13.2 Emollient and Barrier Preparations

POWDERS

Macrogl Oral Powder

Synonyms : Polyethylene Glycol ; PEG Lavage

Polyethylene Glycol 4000	5.50 g
Potassium Chloride	0.07 g
Sodium Chloride	0.15 g
Sodium Bicarbonate	0.17 g
Sodium Sulfate	0.57 g

Group : 1.6 Laxatives

Note : ผสมน้ำ 100 ml

Oral Rehydration Salts

Synonyms : O.R.S.

Sodium Chloride	2.60 g
Trisodium Citrate Dihydrate	2.90 g
Potassium Chloride	1.50 g
Glucose	13.50 g

Group : 1.4 Drugs Used in Acute Diarrhoea

Note : เป็นสูตรเตรียมผงเกลือแร่สำหรับผสมน้ำ 1 ลิตร เมื่อผสมน้ำ 1 ลิตรแล้วจะมี
Glucose 75 mEq, Sodium 75 mEq (mmol), Chloride 65 mEq (mmol),
Potassium 20 mEq (mmol), Citrate 10 mEq (mmol),
Osmolarity 245 mOsm

SCRUBS

Povidone-Iodine Scrub

Povidone-iodine	7.50 g
Sodium Lauril Sulfate (Sodium Lauryl Sulfate) (LZV)	20.00 g
Cocamide DEA	3.00 ml
Isopropyl Myristate	0.75 ml
Propylene Glycol	1.50 ml
Sodium Chloride	0.25 g
Preservative q.s.	
Citric Acid q.s. to pH 4.5-5.0	
EDTA	0.075 g
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 5.6 Antiseptics

SHAMPOOS

Tar Shampoo

Coal Tar Solution	5.00 ml
Shampoo Base q.s.	100.00 ml

Shampoo Base

Sodium Lauryl Ether Sulfate	20.00 gm
Sodium Lauril Sulfate (Sodium Lauryl Sulfate) Needle	20.00 gm
EDTA	0.10 gm
Polysorbate 80	1.00 ml
Cocamidopropyl Betaine	4.00 ml
Cocamide diethanolamide (Cocamide DEA)	4.00 ml
Polyethylene Glycol 400	4.00 ml
Propylene Glycol	3.00 ml
Glycerol (Glycerin)	3.00 ml
Panthenol (D-panthenol)	0.20 ml
Sodium Chloride	2.00 gm
Methyl Hydroxybenzoate (Methylparaben)	0.10 gm
Propyl Hydroxybenzoate (Propylparaben)	0.02 gm
Citric Acid q.s. to pH 4.5-5.5	
Deionized Water q.s.	100.00 ml

Group : 13.5 Other Preparations for Psoriasis (Excluding Topical Corticosteroids)

Note : อาจเติม Salicylic Acid 3.0% ได้

SOLUTIONS

Aluminium Acetate Solution

Synonyms : Burow's Solution

Aluminium Subacetate Solution 54.50 ml

Glacial Acetic Acid 1.50 ml

Purified Water q.s. 100.00 ml

Aluminium Subacetate Solution

Aluminium Sulfate 14.50 g

Acetic Acid 16.00 ml

Precipitated Calcium Carbonate 7.00 g

Purified Water q.s. 100.00 ml

ในตำรับอาจมี Boric Acid 0.90 g

Group : 13.2 Emollient and Barrier Preparations

Note : ก่อนใช้ให้เจือจางด้วยน้ำ 1:10 - 1:40

Cloral Hydrate Oral Solution

Synonyms : Chloral Hydrate Oral Solution; Chloral Hydrate Mixture, Pediatric

Cloral Hydrate (Chloral hydrate) 10.00 g

Citric Acid, Monohydrate 0.75 g

Paraben Conc 1.00 ml

Glycerol (Glycerin) 10.00 ml

Purified Water 20.00 ml

Color, Flavor q.s.

Simple Syrup q.s. 100.00 ml

Group : 4.1 Hypnotics and Anxiolytics

Storage : ควรใช้ภายใน 3 เดือน เมื่อเก็บยาที่อุณหภูมิห้อง

Note : ข้อห้ามใช้ 1. Hypersensitivity 2. Severe hepatic impairment 3. Severe renal impairment
4. gastritis

Copper Sulfate Sterile Solution

Copper (II) sulfate ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 0.157 g

Distilled Water q.s. 100.00 ml

Group : 9.5 Minerals

Ethyl Alcohol Solution

Synonyms : Ethyl Alcohol 70%

Ethyl Alcohol 95% 73.70 ml

Purified Water q.s. 100.00 ml

Group : 5.6 Antiseptics

Note : ควรแต่งสีด้วย Brilliant Blue

Glycerol Oral Solution

Glycerol (Glycerin)	50.00 ml
Peppermint Spirit, Color q.s.	
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 11.4 Drugs for Treatment of Glaucoma

Intraperitoneal Dialysis Solution (Isotonic Solution) (1.5% Dextrose in Dialysis)

Dextrose, anhydrous	15.00 g
Sodium Chloride	5.56 g
Sodium Acetate	4.49 g
Calcium Chloride	0.257 g
Magnesium Chloride	0.05-0.10 g
Sodium Metabisulfite	0.01 g
Water for Injection q.s.	1000.00 ml

Group : Fluids and Electrolytes

Intraperitoneal Dialysis Solution (2.5% Dextrose in Dialysis)

Anhydrous Dextrose	25.00 g
Sodium Chloride	5.56 g
Sodium Lactate	4.49 g
Calcium Chloride	0.257 g
Magnesium Chloride	0.05-0.10 g
Sodium Metabisulfite	0.01 g
Water for Injection q.s.	1000.00 ml

Group : Fluids and Electrolytes

Intraperitoneal Dialysis Solution (4.25% Dextrose in Dialysis)

Anhydrous Dextrose	42.50 g
Sodium Chloride	5.56 g
Sodium Lactate	4.49 g
Calcium Chloride	0.257 g
Magnesium Chloride	0.05-0.10 g
Sodium Metabisulfite	0.01 g
Water for Injection q.s.	1000.00 ml

Group : 9.2 Fluids and Electrolytes

Lugol's Solution

Synonyms : Aqueous Iodine Oral Solution , Strong Iodine Solution

Iodine	5.00 g
Potassium Iodide	10.00 g
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 6.2.2 Antithyroid Drugs

Magnesium Sulfate Solution

Synonyms : Saturated Magnesium Sulfate Solution

Magnesium Sulfate	50.00 g
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 1.6 Laxatives

Note : ยานี้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส จะมีอายุไม่เกิน 4 สัปดาห์
หลังเตรียมยา

Neutral Phosphate Oral Solution

Dibasic Sodium Phosphate (Disodium Hydrogen Phosphate)	0.539 g
Potassium Dihydrogen Phosphate	1.30 g
Monobasic Sodium Phosphate Dihydrate (Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate)	0.297 g
Glycerol (Glycerin)	5.00 ml
Simple Syrup	40.00 ml
Paraben Conc	1.00 ml
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 9.5 Minerals

Note : 5 ml ประกอบด้วย Sodium, Potassium อย่างละ 0.475 mEq และ Phosphate 0.95 mEq

Potassium Acetate Sterile Solution

Potassium Acetate	2.95 g
Water for Injection q.s	10.00 ml

Group : 9.2 Fluids and Electrolytes

Note : - 5 ml ประกอบด้วย Potassium 15 mEq
- ควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยโรคหัวใจ
- ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่การทำงานของไตบกพร่องและมีอาการปัสสาวะน้อย ไม่มีปัสสาวะ ภาวะเลือดคั่ง
ไนโตรเจน (Azotemia) Addison's Disease ภาวะที่มีโพแทสเซียมในเลือดสูง
- ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับ Potassium-sparing Diuretics
- ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำควรให้ช้า ๆ เพราะถ้าความเข้มข้นของโพแทสเซียมในเลือดสูง จะมีผล
ต่อการทำงานของหัวใจ ภาวะ Peripheral และ Pulmonary Edema

Potassium Citrate Oral Solution

Potassium Citrate	6.60 g
Orange Powder	0.005 g
Paraben Conc	1.00 ml
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 7.4.3 Drugs Used in Alkalinisation of Urine และ 9.2 Fluids and Electrolytes

Povidone-Iodine Solution

Povidone-Iodine	10.00 g
Propylene Glycol	0.25 ml
Polyethylene Glycol 400	0.50 ml
Dibasic Sodium Phosphate (Sodium Phosphate, Disodium Phosphate)	1.32 g
Citric Acid	0.92 g
Cetomacrogol 1000 หรือ Nonoxinol 9	0.02 g
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 5.6 Antiseptics

Note : ยามี pH = 4-5

Saturated Solution of Potassium Iodide Oral Solution (SSKI)

Potassium Iodide	100.00 g
Sodium Thiosulfate	0.05 g
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 6.2.2 Antithyroid Drugs

Sodium Acetate Sterile Solution

Sodium Acetate	4.07 g
Water for Injection q.s	10.00 ml

Group : 9.2 Fluids and Electrolytes

Note : - 5 ml ประกอบด้วย Sodium 20 mEq
- ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตสูง การทำงานของไตบกพร่อง
ภาวะ Peripheral และ Pulmonary Edema

Sodium Citrate and Citric Acid Oral Solution

Synonyms : Shohl's solution

Methyl Hydroxybenzoate (Methylparaben)	0.035 g
Propyl Hydroxybenzoate (Propylparaben)	0.025 g
Ethyl Alcohol 95%	1.50 ml
Sucrose	5.00 g
Sodium Citrate dihydrate	10.00 g
Citric Acid anhydrous	6.00 g
Lemon Oil q.s.	
Color q.s.	
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 7.4.3 Drugs Used in Alkalinisation of Urine

Note : 5 ml ประกอบด้วย Sodium 5 mEq ซึ่งให้ bicarbonate ประมาณ 5 mEq

Sodium Citrate and Potassium Citrate Oral Solution

Sodium Citrate	24.80 g
Potassium Citrate	27.20 g
Propylene Glycol	10.00 ml
Simple Syrup	20.00 ml
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 7.4.3 Drugs Used in Alkalinisation of Urine

Note : 5 ml ประกอบด้วย Sodium, Potassium อย่างละ 12.65 mEq

Sodium Thiosulfate Solution

Sodium Thiosulfate	20.00 g
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 13.1.2 Antifungal Preparations

Note : ยานี้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส จะมีอายุไม่เกิน 4 สัปดาห์
หลังเตรียมยา

Tincture of Iodine Solution (Iodine in Alcohol)

Synonyms : Weak Iodine Solution ; Iodine Tincture

Iodine	2.50 g
Potassium Iodine	2.50 g
Purified Water	2.50 ml
Ethyl Alcohol 95% q.s.	100.00 ml

Group : 5.6 Antiseptics

Trace Element Solution (Oral Solution)

Zinc Sulfate ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)	5.719 g
Manganese sulfate ($\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)	0.923 g
Copper (II) sulfate pentahydrate ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)	0.707 g
Potassium Iodine (KI)	0.026 g
Chromic Trichloride ($\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)	0.012 g
Sodium Molybdate ($\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	0.008 g
Cobalt (II) sulfate Heptahydrate ($\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)	0.008 g
Distilled Water q.s.	1000.00 ml

Group : 9.5 Minerals

Note : Distilled Water ที่ใช้เตรียมยา กลุ่ม Minerals ต้องปราศจาก Minerals

Zinc Sulfate Sterile Solution

Zinc Sulfate ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)	0.44 g
Distilled Water q.s.	100.00 ml

Group : 9.5 Minerals

SPIRITS

Aromatic Ammonia Spirit

Ammonium Carbonate	3.20 g
Ammonia Solution 30%	3.50 ml
Lemon Oil	1.00 ml
Lavender Oil	0.10 ml
Ethyl Alcohol 95%	70.00 ml
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 3.8 Other respiratory preparations

SUSPENSIONS

Aluminium Hydroxide and Magnesium Hydroxide Suspension

Synonyms : Alumina and Magnesia Oral Suspension

Aluminium Hydroxide Compressed Gel equivalent to Aluminium Oxide	3.56 g
Magnesium Hydroxide Paste equivalent to Magnesium Hydroxide	1.80 g
Sorbitol Solution 70%	10.00 ml
Syrup U.S.P.	5.00 ml
Paraben Conc	1.00 ml
Peppermint Oil q.s.	
Color q.s.	
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 1.1 Antacids and Other Drugs for Dyspepsia

Note : ให้มีส่วนประกอบ $\text{Al}_2\text{O}_3 = 3.1\text{-}4.0\%$ w/w , $\text{Mg}(\text{OH})_2 = 1.4\text{-}2.2\%$ w/w

Aluminium Hydroxide Suspension

Synonyms : Aluminium Hydroxide Gel ; Colloidal Aluminium Hydroxide ;
Aluminium Hydroxide Mixture

Aluminium Hydroxide Paste equivalent to Aluminium Oxide	4.00 g
Glycerol (Glycerin)	9.33 ml
Sorbitol Solution	5.00 ml
Peppermint Oil	0.026 ml
Methyl Hydroxybenzoate (Methylparaben)	0.10 g
Propyl Hydroxybenzoate (Propylparaben)	0.02 g
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia และ 9.5 Minerals

Note : ปรับความหนืดด้วย Suspending Agent ตามความเหมาะสม

Bentonite Magma Suspension

Synonyms : Bentonite Magma

Bentonite	7.00 g
Glycerol (Glycerin)	20.00 ml
Paraben Conc	1.00 ml
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 16. Antidotes

Note : ยานี้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส จะมีอายุไม่เกิน 4 สัปดาห์
หลังเตรียมยา

Magnesium Hydroxide Suspension

Synonyms : Milk of Magnesia

Magnesium Hydroxide	7.50 g
Glycerol (Glycerin)	9.33 ml
Sorbitol Solution	5.00 ml
Peppermint oil	0.026 ml
Methyl Hydroxybenzoate (Methylparaben)	0.10 g
Propyl Hydroxybenzoate (Propylparaben)	0.02 g
Citric Acid	0.10 g
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 1.1 Antacids and Other Drugs for Dyspepsia , 1.6 Laxatives และ 9.5 Minerals

Note : ปรับความหนืดด้วย Suspending Agent ตามความเหมาะสม

Mebendazole Suspension

Mebendazole	2.00 g
Carboxymethyl Cellulose Sodium (medium viscosity grade)	1.00 g
Citric Acid	0.30 g
Sorbitol Solution	10.00 ml
Syrup	12.00 ml
Paraben Conc	1.00 ml
Flavouring Agent q.s.	
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 5.5 Anthelmintics

Note : แต่งสีและกลิ่นได้ตามที่เห็นเหมาะสม

SYRUPS

Acetaminophen (Paracetamol) Syrup

Synonyms : Acetaminophen (Paracetamol) Syrup, Pediatric

Acetaminophen (Paracetamol)	24.00 g
Polyethylene Glycol 1500	75.00 g
Glycerol (Glycerin)	150.00 ml
EDTA	0.10 g
Methyl Hydroxybenzoate (Methylparaben)	1.00 g
Propyl Hydroxybenzoate (Propylparaben)	0.20 g
Syrup	400.00 ml
Sorbitol Solution 70%	100.00 ml
Citric Acid	0.30 g
Sodium Citrate	1.00 g
Sodium Chloride	0.20 g
Color, Flavor q.s.	
Purified Water q.s.	1,000.00 ml

Group : 4.6 Analgesics and Antipyretics

Chlorpheniramine Maleate Syrup

Synonyms : Chlorpheniramine Syrup , Pediatric

Chlorpheniramine Maleate	0.04 g
Simple Syrup	40.00 ml
Sorbitol Solution	10.00 ml
Paraben Conc	1.00 ml
Color, Flavor q.s.	
Purified Water q.s.	100.00 ml
pH = 4 - 5	

Group : 3.4 Antihistamines

Note : เพิ่มความหนืด แต่งสีและกลิ่นได้ตามความเหมาะสม

Ferrous Sulfate Drops

Ferrous Sulfate	12.50 g
Citric Acid	0.20 g
Paraben Conc	1.00 ml
Syrup q.s.	100.00 ml

Group : 9.5 Minerals

Storage : เก็บให้พ้นแสง ให้บรรจุในขวดสีชา

Note : 100 ml ประกอบด้วย ferrous ion 2.5 g

Glyceryl Guaiacolate Syrup

Guaifenesin (Glyceryl Guaiacolate)	2.00 g
Citric Acid	0.80 g
Sodium Citrate	0.05 g
Sodium Chloride	0.50 g
Menthol	0.03 g
Paraben Conc	1.00 ml
Glycerol (Glycerin)	10.00 ml
Polyethylene Glycol 4000	10.00 g
Syrup	50.00 ml
Ethyl Alcohol 95%	0.03 ml
Color, Flavor q.s.	
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 3.6.2 Expectorant and Demulcent Cough Preparations

Potassium Chloride Syrup

Potassium Chloride	10.00 g
Citric Acid	0.60 g
Aspartame	0.10 g
Menthol	0.01 g
Methyl Hydroxybenzoate (Methylparaben)	0.10 g
Propyl Hydroxybenzoate (Propylparaben)	0.02 g
Sorbitol Solution	20.00 ml
Purified Water	30.00 ml
Flavoring Agent q.s.	
Syrup q.s.	100.00 ml

Group : 9.2 Fluids and Electrolytes

Note : 15 ml ประกอบด้วย Potassium 20 mEq

DENTAL PREPARATIONS

Artificial Saliva Solution (Saliva Substitutes)

Carboxymethyl Cellulose Sodium	0.30 g
Magnesium Sulfate	0.003 g
Potassium Chloride	0.06 g
Monobasic Sodium Phosphate Dihydrate (Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate)	0.05 g
Glycerol (Glycerin)	2.00 ml
Paraben Conc	1.00 ml
Purified Water q.s.	100.00 ml

Group : 12.3.3 Other Dental Preparations

Storage : เก็บในภาชนะปิดสนิท ในตู้เย็น

Camphorated Parachlorophenol Solution

Synonyms : Chlorocamphene

Camphor 21.00 g

Parachlorophenol (4-Chlorophenol) 9.00 g

Group : 12.3.1 Oropharyngeal Antiseptics

Storage : เก็บในภาชนะปิดสนิท ป้องกันแสงแดด

Note : - ระคายเคืองผิวหนังและเนื้อเยื่อ
- เตรียมยาตัวนี้ใน Hood ตลอดขั้นตอน และสวมถุงมือ

Camphorated Phenol Solution

Synonyms : Camphophenol

Phenol 30.00 g

Camphor 60.00 g

Liquid Paraffin q.s. 100.00 ml

Group : 12.3.1 Oropharyngeal Antiseptics

Storage : เก็บในภาชนะปิดสนิท ป้องกันแสงแดด

Note : - ระคายเคืองผิวหนังและเนื้อเยื่อ
- เตรียมยาตัวนี้ใน Hood ตลอดขั้นตอน และสวมถุงมือ

Carnoy's Solution

Absolute Ethyl Alcohol 6.00 ml

Chloroform 3.00 ml

Glacial Acetic Acid 1.00 ml

Ferric Chloride 1.00 g

Group : 12.3.3 Other Dental Preparations

Storage : เก็บในขวดแก้วสีชา ป้องกันแสงแดด

Note : - ส่วนประกอบเป็นสารมีพิษ ต้องระมัดระวังในการใช้
- สารระเหยของ Absolute Ethyl Alcohol เป็นสารไวไฟ

EDTA Solution

EDTA 14.30 g

Cetrimide 0.083 g

Sodium Hydroxide 1.00 g

Distilled Water q.s. 100.00 ml

Group : 12.3.3 Other Dental Preparations

Storage : เก็บในภาชนะที่ไม่เป็นโลหะหนัก

Note : - ไม่ให้ใช้ที่ผิวฟัน (tooth surface) เพราะอาจทำให้ฟันสูญเสียแคลเซียม (Tooth Decalcification)
- ให้เตรียมใช้ขณะนั้นเลย (Freshly Prepared)
- ตำรับนี้ต้องระวังเกี่ยวกับน้ำที่ใช้ เพราะ EDTA เป็น Chealating Agent น้ำต้องบริสุทธิ์มาก ๆ

Fluocinolone Acetonide Gel

Fluocinolone Acetonide	0.18 g
Ethyl Alcohol 95%	1.82 ml
Propylene Glycol	45.45 ml
Polyethylene Glycol 400	36.36 ml
Paraben Conc	1.82 ml
Carboxymethylcellulose 1500	4.36 g
Glycerol (Glycerin)	14.55 ml
Hot Water	100.00 ml

Group : 12.3.3 Other Dental Preparations

Fluocinolone Acetonide Solution

Fluocinolone Acetonide	0.18 g
Ethyl Alcohol 95%	1.82 ml
Propylene Glycol	45.45 ml
Polyethylene Glycol 400	36.36 ml
Paraben Conc	1.82 ml
Carboxymethylcellulose 1500	0.91 g
Glycerol (Glycerin)	3.64 ml
Hot Water	100.00 ml

Group : 12.3.3 Other Dental Preparations

Formaldehyde and Cresol Solution

Synonyms : Cresolated Formaldehyde; Formocresol

Formocresol Conc

Formaldehyde (Formalin) 37-38 %	19.00 ml
Cresol	35.00 ml
Glycerol (Glycerin)	25.00 ml
Steriled Water	21.00 ml

ให้เก็บ Formocresol Conc ในขวดแก้วสีชา ก่อนนำมาใช้ให้เจือจางก่อนด้วย Glycerol และ Water
ใน อัตราส่วน Glycerol : Water : Formocresol Conc = 3:1:1 (240 ml : 80 ml : 80 ml)

Group : 12.3.1 Oropharyngeal Antiseptics

Storage : เก็บในภาชนะปิดสนิท ป้องกันแสงแดด

Note : - เตรียมยาใน Hood เนื่องจากมีส่วนประกอบของ Formaldehyde
- อันตรายของ Formaldehyde ไอระเหยจะทำให้ระคายเคืองตา จมูก ระบบทางเดินหายใจและอาจทำให้เกิดการไอ กลืนลำบาก (Dysphagia) ทางเดินหายใจเกิดการหดเกร็งและบวม ปอดบวม หอบ หากสารละลายที่เข้มข้นสูงๆ ถูกผิวหนังทำให้ผิวหนังขาวและแข็งด้าน ทำให้เกิดผื่นแพ้สัมผัสและอาการแพ้
- Glycerol ช่วยป้องกันการเกิดตะกอนที่เกิดจาก Polymerization ของ Formaldehyde เป็น Solid Paraformaldehyde

Talbot's Solution

Synonyms : Iodine and Zinc Iodide Glycerite

Zinc Iodide	4.00 g
Iodine, Crystal	3.00 g
Glycerol (Glycerin)	60.00 ml
Purified Water	40.00 ml

Group : 12.3.1 Oropharyngeal Antiseptics

Storage : เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ป้องกันแสงและควรเก็บในที่เย็นเพราะ Iodine เป็นสารระเหิด

Whitehead's Varnish

Synonyms : Compound Paint of Iodoform BPC.

Benzoin, powder	10.00 g
Iodoform	10.00 g
Storax (Styrax prepared)	7.50 g
Tolu Balsam	5.00 g
Diethyl Ether	100.00 ml

Group : 12.3.3 Other Dental Preparations

Storage : เก็บในภาชนะปิดสนิท ป้องกันแสงแดด และเก็บในที่เย็น

Zinc Oxide + Zinc Acetate Powder

Synonyms : Compound Zinc Oxide Cavity Bases

Zinc Acetate	1.00 g
Zinc Oxide Powder q.s.	100.00 g

Group : 12.3.3 Other Dental Preparations

Storage : เก็บในภาชนะปิดสนิท

2. สูตรตำรับของสารช่วยในเภสัชตำรับโรงพยาบาล

CREAM BASES

Non-ionic Buffered Cream Base

Cetostearyl Alcohol	10.00 g
Cetomacrogol 1000	3.00 g
White Soft Paraffin	10.00 g
Liquid Paraffin	10.00 g
Monobasic Sodium Phosphate (Sodium Dihydrogen Phosphate)	2.50 g
Citric Acid, Monohydrate	0.50 g
EDTA	0.01 g
Propylene Glycol	5.00 ml
Chlorocresol	0.15 g
Purified Water q.s.	100.00 g

Note : ยามี pH 5-6

OINTMENT BASES

Hydrophilic Ointment Base

Stearyl Alcohol	25.00 g
White Soft Paraffin	25.00 g
Liquid Paraffin	10.00 g
Sodium Lauril Sulfate (Sodium Lauryl Sulfate)	1.00 g
Propylene Glycol	10.00 ml
Paraben Conc	1.00 ml
Purified Water q.s.	100.00 g

PRESERVATIVES

Paraben Conc

Methyl Hydroxybenzoate (Methylparaben)	10.00 g
Propyl Hydroxybenzoate (Propylparaben)	2.00 g
Propylene Glycol q.s.	100.00 ml
