

Am p 191

LA FLORE D'HAÏTI

PAR

H. D. BARKER & W. S. DARDEAU

191

ENSEMBLE DES OUVRAGES UNIVERSITAIRES

RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

SERVICE TECHNIQUE DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

ET DE

L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

FLORE D'HAÏTI

Clé et Description des Ordres—Familles et Genres
des Spermatophytes d'Haïti avec la liste
de la plupart des espèces.

par

HENRY D. BARKER, Ph. D.

et

WILLIAM S. DARDEAU



PUBLIE SOUS LA DIRECTION DU
SERVICE TECHNIQUE DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

PORT-AU-PRINCE, HAÏTI

1930

AVANT-PROPOS

«La Flore d'Haïti» est le fruit de laborieuses études faites par les auteurs. De tous les ouvrages déjà parus sur ce sujet, celui-ci est incontestablement le plus complet. Il sera d'une grande importance pour tous ceux qui s'intéressent à la botanique en Haïti et spécialement pour les élèves de l'Ecole Centrale qui s'adonnent à l'étude de cette science. Ce volume est le septième de l'Ensemble des Ouvrages Universitaires publiés par le Service Technique.

CARL COLVIN
Directeur Général a. i.

PREFACE

Dès Juillet 1924, c'est-à-dire à l'ouverture de l'Ecole Centrale d'Agriculture, le Département de Botanique se mit en devoir de recueillir des échantillons de plantes en vue de former un herbier national.

Le Dr. E. L. Ekman, le grand herborisateur suédois, collaborateur avisé du Professeur allemand Ign. Urban, commençait également son intensive collection des plantes du pays. Par bonheur, il voulut bien accepter de nous céder un double de tous les spécimens qu'il aurait recueillis. Le Chef du Département de Botanique, coauteur de l'ouvrage, eut la bonne fortune d'accompagner le savant collecteur, dans bon nombre des excursions effectuées à travers la République, durant les cinq dernières années.

Le manque d'ouvrage spécifique et moderne traitant des plantes d'Haïti au double point de vue systématique et descriptif et les notes précieuses recueillies au sujet des espèces et genres nouveaux découverts par le Dr. Ekman et ajoutés à notre herbier, nous ont portés à écrire cette Flore annotée des Spermatophytes de l'île.

Notre tâche a été dure, si dure que nous avons été obligés de nous contenter de décrire uniquement les Classes, Ordres, Familles et Genres en faisant suivre ces derniers d'une simple énumération des espèces.

Pour que cet ouvrage de vulgarisation scientifique put rendre aux lecteurs tous les services que nous en attendons, il faudrait qu'il fût largement illustré. Nous avons eu recours dans ce but aux talents de l'artiste Fritz Maximilien qui nous a préparé plusieurs centaines de dessins; ce résultat, malheureusement n'a pu être obtenu, vu que nos faibles ressources nous ont empêchés de donner une suite heureuse à cette idée.

Nous nous faisons un devoir de citer les importants ouvrages qui ont contribué à faciliter notre besogne:

Gray's *New Manual of Botany*. New-York, Cincinnati, Chicago. American book company.

L. H. Bailey.—*Manuel of Cultivated Plants*. New-York. The Macmillan Company. 1924.

L. H. Bailey.—*The Standard Cyclopedia of Horticulture*. New-York. The Macmillan Company.

Fawcett and Rendle.—*Flora of Jamaica*. London. Printed by order of the trustees of the British Museum. 1924.

Paul C. Standley.—*Contribution from the United States National Herbarium. Trees and Shrubs of Mexico*. Washington. Government printing office. 1923.

John Kunkel Small.—*Flora of the Florida Keys*. New-York, published by the author. 1913.

John Kunkel Small.—*Flora of the Southeastern United States*. New-York. Published by the author. 1913.

M. Burret.—*Palmae Cubenses et Domingenses*. A. Cl. E. L. Ekman. 1914-1928 Lectæ. Stockholm. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A. B. Engler-Prantl.—*Natürliche Pflanzen Familien*. Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann. 1899.

Ign. Urban.—*Symbolæ Antillanæ Seu Fundamenta Floræ Indiæ Occidentalis*. Lipsiæ. Frates Bornträger. 1904-1923.

Ign. Urban.—*Sertum Antillarum. Plantæ haitienses et domingenses novæ vel rariores*. A. Cl. E. L. Ekman. Publications diverses. 1913-1930.

Avant de terminer, nous exprimons notre grande reconnaissance à Monsieur le Dr. E. L. Ekman qui a consenti à revoir notre manuscrit sur les Gymnospermæ et les Monocotyledonæ et qui nous a donné au cours de la préparation de l'ouvrage, les plus utiles conseils. Nous devons les plus vifs remerciements à Mr. W. Buch qui, avec son amabilité coutumière, ne nous a pas marchandé son concours, en mettant à notre disposition sa si précieuse bibliothèque. Nous exprimons aussi notre gratitude à Melle. Jeanne G. Sylvain pour tout le mal qu'elle s'est donné dans la transcription ardue de notre manuscrit. Enfin, à tous ceux qui nous ont apporté une aide, nous disons: Merci.

Port-au-Prince, ce 31 Août 1930.

H. D. BARKER
WILLIAM S. DARDEAU

SYNOPSIS DE LA FLORE D'HAÏTI

Division I—THALLOPHYTA.

Division II—BRYOPHYTA.

Division III—PTERIDOPHYTA.

Division IV—SPERMATOPHYTA.

Subdivision A—GYMNOSPERMÆ.

Ordre I. Cycadales.

Famille 1. Cycadaceæ.

Ordre II. Pinales.

Famille 2. Taxaceæ.

3. Pinaceæ.

Subdivision AA.—ANGIOSPERMÆ.

Classe B—Monocotyledonæ.

Ordre III. Pandanales.

Famille 4. Pandanaceæ.

5. Typhaceæ.

Ordre IV. Najadales.

Famille 6. Potamogetonaceæ.

7. Najadaceæ.

8. Alismataceæ.

9. Butomaceæ.

10. Hydrocharitaceæ.

Ordre V. Poales.

Famille 11. Poaceæ.

12. Cyperaceæ.

Ordre VI. Phœnicales.

Famille 13. Phœnicaceæ.

Ordre VII. Cyclanthales.

Famille 14. Cyclanthaceæ.

Ordre VIII. Arales.

Famille 15. Araceæ.

16. Lemnaceæ.

Ordre IX. Xyridales.

Famille 17. Xyridaceæ.

18. Eriocaulaceæ.

19. Bromeliaceæ.

20. Commelinaceæ.

21. Pontederiaceæ.

Ordre X. Liliales.

Famille 22. Liliaceæ.

23. Amaryllidaceæ.

24. Dioscoreaceæ.

25. Iridaceæ.

Ordre XI. Scitaminales.

Famille 26. Musaceæ.

27. Zingiberaceæ.

28. Cannaceæ.

29. Marantaceæ.

Ordre XII. Orchidales.

Famille 30. Burmanniaceæ.

31. Orchidaceæ.

Classe BB—Dicotyledonæ.

- Ordre XIII. Casuarinales.
Famille 32. Casuarinaceæ.
- Ordre XIV. Piperales.
Famille 33. Piperaceæ.
34. Chloranthaceæ.
- Ordre XV. Salicales.
Famille 35. Salicaceæ.
- Ordre XVI. Myricales.
Famille 36. Myricaceæ.
- Ordre XVII. Juglandales.
Famille 37. Juglandaceæ.
- Ordre XVIII. Fagales.
Famille 38. Fagaceæ.
- Ordre XIX. Urticales.
Famille 39. Ulmaceæ.
40. Moraceæ.
41. Urticaceæ.
- Ordre XX. Santalales.
Famille 42. Olacaceæ.
43. Loranthaceæ.
44. Balanophoraceæ.
- Ordre XXI. Aristolochiales.
Famille 45. Aristolochiaceæ.
- Ordre XXII. Polygonales.
Famille 46. Polygonaceæ.
- Ordre XXIII. Chenopodiales.
Famille 47. Chenopodiaceæ.
48. Amaranthaceæ.
49. Allioniaceæ.
50. Batidaceæ.
51. Phytolaccaceæ.
52. Aizoaceæ.
53. Portulacaceæ.
54. Basellaceæ.
55. Caryophyllaceæ.
- Ordre XXIV. Ranunculales.
Famille 56. Nymphaeaceæ.
57. Ceratophyllaceæ.
58. Ranunculaceæ.
59. Menispermaceæ.
60. Magnoliaceæ.
61. Annonaceæ.
62. Myristicaceæ.
63. Lauraceæ.
- Ordre XXV. Papaverales.
Famille 64. Papaveraceæ.
65. Capparidaceæ.
66. Brassicaceæ.
67. Moringaceæ.
- Ordre XXVI. Rosales.
Famille 68. Crassulaceæ.
69. Brunelliaceæ.
70. Cunoniaceæ.
71. Rosaceæ.
72. Connaraceæ.
73. Krameriaceæ.
74. Leguminosæ.

SYNOPSIS

- Ordre XXVII. Geraniales.
Famille 75. Geraniaceæ.
76. Oxalidaceæ.
77. Tropaeolaceæ.
78. Linaceæ.
79. Erythroxylaceæ.
80. Zygophyllaceæ.
81. Rutaceæ.
82. Simarubaceæ.
83. Burseraceæ.
84. Meliaceæ.
85. Malpighiaceæ.
86. Polygalaceæ.
87. Dichapetalaceæ.
88. Euphorbiaceæ.
89. Callitrichaceæ.
- Ordre XXVIII. Sapindales.
Famille 90. Buxaceæ.
91. Anacardiaceæ.
92. Cyrillaceæ.
93. Aquifoliaceæ.
94. Celastraceæ.
95. Hippocrateaceæ.
96. Icacinaceæ.
97. Staphyleaceæ.
98. Sapindaceæ.
99. Balsaminaceæ.
100. Sabiaceæ.
- Ordre XXIX. Rhamnales.
Famille 101. Rhamnaceæ.
102. Vitaceæ.
- Ordre XXX. Malvales.
Famille 103. Elæocarpaceæ.
104. Tiliaceæ.
105. Malvaceæ.
106. Bombacaceæ.
107. Sterculiaceæ.
- Ordre XXXI. Violales.
Famille 108. Dilleniaceæ.
109. Ochnaceæ.
110. Marcgraviaceæ.
111. Ternstroemiaceæ.
112. Hypericaceæ.
113. Elatinaceæ.
114. Tamaricaceæ.
115. Cistaceæ.
116. Bixaceæ.
117. Canellaceæ.
118. Violaceæ.
119. Flacourtiaceæ.
120. Turneraceæ.
121. Passifloraceæ.
122. Caricaceæ.
123. Loasaceæ.
124. Begoniaceæ.
- Ordre XXXII. Opuntiales.
Famille 125. Cactaceæ.

- Ordre XXXIII. Myrtales.
 Famille 126. Thymelacææ.
 127. Lythracææ.
 128. Punicacææ.
 129. Lecythidacææ.
 130. Rhizophoracææ.
 131. Combretacææ.
 132. Myrtacææ.
 133. Melastomatacææ.
 134. Oenotheracææ.
- Ordre XXXIV. Umbellales.
 Famille 135. Araliacææ.
 136. Umbelliferææ.
 137. Cornacææ.
- Ordre XXXV. Ericales.
 Famille 138. Pyrolacææ.
 139. Ericacææ.
- Ordre XXXVI. Primulales.
 Famille 140. Theophrastacææ.
 141. Myrsinacææ.
 142. Primulacææ.
- Ordre XXXVII. Plumbaginales.
 Famille 143. Plumbaginacææ.
- Ordre XXXVIII. Ebenales.
 Famille 144. Sapotacææ.
 145. Ebenacææ ou Diospyracææ.
 146. Symplocacææ.
 147. Styracacææ.
- Ordre XXXIX. Gentianales.
 Famille 148. Oleacææ.
 149. Loganiacææ.
 150. Gentianacææ.
 151. Apocynacææ.
 152. Asclepiadacææ.
- Ordre XL. Polemoniales.
 Famille 153. Convolvulacææ.
 154. Polemoniaceææ.
 155. Hydrophyllacææ.
 156. Boraginacææ.
 157. Verbenacææ.
 158. Menthacææ.
 159. Solanacææ.
 160. Scrophulariacææ.
 161. Bignoniaceææ.
 162. Pedaliaceææ.
 163. Martyniacææ.
 164. Gesneriacææ.
 165. Lentibulariacææ.
 166. Acanthacææ.
 167. Myoporacææ.
- Ordre XLI. Plantaginales.
 Famille 168. Plantaginacææ.
- Ordre XLII. Rubiales.
 Famille 169. Rubiacææ.
 170. Caprifoliaceææ.
 171. Valerianacææ.
- Ordre XLIII. Cucurbitales.
 Famille 172. Cucurbitacææ.
- Ordre XLIV. Campanulales.
 Famille 173. Campanulacææ.
 174. Lobeliaceææ.
 175. Goodeniaceææ.
 176. Compositææ.

GRANDES DIVISIONS DU RÈGNE VÉGÉTAL

Pour la commodité de l'étude de la Botanique le grand règne végétal a été partagé en Divisions, Classes, Ordres, Familles, Genres, Espèces et parfois en Variétés.

Les noms scientifiques ou latins des plantes forment le système de la *nomenclature binaire*, créé par Linné, c'est-à-dire la dénomination des espèces à l'aide de deux termes, dont l'un est le nom du genre, commun à plusieurs espèces, l'autre le nom spécifique appartenant en propre à l'espèce; celle-ci est donc déterminée par ses deux noms, générique et spécifique, juxtaposés, sans confusion possible.

Pour cette raison, la classification et la nomenclature végétales sont les mêmes dans toutes les langues.

D'après le «Système naturel» tous les groupements du règne végétal se rapportent à la Phylogénie où se manifestent les relations qui existent entre tous les végétaux.

Le règne végétal se divise en quatre grands groupes ou embranchements:

Règne	Sous-Règne	Grandes divisions
Végétal.....	A. Cryptogamæ Plantes dépourvues de graines	I. Thallophyta II. Bryophyta III. Pteridophyta
	B. Phanerogamæ Plantes à graines	IV. Spermatophyta

Bien qu'il soit incomplet, le tableau suivant montre néanmoins les relations qui existent entre les grandes divisions, les subdivisions et les classes du Règne Végétal.

Divisions	Subdivisions	Classes
I. Thallophyta (Plantes à thalle, non diffé- renciées)	1. Myxomycètes, Moisissures visqueu- ses.	a. Schyzophycææ, Algues bleu vert. b. Schyzomycètes, Bactéries.
	2. Schyzophyta, Division végétative.	
	3. Diatomææ, Diatomes. Desmides.	
	4. Euphyceææ, Vraies algues.	a. Chlorophycææ, Algues vertes. b. Phéophycææ, Algues brunes. c. Rhodophycææ, Algues rouges.
	5. Eumycètes, Vrais champignons.	a. Phycomycètes. b. Ascomycètes. c. Basidiomycètes. d. Mycelia Sterila.

Divisions	Subdivisions	Classes
II. Briophyta (Plantes différenciées en tiges et feuilles, avec rhizoïdes, mais sans vraies racines.)	{	{ a. Hepaticæ, Hépatiques. b. Musci, Muscinées.
III. Ptéridophyta (Cryptogames vasculaires différenciés en racines, tiges et feuilles.)	{	{ a. Filicineæ, Fougères. b. Equisetineæ, Prêles. c. Lycopodineæ, Mousses terrestres.
IV. Spermatophyta (Plantes à graines)	{	{
	1. Gymnospermæ, Plantes à cône sans vraies fleurs.	{
	2. Angiospermæ, Plantes à vraies fleurs.	{ a. Monocotyledoneæ, b. Dicotyledoneæ,

Division IV. SPERMATOPHYTA

—Plantes qui produisent des fleurs et des graines—

- x. Ovules et graines placés à nu sur la surface d'une bractée ou d'une écaille. Stigmate absent A. **Gymnospermae**, p. 3
 x. Ovules et graines placés dans un réceptacle clos (ovaire). Stigmate présent AA. **Angiospermae**, p. 5

Subdivision A. GYMNOSPERMÆ

- x. Seul bourgeon terminal; feuilles pennées, grandes I. **Cycadales**, p. 3
 x. Bourgeons terminaux et latéraux; feuilles en forme d'écailles ou d'aiguilles II. **Pinales**, p. 3

Ordre I. CYCADALES

Famille 1. CYCADACEÆ

Plantes dioïques ressemblant aux palmiers ou aux fougères, avec des graines exposées sur le bord de la feuille ovulaire (carpelle) ou enfermées dans un cône.

- x. Cônes petits—ne mesurant pas plus de 10 cm. de long **Zamia**, p. 3
 x. Cônes grands—mesurant généralement de 40 à 45 cm. de long **Cycas**, p. 3

Zamia, L.

Plantes indigènes de St-Domingue ressemblant à de petites fougères.

Z. integrifolia Ait.

Z. media Jacq.

Ces deux espèces sont connues à St-Domingue sous le nom de «Guayiga.»

Cycas L.

Plantes ressemblant aux palmiers; hauteur 2 à 3 mètres.

Cycas revoluta L. «Palmiste des Indes» (Haïti), cultivé dans les jardins.

Ordre II. PINALES

- x. Fleurs à ovule solitaire; fruit baccaire, petit 2. **Taxaceæ**, p. 3
 x. Fleurs à ovules nombreux ou restreints; fruit sec ou cône charnu, plutôt gros 3. **Pinaceæ**, p. 4

Famille 2. TAXACEÆ

Arbres ou arbrisseaux résineux; feuilles alternes ou rarement opposées, en forme d'aiguilles ou d'écailles. Plantes dioïques ou rarement monoïques; fleurs staminées en forme de cônes, les anthères portées sur la partie protégée des écailles plus ou moins épaissies au sommet ou peltées; fleurs pistillées de 1 ou 2 ovules portés sur un carpelle charnu ou rudimentaire, le tégument externe formant un arille. Fruit: une graine à enveloppe osseuse environnée par l'arille charnu souvent coloré.

Podocarpus L'Her.

Caractères de la famille.

P. Buchii Urb. Morne La Selle.

P. angustifolius Griseb, var. **wrightii** Pilger. «Bois Lubin» (Haïti) Massif du Nord, 800 mètres d'altitude.

Famille 3. PINACEÆ

Arbres ou arbrisseaux résineux. Feuilles alternes ou opposées, ou verticillées ou fasciculées, linéaires, en forme d'aiguilles ou d'écailles, le plus souvent persistantes, parfois décidues. Plantes monoïques ou rarement dioïques. Fleurs portées dans des cônes et sous-tendues par des écailles. Écailles des cônes staminées avec le plus souvent 2-6 anthères sur le bord inférieur. Ovules solitaires ou plusieurs sur la surface d'une écaille. Fruit: un cône dur, ligneux, avec des graines sèches, souvent ailées, placées entre les écailles ou parfois en forme de baie.

- x. Écailles du cône et feuilles disposées en spirale:
 - 2x. Écailles du cône sous-tendues par des bractées distinctes..... **Pinus**, p. 4
 - 2x. Écailles du cône dépourvues de bractées distinctes..... **Araucaria**, p. 4
- x. Écailles du cône et feuilles opposées ou verticillées:
 - 2x. Fruit en forme de baie et indéhiscent..... **Juniperus**, p. 4
 - 2x. Fruit: un cône ligneux, déhiscent:
 - 3x. Écailles du cône peltées..... **Cupressus**, p. 5
 - 3x. Écailles du cône aplaties et imbriquées..... **Thuja**, p. 5

Pinus L.

Arbres résineux. Feuilles de deux sortes: les premières squameuses et décidues, portant dans leurs axes les feuilles linéaires secondaires, en faisceaux de 2-5 (rarement 1) entourés à la base de gaines d'écailles. Fleurs staminées, axillaires, groupées à la base des jeunes pousses, composées de nombreuses anthères biloculaires disposées en spirales avec connectif élargi et squameux au sommet. Fleurs pistillées, latérales ou terminales, formées de nombreuses écailles disposées en spirale dans l'axe des petites bractées, chacune portant deux ovules à l'intérieur. Cônes subglobulaires-cylindriques avec écailles ligneuses, imbriquées, persistantes.

P. occidentalis Sw. «Bois pin,» (Haïti). Ce nom s'emploie pour désigner l'arbre dont le bois s'appelle «bois chandelle.» Se développe à une altitude de plus de 800 mètres. Très apprécié comme bois à brûler et de construction dans les régions montagneuses.

Araucaria Juss.

Arbres toujours verts. Branches régulièrement verticillées. Feuilles disposées en spirale, squameuses et raides, ordinairement très imbriquées ou subulées ou aplaties; le plus souvent dioïques. Fleurs staminées terminales, solitaires ou en fascicules, composées de nombreuses anthères groupées en spirale et imbriquées. Fleurs pistillées en capitules ovoïdes ou globulaires, formées de nombreuses écailles en spirale, chacune avec un ovule. Cônes grands et ligneux, les nombreuses écailles avec 2 tranchants ou 2 ailes qui volent en éclats à maturité; graines non ailées adnées à l'écaille à la base.

A. excelsa R. Br., Cultivée.

Juniperus L.

Arbres ou arbrisseaux avec écorce mince se déchirant en lambeaux. Feuilles sessiles, en forme d'aiguilles, ou en verticilles de trois, ou en forme d'écailles et opposées étroitement imbriquées, dioïques. Fleurs très petites, axillaires ou terminales. Fleurs staminées solitaires, formées de nombreuses anthères, unies en un chaton ovoïde ou oblong. Fleurs pistillées ovoïdes verdâtres, avec plu-

sieurs bractées portant un ou deux ovules. Fruit: un cône forme de baie, formé par l'union des écailles florales.

J. urbaniana Pilg. et Ekm. Morne La Selle 2500 m.

J. lucayana Britton, «Cypres,» Massif du Nord 400-600 m.

J. chinensis L. «Génévrier,» Cultivé dans les jardins.

Cupressus L.

Arbres, rarement arbrisseaux. Ecorce se séparant généralement en de longues écailles en forme de lambeaux; les branchettes cylindriques ou quadri-ailées, rarement comprimées. Feuilles petites et squameuses, opposées, appressées, avec de toutes petites denticules, les feuilles plus jeunes en forme d'aiguilles et divergentes. Fleurs très petites, terminales, solitaires, les sexes sur des branches distinctes. Fleurs staminées oblongues, de 6-12 étamines décussées, jaunes. Fleurs pistillées, subglobulaires, les écailles avec de nombreux ovules dressés. Cônes presque globulaires, avec des écailles peltées et des graines ailées.

C. macrocarpa Hartw. Récemment introduit à Kenscoff.

Thuja L.

Arbres résineux aromatiques. Ecorce mince et squameuse, branchettes aplaties en forme de fronde, feuilles squameuses, opposées par paires, appressées, généralement glandulaires sur l'écorce, les jeunes feuilles en forme d'aiguilles. Fleurs très petites, solitaires, terminales, les deux sexes généralement sur des branchettes différentes. Fleurs staminées de 6-12 étamines décussées. Fleurs pistillées avec 8-12 écailles opposées par paires, avec 2 ovules à la base. Cônes ovoïdes — oblongs, dressés, le bord des écailles épais.

T. orientalis L. Introduit dans les jardins.

Subdivision AA. ANGIOSPERMÆ

- x. Feuilles à nervation parallèle, verticilles floraux toujours au nombre de trois ou de multiples de trois..... **B. Monocotyledonæ**, p. 5
- x. Feuilles à nervation réticulée, verticilles floraux au nombre de cinq ou d'un multiple de cinq..... **BB. Dicotyledonæ**, p. 75

Classe B. MONOCOTYLEDONÆ

Embryon avec un seul cotylédon. Feuilles en général isolées, engainantes, avec pétiole souvent indistinct. Verticilles floraux au nombre de 3 ou d'un multiple de 3. Jamais au nombre de 5. Faisceaux fibro-vasculaires très dispersés.

CLE DES ORDRES

- x. Périanthé rudimentaire ou absent, souvent des poils ou de simples écailles qui ne ressemblent pas à une corolle:
 - 2x. Fleurs non situées dans l'axe de bractées sèches (écailles ou glumes):
 - 3x. Périanthé formé de soies ou d'écailles sèches, (absent dans la famille Pandanaceæ)..... **III. Pandanales**, p. 6
 - 3x. Périanthé charnu ou herbacé ou absent:
 - 4x. Fruit à baies; endosperme présent..... **VIII. Arales**, p. 42
 - 4x. Fruit à drupes; endosperme absent..... **IV. Najadales**, p. 7
 - 2x. Fleurs situées dans l'axe des bractées sèches (écailles ou glumes)..... **V. Poales**, p. 10

x. Périanthe formé de 2 séries distinctes, la série interne ressemble généralement à une corolle:

2x. Endosperme farineux.....

2x. Endosperme charnu, corné ou cartilagineux:

3x. Ovaire et fruit supères:

4x. Herbes, rarement arbrisseaux ou arbres avec feuilles simples; ovules 2 ou plusieurs dans chaque loge de l'ovaire, excepté dans un très petit nombre d'herbes:

5x. Inflorescence dépourvue de spadice charnu.....

5x. Inflorescence avec un spadice charnu entouré d'une spathe.....

4x. Arbres ou arbrisseaux avec feuilles composées, palmées ou lobées:

5x. Ovaire généralement 1, tri-loculaire et tri-ovulé: fruit monosperme par avortement.....

5x. Ovaire 1, uniloculaire mais formé de 2 ou de 4 sarpelles, multiovulé. Fruit un syncarpe.....

3x. Ovaire et fruit entièrement infères ou semi-infères:

4x. Endosperme présent et généralement abondant:

5x. Fleurs régulières, androcée non réduit.....

5x. Fleurs très irrégulières, androcée très réduit et modifié.....

4x. Endosperme absent:

5x. Plantes aquatiques; fleurs unisexuées.

5x. Plantes terrestres ou épiphytes.

Fleurs parfaites.....

IX. Xyridales, p. 46

X. Liliales, p. 51

VIII. Arales, p. 42

VI. Phœnicales, p. 36

VII. Cyclanthales, p. 42

X. Liliales, p. 51

XI. Scitaminales, p. 57

IV. Najadales, p. 7

XII. Orchidales, p. 61

Ordre III. PANDANALES

Herbes vivaces, aquatiques ou marécageuses avec rhizomes allongés, rarement plantes arborescentes.

x. Plantes arborescentes; périanthe absent..... 4. Pandanaceæ, p. 6

x. Plantes herbacées; périanthe présent..... 5. Typhaceæ, p. 6

Famille 4. PANDANACEÆ

Plantes plus ou moins arborescentes, parfois grimpantes, produisant le plus souvent des racines en forme de pilotis au-dessus du sol. Feuilles longues, raides et en forme de sabre, souvent à bord spinescent. Étamines et pistils séparés, éparpillés sur l'axe floral et non en fleurs définies, en capitules et épis axillaires ou terminaux, les bractées feuillues du spadice le plus souvent voyantes ou colorées, caduques, — les parties fertiles étroitement agrégées; périanthe le plus souvent absent; étamines peu — beaucoup, avec filets libres ou connés, rarement représentées dans les fleurs fertiles par des staminodes. Ovaire 1 — beaucoup de loges avec ovules solitaires ou plusieurs. Fruit: un syncarpe ou fruit agrégé.

Pandanus L.

Caractères de la famille.

P. furcatus Roxb. «Screw pine» en anglais. Récemment introduit.

Famille 5. TYPHACEÆ

Grappe en forme d'épi, solitaire et terminale, les fleurs staminées sont situées sur la partie supérieure de l'épi. Périanthe de soies. Pistil stipité. Stigmate étroit, spatulé, oblong ou rhomboïdal.

Typha L.

Caractères de la famille.

T. domingensis (Pers.) Kunth, «Grand Jonc» (Haïti). Commun dans les endroits marécageux des plaines et près des rivages de la mer.

Ordre IV. NAJADALES

Herbes vivaces, aquatiques ou marécageuses. Feuilles variées. Dans certaines formes, elles deviennent principalement des phyllodes. Fleurs généralement symétriques. Périanthe absent ou imparfait. Androcée généralement de 1-4 étamines. Gynécée d'un seul ou de plusieurs carpelles.

x. Périanthe absent, ou imparfait, ou herbacé:

2x. Périanthe absent, la majeure partie des fleurs parfaites sont en épi.....

2x. Périanthe en forme de coupe sur les fleurs staminées, généralement solitaires.....

x. Périanthe formé de 2 séries distinctes, la série interne à corolle:

2x. Gynécée formé de carpelles distincts.....

2x. Gynécée formé de carpelles soudés:

3x. Fleurs parfaites.....

3x. Fleurs généralement dioïques, parfois monoïques.....

6. Potamogetonaceæ, p. 7

7. Najadaceæ, p. 8

8. Alismataceæ, p. 8

9. Butomaceæ, p. 8

10. Hydrocharitaceæ, p. 9

Famille 6. POTAMOGETONACEÆ

Herbes vivant le plus souvent dans l'eau de rivière ou l'eau de mer. Feuilles très variées. Les feuilles submergées diffèrent complètement des feuilles flottantes. Fleurs parfaites, monoïques ou dioïques, spiciformes. Androcée de 1-4 étamines, avec anthères généralement appendiculées. Gynécée de 1-4 carpelles. Fruit: 4 petites drupes réunies ensemble, spiciformes, sessiles.

x. Gynécée formé de carpelles distincts:

2x. Étamines 4.....

2x. Étamines 2.....

x. Gynécée formé d'un carpelle ou de carpelles soudés:

2x. Stigmates 2. Feuilles à limbe plus ou moins cylindrique.....

2x. Stigmate 1. Feuilles à limbe aplati.....

Potamogeton, p. 7

Ruppia, p. 7

Cymodocea, p. 8

Diplanthera, p. 8

Potamogeton L.

Plantes rivulaires à tiges articulées, racinantes; feuilles disposées en 2 rangées, alternes ou imparfaitement opposées.

P. fluitans Roth. sub. sp. *americanus* Cham et Schlecht, Commun.

P. coloratus Vahl. var. *jamaicensis* (Griseb) Graebn.

P. pectinatus L.

P. malainus Miq.

P. filiformis L.

P. foliosus Raf.

P. pusillus L.

P. pulchelliformis Hagstr. Presqu'île du Sud-Ouest.

Ruppia L.

Herbes marines vivant sous l'eau à tiges bifurquées ressemblant à de longs filaments, feuilles presque capillaires, alternes.

R. maritima L.

Cymodocea Koenig.

Rhizomes allongés. Feuilles cylindriques ou semi-cylindriques au-dessus des gaines. Fleurs cachées dans les gaines de la feuille ou les fleurs staminées longues — exertes.

C. manatorum Aschers.

Diplanthera Thouars.

Rhizomes allongés. Feuilles plates au-dessus des gaines. Fleurs portées dans les gaines de la feuille ou les fleurs staminées longues — exertes.

D. wrightii Aschers, [*Halodule wrightii* Aschers].

Famille 7. NAJADACEÆ

Plantes généralement rivulaires. Feuilles opposées, limbe denté le plus souvent, base dilatée. Fleurs dioïques, axillaires. Périanthé en forme de coupe, disposé sur les fleurs staminées généralement solitaires. Fleurs staminées: une seule étamine et un périanthé double; anthères 1-4 loges. Fleurs pistillées: un ovaire avec un style à 2-4 stigmates.

Fruit: une petite drupe sessile.

Najas L.

Caractères de la famille.

N. marina L.

N. guadalupensis (Spreng) Morong.

Famille 8. ALISMATACEÆ

Herbes annuelles ou vivaces. Feuilles basilaires à limbe aplati souvent avec des lobes basilaires ou de simples phyllodes. Fleurs parfaites, monoïques ou dioïques, verticillées; sépales herbacés; pétales tendres, blancs ou roses; androcée de 6 étamines ou plus; filets distincts; anthères biloculaires, extrorses; gynécée formé d'un petit nombre ou de plusieurs carpelles; style manifeste. Fruit: un capitule formé d'akènes plats ou turgescents.

x. Fleurs toutes parfaites; carpelles quelque peu turgescents

Echinodorus, p. 8

x. Fleurs monoïques (rarement dioïques), les inférieures pistillées, les supérieures staminées;

Carpelles aplatis

Sagittaria, p. 8

Echinodorus L. C. Rich.

Feuilles avec lobes basilaires arrondis. Fleurs parfaites en racemes ou panicules. Etamines 12-30. Akènes nombreux avec des corps turgescents en un capitule velu.

E. cordifolius (L.) Griseb., Commun dans les marécages.

E. tenellus (Mart.) Buchen. (St. Domingue).

Sagittaria L.

Feuilles souvent avec lobes basilaires, parfois sans lobes ou simplement des phyllodes. Fleurs monoïques ou dioïques, les fleurs supérieures généralement staminées. Etamines généralement nombreuses. Akènes nombreux avec des corps plats, en capitules denses.

S. intermedia M. Mich. Assez commun, endroits humides.

S. lancifolia L. Abondant, endroits marécageux.

Famille 9. BUTOMACEÆ

Herbes vivaces, marécageuses ou aquatiques, généralement lactescentes, étroitement apparentées aux *Alismataceæ*, avec cette différence qu'elles possè-

dent de nombreux ovules et des fruits déhiscents sur le côté interne. Fleurs solitaires ou en ombelles, bisexuées, voyantes.

Limnocharis H. & B.

Caractères de la famille.

L. flava (L.) Buchen. Tiges triangulaires, spongieuses; fleurs jaunes. Lieux boueux.

Famille 10. HYDROCHARITACEÆ

Herbes vivaces, aquatiques ou marécageuses, avec ou sans tige, rhizomateuses. Hampes, tiges et feuilles, généralement succulentes ou spongieuses. Feuilles alternes, souvent toutes basilaires; limbes étroits et courts ou très allongés et généralement sessiles ou très larges et pétioles. Fleurs monoïques ou dioïques ou rarement parfaites, sortant des spathes généralement solitaires, les pédicelles parfois très allongés. Périanthé double ou rarement simple. Calice de 3 sépales herbacés, ou pétaloïdes. Corolle de 3 pétales minces ou absente. Androcée de 3-12 étamines avec filets distincts ou unis. Ovaire uniloculaire et avec plusieurs placentas pariétaux ou 2-15 loges. Fruit: une baie courte ou allongée ou un utricule.

x. Gynécée de 3 carpelles, rarement 2-4-5. Stigmates 3

Vallisneria, p. 9

x. Gynécée de 6-15 carpelles. Stigmates 6-9:

2x. Plantes marines à feuilles distiques et sessiles; anthères de 4 loges

Thalassia, p. 9

2x. Plantes d'eau douce avec feuilles verticillées, pétioles; anthères biloculaires

Hydromystria, p. 9

Vallisneria L.

Plantes aquatiques, dioïques, submergées presque sans tige avec des rhizomes vivaces stolonifères. Feuilles basilaires, en forme de ruban, flottantes. Fleurs staminées nombreuses, agglomérées sur un spadice, enfermées dans une spathe bi-trifide, détachées à maturité et flottant et s'étendant sur la surface de l'eau; périanthé de 3 sépales; étamines 1-3, généralement 2. Fleurs pistillées solitaires, à l'extrémité de longues hampes grêles, flottant sur l'eau, sous-tendues par une spathe tubulaire bifide; hypanthium linéaire, cylindrique. Sépales et pétales 3. Ovaire uniloculaire avec 3 placentas pariétaux. Stigmates 3, bilobés. Ovules nombreux, orthotropes. Fruit cylindrique indéhiscent.

V. spiralis L. Etang de Miragoâne, etc.

Thalassia Solander.

Herbes marines, dioïques avec rhizomes rampants. Feuilles plusieurs, agrégées aux nœuds; engageantes à la base; linéaires, allongées. Hampes s'élevant des bouquets de feuilles; spathes tubulaires, bifides. Fleurs staminées, pédicellées. Périanthé de 3 sépales pétaloïdes. Etamines 9, filets très courts ou obsoletes, distincts; anthères s'ouvrant latéralement. Fleurs pistillées presque sessiles dans la spathe; ovaire de 6-12 loges. Fruit stipité, mamelonné ou échiné, s'ouvrant par des valves. Graines nombreuses.

T. testudinum (Solander) Konig, Près des côtes.

Hydromystria G. F. W. Mey.

Plantes aquatiques stolonifères, dioïques ou monoïques. Feuilles basilaires, pétioles, agglomérées, limbes ovés, ou ovés-orbiculaires. Fleurs solitaires ou les staminées 2 ou 3, enfermées dans une spathe bifide. Sépales 3, lancéolés.



Pétales 3, dans les fleurs staminées, linéaires, presque filiformes, plus longs que les sépales, dans les pistillées, absents et rudimentaires. Etamines 6-12, distinctes; anthères linéaires. Gynécée d'environ 6 pistils unis. Ovaire uniloculaire avec 6 placentas. Styles 6, subulés, stigmates courbés. Fruit ellipsoïde, uniloculaire, multisperme.

H. stolonifera G. Mey. Endroits marécageux (St-Domingue).

Ordre V. POALES

Plantes annuelles ou vivaces, à tiges simples ou ramifiées. Feuilles alternes, généralement étroites et allongées, engainantes à la base. Fleurs non voyantes nées dans l'axe des bractées ou écailles (glumes). Fruit: un caryopse (graine) ou un akène.

- x. Feuilles insérées sur 2 rangs; tiges généralement creuses ou aplaties; anthères attachées par le milieu 11. Poaceæ, p. 10
- x. Feuilles insérées sur 3 rangs, tiges généralement solides, triangulaires, anthères attachées par leur base 12. Cyperaceæ, p. 31

Famille 11. POACEÆ

Herbes annuelles ou vivaces, rarement arbrisseaux ou arbres, parfois monoïques ou dioïques, très variées. Tiges généralement creuses. Nœuds serrés. Feuilles alternes disposées sur 2 rangs, engainantes. La gaine s'épanouit en un limbe entier, étroit, rubanné et rectinerve dont l'épiderme est souvent silicifié. Au niveau du point d'attache du limbe, la gaine se prolonge encore au-dessus, contre la tige, par une lamelle, membraneuse, très mince, sèche ou cartilagineuse, la *ligule*. Fleurs toujours disposées en inflorescences à l'extrémité des tiges ou des rameaux. Ces inflorescences sont composées; ce sont en général, des épis composés ou bien des grappes d'épis de forme un peu spéciale, appelés des *panicules*. Ces épillets se composent de 2 à plusieurs bractées imbriquées, généralement les 2 bractées inférieures et parfois les 2 ou 4 écailles qui succèdent sont aussi vides. Une ou plusieurs des écailles supérieures, excepté l'écaille terminale, portent une fleur axillaire, environnée d'un organe en forme de bractée, appelé *paillette*, qui est placé en face de l'écaille et son revers en face de l'épillet généralement binervé et dépourvu de poils, rarement uninerve. La paillette est parfois présente sans la fleur et vice-versa, le *rachilla* s'épaissit souvent et apparaît comme une dure projection à la base de l'écaille. Fleurs parfaites, staminées ou pistillées, sous-tendues par 1-3 écailles toutes petites (lodicules). Etamines 1-6, rarement plus, généralement 3. Anthères à 2 lobes, versatiles. Ovaire à 1 lobe et à 1 ovule. Styles 1 à 3, généralement 2 distincts ou plus ou moins unis, rarement absents. Stigmates poilus ou plumeux. Fruit: caryopse semblable à une graine, parfois à une noix. Endosperme amylicé.

Il convient de rappeler, en passant, le rôle économique important des plantes de cette famille, soit pour l'alimentation de l'homme ou des animaux, soit dans leurs applications aux diverses branches de l'activité humaine.

- x. Epillets à 1 fleur; rarement à 2 fleurs; fleur inférieure staminée. Rachilla articulée au-dessous des glumes (écailles vides). Rachilla ne s'étendant pas au-delà des écailles placées au sommet:
- 2x. Epillets ronds ou comprimés au dos; écailles vides, manifestes:

- 3x. Lemma et palea hyalins, minces, de structure beaucoup plus délicate que les glumes:
- 4x. Epillets unisexués Tribu I. Maydeæ, p. 11
- 4x. Epillets généralement appariés, l'un avec fleur parfaite, l'autre parfois staminé ou stérile Tribu II. Andropogoneæ, p. 12
- 3x. Lemma et palea de même texture que les glumes, jamais hyalins et minces:
- 4x. Lemma et palea membraneux:
- 5x. Inflorescence spiciforme, glume externe plus grande que les autres écailles Tribu III. Zoysieæ, p. 15
- 5x. Inflorescence paniculée, glume externe plus petite et plus étroite que les autres écailles Tribu IV. Tristegineæ, p. 16
- 4x. Lemma et palea cartilagineux ou coriacés, de couleur et d'aspect très différents des autres écailles Tribu V. Paniceæ, p. 16
- 2x. Epillets très comprimés latéralement, glumes absentes ou rudimentaires Tribu VI. Oryzeæ, p. 23
- x. Epillet: 1 à plusieurs fleurs. Rachilla articulée au-dessus des glumes. Rachilla s'étendant très souvent au-delà des écailles supérieures:
- 2x. Limbe sessile, non articulé avec gaine. Tiges herbacées:
- 3x. Epillets portés en panicules ou en grappes:
- 4x. Epillets uniflores Tribu VII. Agrostideæ, p. 24
- 4x. Epillets à 2 ou plusieurs fleurs:
- 5x. Glumes généralement plus longues que le palea, arête dorsale et généralement recourbée Tribu VIII. Aveneæ, p. 25
- 5x. Glumes généralement plus courtes que le palea, l'arête généralement terminale et dressée, parfois absente Tribu X. Festuceæ, p. 28
- 3x. Epillets disposés en 2 rangées Tribu IX. Chlorideæ, p. 26
- 2x. Limbe à base en forme de pétiole, articulé avec la gaine. Tige ligneuse Tribu XI. Bambuseæ, p. 30

Tribu I. MAYDEÆ

Epillets pistillés et staminés en différentes inflorescences ou en différentes parties de la même inflorescence; dépourvus d'arêtes; glumes indurées.

- x. Inflorescence staminée terminale sur le chaume; inflorescence pistillée disposée en épis séparés Zea, p. 11
- x. Inflorescence staminée se terminant en bouquet qui est pistillé à la base:
- 2x. Epillets pistillés enfermés dans un involucre en forme de collier Coix, p. 12
- 2x. Epillets pistillés enfouis dans les entrenœuds du rachis épais Tripsacum, p. 12

Zea L.

Epis en nombreuses rangées avec rachis continu, grains plats très différents, les rangées sont supposées représenter des épis pistillés; virtuellement chaque nœud peut porter un épi ou même plusieurs, mais généralement 1-3 pour chaque tige et un seul à chaque nœud; parfois les fleurons staminés sont produits à l'extrémité de l'épi et les fleurons pistillés (portant des grains arrondis) peuvent être nés dans le gland ou inflorescence staminée.

Z. mays L. var. *indurata* Bailey, «Maïs.» Grains durs, lisses, jaunes. Les autres types et variétés généralement cultivés ne sont pas connus en Haïti.

Tripsacum L.

Épillets pistillés solitaires, enfouis dans les articulations d'un rachis épaissi, les articulations se séparent promptement à maturité; les épillets staminés sont appariés aux jointures du segment supérieur du même rachis.

T. dactyloides L. Plante mesurant en bloc de 2 à 3 m. de haut. Se trouve dans les montagnes.

T. laxum Nash. «Herbe de Guatemala.» Cultivée.

Coix L.

Épillets pistillés, 2 ou 3 ensemble, généralement un seul fertile, enfermé dans un involucre en forme de collier osseux; épillets staminés sur un tendre rachis formant une courte grappe, le rachis sort de l'orifice de l'involucre.

C. lacryma jobi L. «Larme de Job,» «Graine Chapelet,» «Graine Maldioc.» Haut d'environ un mètre, les «graines» de 8 à 10 mm. de long.

Tribu II. ANDROPOGONEÆ

Épillets appariés ou 3 épillets sur le rachis d'une grappe en forme d'épi, un est sessile et fertile, les autres pédicellés, parfaits, staminés, neutres ou rudimentaires. Glumes plus ou moins indurées; lemma plus petit que les glumes, hyalin, celui de la fleur fertile est généralement pourvu d'arêtes.

x. Epillets tous parfaits:

- 2x. Rachis continu **Imperata**, p. 13
- 2x. Rachis désarticulé **Saccharum**, p. 13

x. Epillets non parfaits et parfaits. Les uns sessiles généralement parfaits, les autres pédicellés généralement staminés ou rudimentaires:

- 2x. Epillets fertiles avec calus poilu et pointu. Arêtes généralement longues:
- 3x. Grappes solitaires, non sous-tendues par une spathe feuillée; épillets parfaits variant de quelques-uns à un grand nombre **Heteropogon**, p. 15

3x. Grappes nombreuses en bouquet flabellé sous-tendues par des spathes foliacées. Epillets parfaits, un dans chaque grappe.

- 2x. Epillet fertile dépourvu de calus, le rachis se désarticulant immédiatement au-dessous de l'épillet: **Themeda**, p. 15

3x. Inflorescence, une panicule dense, soyeuse, de couleur brun doré; l'épillet pédicellé est pistillé.

..... **Eriochrysis**, p. 13

3x. Inflorescence, pas une panicule dense, soyeuse, de couleur brun doré; l'épillet pédicellé est staminé ou rudimentaire:

4x. Pédicelle de l'épillet stérile, épaissi, appressé au nœud du rachis épaissi, auquel il est adné:

- 5x. Epillet sessile, enfoncé dans les cavités du rachis épaissi, la première glume recouvre l'ouverture. Epillet stérile, caché. **Manisuris**, p. 13

5x. Epillet sessile, non enfoncé dans le rachis, le nœud et le pédicelle du rachis sont adnés et enfoncés dans l'ouverture de la première glume globulaire. Epillet stérile, grand **Rytidix**, p. 14

4x. Pédicelle de l'épillet stérile, distinct, le pédicelle et le nœud du rachis généralement grêles:

5x. Epillets en grappes réduites, de 1-5 (rarement 7) articulations:

6x. Epillets pédicellés staminés présents **Sorghum**, p. 14

6x. Epillets pédicellés absents, le pédicelle seul est présent **Sorghastrum**, p. 15

5x. Epillets en grappes frappantes, variant de quelques-unes à un grand nombre d'articulations:

6x. Racemes quelques-uns ou tous sessiles **Andropogon**, p. 14

6x. Racemes tous plus ou moins pédonculés:

7x. Racemes verticillés en une longue panicule **Anatherum**, p. 14

7x. Racemes par paires sortant d'une bractée engainante, paniculés **Cymbopogon**, p. 14

Imperata Cyrillo.

Épillets tous parfaits, dépourvus de barbe, tous pédicellés, articulés au-dessous des glumes, le rachis ne se disjoint pas. Les grappes en panicule étroites, semblables à des épis. Glumes membraneuses épaississement recouvertes de longs cheveux soyeux.

I. contracta (H. B. K.) Hitch. Champs cultivés. Fléau dangereux.

I. brasiliensis Trin. Dans les montagnes.

Saccharum L.

Inflorescence: une grande panicule terminale; épillets par paires aux articulations du rachis, chaque épillet uniflore et parfait ou l'épillet supérieur rarement pistillé; un épillet sessile et un épillet pédicellé, une touffe de longs poils soyeux sous-tendant chaque épillet; étamines 3; styles longs et plumeux. Fruit libre.

S. officinarum L., «Canne à Sucre,» beaucoup de variétés cultivées. «Canne indigène» et «Canne pays,» apparemment des races de la vieille variété Cristalline, ont graduellement cédé la place à des variétés améliorées résistant aux maladies.

Eriochrysis Beauv.

Épillets dépourvus de barbe, épillets sessiles parfaits, épillets pédicellés pistillés. Grappes courtes, enfouies dans une panicule en forme d'épillet, étroite, dense, soyeuse et interrompue.

E. cayennensis Beauv. Massif du Nord.

Manisuris L.

Épillets sessiles parfaits, dépourvus de barbe, enfoncés dans un creux dans les nœuds épaissis du rachis. La première glume plate, souvent rugueuse, indurée, recouvrant la cavité. Les épillets pédicellés stériles, le pédicelle épaissi, appressé ou adné au nœud du rachis; grappes solitaires.

M. exaltata (L. f.) Kuntze: [*Rottbællia exaltata* L. f.] «L'herbe Bette-Elise,» Fléau dangereux.

Rytilix Raf.

Épillets sessiles parfaits, la première glume globulaire, indurée, alvéolée, la jointure du rachis adnée et le pédicelle s'ajustent dans l'ouverture de la glume. Épillet pédicellé relativement grand, stérile.

R. granularis (L.) Skeels. [*Manisuris granularis* (L.) Sw.]

Andropogon L.

Épillet sessile parfait, généralement barbu; épillet pédicellé staminé ou neutre; rachis articulé; grappes solitaires, digitées ou se rapprochant le long d'un axe principal. Genre très commun et très répandu en Haïti, d'une certaine importance comme pâture.

A. fastigiatus Sw. Sur les collines sèches, assez abondant.

A. brevifolius Swartz. Assez commun.

A. virgatus Desv. (St-Domingue).

A. gracilis Spreng. Abondant.

A. domingensis (Spreng) Hubbard.

A. tener (Nees.) Kunth. Dans les montagnes.

A. semiberbis (Nees) Kunth. Abondant.

A. annulatus Forsk. Cultivé comme fourrage (Angleton grass).

A. saccharoïdes Swartz.

A. bicornis L. «Z'herbe panache», particulièrement dans les montagnes.

A. leucostachyus H. B. K. Dans les montagnes.

A. urbanianus Hitchc. «Z'herbe Caye», abondant.

A. virginicus L. Dans les montagnes.

A. glomeratus (Walt) B. S. P. «Panache», abondant.

A. condylotrichus Hochst. Abondant.

Anatherum Beauv.

Plantes vivaces, avec de longues panicules étroites. Épillets par paires, étroits, aigus, le plus souvent appressés. Un épillet sessile et parfait et un autre pédicellé et staminé. L'épillet parfait porte de courtes épines pointues et quelque peu aplaties sur les côtés. Stigmates plumeux; étamines 3.

A. zizanioides Hitchc et Chase, «Vétiver» (Haïti). Lieux secs et élevés; Morne l'Hôpital. Plantes dont les racines aromatiques sont employées en parfumerie et en médecine et pour autres usages domestiques.

Cymbopogon Spreng.

Plantes généralement vivaces, produisant des huiles odoriférantes. Épillets par paires. Quelques-uns des épillets inférieurs dans chaque épi staminé sont portés sur un pédoncule commun qui est supporté par une spathe engainante ou une bractée: racemes souvent poilus.

C. nardus Rendle. «Citronnelle» (Haïti). Cultivé le plus souvent.

Sorghum Pers.

Grappes réduites à 1-5 nœuds, portées sur des pédoncules grêles sur des branches grêles d'une panicule composée. Rachis grêle se disjoignant lentement; épillets disposés comme dans l'*Andropogon*, les épillets pédicellés sont généralement staminés; les épillets sessiles imberbes ou pourvus d'une arête caduque.

S. halapense (L.) Pers. «Z'herbe Yaguidi.» Une herbe grossière, rugueuse, très commune dans les plaines, d'une importance considérable comme pâture, mais dangereuse dans les champs cultivés.

S. vulgare Pers. «Pti-mil» (Haïti). Très haut. Plusieurs variétés sont cultivées sur une très grande échelle en Haïti et jouent un rôle important dans le régime alimentaire des paysans et sont très employées pour nourrir les bestiaux.

Sorghastrum Nash.

Grappes disposées comme dans le genre *Sorghum*, les épillets pédicellés sont absents, le pédicelle seul est présent; rachis flexueux se désarticulant facilement.

S. parviflorum (Desv.) Hitchc et Chase. Pousse dans les talus herbeux des montagnes.

Heteropogon Pers.

Grappes solitaires, la partie inférieure du rachis ne se disjoint pas, porte 2 à 5 paires d'épillets staminés imberbes, la partie supérieure du rachis se désarticule obliquement à la base de chaque nœud, chacun formant un calus acéré au-dessous des épillets sessiles, parfaits et à longue arête, les épillets pédicellés sont staminés.

H. contortus (L.) Beauv. Plantes annuelles à longues branches poussant sur les pentes rocheuses des collines.

H. melanocarpus (E.) Benth. Furcy.

Themeda Forsk.

Inflorescence, un bouquet flabellé formé de plusieurs grappes, chacune sous-tendue par une spathe foliacée, le bouquet entier (ou panicule) est sous-tendu ou partiellement clos par une plus grande spathe. Les grappes consistent en 2 paires d'épillets sessiles, imberbes, staminés ou neutres et d'un seul épillet fertile barbu avec une paire d'épillets pédicellés stériles, le rachis se disjoignant au-dessus des paires d'épillets sessiles staminés, formant un calus pointu au-dessous d'un épillet fertile.

T. quadrivalvis (L.) Kuntze. «Z'herbe Madam Michel» (Haïti). Cette herbe constitue la végétation dominante de la Plaine Centrale, est d'une valeur extrême comme pâture, mais peut être aussi un fléau dangereux.

Tribu III. ZOYSIÆ

Épillets généralement uniflorés. Palea et lemma membraneux. Inflorescence spiciforme.

- x. Glumes lisses, connées à la base formant un faux involucre en forme de cruche **Antheophora**, p. 15
- x. Glumes recouvertes d'épines encapuchonnées formant des sortes de petites barbes non connées **Nazia**, p. 15

Antheophora Schreb.

Épillets par groupes de 4, les premières glumes indurées sont unies à la base, formant un faux involucre en forme de cruche, le groupe est subsessile et dressé sur un axe grêle, flexueux et continu.

A. hermaphrodita (L.) Kuntze. Répandu, champ cultivés.

Nazia Adan.

Épillets par groupes de 2, leurs faces plates, contiguës, leurs glumes secondaires à l'extérieur, fortement connexes, recouvertes d'épines uncinées.

N. aliena (Spreng) Scribn, [*Tragus alienus* (Spreng) Schult]. Abondant dans les plaines sèches.

Tribu IV. TRISTEGINEÆ

Tous les épillets parfaits. Inflorescence en panicules.

- x. Glumes des fleurs parfaites, barbuées..... **Arundinella**, p. 16
 x. Glumes des fleurs parfaites, imberbes
 lemma barbu..... **Melinis**, p. 16

Arundinella Raddi.

Epillet à pédicelle court, dans de grandes panicules; glumes acuminées, les pointes s'étendent largement, la seconde plus longue que la première. Lemma très petit, portant une longue barbe grêle au sommet.

A. confinis (Schult) Hitchc et Chase. Sur les pentes rocheuses des montagnes.

A. berteroniana (Schult) Hitchc et Chase. Bord des rivières.

Melinis Beauv.

M. minutiflora Beauv. («Molasses grass» en Anglais). Herbe fourragère de l'Amérique du Sud récemment introduite en Haïti.

Tribu V. PANICEÆ

Epillet à 1 ou à 2 fleurs; dans ce dernier cas, la fleur inférieure est staminée. Palea fertile et lemma plus ferme que les glumes et généralement de couleur différente.

- x. Epillets unisexués:
 2x. Panicules terminales, grandes..... **Olyra**, p. 23
 2x. Panicules, toutes axillaires, ou axillaires
 avec une panicule staminée terminale..... **Lithachne**, p. 23
 x. Epillets parfaits:
 2x. Axe épaissi et subéreux, les épillets enfoncés
 dans les cavités des nœuds..... **Stenotaphrum**, p. 23
 2x. Axe non épaissi, épillets non enfoncés dans
 l'axe:
 3x. Epillets sous-tendus ou entourés par
 beaucoup de soies ou d'épines:
 4x. Soies persistantes, attachées au rachis
 après la chute des épillets..... **Setaria**, p. 22
 4x. Soies tombant avec les épillets à ma-
 turité:
 5x. Soies non soudées à la base, géné-
 ralement grêles, souvent plumeuses..... **Pennisetum**, p. 22
 5x. Soies soudées à la base formant
 une armature de piquants..... **Cenchrus**, p. 23
 3x. Epillets non sous-tendus ni environnés de
 soies:
 4x. Fruits cartilagineux, indurés, non rigi-
 des, généralement de couleur brune,
 le lemma avec des bords hyalins:
 5x. Fruit ouvert au sommet, hyalin;
 inflorescence: une panicule étroite,
 soyeuse et grisâtre..... **Leptocoryphium**, p. 18
 5x. Fruit non ouvert au sommet; in-
 florescence de grappes grêles, pani-
 culées digitées ou flabellées:
 6x. Epillet à duvet visiblement
 long; fruit lancéolé, acuminé;
 grappes en panicules flabellées..... **Trichachne**, p. 18
 6x. Epillets à pubescence courte ou
 glabres; fruit elliptique, grap-
 pes digitées ou subdigitées..... **Digitaria**, p. 19
 4x. Fruits indurés, rigides (ou si ils sont
 minces, à bord non hyalin).

- 5x. Epillets solitaires, subsessiles, placés
 avec le dos du fruit tourné à dis-
 tance du rachis:
 6x. Nœud du Rachilla et première
 glume formant un calus enflé
 en forme d'anneau à la base de
 l'épillet; inflorescence paniculée..... **Eriochloa**, p. 19
 6x. Nœud du Rachilla et première
 glume ne formant pas un calus
 à la base de l'épillet; inflores-
 cence en grappes..... **Axonopus**, p. 19
 5x. Epillets doubles ou triples, ou so-
 litaires, avec le dos du fruit tour-
 né vers le rachis ou pédicellés dans
 les panicules:
 6x. Fruit long, acuminé, à peine in-
 duré, les 2 glumes absentes..... **Reimarochloa**, p. 19
 6x. Fruit non long acuminé, indu-
 ré (mais si légèrement induré
 les 2 glumes présentes):
 7x. Première glume absente; épil-
 lets plano-convexes, subses-
 siles dans des grappes en for-
 me d'épis..... **Paspalum**, p. 19
 7x. Première glume présente; épil-
 lets généralement en panicu-
 les biconvexes—globulaires:
 8x. Glumes ou lemma (ou les
 deux) barbus, ou si à
 pointes courtes seulement,
 le sommet du palea fertile
 non enfermé et les épillets
 enfoncés dans des grappes
 courtes:
 9x. Inflorescence de grappes
 à un côté le long d'un
 axe commun..... **Oplismenus**, p. 22
 9x. Inflorescence paniculée:
 10x. Epillets à longs du-
 vets..... **Tricholaena**, p. 22
 10x. Epillets sans longs
 duvets; sommet
 scabieux ou hispide..... **Echinochloa**, p. 22
 8x. Glumes et lemma imberbes:
 9x. Fleur inférieure de l'épil-
 let parfaite; générale-
 ment fertile..... **Isachne**, p. 22
 9x. Fleur inférieure de l'épil-
 let staminée ou neutre:
 10x. Deuxième glume et
 lemma stériles, co-
 riaces, indurés;
 fruit mucroné..... **Scutachne**, p. 21
 10x. Deuxième glume et
 lemma stérile mem-
 braneux; fruit mu-
 croné:
 11x. Inflorescence: une
 panicule cylin-
 drique ou inter-
 rompue en for-
 me d'épi:

- 12x. Deuxième glume renflée sacculiforme; fruit stipité... *Sacciolepis*, p. 21
- 12x. Deuxième glume non renflée-sacculiforme; fruit non stipité... *Hymenachne*, p. 21
- 11x. Inflorescence, une panicule ouverte ou contractée ou ou si elle est quelque peu semblable à un épi le fruit n'est pas stipité, ni la 2ème glume sacculiforme:
- 12x. Chaume ligneux ou en forme de bambou... *Lasiacis*, p. 21
- 12x. Chaume non ligneux, ni en forme de bambou:
- 13x. Lemma fertile avec appendices latéraux ou excavations à la base, bords générale ment non roulés à l'intérieur... *Ichnanthus*, p. 21
- 13x. Lemma fertile, dépourvus d'appendices latéraux ou d'excavations à la base, les bords non roulés à l'intérieur agrippant le palea... *Panicum*, p. 20

Leptocoryphium Nees.

Épillets en panicules étroites; première glume absente; lemma stérile vide; le lemma et la 2ème glume chevelus; lemma fertile et palea brun avec un sommet blanc hyalin, quelque peu lacéré ou cilié, ouvert à maturité.

L. lanatum (H. B. K.) Nees. Plaine Centrale, Massif du Nord.

Trichachne Nees.

Épillets appariés, à pédicelle court disposé en 2 rangées le long d'un côté d'un rachis étroit, les faibles grappes réunies en une panicule étroite ou flabel-

lée; épillets lancéolés, recouverts de longs cheveux soyeux; la première glume très petite; fruit acuminé; brun, avec de larges bords blanc hyalin.

T. insularis (L.) Nees. «Z'herbe-à-blé» Fléau abondant.

Digitaria Heist.

Épillets en 2 ou en 3, à pédicelle court disposé en 2 rangées le long d'un côté d'un rachis étroit, les faibles grappes digitées ou subdigitées; épillets lancéolés ou elliptiques; première glume très petite ou obsolet; fruit pointu, les bords hyalins du lemma sont étroits.

D. digitata (Sw.) Hitchc.

D. sanguinalis (L.) Dulac. Commun dans les champs cultivés.

D. panicea (Sw.) Nash.

D. leucocoma Nash.

D. villosa Walt.

D. argillaceæ H. et C.

Eriochloa H. B. K.

Inflorescence de peu à beaucoup de grappes le long d'un axe commun; épillets subsessiles, solitaires, le dos du fruit détourné du grêle rachis; nœud du rachilla entre la 1ère et la 2ème glume épaissi formant une base annulaire à l'épillet, la 1ère glume généralement réduite à une toute petite gaine soudée à l'anneau; fruit minutieusement papilleux, rugueux, mucroné, pointu ou avec une barbe délicate, souvent caduque.

E. punctata (L.) Dew. Endroits humides, particulièrement presqu'île du Sud-Ouest.

Axonopus Beauv.

Inflorescence de 2 à beaucoup de grappes grêles, réunies au sommet du chaume; épillets déprimés-biconvexes, oblongs-elliptiques, solitaires, subsessiles, le dos du fruit détourné du rachis, première glume absente.

A. compressus (Sw.) Beauv.

Reimarochloa Hitchc.

Inflorescence de 2 à plusieurs grappes grêles, épillets fortement comprimés, acuminés, solitaires, plutôt distincts, subsessiles, le dos du fruit tourné vers le rachis, les 2 glumes absentes, excepté dans l'épillet terminal.

R. brasiliensis (Spreng.) Hitchc. Seulement recueilli par Poiteau.

Paspalum L.

Inflorescence de 1 à beaucoup de grappes; ces grappes le long d'un axe commun; épillets plano-convexes, subsessiles le long d'un rachis grêle ou ailé, le dos du fruit tourné vers le rachis; 1ère glume généralement absente.

P. heterotrichum Trin. Collines, répandu.

P. vaginatum Sw. Bord de mer.

P. distachyon Poit. Bord de mer.

P. distichum L. Endroits humides.

P. notatum Flugge. Répandu.

P. plicatum Michx. Dans les savanes.

P. fimbriatum H. B. K. «Gazon» (Haïti). Très commun.

P. leptocaulon Nash. Très rare.

P. lindenianum, A. Rich. Commun.

P. alterniflorum A. Rich. Rare.



- P. rupestre* Trin. Assez rare.
P. caespitosum Flugge. Collines calcaires, commun.
P. simpsoni Nash. Très rare.
P. glabrum Poir. Bord de mer.
P. ciliatifolium Michx. Sur les plages, répandu.
P. decumbens Sw. Dans les montagnes.
P. ciliiferum (Nash) Hitchc. Jacmel, Port-au-Prince.
P. paniculatum L. Répandu.
P. orbiculatum Poir. St-Domingue, très rare.
P. conjugatum Bergius. «Z'herbe sûre.» Très commun.
P. virgatum L. Endroits humides, répandu.
P. secans Hitchc et Chase. Répandu.
P. pulchellum Kunth. St-Domingue.
P. stellatum Flugge. Plaine Centrale.
P. dispar Chase. Répandu.
P. pleostachyum Doell. Ile de la Tortue.
P. millegrana Schreb. Les Cayes.
P. densum Poir. Perodin.
P. breve Chase. Répandu.
P. epile Nash. Les Cayes.
P. distortum Chase. Corail.
P. secans Hitchc et Chase.

Panicum L.

Inflorescence paniculée (rarement grappe); épillets pédicellés, biconvexes; première glume présente; lemma stérile renfermant généralement un palea hyalin, parfois une fleur staminée; fruit papyracé-induré, les bords du lemma enroulés à l'intérieur.

- P. distantiflorum* A. Rich. Sur les collines sèches, répandu.
P. dichotoniflorum Michx. Marécages, répandu.
P. utowanæum Scribn. Massif du Nord.
P. germinatum Forsk. Endroits humides, abondant.
P. barbinode Trin. «Para grass» en anglais [*P. numidianum*] «Z'herbe Para.»
P. reptans L. Champs cultivés, commun.
P. fasciculatum Sw. «Z'herbe pintade.»
P. adpersum Trin. Champs cultivés, abondant.
P. elephantipes. «Z'herbe à côtes.» Rivière Estère, étang Miragoâne.
P. hirticaule J. Presl. Champs cultivés.
P. diffusum Sw. Collines sèches.
P. ghiesbreghtii Fourn. Dans les pâturages.
P. hirsutum Sw., Assez rare.
P. maximum Jacq. «Z'herbe Guinée,» commun.
P. stenodes Griesb. Très rare, St-Domingue; Acul Samedi.
P. condensum Nash. Endroits humides, répandu.
P. laxum Sw. Mont-Organisé.
P. exiguilorum Griseb. Morne Belanse.
P. schiffneri Hack. Dans les montagnes.
P. trichoides Sw. Massif du Nord.
P. venezuelæ Hack. Très rare.
P. glutinosum Sw. Dans les montagnes.
P. xalapense H. B. K. Dans les montagnes.
P. strigosum Mulb. Assez rare; dans les montagnes.

- P. chrysopsidifolium* Nash. Dans les montagnes.
P. acuminatum Sw. Dans les montagnes.
P. lancearium Trin. St-Domingue.
P. scoparium Lam. Perodin.
P. zizanioides H. B. K. Massif du Nord.
P. aciculare Muhlenb. Dans les montagnes.
P. trichanthum Nees. Cavaillon.
P. molle Sw. Massif des Matheux.
P. boliviense Hack. Morne La Hotte.

Ichnanthus Beauv.

Inflorescence et épillets comme pour le *Panicum*, la première glume souvent presque aussi longue que les épillets, le fruit aigu ou subaigu, les bords du lemma généralement plats, le rachilla produit au-dessous du lemma dans un très petit stipe, celui-ci portant de chaque côté des appendices membraneux adnés à la base du lemma et libres au-dessus, les appendices souvent indistincts et indiqués seulement par de toutes petites excavations.

- I. nemorosus* (Sw.) Doell. Répandu.
I. pallens (Sw.) Munro. Répandu.
I. axillaris (Nees) H. et Ch. Dans les montagnes; rare.

Lasiacis (Griseb) Hitchc.

Inflorescence composée de panicules ouvertes (rarement compactes) au sommet des chaumes et des branches feuillées; épillets légèrement globuleux placés obliquement sur leurs pédicelles; glumes et lemma stérile larges, papyracés, brillants, glabres, généralement laineux au sommet; fruit blanc, osseux—induré, de forme d'œuf renversé; le lemma et le palea portent tous deux au sommet, dans une légère excavation cratériforme, une touffe de cheveux laineux, le palea concave en dessous, gibbeux en dessus, le sommet souvent libre à maturité; herbes vivaces, grimpantes, à tige ligneuse (rarement rampantes).

- L. rugelli* (Griseb) Hitchc. Ile de la Tortue.
L. oaxacensis (Steud) Hitchc. Dans les montagnes; rare; Port-Margot.
L. sorghoidea (Desv.) H. et Ch. Dans les montagnes; répandu.
L. divaricata (L.) Hitchc. Abondant.
L. sloanei (Griseb) Hitchc. «Calumette.» Abondant.

Sacciolepis Nash.

Inflorescence, une panicule étroite en forme d'épi; épillets pointus, la 2ème glume et le lemma stérile renflés (la glume plus ou moins sacculiforme) beaucoup plus grands que le fruit à peine stipité.

- S. striata* (L.) Nash. Dans les marécages; rare (Port Margot).

Hymenache Beauv.

Épillets à pédicelles courts en panicules longues, denses, épiées ou interrompues; épillets acuminés; lemma et palea à peine indurés, les bords du lemma plats, le palea non fermé au-dessus.

- H. amplexicaulis* (Rudge) Nees. Marécages, abondant.

Scutachne Hitchc. et Chase.

Inflorescence paniculée; épillets acuminés, atténués à la base; 1ère glume membraneuse; 2ème glume et lemma stérile coriacés—indurés; le lemma renfermant un palea de même texture; fruit sinon légèrement plus induré que le

- P. rupestre* Trin. Assez rare.
P. caespitosum Flugge. Collines calcaires, commun.
P. simpsoni Nash. Très rare.
P. glabrum Poir. Bord de mer.
P. ciliatifolium Michx. Sur les plages, répandu.
P. decumbens Sw. Dans les montagnes.
P. ciliiferum (Nash) Hitchc. Jacmel, Port-au-Prince.
P. paniculatum L. Répandu.
P. orbiculatum Poir. St-Domingue, très rare.
P. conjugatum Bergius. «Z'herbe sûre.» Très commun.
P. virgatum L. Endroits humides, répandu.
P. secans Hitchc et Chase. Répandu.
P. pulchellum Kunth. St-Domingue.
P. stellatum Flugge. Plaine Centrale.
P. dispar Chase. Répandu.
P. pleostachyum Doell. Ile de la Tortue.
P. millegrana Schreb. Les Cayes.
P. densum Poir. Perodin.
P. breve Chase. Répandu.
P. epile Nash. Les Cayes.
P. distortum Chase. Corail.
P. secans Hitchc et Chase.

Panicum L.

Inflorescence paniculée (rarement grappe); épillets pédicellés, biconvexes; première glume présente; lemma stérile renfermant généralement un palea hyalin, parfois une fleur staminée; fruit papyracé-induré, les bords du lemma enroulés à l'intérieur.

- P. distantiflorum* A. Rich. Sur les collines sèches, répandu.
P. dichotoniflorum Michx. Marécages, répandu.
P. utowanæum Scribn. Massif du Nord.
P. germinatum Forsk. Endroits humides, abondant.
P. barbinode Trin. «Para grass» en anglais [*P. numidianum*] «Z'herbe Para.»
P. reptans L. Champs cultivés, commun.
P. fasciculatum Sw. «Z'herbe pintade.»
P. adpersum Trin. Champs cultivés, abondant.
P. elephantipes. «Z'herbe à côtes.» Rivière Estère, étang Miragoâne.
P. hirticaule J. Presl. Champs cultivés.
P. diffusum Sw. Collines sèches.
P. ghiesbreghtii Fourn. Dans les pâturages.
P. hirsutum Sw., Assez rare.
P. maximum Jacq. «Z'herbe Guinée.» commun.
P. stenodes Griesb. Très rare, St-Domingue; Acul Samedi.
P. condensum Nash. Endroits humides, répandu.
P. laxum Sw. Mont-Organisé.
P. exiguilorum Griseb. Morne Belanse.
P. schiffneri Hack. Dans les montagnes.
P. trichoides Sw. Massif du Nord.
P. venezuelæ Hack. Très rare.
P. glutinosum Sw. Dans les montagnes.
P. xalapense H. B. K. Dans les montagnes.
P. strigosum Mulb. Assez rare; dans les montagnes.

- P. chrysopsidifolium* Nash. Dans les montagnes.
P. acuminatum Sw. Dans les montagnes.
P. lancearium Trin. St-Domingue.
P. scoparium Lam. Perodin.
P. zizanioides H. B. K. Massif du Nord.
P. aciculare Muhlenb. Dans les montagnes.
P. trichanthum Nees. Cavaillon.
P. molle Sw. Massif des Matheux.
P. boliviense Hack. Morne La Hotte.

Ichnanthus Beauv.

Inflorescence et épillets comme pour le *Panicum*, la première glume souvent presque aussi longue que les épillets, le fruit aigu ou subaigu, les bords du lemma généralement plats, le rachilla produit au-dessous du lemma dans un très petit stipe, celui-ci portant de chaque côté des appendices membraneux adnés à la base du lemma et libres au-dessus, les appendices souvent indistincts et indiqués seulement par de toutes petites excavations.

- I. nemorosus* (Sw.) Doell. Répandu.
I. pallens (Sw.) Munro. Répandu.
I. axillaris (Nees) H. et Ch. Dans les montagnes; rare.

Lasiacis (Griseb) Hitchc.

Inflorescence composée de panicules ouvertes (rarement compactes) au sommet des chaumes et des branches feuillées; épillets légèrement globuleux placés obliquement sur leurs pédicelles; glumes et lemma stérile larges, papyracés, brillants, glabres, généralement laineux au sommet; fruit blanc, osseux—induré, de forme d'œuf renversé; le lemma et le palea portent tous deux au sommet, dans une légère excavation cratériforme, une touffe de cheveux laineux, le palea concave en dessous, gibbeux en dessus, le sommet souvent libre à maturité; herbes vivaces, grimpantes, à tige ligneuse (rarement rampantes).

- L. rugelli* (Griseb) Hitchc. Ile de la Tortue.
L. oaxacensis (Steud) Hitchc. Dans les montagnes; rare; Port-Margot.
L. sorghoidea (Desv.) H. et Ch. Dans les montagnes; répandu.
L. divaricata (L.) Hitchc. Abondant.
L. sloanei (Griseb) Hitchc. «Calumette.» Abondant.

Sacciolepis Nash.

Inflorescence, une panicule étroite en forme d'épi; épillets pointus, la 2ème glume et le lemma stérile renflés (la glume plus ou moins sacculiforme) beaucoup plus grands que le fruit à peine stipité.

- S. striata* (L.) Nash. Dans les marécages; rare (Port Margot).

Hymenache Beauv.

Épillets à pédicelles courts en panicules longues, denses, épiées ou interrompues; épillets acuminés; lemma et palea à peine indurés, les bords du lemma plats, le palea non fermé au-dessus.

- H. amplexicaulis* (Rudge) Nees. Marécages, abondant.

Scutachne Hitchc. et Chase.

Inflorescence paniculée; épillets acuminés, atténués à la base; 1ère glume membraneuse; 2ème glume et lemma stérile coriacés—indurés; le lemma renfermant un palea de même texture; fruit sinon légèrement plus induré que le

lemma stérile, mucroné, le sommet du palea non enfermé, très pubescent sur le bord.

S. dura (Griseb.) H. et Ch. Répandu.

Isachne R. Br.

Inflorescence paniculée; épillets petits, subglobulaires; glumes subégales; fleuron inférieur parfait ou staminé, son lemma et son palea sont indurés et semblables en forme et en texture à ceux du fleuron supérieur; tous les deux fruits plano-convexes, presque de dimension égale, restant généralement attachés par le très petit nœud du rachilla placé entre eux.

I. rigidifolia (Poir.) Urb. Dans les montagnes.

Oplismenus Beauv.

Inflorescence de plusieurs grappes épaisses le long d'un axe commun; épillets subsessiles; glumes et lemma stériles, barbus ou mucronés; fruit aigu comme dans le genre *Panicum*.

O. burmanni (Retz.) Beauv. Abondant.

O. setarius (Lam.) Roem et Schult. Abondant.

O. hirtellus (L.) Beauv.

Echinochloa Beauv.

Inflorescence paniculée; la panicule généralement compacte à fleurs denses, composée de grappes unilatérales ou de branches presque simples; épillets hispides ou épineux; glumes généralement mucronées; lemma stérile généralement barbu; fruit légèrement induré, acuminé, pointu.

E. colona (L.) Link. Endroits humides, abondant.

E. crusgalli (L.) Beauv. Marécages, répandu.

E. spectabilis (Nees.) Link. Bord des rivières, etc.

Tricholæna Schrad.

Inflorescence paniculée; épillets à courts pédicelles, la première glume très petite, le nœud du rachilla placé entre les glumes allongées. La 2ème glume et le lemma stérile sont abondamment couverts de longs cheveux soyeux, bilobés, avec une barbe délicate entre les lobes, fruit légèrement induré.

T. rosea Nees. Introduit à St-Domingue («Natal grass» en anglais).

Setaria Beauv.

Inflorescence, une panicule compacte en forme d'épi (rarement flasque), les épillets solitaires ou disposés en petits bouquets sous-tendus par 1—plusieurs soies grêles et scabreuses (branchettes stériles), celles-ci persistent souvent après la chute des épillets; épillets semblables à ceux du genre *Panicum*, turgides; le fruit est, en général, obliquement rugueux.

S. barbata (Lam.) H. et C. Trouvé par Picarda, disparu?

S. setosa (Sw.) Scribe. Très commun.

S. vulpiseta (Lam.) H. et C. Pas retrouvé depuis l'époque coloniale.

S. geniculata (Lam.) Millsp. Chase. Très commun.

S. lutescens (Weigel) Stuntz. Furcy.

S. scandens (Schrad) Scribe et Merr. Dans les montagnes.

S. tenax (L. C. Rich) Hitchc. Ile de la Tortue.

Pennisetum Pers.

Épillets 1 à 3 ensemble sous-tendus par un verticille de soies grêles (branchettes stériles) subsessiles le long d'un axe commun formant des épillets velus, les soies en tombant s'attachant à l'épillet lancéolé.

P. domingense (Spreng) Spreng. Très rare, St-Domingue.

P. clandestinum Choir. («Kikuyu grass» en anglais).

P. purpureum Schum. «Z'herbe éléphant» cultivé sur de grandes plantations comme fourrage pour les bœufs.

P. glaucum R. Br. «Pti-mil chandelle» (Haïti).

Cenchrus L.

Épillets 1-4 ensemble, sous-tendus et environnés par un involucre ovoïde ou globulaire, hérissé d'épines, formé de branches stériles soudées; cet involucre hérissé, légèrement sessile le long d'un axe commun, tombe avec les épillets et les enferme d'une façon permanente; épillets acuminés, la première glume parfois obsolette.

C. myosuroides H. B. K. Bord de mer, assez rare.

C. pauciflorus Benth. Ile de la Tortue.

C. tribuloides L. Sur les plages.

C. echinatus L. «Piquant cousin» (Haïti).

C. viridis Spreng. «Piquant cousin» ou «Piquant ver» (Haïti).

Stenotaphrum Trin.

Épillets 2 ou 3 ensemble disposés en grappes réduites, celles-ci enfouies dans des cavités le long d'un côté d'un axe large, plat, épais, subéreux, articulé; les épillets en tombant s'attachent aux nœuds; épillets très convexes sur le côté interne, 1ère glume très petite.

S. secundatum (Walt.) O. Kuntze. Bord de mer, une variété est cultivée dans les jardins.

Olyra L.

Plantes monoïques; inflorescence pistillée; épillets nés sur les branches supérieures et sur les extrémités des branches inférieures, des panicules terminales, flasques; les plus petits épillets staminés, pédicellés le long des branches inférieures. Epillets pistillés plutôt grands, 1ère glume absente; 2ème glume et lemma stérile herbacés, caudé-acuminés, fruit ossu-induré. Epillets staminés, facilement caducs, glumes et lemma stérile absents, lemma et palea membraneux.

O. latifolia L. «Bambou.» Dans les halliers, commun.

Lithachne Beauv.

Plantes monoïques; épillets disposés en petites panicules axillaires, celles-ci, avec un seul épillet au sommet et 1- plusieurs épillets staminés au-dessous; panicule terminale (si présente) entièrement staminée; 1ère glume de l'épillet pistillé absente; 2ème glume et lemma stérile herbacés, à pointes longues; fruit ossu-induré, latéralement subcompressés, le lemma grandement renflé ou gibbeux au dos; l'étroit palea légèrement convexe; épillets staminés réduits au lemma et au palea.

L. pauciflora (Swartz) Beauv.

Tribu VI. ORYZEÆ

Épillets unisexués ou parfaits en panicules détachées; rachilla articulé au-dessous des glumes, glumes souvent absentes. Etamines généralement 6.

x. Epillets unisexués:

2x. Lemma pistillé, cylindrique, glumes présentes, limbes larges, elliptiques, oblancéolés-oblongs

Pharus, p. 24

- 2x. Lemma pistillé subglobulaire, glumes absentes, limbes étroitement linéaires..... **Luziola**, p. 24
- x. Epillets parfaits:
- 2x. Glumes barbues, presque aussi longues que le lemma..... **Reynaudia**, p. 24
- 2x. Glumes imberbes, plus courtes que le lemma ou absentes:
- 3x. Glumes absentes, lemma imberbe..... **Homalocenchrus**, p. 24
- 3x. Glumes présentes, lemma généralement barbu..... **Oryza**, p. 24

Pharus L.

Epillets appariés, comprimés le long des branches grêles d'une panicule très étendue, un épillet pistillé subsessile, les autres staminés, pédicellés beaucoup plus petits que les épillets pistillés; lemma fertile légèrement induré, cylindrique couvert de cheveux uncinés. Limbes pétioles, le pétiole doué d'un enroulement qui renverse la surface des limbes.

- P. glabra** H. B. K. Commun, endroits marécageux.
- P. parvifolius** Nash. Ça et là.
- P. latifolius** L. Assez commun.

Luziola Gmel.

Epillets pistillés et staminés en panicules distinctes; glumes absentes. Caryopse avec péricarpe épais et dur.

- L. spruceana** Gmel. Dans les marécages, répandu.

Oryza L.

Epillets parfaits, paniculés, latéralement compressés; glumes excessivement petites; lemma et palea légèrement indurés, papilleux — rude; le lemma généralement barbu.

- O. latifolia** Desv. Bayeux.
- O. sativa** L. «Du riz.» Cultivé dans les régions marécageuses. Le riz des montagnes est très répandu en Haïti.

Homalocenchrus Mieg.

Epillets dépourvus de barbe, glumes absentes, autrement semblable au genre **Oryza**.

- H. hexandrus** (Sw.) Kuntze [*Leersia hexandrus* Sw.] Pte-Rivière de l'Ar-tibonite.

- H. monandrus** (Sw.) Kuntze [*Leersia monandrus* Sw.] Dans les collines sèches.

Reynaudia Kunth.

Epillets parfaits; glumes à nervation très prononcée, barbues entre les lobes du sommet émarginé; lemma barbu, sommet bilobé.

- R. filiformis** Kunth. Mont-Organisé.

Tribu VII. AGROSTIDEÆ

Epillets uniflorés; rachilla parfois prolongé au-delà du palea en une soie nue ou plumeuse; glumes presque égales, généralement aussi longues ou plus longues que le lemma; palea à 2 nervures, rarement dépourvu de nervures ou absent.

- x. Lemma induré..... **Aristida**, p. 25
- x. Lemma membraneux:
- 2x. Lemma avec 1 (rarement 3) nervures; péricarpe se séparant facilement du grain **Sporobolus**, p. 25

- 2x. Lemma 3-5 nervures; péricarpe adhérent au grain:
- 3x. Rachilla non prolongé derrière le palea... **Agrostis**, p. 25
- 3x. Rachilla prolongé derrière le palea, ressemblant à une soie..... **Calamagrostis**, p. 25

Aristida L.

Epillets en panicules fermées ou ouvertes; glumes acuminées; lemma convoluté, légèrement induré avec un calus pointu et portant une barbe trifide en partant du sommet.

- A. adscensionis** L. Très commun.
- A. ternipes** Cav. Port-de-Paix, rare.
- A. purpurascens** Poir. Acul Samédi.
- A. refracta** Griseb. Plaine du Nord.
- A. neglecta** Leon et Hitchc. Dans les savanes, assez rare.
- A. rosei** Hitchc. Par les collines sèches, commun.
- A. swartziana** Stend.

Sporobolus R. Br.

Epillets en panicules épiées ou ouvertes, imberbes; glumes plus courtes que le fleuron; palea se divisant facilement; péricarpe du caryopse, libre, la graine sortant facilement du caryopse.

- S. argustus** (Nees) Kunth. Bord de mer, commun.
- S. domingensis** (Trin.) Kunth. Bord de mer, assez commun.
- S. virginicus** (L.) Kunth. Endroits marécageux, bord de mer, très commun.
- S. litoralis** (Lam.) Kunth. Bord de mer, répandu.
- S. indicus** (L.) R. Br. «Z'herbe fine», très commun.
- S. berterianus** (Trin.) H. et C. Dans les montagnes.
- S. cubensis** Hitchc. Plaine Centrale, rare.

Agrostis L.

Epillets paniculés; glumes dépourvues de barbe, plus longues que le lemma; palea absent dans la plupart des espèces.

- A. perennans** (Walt.) Tuckerm. La Selle.
- A. hiemata** (Walt.) B. S. P. La Selle.

Calamagrostis Adans.

Epillets uniflores; rachilla prolongé derrière le palea en une soie poilue ou pédicellé; glumes presque égales, généralement plus longues que le fleuron; lemma avec une arête sur la partie dorsale généralement à la partie inférieure du milieu, environné à la base de nombreux poils longs. Palea plus court que le lemma, binervé.

- C. leonardi** Chase. Morne La Selle.

Tribu VIII. AVENÆ

Epillets de 2 ou plusieurs fleurs, paniculés; rachilla prolongé en arrière du palea du fleuron supérieur; glumes plus longues que le premier fleuron; un ou plusieurs fleurons barbus au dos au sortant des dents du sommet bifide; le calus et généralement les nœuds du rachis, chevelus.

- x. Articulation au-dessous de l'épillet **Sphenopholis**, p. 26
- x. Articulation au-dessus des glumes et entre les fleurons:
- 2x. Barbe sortant entre les dents du lemma, plate **Danthonia**, p. 26
- 2x. Barbe dorsale, cylindrique..... **Trisetum**, p. 26

Trisetum Pers.

Epillets avec 2 ou 3 fleurons parfaits; glumes égales; lemmas bidentés portant une barbe dorsale grêle.

T. spicatum (L.) Richt. La Selle.

Sphenopholis Scribn.

Epillets de 2 ou 4 fleurs, glumes inégales, tombant de l'épillet, la première étroite, aiguë, la deuxième cunéiforme, obtuse, devenant légèrement coriace dans le fruit; lemmas dépourvus de barbe.

S. obtusata (Michx.) Scribe. St-Domingue, dans les montagnes.

Danthonia D. C.

Epillets de plusieurs fleurs; glumes presque égales; plus longues que tous les fleurons; lemmas bifides, avec une arête enroulée, fixée entre les dents; arêtes plates, formées par l'extension des 3 nervures médianes du lemma.

D. shrevei Britton. Morne La Selle.

D. domingensis Hack. et Pilger. Morne La Selle.

Tribu IX. CHLORIDEÆ

Epillets de 1 ou plusieurs fleurs en épis unilatéraux qui sont digités ou paniculés, parfois solitaires.

x. Une seule fleur parfaite dans chaque épillet (très rarement 2):

2x. Epi disposés en grappes:

3x. Epillets articulés au-dessous des glumes, uniflores.

3x. Epillets de 2 ou plusieurs fleurs, articulés au-dessus des glumes, le 2ème fleuron parfois rudimentaire.

4x. Epillets courts et relativement larges, les fleurons supérieurs souvent réduits à des arêtes.

4x. Epillets longs et grêles, fleurons parfaits 2 ou davantage.

2x. Epi digités ou presque digités:

3x. Epillets avec 2 ou plusieurs fleurons parfaits:

4x. Rachis se déployant derrière les épillets. *Dactyloctenium*, p. 27

4x. Rachis ne se déployant pas derrière les épillets.

3x. Epillets avec un seul fleuron parfait: *Eleusine*, p. 27

4x. Fleuron stérile absent, lemma obtus. *Cynodon*, p. 26

4x. Fleuron fertile présent, lemma barbu ou mucroné:

5x. Fleuron fertile élevé sur un long stipe, fleuron stérile réduit à de longues barbes.

5x. Fleuron fertile non élevé sur un long stipe, fleuron stérile consistant en lemmas distincts. *Gymnopus*, p. 27

5x. Fleuron fertile non élevé sur un long stipe, fleuron stérile consistant en lemmas distincts. *Chloris*, p. 27

x. Deux à trois fleurs parfaites dans chaque épillet. *Tripogon*, p. 28

Cynodon Pers.

Epillets uniflorés, sessiles, imbriqués en épis unilatéraux, grêles; glumes inégales, étroites, aiguës, lemma large, cymbiforme, enveloppant un palea d'égale longueur.

C. dactylon (L.) Pers. «Chiendent [*Capriola dactylon* (L.) Kuntze.] Très commun.

Spartina Schreb.

Epillets de 1 ou beaucoup de fleurs, sessiles, latéralement aplatis en épis unilatéraux épais; glumes inégales, acuminées; lemma et palea obtus, subégaux.

S. patens Muchlenb. Var. *junceae* (Michx.) Hitchc. Sur les plages.

Chloris Sw.

Epillets avec une fleur parfaite, sessiles, le long d'un rachis grêle formant des épis unilatéraux, et digités; glumes inégales; lemma barbu ou mucroné; rachilla prolongé derrière le palea et portant quelques lemmas rudimentaires barbus, stériles.

C. petraea Sw. Sur les plages, répandu.

C. sagraeana A. Rich. Près de la mer, répandu.

C. cubensis Ekman. Long des chemins.

C. angustiflora Aresch. Anses-à-Pitre.

C. radiata (L.) Sw. Particulièrement dans les montagnes.

C. virgata Sw. Assez commun.

C. barbata (L.) Nash. Les Cayes, Gde-Caïmite.

C. paraguayensis Stend. Très commun.

C. ciliata Sw. Très commun.

Gymnopus Beauv.

Epillets avec un fleuron parfait et 2 ou 3 fleurons stériles, la plupart réduits à de simples arêtes au-dessus; glumes égales aux fleurons ou plus longues; lemma fertile, étroit, à barbes longues; épillets distants ou rapprochés, appressés le long d'un axe grêle.

G. foliosus (W.) Nees. St-Domingue, (?) Très rare.

Bouteloua Lag.

Epillets avec un fleuron parfait, groupes unilatéralement le long d'un rachis étroit, formant de courts épis (mais rarement un seul épillet à un épi); glumes inégales, lemma fertile, plutôt large, généralement de 3 à 5 dents, très souvent mucroné ou barbu; lemma stérile généralement avec 3 barbes; épis en grappes, souvent marcescents.

B. juncea (Desv.) Hitch. Dans les plaines sèches, commun.

B. americana (L.) Scribn. Sur les collines, abondant.

B. heterostega (Trin.) Griffiths. Sur les collines, abondant.

Eleusine Gaertn.

Epillets avec plusieurs ou beaucoup de fleurs, compactement imbriqués en épis épais, ceux-ci légèrement digités; glumes et lemmas avec carènes épaisses à 5 nervures, aigus; caryopse avec péricarpe mince, marqué de fines lignes transverses.

E. indica (L.) Gaertn. «Z'Herbe pieds-poule.»

E. verticillata Roxb. Plaine Cul-de-Sac.

Dactyloctenium Willd.

Epillets semblables à ceux du genre *Eleusine*, mais les glumes et les lemmas sont mucronés et garnis d'une arête au bout; le sommet du rachis s'étend en une pointe au-delà des épillets.

D. ægyptium (L.) Richt. Long des chemins, etc. Très commun.

Leptochloa Beauv.

Épillets avec peu ou beaucoup de fleurs, à pédicelles courts, compressés librement, imbriqués le long d'un étroit rachis formant des grappes grêles, celles-ci nombreuses en une panicule allongée; glumes et lemma carénés, les lemmas pourvus de trois nervures.

L. scabra Nees.

L. filiformis (Lam.) Beauv. Champs cultivés, répandu.

L. fascicularis (Lam.) A. Gray. Endroits marécageux, répandu.

L. virgata (L.) Beauv. Sur les collines, répandu.

L. domingensis (Jacq.) Trin. Dans les halliers, assez commun.

L. mornicola Chase. La Selle.

Tripogon R. & S.

Petites herbes gazonnantes avec des feuilles étroites. Epis longs, assez déliés; épillets libres, pluriflores, les 1-2 fleurs supérieures petites, staminées ou stériles.

T. spicatus (Nees) Ekm. St-Michel de l'Attalaye.

Tribu X. FESTUCEÆ

Épillets de 2 à beaucoup de fleurs, généralement parfaits, pédicellés, disposés en grappes ou en panicules compactes; glumes plus courtes que le fleuron inférieur; lemmas avec une à plusieurs nervures, dépourvus de barbe ou garnis d'une ou plusieurs barbes droites, lemmas terminaux ou nés juste au-dessous du sommet.

- x. Epillets (au moins les pistillés) abondamment garnis de longs cheveux soyeux sur les lemmas ou sur le rachilla:
 2x. Epillets unisexués..... **Gynierium**, p. 29
 2x. Epillets parfaits:

3x. Lemmas chevelus; rachilla glabre **Arundo**, p. 29

3x. Lemmas glabres; rachilla chevelu..... **Phragmites**, p. 29

x. Epillets non garnis de longs cheveux; les cheveux, s'ils sont présents, sont beaucoup plus courts que les lemmas:

2x. Limbes larges, variant de la forme ovoïde à la forme elliptique, montrant des veines transverses entre les nervures..... **Senites**, p. 29

2x. Limbes linéaires, ne montrant pas de veines transverses:

3x. Lemmas avec 3 nervures..... **Eragrostis**, p. 29

3x. Lemmas avec 5 nervures ou plus:

4x. Les lemmas le plus bas placés sont vides:

5x. Plantes hermaphrodites généralement plus de 50 cm. de hauteur..... **Uniola**, p. 29

5x. Plantes dioïques généralement de moins de 30 cm. de haut..... **Distichlis**, p. 30

4x. Les lemmas plus bas placés sont fertiles:

5x. Lemmas obtus ou presque obtus, dépourvus de barbe, — généralement en forme de toile d'araignée à la base..... **Poa**, p. 30

5x. Les lemmas aigus ou poilus, non en forme de toile d'araignée:

6x. Extrémité du lemma bifide.... **Bromus**, p. 30

6x. Extrémité du lemma entière... **Festuca**, p. 30

Gynierium Hum. & Bonpl.

Plantes dioïques; épillets de plusieurs fleurs; épillets pistillés avec de longues glumes atténuées et des lemmas plus courts à longues soies; épillets staminés avec des glumes plus courtes et des lemmas glabres.

G. sagittatum (Aubl.) Beauv. «Roseau.» Dans les rivières, commun.

Arundo L.

Épillets parfaits, de 2 ou de plusieurs fleurs; glumes d'environ même longueur que les épillets; lemmas bidentés, cuspidés entre les dents et garnis de longs cheveux soyeux sur le dos; rachilla à nu.

A. donax L. «Z'Herbe roseau,» très grande plante de 5 à 8 mètres de hauteur, croissant le long des bancs de rivières et dans les terrains humides.

Phragmites Rrin.

Épillets de 2 à plusieurs fleurs, le fleuron inférieur staminé ou neutre, ses lemmas allongés; glumes plus courtes que les fleurons; lemmas acuminés, rachilla compactement recouvert de longs cheveux soyeux.

P. phragmites (L.) Karst. Endroits marécageux, Presqu'île du Sud-Ouest.

Eragrostis Host.

Épillets variant de peu à beaucoup de fleurs, fortement compressés; glumes et lemmas quillés, les lemmas à 3 nervures; rachilla souvent continu, les paleas généralement persistant après la chute du fruit.

E. amabilis (L.) Wight et Arn. Dans les rues.

E. ciliaris (L.) Link.

E. hypnoïdes (Lam.) B. S. P. Bords des étangs, assez rare.

E. pilosa (L.) Beauv. Dans les savanes, pas rare.

E. tephrosanthos Schult. Très commun.

E. minor Host. Trouvé par Picarda, disparu?

E. berteroniana (Schult) Stend. Dans les plaines sèches, abondant.

E. elliotii S. Watts. St-Domingue, rare.

E. prolifera (Sw.) Stend. Sur les plages, Massif du Nord.

Senites Adans.

Épillets de 2 à plusieurs fleurs; le fleuron inférieur parfait, les autres staminés, le nœud du rachilla entre les fleurons parfaits et staminés, allongé; glumes et lemmas fertiles, herbacés, larges, avec des veines transverses entre les nervures, obtus ou tronqués, les glumes environ ½ fois aussi longues que les lemmas; lemmas stériles membraneux, plus étroits, aigus.

S. zeugites (L.) Nash [*Zeugites americana* Willd.] Dans les montagnes.

S. haitiensis (Pilg.) Hitch. et Chase [*Zeugites haitiensis* (Pilg.) Urb.] Dans les montagnes.

Uniola L.

Épillets fortement compressés, de peu à beaucoup de fleurs, les fleurons inférieurs de 1 à 4 vides; glumes et lemmas quillés, fermes, les glumes petites, les lemmas à nervures nombreuses, peu apparentes; paleas rigides; les carènes munies de larges ailes.

U. virgata (Poir.) Griseb. «Herbe à flèche.» Sur les collines sèches, très commun.

Distichlis Raf.

Plantes dioïques; épillets compressés, formés de plusieurs fleurs; les glumes et les lemmas sont fermes, carénés, les lemmas à nervures nombreuses peu apparentes.

D. spicata (L.) Greene. Bord de mer, assez rare, Sources-Puantes.

Poa L.

Épillets petits, de peu de fleurs; glumes carénées, aiguës; lemmas herbacés avec les bouts scariés, carénés à 5 nervures, dépourvus de barbe.

P. annua L. Dans les montagnes, introduit de l'Europe.

P. compressa L.

P. protensis L. La Selle.

Festuca L.

Épillets de peu à beaucoup de fleurs; glumes petites; lemmas fermes, convexes ou carénés vers le sommet seulement, barbus à partir du sommet.

F. myuros L. La Selle, introduit.

Bromus L.

Herbes avec feuilles plates et panicules terminales d'épillets plutôt grands. Épillets de peu à beaucoup de fleurs; glumes inégales, aiguës, de 1-5 nervures; lemmas plus longs que les glumes, convexes ou parfois carénés de 5-9 nervures; généralement bi-dentés, au sommet; palea un peu plus court que le lemma, bi-caréné; grain ridé adné au palea.

B. unioloïdes H. B. K. Ganthier.

B. sterilis L. Croix-des-Bouquets.

Tribu XI. BAMBUSEÆ

Tiges ligneuses dressées ou grimpantes; les limbes plats avec un court pétiole articulé avec la gaine; épillets de peu à beaucoup de fleurs, aplatis en panicules ou en grappes.

x. Tiges grimpantes ou rampantes:

2x. Épillets de 2 à plusieurs fleurs, grappes ... *Arthrostyidium*, p. 30

2x. Épillets uniflorés, en petite panicule ... *Chusquea*, p. 30

x. Tiges dressées ... *Bambos*, p. 30

Arthrostyidium Rupr.

Épillets pauciflores, en grappes, les lemmas inférieurs (1 ou 2) vides, le rachilla articulé entre les fleurons, rarement au dessous des flumes.

A. capillifolium Griseb. «Liane à scie.» Sur les collines sèches, répandu.

A. sarmentosum Pilger, «Violon.» Massif du Nord.

A. haitiense (Pilger) H. et C. «Liane à scie.» au-dessus de 800 m. d'altitude.

A. multispicatum Pilger. Dans les montagnes.

Chusquea Kunth.

Épillets petits, avec un fleuron parfait et au-dessous 2 lemmas vides, le rachilla articulé au-dessous des glumes; les épillets disposés en panicules terminales.

C. abietifolia Griseb. Dans les montagnes, répandu.

Bambos Retz.

Épillets de plusieurs à beaucoup de fleurs, les glumes et les lemmas stériles persistent après la chute des fleurons; glumes petites; lemmas fermes, à poin-

tes acérées ou à extrémités barbues, sessiles, solitaires ou en bouquets sur un axe allongé ou sur les branches d'une panicule; étamines 6.

B. vulgaris Schwd. «Bambou» (Haïti). Très commun.

Famille 12. CYPERACEÆ

Plantes caulescentes ou à hampes, semblables aux herbes ou aux joncs; un grand nombre d'espèces vivaces portent de longs rhizomes. Tiges ou hampes grêles, solides ou rarement creuses, triangulaires, quadrangulaires, arrondies ou aplatis. Feuilles insérées sur 3 rangs avec gaine non fendue; limbes étroits. Fleurs parfaites ou imparfaites, disposées en épillets, 1 rarement 2 sur l'axe de chaque écaille (glumes, bractées); épillets solitaires ou en grappes à une ou plusieurs fleurs. Écailles appariées ou spiralement imbriquées, persistantes ou caduques. Périanthe hypogyne réduit le plus souvent à de simples paillettes ou à des soies plus ou moins nombreuses et plus ou moins développées, ou entièrement absent. Androcée de 1 à 3 étamines ou rarement plus. Filaments grêles ou filiformes. Anthères à 2 lobes. Gynécée de 2 ou 3 carpelles soudés. Ovaire à un compartiment. Styles ou stigmates: 2 ou 3, souvent les premiers sont plus ou moins soudés. Ovule anatrophe, dressé. Fruit: un akène lenticulaire, plano-convexe ou triangulaire. Endosperme farineux. Embryon très petit.

Cette famille est en général de peu d'importance économique; certaines formes sont employées comme plantes ornementales, d'autres fournissent de la paille qu'on utilise dans la confection des «nattes» des chapeaux et des paniers.

x. Épillets composés d'au moins une fleur parfaite:

2x. Épillets parfaits, rarement 2 écailles et une fleur:

3x. Écailles des épillets disposées sur 2 rangs:

4x. Epillet avec 2 ou plusieurs fleurs parfaites; écailles plusieurs ou beaucoup. *Cyperus*, p. 32

4x. Epillet avec une fleur parfaite; écailles de 2 à 4. *Kyllinga*, p. 32

3x. Écailles des épillets spiralement imbriquées:

4x. Base du style pas ou peu épaisse, caduque:

5x. Écailles pubescentes; périante avec écailles dilatées. *Fuirena*, p. 34

5x. Écailles glabres; périante dépourvu d'écailles. *Scirpus*, p. 34

4x. Base du style manifestement renflée, persistante comme un tubercule sur l'akène:

5x. Périante présent. *Heleocharis*, p. 33

5x. Périante absent

6x. Akène non surmonté d'un tubercule. *Fimbristylis*, p. 33

6x. Akène surmonté d'un tubercule:

7x. Épillets en ombelles ou en cymes, dépourvus d'un involucre imbriqué. *Bulbostylis*, p. 34

7x. Épillets en capitules sous-tendus par un involucre imbriqué. *Dichromena*, p. 34

2x. Épillets polygames, ou rarement de 4 écailles et d'une seule fleur:

3x. Stigmates 3; style caduc:

4x. Périante présent. *Schoenus*, p. 35

- 4x. Périanthe absent:
 5x. Epillets uniflorés..... Remirea, p. 35
 5x. Epillets généralement pluriflorés Cladium, p. 35
 3x. Stigmates 2; style persistant..... Rynchospora, p. 34
 x. Plantes monoïques ou dioïques:
 2x. Akènes non enfermés dans un utricule
 (Perigynium)..... Scleria, p. 35
 2x. Akènes enfermés dans un utricule:
 3x. Un axe manifeste sur lequel naît la
 fleur pistillée latérale..... Carex, p. 36
 3x. Un axe indistinct ou à peine perceptible
 sur lequel naît la fleur pistillée latérale . Uncinia, p. 36

Kyllinga Rottb.

Involucre de 2 ou plus de 2 bractées; épillets nombreux, compressés, chaque épillet avec une fleur parfaite comprenant 3 ou 4 écailles, la première ou la deuxième écaille inférieure vide, celle du milieu fertile, l'écaille supérieure vide ou staminée. Écailles carénées disposées sur 2 rangs. Périanthe absent.

- K. brevifolia Rottb.
 K. pungens Link.
 K. peruviana Lam.
 K. pumila Michx.

Cyperus L.

Epillets de peu à beaucoup de fleurs, la plupart plats formant généralement une ombelle simple ou composée, terminale. Écailles disposées sur deux rangs. Style avec une ou deux fentes; chaumes avec une ou plusieurs feuilles au sommet formant un involucre.

Genre très commun comprenant environ 400 espèces connues se trouvant principalement dans les régions tropicales ou subtropicales. Certaines espèces sont employées comme plantes ornementales, tandis que d'autres constituent un vrai fléau pour les champs cultivés.

- C. amabilis Vahl.
 C. haspan L. Subs. juncoïdes Lam. Var. amplissimus Kük.
 C. constanzæ Urb.
 C. ochraceus Vahl.
 C. luzulæ (L.) Rottb.
 C. elegans L.
 C. compressus L.
 C. distans L.
 C. articulatus L.
 C. rotundus L. «Año», un fléau très sérieux dans les champs.
 C. radiatus Vahl.
 C. alternifolius L. «Parasol chinois», plante ornementale, var. flabelliformis (Rottb.) Kükenthal.
 C. picardæ Boech.
 C. sphacelatus Rottb.
 C. polystachyus Rottb.
 C. pulicaris Kükenth. Morne La Selle. Var. explicatus Kük.
 C. planifolius L. C. Rich. Var. navassanus Kük et Ekm.
 C. flavus (Vahl.) Nees.
 C. eggersii Roeb. [Torulinum eggersii Clarke].
 C. fuligineus Chapm.
 C. lævigatus L. [Juncellus lævigatus (L.) Clarke].
 C. swartzii (Diter) Borek [Mariscus filiformis (Sw) Spreng].

- C. densus Link.
 C. virens Mich.
 C. confertus Sw.
 C. humilis Kunth.
 C. flavescens (L.) Reichb.
 C. odoratus (L.) Urb.
 C. olfersianus Kunth.
 C. unioloïdes R. Br.
 C. cayennensis (Lam.) Urb.
 C. gracilis Vahl.
 C. hermaphroditus. (Jacq.) Urb.
 C. mutisii H. B. K.
 C. globulus Aubl. Var. multiflorus Kük et Ekm. La Gonâve.
 C. ehrenbergianus Bock.
 C. tenuis Sw.
 C. giganteus Vahl.
 C. capillaris (Sw) Vahl.
 C. ligularis (L.) Urb.
 C. flabelliformis H. B. K.
 C. bruneus (Sw.) Clarke.
 C. esculentus L. Var. phymatodes (Muehlenb) Kük.
 C. ferax L. C. Rich.
 C. vahili Steud.
 C. filiformis Sw.
 C. digéatus Roxb. Massif de la Hotte.

Heleocharis R. Br.

Feuilles réduites à des gaines. Epillets solitaires, terminaux dressés, de plusieurs à beaucoup de fleurs; épillets non involucreux (rarement deux petites bractées sous-tendantes). Écailles en spirale. Périanthe de une à 12 soies ou périante absent.

- H. interstincta (Vahl) R. Br.
 H. mutata (L.) R. Br.
 H. cellulosa Torr.
 H. flaccida (Rchb.) Urb.
 H. capitata (L.) R. Br.
 H. nodulosa (Roth) Schult. Var. subnodulosa (Stendel.) Kükenthal.
 H. acicularis (L.) R. Br.
 H. retroflexa (Poir) Urb.
 H. tenuissima Boeck.
 H. geniculata R. Br.

Fimbristylis Vahl.

Epillets en ombelles ou en capitules, cylindriques, plusieurs à beaucoup de fleurs; écailles en spirale, toutes fertiles, caduques. Involucre avec une ou beaucoup de bractées. Périanthe absent.

- F. annua (All) R. et Sch.
 F. ferruginea (L.) Vahl.
 F. spadicea (L.) Vahl.
 F. glomerata (Retz) Urb.
 F. complanata (Retz) Link.
 F. monostachya (L.) Hassk.

Bulbostylis Kunth.

Feuilles basilaires, limbes étroitement linéaires ou filiformes, les gaines ciliées ou pubescentes avec de longs poils. Epillets en ombelles, en capitules, ou solitaires, sous-tendus par un involucre d'une à plusieurs bractées, leurs écailles spiralement imbriquées, la plupart caduques. Fleurs parfaites. Périante absent.

- B. alpestris* Urb. [*Stenophyllus alpestris* Britton].
- B. junciformis* (HBK) Clarke [*Stenophyllus junciformis* Britton].
- B. tuerckheimii* Urb. [*Stenophyllus tuerckheimii* Britton].
- B. capillaris* (L) Clarke [*Stenophyllus capillaris* Britton].
- B. vestita* Kunth. Massif du Nord.
- B. haïtiensis* Kunth.
- B. ekmanii* Kukenth.
- B. curassavica* Britton, var. *pallenscens* Kük et Ekm. La Gonâve.
- B. subfimbriata* Kük. Massif de la Selle.
- B. hispaniola* Kük et Ekm. Massif du Nord.

Scirpus L.

Epillets cylindriques ou quelque peu aplatis, solitaires, capités, en épis, ou en ombelles, généralement sous-tendus par un involucre d'une ou de plusieurs bractées. Ecaïlles spiralement imbriquées, 1 à 3 des écailles inférieures parfois vides. Fleurs parfaites; périante composé généralement de 1-6 soies.

- S. spadiceus* (Lam) Boeck.
- S. cubensis* Poepp. et Kth.
- S. olneyi* A. Gray, var. *longisetis* Kük. Massif de la Selle.
- S. lacustris* L.

Fuirena Rottb.

Ecaïlles spiralement imbriquées, barbuës, les écailles inférieures généralement vides. Fleurs parfaites. Périante de 3 sépales oblongs ou cordé-ovoïdes, pétiolés, souvent barbus, alternant généralement avec autant de soies barbuës.

- F. umbellata* Rottb. Port-Margot.

Dichromena Vahl.

Epillets à tiges feuillées réunies en un capitule terminal involucre par plusieurs bractées qui sont souvent blanches à la base. Ecaïlles spiralement imbriquées, dont plusieurs avec fleurs imparfaites ou vides. Périante absent.

- D. colorata* (L) Hitch. Port-au-Prince.
- D. ciliata* Vahl. Marmelade.
- D. radicans* Schlecht et Cham. Port-Margot.

Rynchospora Vahl.

Limbes des feuilles étroits, plats ou involutés. Ecaïlles minces, uninerves, imbriquées, généralement mucronées, les écailles inférieures vides. Les fleurs supérieures imparfaites, les inférieures parfaites. Périante généralement présent, composé généralement de 6 soies barbuës ou scabreuses.

- R. barbata* (Vahl) Kunth.
- R. buchii* Urb.
- R. cyperoides* (Sw) Mart. Port-de-Paix.
- R. corymbosa* (L) Britton, Azua. (Rep. Dominicaine).
- R. domingensis* Urb.
- R. pusilla* (Sw) Griseb. Mirebalais.

- R. fascicularis* (Mich) Vahl.
- R. glauca* Vahl. Port-de-Paix.
- R. cymosa* (W) Elliott. Borgne.
- R. stenophylla* Chapm.
- R. eximia* (Nees) Boeck. Massif du Nord.
- R. exaltata* Kunth var. simple Kük. Massif de la Hotte.
- R. cubensis* A. Rich. Borgne.
- R. racemosa* C. Wr. St-Domingue.
- R. miliacea* (Lam) Gray.
- R. elongata* (Urb.) Kukenth.
- R. lindeniana* Griseb. Massif du Nord.
- R. aristata* Boeck.
- R. ekmanii* Urb.
- R. micrantha* Vahl. Massif de la Selle.
- R. setacea* (Berg.) Boeck. Massif de la Hotte.

Schoenus L.

Feuilles basilaires; gaines de couleur sombre. Epillets disposés en bouquets terminaux de 1-8 fleurs sous-tendues par un involucre de 1-2 bractées. Epillets souvent de couleur sombre; écailles imbriquées. Périante de 3-6 soies scabreuses.

- S. nigricans* L. Massif de la Selle.

Cladium R. Br.

Epillets de plusieurs écailles lâchement imbriquées; l'épillet inférieur vide, 1-2 au-dessus portant une fleur staminée ou imparfaite, la fleur terminale parfaite. Périante absent.

- C. mariscus* (L) R. Br. [*Mariscus jamaicens* Britton]
- C. restioides* (Sw) Benth. Département du Nord, Port-Margot.
- C. ekmanii* Kukenth. Massif du Nord. Var. *effusa* (Griseb) Clarke.

Remirea Aubl.

Feuilles imbriquées, limbes étroits, rigides. Involucre avec de nombreuses bractées. Epillets nombreux, capités, uniflorés; écailles imbriquées. Périante absent.

- R. maritima* Aubl.

Scleria Berg.

Epillets petits, groupés en faisceaux ou quelque peu épiés. Fleurs monoïques; épillets fertiles, uniflorés; épillets staminés pluriflorés. Ecaïlles imbriquées. Périante absent. Limbes généralement rugueux.

- S. distans* Poir. Morne La Selle. Var. *interrupta* (A. Rich) Kuk.
- S. hirtella* Sw.
- S. lithosperma* (L) Sw.
- S. ciliata* Michx.
- S. secans* (L) Urb.
- S. pterota* Presl. «Z'Herbe rasoir» (Haïti).
- S. cubensis* Boeck. Département du Sud, Morne La Hotte.
- S. eggersiana* Boeck. Départements du Sud et du Nord.
- S. microcarpa* Nees. Département du Nord, Bayeux.
- S. setacea* Poir.
- S. mitis* Bergius.

Uncinia Pers.

Fleurs unisexuées, les fleurs pistillées projetant d'une utricule.

U. hamata (Sw) Urb. Répandu.

Carex L.

Herbes en forme de gazon. Bractées sous-tendant généralement les épis. Fleurs monoïques ou dioïques, solitaires. Périanthé indistinct. Genre très étendu, comprenant environ 500 espèces, réparties à travers le monde.

C. cubensis Kuk. var. *flaccida* Kuk. Massif de la Hotte.

C. albolutescens Schwein. Morne La Selle.

C. stellulata Good. Var. *angustata* Carey.

C. cladostachya Wahlbg. Morne La Selle.

C. pseudocyperus L. Var. *polysticha* (Boeck) Kukenth.

C. ekmanii Kukenth. Morne La Selle. Var. *hottensis* Kuk et Ekm.

C. scabrella Wahlbg.

C. subscabrella Kuk.

Ordre VI. PHŒNICALES

Arbres ou arbrisseaux. Tiges verticales, dressées, appelées stipes, terminées par un bouquet de grandes feuilles développées en rosette autour du sommet. Fleurs très petites, généralement nombreuses, réunies sur un pédoncule commun, simple ou ramifié en grappes plus ou moins complexes. L'ensemble est enveloppé au début dans une spathe dure accompagnée ou non de spathes secondaires. Le pédoncule commun inclus dans la spathe est le spadice. Fleurs actinomorphes, le plus souvent unisexuées par avortement. Périanthé généralement de 6 parties ou lobes, représentant 3 pétales et 3 sépales.

Les caractères végétatifs donnent à ces plantes un port et un aspect spéciaux qui permettent de les reconnaître tout de suite. Famille de plantes tropicales d'une importance économique considérable. Certains types sont cultivés comme plantes ornementales. On utilise la tige pour la construction des maisons. Les bourgeons de certaines espèces sont comestibles: chou de palmiste. Les feuilles sont utilisées d'une foule de manières pour la confection des chapeaux, des nattes, des cordes et d'autres articles. Les fruits d'un grand nombre d'espèces constituent des produits alimentaires précieux, tandis que d'autres fournissent de grandes quantités d'huile.

Famille 13. PHŒNICACEÆ.

Caractères de l'ordre.

x. Feuilles flabellées:

2x. Pétioles inermes:

3x. Calice et corolle soudés en une coupe à 6 lobes ou tronquée:

4x. Drupe à chair blanche; endosperme lisse.

4x. Drupe à chair noire; endosperme sillonné. *Thrinax*, p. 38

3x. Calice et corolle distincts et disposés en 2 séries. *Coccothrinax*, p. 38

3x. Calice et corolle distincts et disposés en 2 séries. *Sabal*, p. 39

2x. Pétioles épineux:

3x. Fleurs bisexuées:

4x. Fruit drupacé; endosperme attaché à la base. *Washingtonia*, p. 38

4x. Fruit à baie; endosperme coriacé attaché au sommet. *Copernicia*, p. 39

3x. Fleurs polygamo-dioïques. *Chamærops*, p. 38

x. Feuilles pennées:

2x. Feuilles pennées courtes; élargies au sommet. *Caryota*, p. 39

2x. Feuilles pennées longues, étroites, pointues à l'extrémité:

3x. Pétioles inermes:

4x. Ovaire formé de 3 carpelles distincts, parfois un seul se développe. *Phoenix*, p. 38

4x. Ovaire formé de carpelles unis:

5x. Graines adhérentes à l'endocarpe, embryon opposé au pore:

6x. Plantes spinescentes:

7x. Fruit manifestement pédicellé. *Acrocomia*, p. 42

7x. Fruit non ou très légèrement pédicellé:

8x. Sépales libres; pinnules

tronquées. *Martinezia*, p. 42

8x. Sépales soudés; pinnules aiguës. *Bactris*, p. 42

6x. Plantes inermes:

7x. Endocarpe avec 3 pores aigus du milieu. *Elaeis*, p. 41

7x. Endocarpe osseux avec 3-6 pores vers la base:

8x. Fruit petit, spathe très épaisse. *Attalea*, p. 41

8x. Fruit grand, spathe mince. *Cocos*, p. 41

5x. Graines ombiliquées; embryon dorsal:

6x. Spadices infrafoliaires:

7x. Stigmates terminaux dans le fruit; ovaire entier, uniloculaire:

8x. Fleurs staminées, non symétriques; sépales généralement petits et non imbriqués:

9x. Ovule basilaire, dressé; étamines 3-6. *Areca*, p. 41

9x. Ovule pariétal, plus ou moins pendant; étamines 9-24. *Archontophoenix*, p. 41

8x. Fleurs staminées symétriques; sépales généralement arrondis et tout à fait enveloppants. *Ptychosperma*, p. 40

7x. Stigmates généralement excentriques ou latéraux sur l'ovaire:

8x. Péricarpe charnu, fibreux; pétales des fleurs pistillées connés à la base. *Roystonea*, p. 40

8x. Péricarpe corré, pétales libres. *Euterpe*, p. 40

6x. Spadices presque toujours interfoliaires:

7x. Fleurs enfoncées dans l'axe du spadice:

8x. Anthères en forme de flèche; style central situé entre les 3 loges fertiles de l'ovaire. *Calyptrogyne*, p. 39

8x. Anthères avec de longues loges distinctes, pendantes; style latéral situé à côté d'une loge fertile de l'ovaire. *Geonoma*, p. 39

7x. Fleurs non enfoncées dans

l'axe du spadice:

8x. Pétales et sépales 3..... *Pseudophoenix*, p. 408x. Pétales et sépales 6..... *Chrysalidocarpus*, p. 40**Phoenix L.**

Plantes à tronc généralement enveloppé par la base des vieilles feuilles. Feuilles longues, pennées, les pinnules inférieures parfois réduites à des épines. Nervation indupliquée. Fleurs dioïques, en spadices ramifiés dans le feuillage; calice trilobé, pétales 3 et généralement distincts; étamines le plus souvent 6, représentées dans les fleurs fertiles par des écailles ou un rebord; ovaires 3, distincts, parfois représentés dans les fleurs stériles par de tout petits pistilloïdes. Fruit cylindrique avec une graine longue, sillonnée.

P. dactylifera L. «Dattier.» Presqu'île du Nord-Ouest, Gonaïves, cultivé.

Chamærops L.

Fleurs dioïques ou polygamo-dioïques en spadices courts et dressés parmi les feuilles; spathes 2-4, spathes inférieures fendues. Calice trilobé; pétales 3, libres; étamines 6-9; ovaires 3 ou rarement plus; stigmates presque sessiles. Fruit ovoïde ou presque globulaire devenant rougeâtre ou jaunâtre, petit. Feuilles profondément coupées avec des segments étroits, étendus; pétiole grêle, généralement spinescent. Plante généralement ramifiée près de la base, produisant plusieurs troncs agrégés. Vernation indupliquée.

C. humilis L. Cultivé.

Thrinax L.

Arbres dépourvus d'épines. Feuilles à limbes flabellés, pâles ou argentées, teigneuses en dessous, pétioles lisses. Spadice relativement long. Etamines généralement 6; filets soudés à la base. Style concave ou plat. Drupe blanc d'ivoire.

T. longistyla Becc. Anses-à-Pitre.

T. wendlandiana Becc. «Latanier lan mer,» Ile de la Tortue, Ile de la Gonaïve, etc.

T. ekmanii Burret. Ile de la Navase.

Coccothrinax Sarg.

Arbres ou arbustes dépourvus d'épines. Feuilles à limbes flabellés, pâles ou argentées, teigneuses en dessous; pétioles lisses. Spadice relativement court; étamines généralement 9, filaments distincts ou presque distincts; style infundibuliforme. Drupe noire ou noir pourpre.

C. argentea (Lodd.) Sarg. «Palme coyau,» Anses-à-Pitre.

C. ekmanii Burret. Massif de la Selle.

C. concolor Burret. Massif de la Selle, Jacmel.

C. gracilis Burret.

C. fragrans Burret. Ile de la Tortue.

C. montana Burret. Massif de la Selle.

C. scoparia Becc. «Latanier balai.»

C. anomala Becc. «Latanier zombi,» Port-de-Paix, Massif de la Hotte.

Washingtonia H. Wendl.

Arbres généralement à stipes volumineux, feuilles flabelliformes, profondément divisées, les bords des feuilles se séparent fréquemment en de longues fibres flétries. Pétioles généralement épineux. Fleurs bisexuées en longs

spadices paniculés; étamines 6; ovaire à 3 loges. Drupe petite, ellipsoïdale, noire, avec stigmate basilaire.

W. filifera (Lind.) «Latanier d'Afrique,» cultivé.

Sabal Adans.

Arbrisseaux ou arbres dépourvus d'épines. Feuilles à limbes flabellés, glabres, spadice allongé. Etamines 6. Périanthé formé de 3 sépales inégaux et de 3 pétales. Graine brun sombre, sphéroïdale.

S. neglecta Becc.

S. domingensis Becc.

S. causiarum (O. F. Cook) Becc. «Latanier chapeau,» (Haïti) Massif de la Hotte.

Copernicia Mart.

Palmiers très grands, avec tronc souvent épaissi au-dessus de la base. Feuilles flabellées, pétiole souvent avec de petites épines, les jeunes petites feuilles généralement non divisées, les plus vieilles palmatifides. Spadice très ramifié, les fleurs solitaires sur le spadice ou en petites grappes; calice tubulaire, plus ou moins profondément tridenté. Fruit globulaire ou ovoïde, monosperme.

C. berteriana Becc. «Yarey» (St-Domingue). Presqu'île du Nord-Ouest.

C. ekmanii Burret. Môle St-Nicolas, «Homme paille.»

Caryota L.

Plantes sans épines, tronc grand, volumineux, annelé, portant plusieurs dragons. Vernation redupliquée. Feuilles bipennées, portant des segments flabellés ou deltoïdes. Fleurs le plus souvent monoïques, dans des spadices interfoliaires, distincts, avec de longues branches pendantes; spathes quelques-unes ou plusieurs, non entières, tubulaires; bractées larges; les 6 parties distinctes ou quelque peu connées à la base; pétales très allongés dans les fleurs stériles; étamines très nombreuses; ovaire trilobulaire avec ovules dressés. Fruit globulaire ou court-oblong, pourpre, de la grosseur d'un œuf de pigeon.

C. mitis Lour.

C. urens L.

Geonoma W.

Plantes grêles sans épines. Feuilles terminales ou alternes, généralement groupées en grappes voyantes; limbe entier, bilobé au sommet ou plus ou moins pinnatifide; segments acuminiés, uninerves, avec bords légèrement recourbés à la base; pétiole presque cylindrique, concave à la base au-dessus; gaine tubulaire. Spadices ascendants ou recourbés, simples ou ramifiés, grêles ou volumineux, souvent colorés. Spathes 2, souvent décidues avant la floraison, ou obsoletes, l'inférieure partielle, tronquée, concave, la supérieure comprimée ou fusiforme; fleurs monoïques dans chaque spadice, nées dans les rainures du spadice; loges des anthères enroulées. Fruit petit, globulaire, noir.

G. oxycarpa Mart. «Coco macaque.» Cette plante a été en si grande demande pour la confection des bâtons qu'on ne la trouve plus maintenant que dans les régions montagneuses les plus inaccessibles. Port-de-Paix, Jérémie.

Calyptrogyne H. Wendl.

Plantes non épineuses avec feuilles terminales inégalement pennées, nombreuses, souvent avec des segments pennés unis ensemble; folioles quelque peu

irrégulièrement disposées sur le rachis; pétiole très court ou absent. Spadice simple ou parfois ramifié à la base, avec long pédicelle; spathes 2; fleurs un peu inégales; sépales 3; pétales 3; étamines 6; style à moitié immergé dans le spadice. Fruit oblong ou obovoïde, monosperme.

C. occidentalis (Sw.) Gomez. «Palme» (Haïti, Morne Saut-d'Eau, Morne la Hotte.

Pseudophoenix H. Wendl.

Plantes non épineuses avec tronc en forme de fuseau. Spadice plus court que les feuilles, pendant, ramifié, presque en zigzag; fleurs femelles avec calice petit, divergent, quelque peu denticulé; pétales 3, ovés, obtus, verts, recourbés; staminodes 6, distinctement pourpre sombre au sommet. Fruit une drupe stipitée, contenant 1-3 carpelles, globulaire.

P. saonæ O. F. Cook. Ile Saona.

P. vinifera (Mart.) Becc. «Catié», Presqu'île de Barahona.

P. insignis Cook. «Catié», sur les collines sèches.

P. elata Cook. «Palme marron», Grand-Goâve.

P. ekmanii Burret. St-Domingue.

P. gracilis Ekm. Msc. Ile de la Gonâve.

P. navassana Ekm. Msc. Ile de la Navase.

Roystonea O. F. Cook.

Feuilles à limbes pennés; pétioles presque cylindriques au-dessus des longues gaines. Spadice pendant.

R. regia (HBK) Cook. [*Oreodoxa regia* H. B. K.] «Palmiste.» Un bel arbre très cultivé comme plante ornementale; pousse souvent à l'état sauvage; la partie externe de la tige s'emploie pour la construction; le bourgeon terminal se mange: chou palmiste.

Euterpe Gaertn.

Plantes non épineuses. Feuilles terminales, également pinnatifides; segments étroitement linéaires, longs et graduellement acuminés ou ensiformes, membraneux, plissés, les bords épaissis, recourbés à la base; rachis et pétiole trilatéraux vers la base, convexes sur le dos, concaves au-dessus; pétiole allongé; gaine très longue, cylindrique, entière. Spadice ramifié en panicules, rachis allongé, branches grêles, se raccourcissant graduellement en dessus, généralement squameuses. Spathes 2, coriacées ou membraneuses, lancéolées, l'inférieure plus courte fendue au sommet, dorsalement bicarénée, la supérieure symétrique, fendue du côté ventral.

E. globosa Gaertn. «Palmiste à chapelet», Massif du Nord, «Macoutouca», La Selle.

Chrysalidocarpus Wendl.

Fleurs monoïques en court spadice dans ou près du feuillage; les fleurs stériles avec des branches recourbées; pétales et sépales 6; étamines 6; anthères courtes et larges, dorsifixes; ovaire 1 avec style court et large stigmat. Fruit quelque peu turbiné, violet ou presque noir. Feuilles lisses et grêles, avec de nombreuses pinnules étroites, les pétioles et rachis sillonnés en dessous; vernation redupliquée. Tronc inerme.

C. glaucescens Waby. Cultivé.

Ptychosperma Labill.

Troncs lisses, annelés, couronnés au sommet par un bouquet dense de feuilles pinnatifides; folioles acuminées ou entières, ou dentées au sommet;

spadice simple ou parfois ramifié, apparaissant au-dessous des feuilles. Fleurs monoïques dans le même spadice. Fruit, une drupe ovoïde.

P. wendlandianum Burret. Cultivé, Massif du Nord, Port-de-Paix.

Archontophoenix Wendl. & Drude

Troncs simples, annulaires, inermes. Feuilles terminales formant une grande couronne souvent légèrement colorée en dessous; les segments ou pinnules entiers ou quelque peu fendus à l'extrémité. Inflorescence monoïque; spathes 2; fleurs sessiles, les staminées avec parfois 8 segments et les pistillées avec 3 ou plus, et portant parfois 6 staminodes; étamines 9-24; filets généralement connés à ou près de la base. Fruit petit, globulaire ou elliptique-globulaire, la noix dans une coque qui découvre en dessous une structure en forme de macis.

A. alexandræ (Fv. Maell.) Wendl. et Drude. Cultivé.

Areca L.

Plantes non épineuses. Feuilles bipartites au début, feuilles adultes pennées formant de grands bouquets terminaux; folioles grêles, lancéolées ou linéaires, acuminées. Spadice très ramifié. Spathes 3, l'une d'entre elles enveloppant les fleurs, les deux autres généralement en forme de bractées. Fleurs monoïques, fleurs femelles solitaires, environnées de nombreux épis grêles de fleurs mâles qui sont odoriférantes et blanches et beaucoup plus petites que les fleurs femelles. Fruit ovoïde, de couleur orange, environné d'un périanthe coriace et persistant.

A. catechu L.

Elæis Jacq.

Plantes inermes avec feuilles pennées, terminales, nombreuses, grandes et dressées-pennées, les segments ensiformes, les bords parfois épineux. Spadice court et épais. Fruits rouges en grappes.

E. guineensis L. «Crocro ou «Crocro Guinée» (Haïti) Port-Margot, etc.

Attalea H. B. K.

Tiges inermes, simples, généralement annelées, parfois absentes. Feuilles généralement nombreuses, en une touffe dressée, pennées; les folioles nombreuses, placées assez régulièrement et à angles droits, par rapport au rachis. Pétiole concave au-dessus, souvent très fibreux à la base. Fleurs monoïques ou polygamo-dioïques, sur un spadice ramifié, enveloppées dans une spathe plutôt ligneuse; spadice recourbé à la fin, sessile, pourvu de bractées, généralement jaune. Fruit, une drupe, parfois assez grande, souvent avec enveloppe fibreuse.

A. crassispatha (Mart.) Burret, comb. nov. [*Maximiliana crassispatha* Mart.] «Carossier» ou «Petit coco», Fond-des-Nègres, redécouvert par Ekman.

Cocos L.

Arbres inermes avec tiges dressées généralement allongées. Feuilles pennées, uninerves, rachis aigu au-dessus, concave au-dessous. Fleurs monoïques, fleurs staminées avec sépales lancéolés ou triangulaires; étamines 6, incluses, ovaire rudimentaire ou absent; fleurs pistillées souvent plus grandes que fleurs staminées, accrescentes; sépales épais et imbriqués; pétales imbriqués, inclus; disque annulaire; ovaire triloculaire, 2 cavités souvent imparfaites. Drupe cylindrique ou triangulaire, péricarpe épais, fibreux, endocarpe osseux. Graines avec testa brun ou rougeâtre, endosperme souvent creux.

C. nucifera L. «Cocotier», cultivé.

Martinezia R. et P.

Plantes spinescentes à tronc annelé. Feuilles pennées, segments larges, cunéiformes, alternes ou groupés, le sommet tronqué ou déchiqueté; pétioles et rachis spinescents de même que les spadices et les spathe de l'inflorescence. Fleurs plutôt petites, calice avec 3 segments; étamines 6, insérées dans le disque. Fruit globulaire, uniloculaire, de couleur orange, écarlate ou rose.

M. acanthophylla (Mart.) Becc. Seulement connu par Plumier.

Acrocomia Mart.

Plantes épineuses. Folioles étroitement linéaires, longues, généralement acuminées de façon oblique, les bords nus et recourbés, la nervure médiane souvent épineuse sur les côtés inférieurs des folioles; rachis et pétioles généralement poilus, toujours plus ou moins épineux. Fleurs jaunâtres, monoïques, les spathe devenant à la longue ligneuses; calice petit, sépales 3, ovés; pétales 3, oblong-lancéolés ou ovés. Fruit généralement de 1 pouce de diamètre, glabre ou parfois tomenteux.

A. aculeata (Jacq.) Lodd. «Corosse.» Dans le Nord de la République.

Bactris Mart.

Tiges solitaires ou fasciculées, annelées, spinescentes ou lisses. Feuilles terminales ou dispersées, pinnatifides, glabres ou pubescentes, segments épars ou agrégés ou plus ou moins imparfaitement connés, formant un limbe bifide, aigu ou rarement obtus au sommet; les bords ciliés, recourbés à la base; gaine longue, épineuse. Spadices perforant les gaines des feuilles; spathe 2, la spathe inférieure courte, ouverte au sommet, la spathe supérieure coriace ou ligneuse. Bractées persistantes. Fleurs petites ou moyennes, d'un jaune pâle ou verdâtre. Fruit petit, vert, ovoïde ou globulaire.

B. plumeriana Mart. «Ptit crocro» (Haïti). Assez abondant.

B. chaetophylla Mart.

Ordre VII. CYCLANTHALES

Plantes acaules ou parfois caulescentes, rarement grimpantes, portant le feuillage des **Pœnicaceæ** et l'inflorescence des **Araceæ**. Fleurs monoïques, disposées dans un spadice simple et dense, sous-tendu par plusieurs spathe en forme de bractées; les fleurs staminées et les fleurs pistillées étroitement associées. Périanthé nul ou petit; étamines le plus souvent nombreuses, parfois représentées dans les fleurs fertiles par de nombreux staminodes; carpelles 2 ou 4, disposés en spirale ou enfoncés dans le spadice, constituant un seul ovaire uniloculaire et multi-ovulé, généralement sur 2-4 placentas. Fruit formé de carpelles cohérents. Feuilles en forme d'éventail, à pétiole long, parfois avec des trous dans le limbe.

Famille 14. CYCLANTHACEÆ

Caractères de l'ordre.

Carludovica Ruiz et Pav.

Caractères de la famille.

C. palmata Ruiz. et Pav. Récemment introduit en Haïti.

Les fibres de cette plante servent à confectionner les chapeaux Panama.

Ordre VIII. ARALES

Herbes vivaces, très souvent marécageuses ou aquatiques (ou rarement arbres); chez les **Lemnaceæ**, les plantes réduites à de très petites structures flot-

tantes en forme de thalle. Feuilles principalement basilaires; limbes ensiformes ou épanouis. Inflorescence, un spadice, les fleurs complètes ou incomplètes couvrent partiellement ou entièrement l'axe; parfois sous-tendues par une spathe ou enfermées dans la spathe ou chez les **Lemnaceæ** avec une ou quelques fleurs dans des pochettes propagatives sur le bord du corps végétatif. Périanthé ne se séparant pas facilement en calice et corolle, parfois absent. Fruit, une baie ou une utricule.

x. Plantes avec tiges et avec feuilles pétiolées et à nervation réticulée 15. **Araceæ**, p. 43

x. Petites plantes ellipsoïdales ou en forme de flacon nageant librement dans l'eau, sans vraies feuilles 16. **Lemnaceæ**, p. 45

Famille 15. ARACEÆ

Herbes charnues, la plupart acaules, avec des rhizomes courts ou allongés. Feuilles basilaires; limbes simples, parfois divisés. Fleurs parfaites, monoïques ou dioïques, nées dans un spadice épais et compact, les fleurs staminées au-dessus des fleurs pistillées. Spadice sous-tendu par une spathe ou enfermé dans la spathe. Périanthé de 4 à 6 pièces ressemblant à des écailles ou absent; androcée souvent de 5 à 10 étamines; filaments très courts; anthères 2-4 loges, avec connectifs épais et tronqués, sacs s'ouvrant par des fentes dorsales ou par pores; gynécée d'un carpelle unique ou de plusieurs carpelles unis; ovaire 1 ou plusieurs loges; stigmaté terminal, excessivement petit; ovule 1 ou plusieurs dans chaque cavité. Fruit, une baie ou une utricule. Graines avec testa lisse ou sculpté.

Cette famille contient un grand nombre de plantes étranges et grotesques. Beaucoup sont cultivées comme plantes ornementales. Le **malanga**, produit alimentaire très important en Haïti, appartient à cette famille.

x. Plantes terrestres:

2x. Fleurs avec périanthé:

3x. Avec rhizomes souterrains **Dracontium**, p. 44

3x. Sans rhizomes souterrains **Anthurium**, p. 44

2x. Fleurs dépourvues de périanthé:

3x. Habituellement grimpantes ou rampantes, tiges plus ou moins ligneuses:

4x. Ovaires distincts, 2-10 loges; graines avec endosperme **Philodendron**, p. 44

4x. Ovaires unis 1-2 loges; graines avec endosperme **Syngonium**, p. 45

3x. Habituellement dressées, herbacées:

4x. Ovaire uniloculaire:

5x. Placenta pariétal **Colocasia**, p. 44

5x. Placenta central ou presque:

6x. Style absent **Caladium**, p. 44

6x. Style discoïde, projetant au-delà de l'ovaire **Xanthosoma**, p. 44

4x. Ovaire à 2 ou 3 loges, avec autant de lobes stigmatiques **Diffenbachia**, p. 43

x. Plantes flottantes, 15 cm. ou moins de diamètre; feuilles veloutées **Pistia**, p. 45

Diffenbachia Schott.

Plantes à tiges ligneuses qu'on cultive souvent pour leurs feuilles mouche-tées et bigarrées. Feuilles avec pétiole long en crochet ou engainant, à limbes entiers, oblongs ou ovés, la plupart larges; nervures médianes très apparentes, nervures latérales à forme cintrée, ascendantes: les pédoncules qui partent des gaines sont plus courts que les pétioles. Spathe oblongue, persistante; spadice

dressé, presque aussi long que la spathe; ovaire 2 ou 3 loges.

D. seguine (Jacq.) Schott. «Canne-à-gratter» ou «Canne-Madère» (Haïti). Abondant; «Pela puerco», St-Domingue.

Colocasia Schott.

Feuilles toujours peltées, la plupart à texture épaisse; plantes tuberculeuses. Le pollen ou la partie staminée du spadice est séparée de la partie pistillée par une section de staminodes. Ovules nombreux et portés sur un placenta pariétal.

C. esculenta Schott. «Malanga deux palles», «Caraïbe», «Tayo bambou», (Haïti). Plante alimentaire.

Caladium Vent.

Plantes ornementales. Feuilles minces, bigarrées. Ce genre diffère du *Colocasia* par son ovaire au milieu duquel naissent de nombreux ovules attachés à un placenta central. Style absent. Spathe avec limbe en forme de bateau; spadice quelque peu plus court que la spathe. Fruit, une baie blanche.

C. bicolor Vent. «Cœur saignant», (Haïti). Cultivé.

Anthurium Schott.

Plantes d'aspects très variés. Feuilles, la plupart ovées à base cordiforme, sagittée, de couleur verte ou variée; pétiole long ou court. Pédoncule généralement long; spathe très étendue, réfléchie ou enroulée, le spadice se tenant seul, sans extrémité stérile ou appendice. Fleurs bisexuées avec périanthe de 4 segments étroits; étamines 4; ovaire à 2 loges avec 1 ou 2 ovules dans chaque cavité. Fruit à baies.

A. scandens (Aubl.) Engl. «Vivora», St-Domingue. Abondant.

A. acaule (Jacq.) Schott. Très rare.

A. scolopendrium (Desv.) Kunth. Très rare.

Dracontium L.

D. polyphyllum L. Très rare, connu seulement par Plumier.

Philodendron Schott.

Plantes ligneuses, grimpantes. Feuilles épaisses, ovées, presque oblongues, plus ou moins cordées ou sagittées; pétiole engainant; la spathe épaisse et persistante, souvent colorée et odoriférante; spadice ne dépassant pas la spathe. Fleurs unisexuées et plantes monoïques. Périanthe absent; étamines 2-6 unies; ovaire de 2 à plusieurs loges.

P. fuertesii Schott. St-Domingue.

P. consanguineum Schott. Les Platons.

P. lacerum (Jacq.) Schott. «Pois-pois», dans le Nord de la République.

P. angustatum Schott. «Guérit-tout», abondant.

Xanthosoma Schott.

Etroitement apparenté au genre *Caladium*; avec la différence qu'il possède un style pelté qui projette au delà de l'ovaire; herbes grandes à tige parfois ligneuse; rhizomes épais plus ou moins tubéreux; feuilles épaisses à longs pétioles, non peltées; la nervure principale au côté inférieur de l'un ou l'autre lobe basilaire, plus ou moins marginale, parfois trilobée. Spathe avec un tube ovoïde ou oblong. Anthères; 4-6, unies.

X. plumieri Schott. Massif des Cahos.

X. jacquinii Schott.

X. belophyllum (Wild) Kunth. «Tayo marron», Massif du Nord.

X. violaceum Schott. «Malanga noir».

X. sagittifolium Schott. «Malanga Thiote», «Tayo», «Caraïbes» (Haïti). Très important.

X. hastifolium C. Koch. «Quélimbé» (Fond-des-Nègres).

X. atroviride C. Koch et Bouché. «Malanga gratté», «Feuille pè».

Synгонium Schott.

Arbustes grimpants, avec tiges racinant aux nœuds. Feuilles pétiolées, les toutes premières sagittées, les adultes à 3-9 lobes, engainantes. Fleurs monoïques, pédoncules courts, solitaires ou fasciculés, le spadice beaucoup plus court que la spathe.

S. auritum (L.) Schott. «Caraïbe gratté», dans les bois, près des rivières.

Pistia L.

Petites plantes flottantes, informes (parfois racinant dans la boue); feuilles simples et entières, oblongues-cunéaires avec extrémités très arrondies, garnies de nombreuses côtes, couleur verte très vive, mais velvetes teigneuses; spathes petites, sessiles, dans l'axe et blanches. Spadice soudé à la spathe et plus court. Fleurs unisexuées. Périanthe absent; étamines 2, ovaire uniloculaire avec de nombreux ovules. Fruit baccaire.

P. stratiotes L. «Salade d'eau», d'après Urban.

Famille 16. **LEMNACEÆ** Dumort

Herbes vivaces, flottantes, à structure charnue très petite, souvent excessivement ténue, représentant des tiges modifiées avec parfois une ou plusieurs racines; sur le corps naît l'inflorescence très simple. La reproduction végétative s'accomplit par ramification latérale. Une ou 2 silicules de propagation dans chaque corps. Fleurs monoïques 1 ou 2, staminées, et 1 pistillée s'élevant d'un point dans la silicule propagative. Fleurs staminées comprenant une étamine. Anthère de 1 ou 2 loges, les sacs s'ouvrant latéralement ou transversalement. Petits grains de pollen, sphériques, duvetés. Fleurs pistillées comprenant un carpelle stigmatique au sommet. Ovules 1 ou plusieurs orthotropes, anatropes ou amphitropes. Fruit: une utricule de 1 à 7 graines. Embryon dressé.

x. Le corps du végétal présente une nervation visible; plusieurs racines, chacune avec un faisceau fibro-vasculaire **Spirodela**, p. 45

x. Le corps du végétal présente une nervation indistincte; racine solitaire, dépourvue de faisceaux fibro-vasculaires **Lemna**, p. 45

Spirodela Schleid.

Stipe attaché comme un bouclier au corps du végétal. Plusieurs racines grêles réunies en grappes. Silicules propagatives 2, triangulaires, s'ouvrant par des fentes. Spathe sacculiforme. Spadice de 2 fleurs staminées et d'une fleur pistillée surgissant des silicules propagatives. Anthères biloculaires. Les sacs s'ouvrent longitudinalement. Ovaire avec 1 ou 2 ovules. Utricule lenticulaire avec bords ailés.

S. polyrhiza (L.) Schleid. Plaine du Cul-de-Sac.

Lemna L.

Le stipe s'attache au bord basilaire du corps de la plante. Racine solitaire. Silicules propagatives comme dans le genre *Spirodela*. Anthères biloculaires.

s'ouvrant transversalement. Utricule quelque peu aplatie souvent couverte de côtes.

L. paucicostata Hegelm et Engelm.

Ordre IX. XYRIDALES

Plantes terrestres, marécageuses, ou épiphytes. Feuilles généralement étroites, effilées à l'extrémité. Inflorescence ne constituant pas généralement un spadice, mais souvent une bractée qui ressemble à une spathe. Fleurs, la plupart parfaites, avec périanthe distinct. Gynécée, un pistil composé. Fruits, une capsule, une utricule ou une baie. Graines à endosperme farineux.

- x. Ovaire uniloculaire, placentation pariétale. Inflorescence, pas de spathe..... 17. *Xyridaceæ*, p. 46
- x. Ovaire de 2 à 3 loges. Fleurs dans une spathe:
 - 2x. Fleurs très petites, monoïques ou dioïques..... 18. *Eriocaulaceæ*, p. 46
 - 2x. Fleurs voyantes, parfaites:
 - 3x. Plantes épiphytes généralement, feuillage rugueux, stigmates 3..... 19. *Bromeliaceæ*, p. 47
 - 3x. Plantes terrestres ou aquatiques, feuillage non rugueux, stigmates unis:
 - 4x. Calice et corolle libres, dissemblables, étamines libres..... 20. *Commelinaceæ*, p. 49
 - 4x. Calice et corolle soudés en partie, semblables; étamines soudées en partie à la corolle..... 21. *Pontederiaceæ*, p. 50

Famille 17. XYRIDACEÆ Lindl.

Herbes à hampes, annuelles ou vivaces. Feuilles basilaires disposées le plus souvent sur 2 rangs, en forme d'épée. Hampes parfois touffues, simples, cylindriques, à angles variés ou ailés. Fleurs parfaites sous-tendues par des bractées cassantes, étroitement imbriquées, formant des épis capités, compacts, terminaux. Sépales 3, les deux latéraux sont fermes, carénés, appendiculaires, persistants, le 3ème plus large, membraneux ou absent. Corolle blanche ou jaune, régulière ou presque régulière, infère. Pétales 3, fugaces; limbe étendu, onglets distincts ou unis. Androcée de 3 étamines. Filaments alternant généralement avec 3 étamines stériles. Gynécée formé de 3 carpelles soudés. Ovaire uniloculaire, parfois à 3 loges, plus ou moins incomplet avec 3 placenta pariétaux. Ovules nombreux, orthotropes. Style non attaché à la base ou rarement attaché. Stigmates 3, terminaux. Fruit: une capsule à 3 valves. Graines nombreuses. Embryon apical.

Xyris L.

Les caractères du genre sont ceux de la famille.

X. jupicai L. C. Rich. St-Domingue.

Famille 18. ERIOCAULACEÆ Lindl.

Herbes vivaces, rarement annuelles, la plupart acaules, marécageuses ou aquatiques. Feuilles réunies en grappes, souvent très denses. Hampes simples, sous-tendues par des bractées engainantes. Fleurs monoïques (androgynes) ou rarement dioïques, réunies en masse dans des capitules terminaux, ceux-ci sont sous-tendus par des involucre de plusieurs bractées et chaque fleur est sous-tendue par une toute petite bractéole. Périnthe en 2 séries (la série interne est rarement obsolète). Fleurs staminées avec 2 ou 3 sépales et 2 ou 3 pétales soudés en partie. Etamines aussi nombreuses que les sépales ou 2 fois plus nombreuses. Fleurs pistillées avec 2 ou 3 sépales et pétales; ovaire

avec 2 ou 3 loges; styles 2 ou 3; ovules solitaires dans chaque cavité, orthotropes. Fruit: une capsule de 2 ou 3 valves, à déhiscence loculicide. Graines pendantes, chacune avec un tout petit embryon au sommet de l'endosperme farineux.

Pæpalanthus Mart.

Les caractères du genre sont ceux de la famille.

P. domingensis Ruhl.

P. tuerckheimii Ruhl. Morne La Selle.

Famille 19. BROMELIACEÆ

Herbes caulescentes, raides ou pendantes, épiphytes ou rarement terrestres, feuillage rugueux ou parfois glabre. Feuilles variées, parfois basilaires, filiformes ou avec des limbes dilatés, allongés, entiers ou grossièrement dentés, épineux. Fleurs parfaites, régulières, solitaires ou disposées généralement en épis, sous-tendues généralement par de très voyantes bractées. Périnthe blanc ou vert ou de couleur plus foncée. Sépales 3, distincts ou partiellement unis; pétales 3, souvent rétrécis en griffes, distincts ou partiellement unis. Androcée de 3 à 6 étamines. Anthères introrsées. Gynécée formé d'un pistil supère ou infère à 3 loges. Styles soudés. Stigmates 3 ou trilobés. Ovules, très nombreux dans chaque loge, anatropes. Fruit: une baie ou une capsule auxquelles adhèrent plus ou moins les restes du périnthe. Embryon très petit placé à la base d'un endosperme farineux.

- x. Ovaire supère ou presque supère, fruit capsulaire:
 - 2x. Plantes pendantes, fleurs solitaires dans l'axe des bractées..... *Dendropogon*, p. 48
 - 2x. Plantes dressées, fleurs groupées en inflorescences épiées:
 - 3x. Pétales connés ou étroitement connivents..... *Guzmania*, p. 49
 - 3x. Pétales libres (non soudés):
 - 4x. Style court ou absent..... *Catopsis*, p. 48
 - 4x. Style filiforme:
 - 5x. Feuilles bordées généralement de spinules à la base..... *Pitcairnia*, p. 48
 - 5x. Feuilles à bords entiers..... *Tillandsia*, p. 48
 - x. Ovaire infère; fruit, une baie:
 - 2x. Calice spinescent ou couvert d'une longue barbe..... *Æchmea*, p. 48
 - 2x. Calice non spinescent ou non couvert d'une longue barbe:
 - 3x. Inflorescence paniculée..... *Bromelia*, p. 47
 - 3x. Inflorescence capitée produisant un fruit multiple..... *Ananas*, p. 47

Bromelia L.

Plantes terrestres; fleurs paniculées, sépales libres, étroits, imberbes, pétales connés à la base, sans ligules; feuilles longues, fortes, lourdes, généralement bordées d'épines.

B. karatas L.

B. pinguin L. «Bayonnette pingouin», souvent employé comme haie vive.

Ananas L.

Plantes terrestres; fleurs sessiles parfaites, pétales pourvus d'une paire de ligules à la base. Fruit, un syncarpe formé de la réunion du rachis épais, des ovaires abortifs et des autres parties adhérentes, surmonté d'un panache de feuilles.

A. comosus Merr. [*A. sativus* Schult], «Ananas;» très cultivé pour son fruit délicieux. Il existe maintenant en Haïti un grand nombre de variétés dont la plus répandue est le type «Red Spanish.»

Aechmea R. et P.

Plantes généralement épiphytes; bractées des fleurs généralement colorées et plus voyantes que les fleurs; sépales libres ou connés, la plupart à barbes pointues; pétales libres avec une paire de ligules à la base de chacun d'eux. Fruit bacciforme ou une baie à graines nombreuses.

A. nudicaulis (L.) Griseb.

Pitcairnia L'Herit.

Plantes terrestres; ovaire presque supère; feuilles longues, grêles, bordées de piquants à la base; inflorescence, une longue grappe ou une panicule. Fruit, une capsule déhiscence.

P. fuertesii Mez. «*Maya cimarrona*,» (St-Domingue).

P. tomentosa Hortul.

P. latifolia Sol.

P. xanthocalyx Mart.

P. fulgens Decne.

P. angustifolia Red.

Catopsis Griseb.

Plantes ressemblant au *Tillandsia*, seulement l'inflorescence ne comporte pas de bractées voyantes. Fleurs petites; style court ou absent. Capsule ovoïde.

C. berteroniana (Schult) Mez.

C. nutans (Sw.) Griseb.

C. nitida (Hook) Griseb.

C. fulgens Griseb.

Dendropogon Raf.

Plantes pendantes, avec de petites feuilles filiformes, éloignées les unes des autres. Fleurs axillaires. Les autres caractères floraux sont semblables à ceux du genre *Tillandsia*.

D. usneoides (L.) Raf. [*Tillandsia usneoides* L.] «Barbe pangnole.»

Tillandsia L.

Généralement épiphytes, parfois terrestres. Feuilles disposées en rosette, glabres, à bords entiers. Inflorescence spiciforme; fleurs, bractées généralement colorées. Capsule oblongue ou prismatique.

T. utriculata L.

T. aloifolia W. Hook.

T. setacea Sw.

T. bromoides Mez.

T. juncea (R. et P.) Poir.

T. festucoïdes Brongn.

T. fasciculata Sw.

T. buchii Urb.

T. polystachya L. «Perroquet.»

T. balbisiana Schult.

T. subluxa J. G. Back.

T. valenzuelana A. Rich.

T. circinnata Schlechtend.

T. pruinosa Sw.

T. vestita Cham et Schelcht.

T. tuerckheimii Mez.

T. pulchella W. Hook

T. recurvata L.

T. fendleri (Bak) Mez.

T. domingensis Mez.

T. hotteana Urb.

T. compacta Griseb.

T. selleana Harms.

T. panniculata Cham et Schelcht.

Guzmania R. et P.

Plantes terrestres ou épiphytes ressemblant beaucoup au genre *Tillandsia*. Feuilles teigneuses disposées en rosettes compactes. Sépales connés ou connivents, en forme de tube; ligules absentes.

G. lingulata (L.) Mez. «*Tinaja*» (St-Domingue).

G. berteroniana (Schult) Mez.

G. monostachya (L.) Rusby.

G. clavata (Lam.) Urb.

G. ekmanii Harms.

Famille 20. COMMELINACEÆ Reicheb

Herbes annuelles, la plupart vivaces, succulentes, à racines épaisses, fibreuses ou tubéreuses et à tiges dressées ou rampantes. Feuilles alternes, souvent à base engainante. Fleurs parfaites, solitaires ou plusieurs disposées en cymes diversement supprimées surgissant d'une spathe ou d'un involucre de bractées en forme de feuilles. Périanthé en 2 séries. Calice de 3 sépales distincts, herbacés, le plus souvent persistants. Corolle souvent voyante, régulière ou irrégulière, formée de 3 pétales fugaces ou marcescents. Androcée de 5 à 6 étamines hypogynes, toutes parfaites ou 2 ou 3 étamines stériles; filaments grêles; les sacs polliniques s'ouvrent le plus souvent longitudinalement. Gynécée de 2 ou 3 carpelles unis; ovaire supère à 2 ou 3 loges; styles soudés; stigmates de 2 ou 3 lobes parfois cachés; ovules solitaires ou plusieurs dans chaque cavité, orthotropes. Fruit: une capsule à 2 ou 3 valves, à déhiscence loculicide; graines parfois supprimées dans une cavité; embryon à forme de poulie dans un endosperme riche, opposé au hile.

x. Étamines fertiles, 2 ou 3:

2x. Connectif large..... **Callisia**, p. 50

2x. Connectif étroit..... **Commelina**, p. 50

x. Étamines fertiles 6 (rarement 5):

2x. Pétales libres ou presque libres:

3x. Chaque loge de l'ovaire avec 3 ou plusieurs graines..... **Tinantia**, p. 50

3x. Chaque loge de l'ovaire avec moins de 3 graines:

4x. Chaque loge de l'ovaire avec 2 graines:

5x. Capsule mûre enfermée dans les pétales succulents..... **Campelia**, p. 50

5x. Capsule mûre libre..... **Tradescantia**, p. 50

4x. Chaque loge de l'ovaire avec une seule graine..... **Rhoeo**, p. 50

2x. Pétales unis en tube..... **Zebrina**, p. 50

Commelina L.

Inflorescence sous-tendue par une grande bractée semblable à une spathe. Fleurs irrégulières; pétales libres, les 2 internes souvent à onglets longs, bleus ou jaunes (rarement blancs); étamines 3 fertiles, 3 stériles, filets glabres; ovaire de 2 ou 3 loges, loge dorsale uni-ovulée, les loges ventrales à 2 ovules.

C. nudiflora L.

C. virginica L. «Maïs marron» (Haïti), «Suela consuelo» (St-Domingue).

C. geniculata Desv.

C. haïtiens Urb. et Ekm.

Tinantia Scheitw.

Étamines fertiles 6, dont 3 plus grandes que les autres, filaments plus ou moins chevelus. Ovaire à 3 loges avec 3 à 5 ovules.

T. erecta (Jacq.) Schlechtend.

Tradescantia L.

Feuilles variées. Pédoncules solitaires, fasciculés ou rarement paniculés; fleurs en ombelles, rarement solitaires; ombelles sessiles ou pédonculées. Sépales libres, persistants; pétales quelque peu orbiculaires, bleus ou rouges, blancs; étamines 6, toutes fertiles, hypogynes, filets nus ou chevelus; ovaire sessile à 3 loges, 2 ovules dans chaque loge.

T. geniculata Jacq.

Callisia L.

Étamines 1 à 3, fertiles avec filets nus. Ovaire à 3 loges, 2 ovules dans chaque loge.

C. repens L. «Belle-mère soleil»; «Bon Dieu mourir» (Haïti).

C. monandra (Sw) Schult.

Campelia L. C. Rich.

Étamines fertiles 6, avec filets poilus. Ovaire à 3 loges (rarement 2) 2 ovules dans chaque loge. Capsule enfermée dans le calice.

C. zanon (L) H. B. K.

Rhoeo Hance.

Fleurs nombreuses disposées en ombelles compactes, entourées de 2 bractées cymbiformes. Pétales 3 ovés; étamines 6, fertiles, hypogynes; filets poilus; ovaire à 3 loges avec un ovule dans chaque loge.

R. discolor Hance. «Boule de Mars» très cultivé dans les jardins; feuilles pourpres en dessous, à raies jaune pâle en dessus.

Zebrina Schnizl.

Fleurs en grappes disposées entre 2 bractées condupliques. Sépales et pétales unis en forme de tube; étamines fertiles 6; ovaire trilobulaire, 2 ovules dans chaque loge.

Z. pendula Schnizl. «Wandering Jew», en anglais. Plantes à tiges très longues souvent employées pour garnir les boîtes de fleurs. Plusieurs variétés se cultivent en Haïti, mais pas sur une aussi grande échelle que le *Rhoeo discolor* à tige beaucoup plus courte.

Famille 21. PONTEDERIACEÆ

Herbes marécageuses ou aquatiques avec rhizomes. Feuilles alternes, souvent réunies en bouquets, parfois basilaires; limbes rubanés ou très étendus. Fleurs parfaites plus ou moins irrégulières, solitaires ou disposées en épis

sous-tendus par des spathes foliacées. Périanthé ressemblant à une corolle, pièces 6, en partie soudées; androcée de 3 à 6 étamines en partie soudées au périanthé, filaments filiformes ou dilatés à la base ou épaissis vers le milieu; gynécée: un pistil composé, ovaire de 3 loges à placentation axile ou uniloculaire par suite d'avortement. Fruit: une utricule uniloculaire avec une seule graine ou une capsule avec plusieurs graines; endosperme farineux, abondant, environnant l'embryon central.

x. Étamines 6 *Eichornia*, p. 51

x. Étamines 3 (rarement 1-4) *Heteranthera*, p. 51

Eichornia Kunth.

Tiges simples, presque nues. Feuilles peu nombreuses, coriaces, à beaucoup de nervures. Epi sous-tendu par une spathe foliacée, multiflore. Périanthé bilabié, chaque verticille avec 3 lobes. Ovaire trilobulaire, à 2 loges vides. Fruit: une utricule uniloculaire qu'environne la base du périanthé. Graine solitaire.

E. diversifolia (Vahl) Urb.

E. crassipes (Mart) Solms. «Boniface» (Haïti) appelé *Lila de agua* à St-Domingue.

E. azurea Kunth. Cayes.

Heteranthera R. et P.

Tiges rampantes ou flottantes. Feuilles alternes, élargies ou herbacées, parfois réduites à des phyllodes. Spathe bractéale à une ou plusieurs fleurs. Ovaire trilobulaire, parfois imparfaitement loculé. Ovules nombreux, en 2 rangs sur chaque placenta. Périanthé fané, persistant autour des capsules. Graines nombreuses, garnies de côtes.

H. limosa (Sw) Wild. Miragoâne.

H. reniformis R. et P.

Ordre X. LILIALES

Plantes relativement charnues, herbacées ou en forme de jonc, ou parfois, sarmenteuses, rarement arborescentes. Feuilles, la plupart avec des limbes plats, parfois en forme d'écailles ou cylindriques. Périanthé de 3 ou de 6 pièces, calice et corolle plus ou moins distincts, parfois partiellement soudés; gynécée de 3 ou rarement de 2 carpelles soudés; ovaire supère ou presque supère. Fruits variés, généralement une capsule ou une baie; endosperme charnu ou corné.

x. Ovaire supère 22. *Liliaceæ*, p. 51

x. Ovaire infère:

2x. Étamines 6:

3x. Jamais de sarments 23. *Amaryllidaceæ*, p. 53

3x. Sarments 24. *Dioscoreaceæ*, p. 55

2x. Étamines 3, anthères extrorses, styles distincts 25. *Iridaceæ*, p. 56

Famille 22. LILIACEÆ

Herbes vivaces, surtout caulescentes, avec bulbes ou cormes. Feuilles alternes ou verticillées, basilaires ou apparemment basilaires: limbes entiers. Fleurs solitaires, ou en grappes terminales, corymbes ou panicules. Périanthé généralement en évidence ou voyant; pétales 3; sépales 3; tout-à-fait semblables, parfois soudés en partie; androcée de 6 étamines, filets généralement distincts, anthères bilobulaires; gynécée de 3 carpelles soudés; ovaire supère, trilobulaire, styles soudés, ovules 2- plusieurs dans chaque cavité. Fruit: une capsule loculicide, globulaire ou allongée, lobée ou prismatique.

- x. Plantes bulbeuses ou cormeuses:
- 2x. Inflorescence surgissant des spathe involuées **Allium**, p. 52
- 2x. Inflorescence ne surgissant pas des spathe involuées **Hyacinthus**, p. 52
- x. Plantes non bulbeuses ou cormeuses, généralement tubéreuses ou axe des rhizomes souterrains très épais:
- 2x. Feuilles charnues **Alœ**, p. 52
- 2x. Feuilles tout autres:
- 3x. Feuillage vert en forme d'aiguilles (cladodes) né dans l'axe de petites écailles sèches (vraies feuilles) **Asparagus**, p. 52
- 3x. Feuillage vert formé de vraies feuilles:
- 4x. Sarments grimpants vrillés avec feuilles ovées **Smilax**, p. 53
- 4x. Sarments non grimpants; feuilles longues:
- 5x. Plantes à tige plus ou moins ligneuses, souvent arbrisseaux ou arbustes:
- 6x. Chaque loge de l'ovaire avec une seule graine **Yucca**, p. 53
- 6x. Chaque loge de l'ovaire avec 6 à 15 graines **Cordyline**, p. 53
- 5x. Pas de vraies tiges au-dessus du sol. Inflorescence née sur une hampe grêle **Sansevieria**, p. 52

Allium L.

Plusieurs formes cultivées en Haïti représentent ce genre, leur forte odeur caractéristique permet de les reconnaître facilement.

- A. sativum** L. «Lai» (Ail), cultivé.
- A. porrum** L. «Porreau» (Poireau), cultivé.
- A. cepa** L. «Zongnon» (oignon), cultivé.
- A. ascalonicum** L. «Zéchalotte» (échalote), cultivé.
- A. schœnoprassum** L. «Cive», cultivé.

Hyacinthus L.

H. orientalis L. «Jacinthe», cultivé, provenant le plus souvent de bulbes importés.

Alœ L.

Plantes xérophiles avec une rosette de feuilles basilaires, charnues, succulentes, recouvertes d'une cuticule épaisse. Fleurs en grappes ou en ombelles, souvent très voyantes. Étamines 6, filets grêles, anthères versatiles; pistil 1, ovaire sessile avec de nombreux ovules, stigmate capité. Fruit: une capsule triangulaire, loculicide.

- A. vera** L. «Laloï» (Aloès), «Sabila», à St-Domingue, d'après Urban.

Asparagus L.

Fleurs petites, généralement verdâtres, peu ou nombreuses, en grappes ou en ombelles. Périante campanulé; anthères oscillantes. Fruit: une baie.

- A. officinalis** L. «Asperge», comestible.
- A. plumosus** Baker. «Mousseline», appelé en anglais «Asparagus Fern».

Sansevieria Thunbg.

Plantes à feuilles larges, coriaces, bariolées, rhizomes très développés. De grandes bractées à la base des feuilles. Périante tubulaire; ovaire trilobulaire à ovule solitaire.

- S. guineensis** (Jacq.) Wild. «Z'oreilles bourrique».

Yucca L.

Plantes à feuilles en forme de baïonnette. Fleurs très voyantes sur une tige ligneuse allongée. Ovaire trilobulaire, chaque loge uniovulée.

- Y. aloëfolia** L. «Bayonnette», appelé en anglais **Spanish Bayonet**.

Cordyline Comm.

Plantes à tiges ligneuses. Nombreux ovules dans chaque loge. Feuilles larges et minces nous rappelant celles du genre *Cama*.

- C. terminalis** (L.) Kunth. «Feuille macaque».

Smilax (Tourn.) L.

Fleurs dioïques en ombelles sur des pédicelles axillaires. Fruit: une petite baie. Plantes grimpantes avec vrilles. Feuilles à nervation réticulée.

- S. hastata** Jacq.
- S. papyracea** Duham. «Boyau diable» (Haïti).
- S. domingensis** Wild.
- S. coriacea** Spreng. Var. *ilicifolia* (Desv.) O. E. Schulz.
- S. havanensis** Jacq. Var. *dentata* et *ovata*.
- S. oblongata** Sw. Var. *viscifolia* (Duham) O. E. Schulz.
- S. populnea** Kunth. Var. *horrida*, O. E. Schulz.
- S. balbisiana** Kunth.

Famille 23. AMARYLLIDACEÆ

Herbes vivaces souvent aqueuses ou charnues avec bulbes ou cormes, ou parfois avec racines fibreuses. Feuilles basilaires, limbes simples, généralement étroits, à nervures parallèles, avec gaines à la base. Fleurs parfaites, régulières ou irrégulières, parfois solitaires. Périante épigyne, coralliforme, caduc, marcescent, ou persistant; sépales 3; pétales 3, soudés en tube au-dessous; androcée de 6 étamines insérées sur un disque épigyne ou à la gorge du tube, opposées aux pétales et aux sépales; filets parfois dilatés, plus ou moins soudés à la base ou réunis par une couronne; anthères introrsées; gynécée, un seul pistil; ovaire infère, trilobulaire ou très rarement unilobulaire, les loges opposées aux sépales, styles unis, stigmates entiers ou trilobés; ovules nombreux anatropes, pendants ou rarement ascendants. Fruit: une capsule trilobulaire ou une baie; graines presque sphériques, aplaties ou angulées à testa mince crustacé, en forme d'aile ou graines épaisses et charnues de couleurs variées; endosperme charnu; embryon axile, presque dressé.

- x. Axe souterrain un bulbe, avec hampe; inflorescence ombellée et involuée ou solitaire:
- 2x. Corona absente; filets non unis en une coupe staminale:
- 3x. Ovules nombreux superposés; testa noir:
- 4x. Fleurs solitaires; spathe tubulaire jusqu'à moitié (partie inférieure) **Zephyranthes**, p. 54
- 4x. Fleurs ombellées; spathe de 2-4 valves; pédicelles sous-tendus par des bractéoles filiformes **Hippeastrum**, p. 55
- 3x. Ovules peu nombreux ou nombreux, superposés; testa vert:
- 4x. Tube du périante long **Crinum**, p. 54
- 4x. Tube du périante court **Amaryllis**, p. 54
- 2x. Corona absente, mais étamines appendiculées à la base et souvent unies en une coupe distincte **Hymenocallis**, p. 54
- x. Axe souterrain un rhizome; tige feuillée au moins à la base:

- 2x. Plantes avec feuilles grandes, épaisses, charnues, en forme de rosette; inflorescence racémeuse ou paniculée:
 3x. Feuilles épaisses, charnues, généralement épineuses au bord ou à l'extrémité:
 4x. Périclanthe infundibuliforme; filets normaux **Agave**, p. 55
 4x. Périclanthe rotacé, filets enflés sur un côté à la base **Furcraea**, p. 55
 3x. Feuilles comparativement minces, inermes au bord ou à l'extrémité **Polianthes**, p. 55
 2x. Plantes avec feuilles ordinaires de petites dimensions; inflorescence variée:
 3x. Limbes des feuilles retournés, face supérieure en bas; inflorescence une ombelle involucree **Bomarea**, p. 55
 3x. Limbes des feuilles normaux, linéaires; inflorescence non ombellée:
 4x. Ovaire souvent développé en un long bec grêle qui simule un tube de périclanthe; fruit succulent, indéhiscent **Curculigo**, p. 55
 4x. Ovaire non rostré; fruit une capsule généralement circonscissile au sommet **Hypoxis**, p. 55

Zephiranthes Herb.

Plantes bulbeuses. Feuilles peu — plusieurs apparaissant généralement en même temps que les fleurs. Fleur 1 à chaque hampe, blanche, jaune, rose ou rouge; spathe simple avec 2 entailles au sommet; périclanthe dressé ou quelque peu incliné, infundibuliforme, avec tube long ou court, les segments presque égaux; étamines insérées à la gorge ou dans le tube, quelque peu inégales; ovules nombreux dans chaque loge; stigmates 3 partites ou avec 3 entailles. Capsules presque globulaires, loculicides, 3 valves; graines plus ou moins aplaties.

Z. tubispatha (L'Hér.) Herb.

Z. bifolia (Aubl.) M. J. Roem. «**Tulipe**,» (Haïti), «**Duende**» ou «**Primavera**» (St. Domingue).

Z. Eggersiana Urb.

Crinum L.

Plantes ornementales, parfois sauvages, bulbeuses. Feuilles en lanières. Fleurs toujours blanches.

C. palustre Urb. «**Oignon de lys**,» d'après Urban.

C. amabile Donn.

C. erubescens Ait. «**Lys**,»

Hymenocallis Salisb.

Plantes ornementales, bulbeuses. Fleurs solitaires ou ombellées à bractées membraneuses. Périclanthe allongé, grêle. Fleurs blanches.

H. arenicola Northrop.

Amaryllis L.

Plantes bulbeuses: feuilles apparaissant après les fleurs, en forme de lanières: périclanthe infundibuliforme avec tube court et segments presque égaux, oblongs, aigus, ascendants: étamines déclinées, insérées à la gorge, non exsertes; ovaire oblong avec de nombreux ovules superposés dans chacune des 3 loges; style grêle et décliné avec stigmate capité; capsule globulaire, se déchirant irrégulièrement, avec quelques graines globulaires.

A. belladonna L. Ornemental. Cultivé

Hippeastrum Herb.

Plantes ornementales, bulbeuses. Périclanthe infundibuliforme. Feuilles en lanières ou linéaires apparaissant après la floraison. Fleurs de couleurs variées.

H. puniceum (Lam.) Urb. «**Amaryllis**,» d'après Urban.

H. vittatum Herb. Plante exotique.

Agave L.

Feuilles épaisses et charnues, très grandes, souvent avec des dents cartilagineuses ou épineuses, disposées en rosette à la base d'une hampe pluriflorée. Périclanthe infundibuliforme.

A. antillarum Descourt.

A. intermixta Trel. «**Karatas**,» à Port-au-Prince et «**Maguay**» à St-Domingue.

A. brevispina Trel. «**Galatas**,» Croix-des-Bouquets.

A. brevipedata Trel.

A. rigida L. Var. **elongata** Bakm. «**Pite heniquen**,» bord des feuilles épineux.

A. rigida L. Var. **sisalana** Engelm. «**Pite sisal**» ou «**Sisal**.» Feuilles inermes. Beaucoup plus cultivé en Haïti que la première variété.

Furcraea Vent.

Plantes ressemblant au genre Agave. Périclanthe rotacé.

F. hexapetala (Jacq.) Urb. «**Pite pays**,» Les fibres sont employées dans la confection des cordes.

F. tuberosa Ait. «**Cabuya**,» à St-Domingue, d'après Urban.

F. gigantea Vent. «**Pite espagnole**,» à Port-de-Paix.

Polianthes L.

Rhizome tubéreux. Feuilles basilaires et caulinaires, celles sur la tige réduites ou en forme de bractées. Fleurs blanches quelque peu en forme de lis, disposées en un long racème ou en épi à l'extrémité de la tige dressée, tube grêle; segments courts, égaux ou presque égaux; étamines insérées dans le tube, incluses; ovules nombreux dans chaque loge, l'une au-dessous de l'autre; style grêle, stigmates 3. Capsule avec périclanthe persistant au sommet; graines plates.

P. tuberosa L. «**Tubéreuse**,» Cultivé.

Bomarea Mirb.

Plantes tubéreuses à tiges volubiles.

B. edulis (Tuss.) Herb. «**Topinambour blanc**,» d'après Urban.

Curculigo Gaertn.

Plantes à rhizomes plus ou moins tubéreux, dépourvues de tiges allongées. Inflorescence épiée, ou en capitules denses non loin du sol.

C. scorzonifolia (Lam.) J. G. Bac.

Hypoxis L.

Herbes petites, acaules, à feuilles linéaires, poilues, et à hampes grêles pourvues de peu de fleurs.

H. decumbens L. Plante à fleurs jaunes.

Famille 24. DIOSCOREACEÆ

Sarments vivaces, herbacés ou quelque peu ligneux, à rhizomes tubéreux ou noueux. Tiges volubiles, inermes. Feuilles souvent opposées ou verticillées

près de la base de la tige, alternes au-dessus; limbes simples, pétioles, rectinerves. Fleurs régulières, parfaites, monoïques ou dioïques, disposées en épis axillaires, en grappes ou en panicules. Péricarpe semblable au calice; sépales 3; pétales 3 en partie soudés; androcée, 3 à 6 étamines placées à la base des lobes du péricarpe; gynécée, 3 carpelles soudés; ovaire trilobulaire, infère, styles aussi nombreux que les loges de l'ovaire, stigmata petits, ovules, 1 ou 2 dans chaque loge. Fruit: une capsule à 3 ailes et à 3 valves, ou bacciforme. Embryon petit dans un endosperme charnu ou presque cartilagineux.

x. Ovaire à 3 loges développées, graines ailées *Dioscorea*, p. 56

x. Ovaire à une seule loge développée, graines non ailées..... *Rajania*, p. 56

Dioscorea L.

Sarments avec rhizomes charnus ou ligneux. Feuilles alternes au moins au-dessus. Fleurs généralement monoïques ou dioïques, disposées en épis, en grappes ou en panicules. Ovaire infère, avec 2 ovules dans chaque loge; styles 3; stigmata entiers. Usage alimentaire.

D. cayennensis Lam. «Yam Guinée.»

D. pilosiuscula Berter.

D. polygonoides H. et B. «Igame», «Yam chat.»

D. tamoidea Griseb. Var. *Lindenii* Uline, «Yam chat.»

D. alata L. «Yam.»

D. occidentalis Knuth. «Yam seguiné.»

D. bulbifera L. «Masoco.»

D. haïtiensis Knuth.

D. altissima Lam. «Igame chat.»

D. trifida L. «Igame Martinique» (Anse-à-Fleur).

Rajania L.

Sarments ressemblant au genre *Dioscorea*. Fleurs dioïques.

R. ovata Sw. «Igame chat», d'après Urban.

R. spiculiflora Uline.

R. cordata L. «Name de India», (St-Domingue).

R. angustifolia Sw.

R. minutiflora Uline.

R. tenuiflora R. Knuth.

R. quinquefolia L. Ile de la Tortue.

R. mucronata Willd.

R. pilifera Urb.

R. hastata L. (Nombreuses variétés). «Guan Banza» ou «Igame chat», d'après Urban; à St-Domingue «Bejuco de name.»

Famille 25. IRIDACEÆ Lindl.

Herbes vivaces, caulescentes, le plus souvent à rhizomes allongés ou en forme de bulbes. Feuilles équitantes, disposées sur 2 rangs, généralement allongées. Fleurs parfaites, régulières ou irrégulières, solitaires ou réunies en grappes protégées par des bractées transformées en spathes. Péricarpe souvent très coloré, sépales et pétales presque égaux ou souvent très différents, marcescents, persistants ou fugaces, distincts ou soudés en dessous; androcée de 3 étamines adnées au péricarpe et opposées aux sépales, filets filiformes distincts ou soudés en partie, anthères bilobulaires extrorses; gynécée de 3 carpelles soudés, — ovaire infère trilobulaire, — styles distincts, entiers ou partiels, parfois semblables aux pétales, — ovules nombreux, anatropes, à

placentation centrale. Fruit: capsule trivalée à déhiscence loculicide; graines nombreuses, disposées en une ou deux rangées dans chaque loge; embryon dressé dans un endosperme charnu ou corné.

x. Spathes pluriflores; fleurs régulières:

2x. Pétales non unis en tube ou seulement à tube court, capsule non entourée d'une spathe *Sisyrinchium*, p. 57

2x. Pétales unis en tube plus ou moins bien développé, capsule entourée d'une spathe *Eleutherine*, p. 57

x. Spathes uniflores; fleurs irrégulières..... *Gladiolus*, p. 57

Sisyrinchium L.

Herbes vivaces généralement touffues à rhizomes distincts ou obsoletes, à racines fibreuses. Feuilles basilaires, limbes linéaires. Péricarpe bleu, blanc ou jaune; étamines 3, filets soudés au sommet ou presque soudés, anthères en grappes; ovaire trilobulaire. Fruit capsulaire et non entouré d'une spathe.

S. graminoides Bickn. La Selle.

S. micranthum Cav.

Eleutherine Herb.

Herbes à rhizomes courts. Inflorescence épiée. Pétales soudés; anthères libres, filets très courts; ovaire trilobulaire. Fruit capsulaire, entouré d'une spathe.

E. bulbosa (Mill.) Urb. Plante de 0,3 à 0,65 m. de haut, à fleurs blanches.

Gladiolus L.

Plantes à cormes, tige dressée plus ou moins feuillée avec de grandes spathes (bractées) généralement herbacées, chacune produisant une fleur sessile. Feuilles généralement en forme d'épée, parfois linéaires ou teretes. Fleurs généralement voyantes, rouges, pourpres, blanches et d'autres couleurs. Ovaire trilobulaire, multiovulé, style grêle. Capsule grande, oblongue et ovoïde, loculicide; graines, le plus souvent aplaties ou ailées.

G. spp. Cultivé, provenant de bulbes importés.

Ordre XI. SCITAMINALES

Plantes herbacées, généralement vivaces, avec rhizomes ou tubercules. Feuilles alternes, parfois toutes basilaires; limbes relativement grands, parfois très grands; pétioles engainants à la base. Fleurs très irrégulières; péricarpe blanc ou de couleur frappante; androcée très irrégulier; gynécée composé, ovaire infère. Fruit, une capsule ou une utricule; endosperme présent.

x. Etamines fertiles 5 ou 6 dans chaque fleur... 26. *Musaceæ*, p. 57

x. Etamine fertile 1 dans chaque fleur:

2x. Ovaire trilobulaire, les 3 carpelles fructifères; ovules nombreux dans chaque cavité de l'ovaire. Fruit capsulaire. Embryon dressé 28. *Cannaceæ*, p. 59

2x. Ovaire unilobulaire ou trilobulaire, mais 2 des carpelles sont abortifs: 27. *Zingiberaceæ*, p. 58

3x. Ovules nombreux..... 29. *Marantaceæ*, p. 60

Famille 26. MUSACEÆ

Herbes vigoureuses, généralement vivaces, caulescentes, ligneuses en partie, souvent de stature gigantesque, la tige engainée par les pétioles ou la base des feuilles. Feuilles grandes, le plus souvent entières, à nervation pennée, le limbe ensiforme ou lancéolé, ou oblong. Inflorescence épiée ou paniculée, sous-tendue par des spathes, avec des bractées pesantes et souvent singulières.

Fleurs le plus souvent sessiles ou presque sessiles et chacune avec une petite bractée ou sans bractée; fleurs bisexuées ou plantes monoïques, nées dans l'axe de grandes bractées; le périanthe clairement différencié; calice de 3 sépales le plus souvent, soudés ou libres; corolle de 3 pétales ou moins, libres ou quelque peu soudés; étamines 6, dont une stérile et les autres portant les anthères, toutes libres; ovaire infère, trilobulaire, ovules uniques ou le plus souvent nombreux; style unique, mais le stigmate est souvent trilobé ou sexlobé. Fruit; une baie ou une capsule, indéhiscente, déhiscente, ou se divisant en 3 carpelles.

- x. Plantes avec troncs ligneux, ressemblant aux palmiers, feuilles distiques au sommet..... **Ravenala**, p. 58
- x. Plantes ne présentant pas les caractères mentionnés ci-dessus:
 - 2x. Troncs robustes, formés d'immenses gaines; fruit long, charnu..... **Musa**, p. 58
 - 2x. Tiges grêles, formées de gaines allongées; fruit, une capsule qui se divise en fruits baccaires **Heliconia**, p. 58

Musa L.

Tiges généralement en groupes, robustes; feuilles disposées en spirale, leurs grandes gaines formant le tronc. Inflorescence terminale. Fleurs unisexuées par avortement, les fleurs supérieures fonctionnant comme fleurs staminées.

M. paradisiaca L. «**Banane**» (Plantain en anglais), vivres alimentaires de première importance en Haïti.

M. paradisiaca L. Var. **sapientum** Kuntze. «**Figue**» ou «**Figue banane**» (**Banana** en anglais).

M. cavendishii Lamb. «**Figue naine**» (**Dwarf banana** en anglais).

Ravenala Adans.

Plantes à tronc ressemblant au stipe des palmiers. Feuilles immenses comme celles des bananiers; disposées sur deux rangées, au sommet de la tige, elles donnent à la plante l'aspect d'un flabellum.

R. madagascariensis Gmel. «**Traveler's palm**,» en anglais. Assez rarement cultivé comme plante ornementale.

Heliconia L.

Plantes à grandes feuilles comme le bananier à bractées voyantes, vivant dans les montagnes humides à plus de 400 mètres d'altitude. Ce genre diffère du *Musa* par les caractères mentionnés dans la clé.

H. bihai L. «**Bananier marron**,» «**Plantano cimarron**» ou «**Plantano sylvestre**» à St-Domingue.

Famille. 27. ZINGIBERACEÆ

Herbes vivaces pourvues de rhizomes, à tiges courtes, le plus souvent simples. Feuilles pétioolées ou sessiles, entières engainantes, linéaires, lancéolées ou oblongues et le plus souvent acuminiées, avec ligule au sommet du pétiole, radicales et caulinaires. Fleurs bisexuées, irrégulières, disposées généralement en épis bractéolés, capitules ou panicules, une ou plusieurs fleurs sous chaque bractée. Périanthe de 6 pièces; calice tubulaire ou quelque peu en forme de spathe, généralement tridenté; corolle tubulaire, à 3 lobes inégaux; étamine fertile 1, les 2 loges de l'anthère séparées par un connectif; staminode 1, pétaloïde et parfois plusieurs, dans ce cas, les staminodes latéraux peuvent être filiformes ou pétaloïdes; ovaire infère, le plus souvent uniloculé, multiovulé; style et stigmate 1, le style est retenu par l'anthère. Fruit, capsule loculicide, à déhiscence souvent tardive.

- x. Pas de staminodes latéraux pétaloïdes:
 - 2x. Lèvre régulièrement développée; filet allongé:
 - 3x. Filet de l'anthère huppé; inflorescence en forme de cône..... **Costus**, p. 59
 - 3x. Filet de l'anthère non huppé; inflorescence non en forme de cône..... **Alpinia**, p. 59
 - 2x. Lèvre réduite à une petite dent en forme de lobe; filet court ou très court:
 - 3x. Connectif petit, à peine perceptible; inflorescence non en forme de cône..... **Renealmia**, p. 59
 - 3x. Connectif large, reniforme, appendiculé; inflorescence en forme de cône..... **Zingiber**, p. 59
- x. Staminodes latéraux, pétaloïdes, développés..... **Curcuma**, p. 59

Costus L.

Plantes avec rhizomes épais, feuilles larges plus ou moins ovales. Inflorescence terminale en forme d'épis épais. Calice et corolle courts, tubulaires. Fruit, une capsule trivalvée.

C. cylindricus Jacq. Assez abondant à St-Domingue, rare en Haïti.

Alpinia L.

De même apparence que le genre *Costus*. Feuilles généralement étroites. Inflorescence quelque peu paniculée. Fruit généralement non valvé.

A. speciosa (Wendl.) Schum. «**Tous-moux**,» «**Jockey-Club**,»

A. allughas (Retz) Roscoe. (Les Cayes).

Renealmia L.

Plantes ressemblant au *Zingiber*. Inflorescence plus ou moins épiée. Calice et corolle tubulaires—cylindriques. Stigmates bulbeux.

R. antillarum (R. et Sch.) «**Gagnepin**,» «**Gingembre marron**» ou «**Canne roseau**» (Haïti).

R. aromatica (Aubl.) Griseb. «**Gingembre marron**,» «**Gengibre cimarron**» à St-Domingue, d'après Urban.

R. densiflora Urb.

Zingiber Adams.

Rhizome tubéreux, aromatique. Feuilles engainantes sur la tige. Inflorescence épiée, bractées persistantes, généralement avec une fleur en dessous. Calice et corolle cylindriques, à lobes courts. Lèvre courbée extérieurement.

Z. cassumunar Roxb. «**Gingembre marron**,» Abondant.

Z. officinale Roscoe. «**Gingembre**,» Cultivé.

Curcuma L.

Se distingue des genres précédents par de grands staminodes pétaloïdes; rhizomes tubéreux, tige courte ou absente. Epis composés, terminés par une touffe de bractées voyantes.

C. longa L. «**Safran**,» Dans les montagnes, répandu; originairement introduit.

Famille 28. CANNACEÆ

Herbes vivaces, caulescentes, à ramifications vigoureuses, dressées ou non ramifiées. Rhizomes rameux, parfois tubérifères, portant de grandes feuilles alternes, larges entières, avec pétioles engainants. Fleurs, le plus souvent rouges ou jaunes, très voyantes, disposées en épis terminaux, en grappes ou en étroites panicules, très irrégulières. Sépales 3, petites et généralement verts, ressemblant à des bractées; pétales 3 semblables aux sépales, le plus souvent

étroits et pointus, verts ou colorés, plus longs que les sépales et alternant avec eux, l'un d'eux généralement plus petit que les autres; les parties florales plus ou moins unies à la base en forme de tube; étamines représentées par des staminodes et comprenant la partie voyante de la fleur; style unique et long, plat ou claviforme, en saillie au centre de la fleur; ovaire infère, trilobulaire, multiovulé. Fruit capsulaire trivalvé et le plus souvent triangulaire, papilleux, verruqueux ou quelque peu épineux, portant le calice persistant.

Canna L.

Caractères de la famille.

C. coccinea Mill. «Sagou marron.» Fleurs rouges.

C. domingensis Urb. Fleurs jaune d'or.

C. jaegeriana Urb. «Banane zombi.» Fleurs jaunes (Furcy).

C. glauca L. Fleurs jaune clair, mouchetées ou teintées de rouge.

C. orchioïdes Bailey. Espèce hybride d'une beauté remarquable, récemment introduite, couleurs variées.

Famille 29. MARANTACEÆ

Herbes vivaces, rhizomateuses ou tubérifères, acaules ou caulescentes. Feuilles larges ou étroites, à nervation pennée et étrécies au pétiole, plus ou moins distiques. Fleurs généralement non voyantes, bisexuées, très irrégulières, en grappes épiées ou capitées, une ou deux, ou plusieurs ensemble, l'inflorescence entourée de bractées en forme de spathe. Périanthé de 6 pièces, les 3 pièces internes constituent la corolle; sépales libres, égaux ou presque égaux; pétales généralement soudés en tube long ou court, le pétale externe généralement grand et plus ou moins encapuchonné est coloré ou blanc; étamines le plus souvent 6 dont une est fertile (portant une anthère uniloculaire) et les autres représentées par des staminodes irréguliers disposés en 2 séries; ovaire infère, trilobulaire, mais une ou 2 loges avortent souvent; ovule 1 dans chaque loge; style grêle et stigmat simple. Fruit: une capsule ou une baie.

x. Ovaire trilobulaire *Calathea*, p. 60

x. Ovaire à une seule loge développée:

2x. Staminodes 2; bractées étroites, convolutées *Maranta*, p. 60

2x. Un staminode; bractées divergentes *Thalia*, p. 60

Calathea G. F. W. Mey.

Plantes herbacées d'aspect quelque peu varié, petites ou hautes, caulescentes ou acaules, dressées ou rampantes. Feuilles radicales et caulinaires, le pétiole engainant au moins à la base. Inflorescence le plus souvent capitée ou semblable à un cône avec des bractées disposées en spirale et née entre les feuilles.

C. allouia (Aubl.) Lindl. Cultivé dans le Nord pour ses tubercules souterrains comestibles, «Topinambour» ou «Topi.»

Maranta L.

Diffère du genre *Calathea* par des caractères plutôt techniques. Le tube de la corolle est cylindrique. Périanthé blanc surtout.

M. arundinacea L. «Arrowroot.» Cultivé pour son rhizome amylacé.

Thalia L.

Semblable au genre *Maranta*, généralement plus vigoureux. Tube de la corolle absent ou obsolete. Périanthé surtout pourpre.

T. geniculata L. «Glaïeul.» (Petite-Rivière de l'Artibonite).

Ordre XII. ORCHIDALES

Herbes terrestres, aquatiques ou épiphytes. Feuilles généralement charnues, parfois squameuses. Fleurs le plus souvent parfaites et complètes, très irrégulières, excepté chez les *Burmaniaceæ*. Calice trisépalé, corolle tripétalée; gynécée composé; ovaire infère. Graines nombreuses; endosperme absent.

x. Fleurs régulières; étamines et pistils distincts: 30. *Burmaniaceæ*, p. 61

x. Fleurs irrégulières; étamines et pistils soudés en une colonne 31. *Orchidaceæ*, p. 61

Famille 30. BURMANIACEÆ

Herbes légères ou relativement petites. Feuilles surtout basilaires, celles-ci sur la tige en forme d'écailles. Fleurs régulières; sépales et pétales en partie soudés; androcée de 3 à 6 étamines; filets soudés au tube du périanthé; gynécée de 3 carpelles. Fruit capsulaire, parfois anguleux ou ailé.

x. Tube du périanthé muni de 3 petits sacs au-dessous des segments intérieurs; filets ailés: graines obovées. *Apteria*, p. 61

x. Tube du périanthé non muni de petits sacs; filets non ailés; graines presque sphériques *Cymbocarpa*, p. 61

Cymbocarpa Myers.

Plantes petites, saprophytes, colorées ou non colorées, avec de fausses ombelles non compactes, bifides ou contractées. Fleurs toutes parfaites ou les premières fleurs pistillées par avortement. Tube du périanthé long, fendu en cercle au milieu, à l'époque de la fécondation, les 3 segments internes très petits ou absents. Anthères sessiles ou avec filets courts, les sacs épais se déchirant transversalement. Style avec 3 stigmates épais, courts, parfois avec 2, poilus.

C. refracta Miers.

Apteria Nutt.

Herbes petites, vivaces, saprophytes. Fleurs inclinantes à pédicelles longs, blanches ou pourpres. Filets avec des appendices en forme d'ailes. Connectif non prolongé au delà des sacs de l'anthère.

A. hymenantha Miq.

Famille 31. ORCHIDACEÆ Lindl.

Une immense famille de plantes intéressantes et assez curieuses, herbacées, terrestres, aquatiques ou épiphytes. Il existe dans le monde plus de 15,000 espèces connues appartenant à des centaines de genres. Elles sont représentées en Haïti par un certain nombre de genres tropicaux. La marque distinctive de la famille est le *gynostème*, un corps plus ou moins volumineux, qui fait saillie au centre de la fleur et constitué par une concrescence de l'étamine avec le style et le stigmat du pistil; ce corps s'appelle parfois «colonne», bien que ce terme s'applique aussi dans d'autres plantes à un organe formé par l'union des étamines seules. Le gynostème peut se composer d'une ou de deux étamines normales représentées par l'anthère ou les anthères unies au style. En outre, celles-ci peuvent être des staminodes attendu que les étamines sont morphologiquement au nombre de 6. Le style se termine souvent en une sorte de bec placé entre les loges de l'anthère ou faisant saillie à la base de l'anthère. Les Orchidées sont vivaces, à racines tubéreuses, bulbaires ou épaisses, dressées, rampantes ou grimpantes. Elles possèdent parfois des tiges épaisses connues sous le nom de pseudobulbes. Certaines espèces ont un développement monopode, d'autres sont sympodes. Feuilles variées. Fleurs généralement parfaites, très

irrégulières, sous-tendues par une bractée. Sépales semblables, généralement étroits et non voyants. Corolle de 3 pétales. Les 2 pétales latéraux sont semblables, le troisième médian postérieur très développé appelé **labelle** est formé d'une large lame colorée, munie d'un long éperon. Ovaire infère, trilobulaire ou uniloculaire par avortement. Le fruit est généralement une capsule déhiscente contenant un nombre considérable de graines très petites.

Vu la diversité des formes présentes et le peu d'importance économique qu'offrent la majeure partie de ces formes, on a jugé bon de les présenter le plus brièvement possible pour donner une simple idée de cette famille en Haïti.

- x. Plantes terrestres:
 - 2x. Plantes non sarmenteuses:
 - 3x. Loges de l'anthère distinctes, divergentes **Habenaria**, p. 65
 - 3x. Loges de l'anthère rassemblées étroitement, mais non unies:
 - 4x. Feuilles non charnues:
 - 5x. Feuilles membraneuses, non plissées:
 - 6x. Pollinies 2-4, granuleuses:
 - 7x. Anthères caduques, operculaires, sur le bord du *clinandrium*. Feuilles le long de la tige ou absentes **Pogonia**, p. 65
 - 7x. Anthères persistantes parallèles au dos du long rostellum. Feuilles généralement radicales:
 - 8x. Labelle sur le côté inférieur de la fleur:
 - 9x. Sépales latéraux réunis en forme d'éperon:
 - 10x. Eperon enfermant la base allongée du labelle **Pelexia**, p. 66
 - 10x. Eperon n'enfermant pas la base allongée du labelle **Stenorrhynchus**, p. 66
 - 9x. Sépales latéraux libres:
 - 10x. Labelle dépourvu d'éperon **Spiranthes**, p. 66
 - 10x. Labelle avec éperon **Erythodes**, p. 66
 - 8x. Labelle sur le côté supérieur de la fleur:
 - 9x. Labelle libre inséré à la base de la colonne **Cranichis**, p. 67
 - 9x. Labelle non libre ou non inséré à la base de la colonne:
 - 10x. Labelle inséré sur la coupe formée par l'union basilaire des sépales **Prescottia**, p. 67
 - 10x. Labelle et pétales insérés sur la longue colonne **Ponthieva**, p. 67
 - 6x. Pollinies 4, cireuses (non granuleuses):
 - 7x. Feuilles vertes; fleurs sans menton:

- 8x. Anthères dressées; colonne courte:
 - 9x. Anthères persistantes, dégageant librement les pollinies à l'aide de rides dans les cloisons **Malaxis**, p. 68
 - 9x. Anthères caduques, non ridées, à déhiscence interne **Microstylis**, p. 67
- 8x. Anthères incombantes. Colonne longue **Liparis**, p. 68
- 7x. Feuilles absentes, fleurs avec menton **Corallorrhiza**, p. 67
- 5x. Feuilles papyracées, plissées:
 - 6x. Fleurs petites, paniculées. Pollinies 2:
 - 7x. Colonne longue, labelle linéaire à partir de la base, sépales soudés en un tube **Corymborchis**, p. 68
 - 7x. Colonne courte, labelle sacculiforme à la base sépales soudés en un menton court **Tropidia**, p. 68
 - 6x. Fleurs grandes en grappes:
 - 7x. Pollinies 4:
 - 8x. Hampe avec feuilles **Govenia**, p. 72
 - 8x. Hampe sans feuilles:
 - 9x. Labelle sacculiforme **Eulophia**, p. 72
 - 9x. Labelle non sacculiforme **Cyrtopodium**, p. 72
 - 7x. Pollinies 8:
 - 8x. Labelle uni avec la base de la colonne, non éperonné. Fleurs pourpres ou roses **Bletia**, p. 72
 - 8x. Onglet du labelle soudé avec la colonne formant un tube, éperonné. Fleurs blanches **Calanthe**, p. 72
- 4x. Feuilles charnues, linéaires, semi-ar rondies. Fleurs petites, roses; labelle trilobé **Tetramicra**, p. 71
- 2x. Plantes sarmenteuses avec fruit charnu **Vanilla**, p. 65
- x. Plantes épiphytes, ou quelquefois poussant sur des roches:
 - 2x. Feuilles plissées:
 - 3x. Pollinies 4. Pseudo-bulbes présents:
 - 4x. Pédoncules plusieurs, avec une fleur sur chacun **Lycaste**, p. 73
 - 4x. Raceme avec plusieurs fleurs **Xylobium**, p. 73
 - 3x. Pollinies 8. Pseudo-bulbes absents **Elleanthus**, p. 72
 - 2x. Feuilles non plissées:
 - 3x. Labelle sur le côté supérieur de la fleur paniculée qui possède de petites bractées **Polystachya**, p. 68
 - 3x. Labelle sur le côté inférieur de la fleur (un petit nombre d'espèces d'*Epidendrum* et d'*Oncidium* possèdent le labelle sur le côté supérieur):
 - 4x. Pollinies 2:
 - 5x. Sans pseudo-bulbes **Polyrrhiza**, p. 75
 - 6x. Tige avec une feuille au sommet:
 - 7x. Fleurs s'ouvrant uniquement par une fissure au côté **Cryptophoranthus**, p. 68

- 7x. Fleurs s'ouvrant normalement:
 8x. Onglet du pétale et labelle adnés à la base de la colonne *Lepanthes*, p. 69
- 8x. Pétale et labelle non adnés à la base de la colonne:
 9x. Pétale et labelle libres, très ressemblants divergents *Stelis*, p. 68
- 9x. Pétales libres, différents du labelle qui est uni à la colonne *Pleurothallis*, p. 69
- 6x. Tige avec 2 ou plusieurs feuilles ou dépourvue de feuilles:
 7x. Fleurs non éperonnées *Oncidium*, p. 74
- 7x. Fleurs éperonnées:
 8x. Fleurs avec un éperon court:
 9x. Labelle plus long que les sépales. Sépales formant l'éperon *Ionopsis*, p. 73
- 9x. Labelle plus court que les sépales. Labelle formant l'éperon *Campylocentrum*, p. 75
- 8x. Fleurs avec un éperon très long, caule et aphyllé *Dendrophylax*, p. 75
- 5x. Avec pseudo-bulbes. Fleurs non éperonnées:
 6x. Fleurs grandes, sépales longs, étroits *Brassia*, p. 74
- 6x. Fleurs petites:
 7x. Hampe plus courte que les feuilles *Trichopilia*, p. 74
- 7x. Hampe plus longue que les feuilles *Leochilus*, p. 74
- 4x. Pollinies 4:
 5x. Colonne avec pied, les sépales avec le pied forment plus ou moins une sorte de menton:
 6x. Labelle libre, articulé au pied de la colonne:
 7x. Mode de croissance monopodial *Dichaea*, p. 75
- 7x. Mode de croissance sympodial:
 8x. Pseudo-bulbes présents; feuilles coriaces *Maxillaria*, p. 73
- 8x. Pseudo-bulbes absents; feuilles membraneuses *Warszewiczella*, p. 74
- 6x. Labelle non articulé au pied de la colonne, dressé:
 7x. Pseudo-bulbes absents: *Isochilus*, p. 70
- 7x. Pseudo-bulbes présents:
 8x. Feuilles charnues *Domingoa*, p. 71
- 8x. Feuilles minces *Ornithidium*, p. 73
- 5x. Colonne sans pied:
 6x. Une sorte anormale de menton formée par les sépales latéraux et la colonne *Tetragamestus*, p. 70
- 6x. Pas de menton formé:
 7x. Pollinies ovoïdes, non ou légèrement comprimées *Hormidium*, p. 67

- 7x. Pollinies parallèles, comprimées:
 8x. Labelle libre de la colonne et l'embrassant à la base, développé au dessous en un éperon adné. Pseudo-bulbes présents. Tige généralement avec seulement 1 ou 2 feuilles au sommet *Broughtonia*, p. 71
- 8x. Labelle appressé à la colonne et plus ou moins conné en tube avec la colonne, mais parfois libre, l'onglet du labelle dressé. Généralement dépourvu de pseudo-bulbes, parfois avec tige généralement feuillée *Epidendrum*, p. 70
- 4x. Pollinies 6 *Brachionidium*, p. 69
- 4x. Pollinies 8:
 5x. Sans pseudo-bulbes:
 6x. Fleurs blanc-crème *Octadesmia*, p. 70
- 6x. Fleurs roses *Cattleyopsis*, p. 71
- 5x. Avec pseudo-bulbes *Neocogniauxia*, p. 72
- Autre genre *Fuertesella*, p. 66

Habenaria Willd.

Plantes terrestres. Racines charnues ou tubéreuses. Tiges dressées, simples, avec quelques feuilles engainantes à leur base. Inflorescence en grappes. Sépales inégaux, libres, celui du milieu encapuchonné. Pétales plus petits. Labelle continu avec la colonne qui est très courte et sans pied.

- H. distans* Griseb. Dans les montagnes.
H. macrocratitis Willd. Haut-du-Cap.
H. distans, Var. *jamaicensis* (Fawc. et Rendle) Cogn.
H. monorrhiza (Sw) Rchb. Assez commun.
H. repens Nutt. Etang Miragoâne.
H. eustachya Rchb. St-Domingue.
H. alata Hook. Dans les montagnes.

Pogonia Juss.

Plantes terrestres. Racines charnues ou tubéreuses. Feuilles absentes ou apparaissant sur la tige avec les fleurs. Fleurs de grandeur moyenne ou petites, semblables à un corymbe, dressées. Sépales et pétales semblables, trilobés. Labelle dressé à partir de la base de la colonne, libre. Colonne allongée, légèrement plus épaisse au sommet.

- P. macrophylla* Lindl. Dans les montagnes, forêts humides.

Vanilla Juss.

Plantes généralement robustes. Tiges grimpantes, émettant des racines. Feuilles variées, absentes dans quelques espèces, coriaces, papyracées ou membraneuses. Fleurs grandes, mais non voyantes.

- V. inodora* Schiede. Régions humides, rare.
V. wrightii Rchb. Massif du Nord, montagnes irrégulières.

- V. claviculata* (W. Wright) Sw.
V. eggersii Rolfe. «Liane vers» (Jacmel).
V. poitaei Rchb.
V. planifolia Andr. «Vanille» cultivée.

Pelexia (Poit) Lindl.

Plantes terrestres avec racines agrégées. Feuilles radicales à pétiole long. Fleurs de grandeur moyenne, disposées en épis peu compacts. Sépales, le sépale médian conné avec les pétales, les sépales latéraux connés à la base en forme d'un éperon linéaire. Colonne courte dépourvue de pied.

- P. setacea* Lindl.
P. calcarata (Sw) Cogn.
P. adnata (Sw) Spreng.

Stenorrhynchus (L. C. Rich) Lindl.

Plantes terrestres, racines fibreuses, charnues, agrégées. Feuilles elliptiques, ligulées. Inflorescence épiée. Sépales libres, le sépale médian adhérent aux pétales, les sépales latéraux formant un menton (avec la colonne) ou un éperon. Labelle embrassant la colonne ou parfois adhérent à la colonne cylindrique qui possède un pied à la base.

- S. speciosus* (Jacq.) Lindl.
S. lanceolatus (Aubl.) Griseb.
S. aphyllus (W. Hook) Lindl.
S. orchioïdes Lindl. Ile de la Tortue.

Spiranthes L. C. Rich.

Plantes terrestres. Racines fibreuses ou tubéreuses. Tiges feuillées ou dépourvues de feuilles à la floraison. Fleurs petites, rangées d'un seul côté dans des épis tordus. Sépales libres, le sépale médian adhérent avec les pétales; les pétales latéraux, relevés en bosses plus ou moins apparentes à la base. Colonne courte, cylindrique.

- S. elata* (Sw) L. C. Rich.
S. fawcettii Cogn.
S. monophylla (Lindl.) Cogn.
S. stahlia Cogn.
S. quinquelobata (Poir.) Urb.

Erythrodites Blume.

Plantes terrestres. Racines charnues. Tiges parfois rampantes, émettant des racines à la partie inférieure, souvent pubescentes au-dessus. Fleurs ténues—petites, presque sessiles, disposées en épis. Labelle dressé, à partir de la base de la colonne qu'il embrasse. [*Physurus* L. C. Rich.].

- E. plantaginea* Fawc. et Rendle [*Physurus plantagineus* (L.) Lindl].
E. sagrænna (A. Rich) Comb. nov. [*P. sagrænus* A. Rich].
E. hirtella Fawc. et Rendle [*P. hirtella* (Sw) Lindl].

Fuertesiiella Schlechter.

Plantes terrestres. Pseudo-bulbes absents. Racines charnues. Feuilles radicales, solitaires, pétiolées. Inflorescence en épis compacts, pluriflorés ou presque capitée. Labelle sessile. Colonne très courte.

- F. pterichoides* Schlechter. Fleurs blanc de cire.

Cranichis Sw.

Plantes terrestres. Racines quelque peu agrégées. Feuilles radicales, larges, membraneuses. Fleurs petites disposées en épis. Pétales un peu plus courts et beaucoup plus étroits que les sépales. Labelle sur le côté supérieur de la fleur. Ovaire et bractées blancs. Fleurs brunes.

- C. diphylla* Sw.
C. muscosa Sw.

Corallorrhiza R. Br.

Herbes caulescentes, succulentes, pourpres, brunes ou rougeâtres, avec rhizome en forme de corail. Feuilles squameuses. Fleurs en raceme terminal. Périanthé coloré de façons variées. Sépales légèrement inéquilatéraux, courbés. Pétales légèrement plus petits que les sépales, quelque peu rétrécis à la base. Lèvre dilatée, limbe ondulé ou lobé.

- C. ekmanii* Mansf.

Hormidium Lindl.

Herbes épiphytes avec tiges grimpantes. Feuilles étendues, limbes relativement étroits. Fleurs en grappes terminales sous-tendues par un involucre de bractées foliacées. Périanthé peu voyant. Sépales latéraux le plus souvent étroits et plus courts que le sépale du milieu. Pétales plus petits que les sépales. Lèvre relativement petite avec 2 grands lobes latéraux et un très petit au milieu.

- H. tripterum* (Brongn) Cogn. Massif du Nord, dans les montagnes.

Microstylis Nutt.

Herbes basses provenant de bulbes solides produisant des tiges simples qui portent une seule feuille et un raceme formé de nombreuses petites fleurs verdâtres. Sépales oblongs étendus. Pétales filiformes ou linéaires, étendus. Lèvres auriculées ou ovées à la base, se rétrécissant au sommet, entières ou presque entières. Colonne très petite, cylindrique avec 2 petites dents ou auricules au sommet, anthère dressée entre elles. Masses polliniques 4, en une rangée (2 dans chaque loge de l'anthère) s'ajustant par paire, cireuses, sans pédicelles, filets ou glandes.

- M. hispaniolæ* Schlechter.

Prescottia Lindl.

Plantes terrestres, rhizomateuses. Tiges feuillées. Feuilles variées. Fleurs très petites—petites, presque sessiles, nombreuses, disposées en épis. Sépales membraneux, connés à la base. Pétales étroits, adnés à la coupe sépaline juste au-dessus du sépale médian. Colonne très courte adnée à la coupe sépaline.

- P. stachyoïdes* (Sw) Lindl.
P. oligantha (Sw) Lindl.

Ponthieva R. Br.

Plantes terrestres. Racines fibreuses. Feuilles radicales, ovées à nervation réticulée. Fleurs petites, disposées en racemes. Sépales libres, les latéraux parfois plus larges que le sépale médian. Labelle sur le côté supérieur de la fleur. Colonne courte, quelque peu arrondie.

- P. harrisii* Cogn. Massif de la Hotte.
P. glandulosa (Sims) R. Br.
P. pauciflora (Griseb) Fawc. et Rendle.
P. haïtiensis Mansf.
P. ventricosa (Griseb) Fawc. et Rendle.
P. ekmanii Mansf. Ile de la Tortue.

Corymborchis Pet. Thouars.

Plantes terrestres, feuillées, avec racines ligneuses, épaisses, agrégées sur un court rhizome. Feuilles grandes, plissées, papyracées. Fleurs de grandeur moyenne, disposées en panicules terminales ou axillaires, presque corymbiformes. Labelle dressé à partir de la base de la colonne, cannelé. Colonne longue, plus épaisse au sommet, terminée par 2 lobes dressés ou auricules [=Corymbis].

C. flava (Sw) O. Ktze [Corymbis flava Hemsl].

Tropidia Lindl.

Plantes ressemblant au genre Corymborchis. Fleurs petites, disposées en épis courts et compacts au sommet des branches. Sépales latéraux connés à la base, sous le labelle en un court menton. Colonne courte.

T. polystachya (Sw) Ames.

Malaxis Soland et Sw.

Plantes terrestres. Base de la tige généralement pseudo-bulbeuse. Feuilles 1 ou 2, larges. Fleurs très petites—petites, disposées en raceme terminal, parfois reserré et corymbiforme. Pétales et sépales presque égaux. Labelle sessile avec auricule embrassant la colonne. Colonne très courte, cylindrique, creuse au sommet.

M. spicata Sw.

M. umbelliflora Sw.

M. grisebachiana Fawc. et Rendle.

Liparis L. C. Rich.

Plantes terrestres. Tiges feuillées, courtes, épaissies en forme d'une corymbe ou d'un grêle pseudo-bulbe. Fleurs petites ou de grandeur moyenne, verdâtres ou pourpres, disposées en raceme terminal pédicellé. Colonne longue, recourbée, semi-cylindrique, sans pied, marginée ou appendiculée au sommet.

L. elata Lindl. Fleurs blanches ou rouges.

Polystachya W. Hook.

Plantes épiphytes. Tiges feuillées, courtes, parfois épaissies en forme de pseudo-bulbes. Feuilles disposées sur deux rangs, non plissées, articulées avec les gaines. Fleurs petites, disposées en grappes terminales ou en panicules peu compactes. Labelle sur le côté supérieur de la fleur, articulé au pied d'une courte colonne. Sépales connivents. Pollinies 4.

P. minuta (Aubl.) Britton.

Cryptophoranthus Barb. Rodr.

Plantes épiphytes à rhizome rampant, sans pseudo-bulbe. Tige avec une feuille. Fleurs petites, solitaires ou agrégées à la base de la feuille. Sépales complètement connés, exception faite des fentes sur l'un et l'autre côté du sépale médian. Pétales beaucoup plus petits. Colonne dressée avec un long pied auquel s'articule le labelle.

C. atropurpureus (Lindl) Rolfe.

Stelis Sw.

Plantes épiphytes. Tiges dressées, agrégées, avec une feuille au sommet. Fleurs petites, disposées en longue grappe, entourée d'une bractée en forme de spathe. Labelle sessile à la base d'une colonne courte.

S. tippenhaueri Urb.

S. domingensis Cogn.

S. desportesii Urb.

S. ophioglossoides (Jacq.) Sw.

S. repens Cogn.

S. chabreana Mans. Gros-Morne, E. 5009.

S. jensenii Urb.

Pleurothallis R. Br.

Plantes épiphytes. Tiges agrégées ou branches d'un rhizome rampant avec une feuille au sommet. Pas de pseudo-bulbes. Fleurs petites, disposées en une ou plusieurs grappes avec spathe. Pétales plus petits que les sépales. Colonne semi-cylindrique presque aussi longue que le labelle. Pied très court.

P. racemiflora (Sw) Lindl.

P. gelida Lindl.

P. crassipes Lindl.

P. velaticaulis Rchb. f.

P. appendiculata Cogn.

P. tricolorata Cogn.

P. domingensis Cogn.

P. erosa Urb.

P. ruscifolia (Jacq.) R. Br.

P. wilsoni Lindl.

P. hotteana Mansf.

P. crypantha Cogn.

P. dussii Cogn. Fleurs jaunes.

P. testifolia (Sw) Lindl. Fleurs rouges.

P. miguelii Schlechter.

P. oborata Lindl.

P. aristata Hook.

P. lanceola (Sw) Spring.

P. melanantha Rchb. f.

P. mornicola Mansf.

P. helenæ Fawc. et Rendle.

P. constanzensis Cogn.

P. barahonensis Cogn.

P. fuertesii Cogn.

P. anthoetium Rchb.

Lepanthes Sw.

Plantes épiphytes, petites. Tiges agrégées, portant une seule feuille au sommet. Fleurs très petites, sur 2 rangs en racemes. Pétales très petits, le court onglet adné à la base de la colonne. Labelle bilobé, adné à la courte colonne à la base ou au dessus de la base.

Les espèces de ce genre se ressemblent beaucoup; elles sont toutes épiphytes sur des arbres dans les montagnes.

L. serrulata Cogn.

L. subalpina Urb.

L. constanzæ Urb.

L. mornicola Urb.

L. ovalis (Sw) Fawc. et Rendle.

L. tenuis Schlechter.

L. urbaniana Mansf.

Brachionidium Lindl.

Plantes épiphytes formant un long rhizome rampant. La tige secondaire avec feuilles solitaires. Fleurs solitaires enfermées dans une gaine. Pétales

semblables aux sépales. Labelle petit, articulé au pied d'une colonne courte, large.

B. sherringii Rolfe.

Isochilus R. Br.

Plantes épiphytes. Tiges dressées surgissant d'un rhizome rampant. Pas de pseudo-bulbes. Feuilles sur 2 rangées. Fleurs de grandeur moyenne, de couleur rose ou cramoisie, disposées en une grappe compacte unilatérale. Pétales légèrement plus longs que les sépales. Labelle quelque peu reserré en dessous attaché à la base de la colonne. Colonne dressée, longue, semi-cylindrique, avec un pied court et deux pointes au sommet.

I. linearis (Jacq.) R. Br.

Tetragamestus Rchb. f.

Plantes épiphytes. Pseudo-bulbes formés. Tiges hautes, agrégées. Inflorescence corymbiforme. Sépales inégaux formant une sorte de menton avec la colonne. Labelle articulé à la colonne. Colonne courte, sans pied, élargie au sommet.

T. modestus Rchb. f.

Octadesmia Benth.

Plantes épiphytes. Tiges simples avec feuilles disposées sur 2 rangs, rigides, mais non charnues, caduques. Fleurs de grandeur moyenne, à pédoncule court. Sépales et pétales semblables. Labelle trilobé, presque dressé à partir de la base de la colonne. Colonne longue, légèrement recourbée, concave antérieurement, avec un pied court.

O. montana (Sw) Benth.

O. scirpoïdea Schlechter.

Epidendrum L.

Plantes épiphytes. Tiges feuillées, parfois charnues ou rarement épaissies en forme de pseudo-bulbes. Feuilles coriaces. Fleurs petites — de grandeur moyenne, disposées en grappe ou en panicule. Pétales généralement semblables aux sépales. Onglet du labelle dressé, pressé contre la colonne et plus ou moins conné avec elle en forme de tube. Colonne généralement étroite.

E. globosum Jacq.

E. teretifolium Sw.

E. isochilum Rchb. f.

E. isochilum, Var. *tridens* Rchb. f.

E. ottonis Rchb. f.

E. christii Cogn.

E. fucatum Lindl.

E. eggersii Cogn.

E. truncatum Cogn.

E. buchii Cogn.

E. atropurpureum Willd.

E. bifidum Aubl.

E. olivaceum Cogn.

E. domingense Cogn.

E. cochleatum L. «Guiguitte.» Assez abondant.

E. fragrans Sw.

E. fuertesii Cogn. Dans les montagnes, pas rare.

E. variegatum W. Hook.

E. variegatum, Var. *coriaceum* (Parker) Lindl.

E. porpax Rchb. f.

E. porpax, Var. *domingense* Cogn.

E. wrightii Lindl. Assez abondant.

E. anceps Jacq. Assez abondant.

E. rivulare Lindl.

E. nocturnum Jacq.

E. nocturnum, Var. *latifolium* Lindl.

E. difforme Jacq. Commun dans les régions humides.

E. corymbosum Lindl.

E. imbricatum Lindl.

E. rigidum Jacq.

E. ramosum Jacq.

E. strobiliferum Rchb. f.

E. strobiliferum, Var. *swartzii* Rchb. f.

E. repens Cogn.

E. ekmanii Mansf. Port-de-Paix.

E. boothianum Lindl.

E. blanchianum Urb.

Domingoa Schlechter.

Plantes épiphytes. Rhizomes courts. Pseudo-bulbes grêles. Feuilles charnues, dressées. Sépales et pétales semblables. Labelle libre, dilaté à la base. Colonne grêle, incurvée avec pied court, sommet avec 2 auricules. Fleurs blanches — violettes.

D. hymenodes (Rchb. f.) Schlechter. Assez commun.

D. nodosa (Cogn.) Schlechter. St-Domingue.

Broughtonia R. Br.

Plantes épiphytes. Pseudo-bulbes ovoïdes ou globulaires. Feuilles coriaces ou charnues. Fleurs de grandeur moyenne, disposées en racemes. Pétales plus grands que sépales. Labelle libre, sessile à la base de la colonne qu'il embrasse. Eperon long, adné à l'ovaire. Colonne courte, à larges ailes.

B. domingensis (Lindl.) Rolfe. «Belle orchidée» au bord de mer.

Cattleyopsis Lemaire.

Plantes épiphytes. Pseudo-bulbes oblongs. Feuilles charnues 1-3. Fleurs moyennes — grandes, disposées en racemes ou en panicules peu compactes. Labelle plus ou moins adné à la colonne. Colonne longue semi-cylindrique.

C. rosea (Schlech.) Mansf. (Comb. nov.) La Selle.

Tetramicra Lindl.

Plantes terrestres. Tiges feuillées. Pas de pseudo-bulbes. Fleurs petites, disposées en racemes peu denses. Pétales semblables aux sépales, mais plus étroits. Labelle libre attaché à la base de la colonne; lobes latéraux distincts sur un court onglet. Colonne dressée, ligneuse, avec 2 larges ailes au-dessus.

T. canaliculata (Aubl.) Urb. «Magueycillo» à St-Domingue, abondant.

T. schomburgkii (Rchb. f.) Rolfe. St-Domingue.

T. pratensis (Rchb. f.) Rolfe, St-Domingue.

T. schœnina (Rchb. f.) Rolfe. Assez commun.

T. parviflora Lindl.

T. bulbosa Mansf. La Selle.

T. ekmanii Mansf. Ennery.

Neocogniauxia Schlechter.

Plantes épiphytes. Rhizomes courts et pseudo-bulbes grêles. Feuilles 1-2 coriaces. Pétales semblables aux sépales. Fleur solitaire terminale. Labelle embrassant à peine la colonne. Colonne épaisse, courte, sans pied.

N. hexaptera (Cogn.) Schlechter.

Elleanthus Presl.

Plantes terrestres, feuillées, de haute taille. Feuilles inférieures plissées, la feuille supérieure en forme de bractée. Fleurs denses disposées en capitule ou en épi compact sur 2 rangs. Pétales semblables aux sépales. Labelle dressé attaché à la base de la colonne qu'il entoure généralement. Colonne dressée, semi-cylindrique ou ailée, sans pied.

E. capitatus (R. Br.) Rchb. f. Dans les montagnes.

E. linifolius Presl. Dans les montagnes.

Calanthe R. Br.

Plantes terrestres. Tiges courtes, rhizomateuses. Feuilles peu nombreuses, grandes. Hampe très haute. Raceme simple à fleurs peu compactes. Bractées très longues, étroites. Pétales semblables aux sépales, mais légèrement ramifiés. Onglet du labelle conné avec la colonne, formant un court éperon à la base. Colonne courte, dressée, à larges ailes au sommet.

C. mexicana Rchb. f.

Bletia R. et P.

Plantes terrestres, dressées. Feuilles surgissant du sommet d'un corme, peu nombreuses, longues, resserrées en forme d'un pétiole engainant. Hampe surgissant du côté du corme, aphyllé avec des bractées engainantes. Fleurs assez grandes, nombreuses, disposées en raceme terminal, généralement ramifié. Pétales semblables aux sépales, légèrement plus larges. Labelle attaché à la base de la colonne, lobes latéraux convergeant au-dessus de la colonne. Colonne longue, semi-cylindrique, à 2 ailes incurvées à la base, apode.

B. patula W. Hook.

B. purpurea (Lam.) P. D. C.

Eulophia R. Br.

Plantes terrestres. Rhizome épaissi en pseudo-bulbes tubériformes, avec très peu de feuilles longues, plissées. Hampe dressée surgissant du rhizome, haute et élevée, aphyllé, avec plusieurs gaines. Raceme simple. Fleurs de grandeur moyenne. Pétales semblables au sépale médian. Labelle trilobé attaché au sommet du pied de la colonne. Colonne semi-cylindrique à angles aigus. Les lobes latéraux du labelle embrassent cette colonne.

E. alata (L.) Fawc. et Rendle.

Cyrtopodium R. Br.

Plantes terrestres. Tiges courtes, rhizomateuses avec peu de feuilles plissées, formant des pseudo-bulbes. Fleurs de grandeur moyenne, disposées en racemes sur des hampes aphyllées. Pétales quelque peu semblables aux sépales. Labelle trilobé adné au pied de la colonne. Colonne dressée, légèrement élargie, à angles aigus.

C. punctatum (L.) Lindl. «Canyuèle.»

Govenia Lindl.

Plantes terrestres. Rhizomes parfois épaissis en pseudo-bulbes tubériformes. Tiges dressées avec un petit nombre de grandes feuilles plissées et quelques

gaines basilaires dont une est souvent renflée et utriculaire. Fleurs de grandeur moyenne disposées en racemes terminaux. Pétales quelque peu semblables aux sépales. Labelle entier attaché au pied de la colonne, articulé, penché à la base. Colonne incurvée, largement semi-cylindrique, ailée avec un pied court.

G. utriculata (Sw.) Lindl.

Lycaste Lindl.

Plantes épiphytes. Tige courte, avec un petit nombre de feuilles grandes et plissées, s'épaississant en forme de pseudo-bulbes charnus. Fleurs grandes, généralement solitaires sur une hampe dressée. Pétales semblables aux sépales, mais plus petits. Labelle trilobé, attaché au pied de la colonne. Colonne plutôt longue, courbée, semi-cylindrique, avec un pied.

L. barringtoniae (Smith) Lindl.

Xylobium Lindl.

Plantes épiphytes. Tige courte s'épaississant en forme de pseudo-bulbes. Une ou deux feuilles à grands plis. Fleurs de grandeur moyenne, disposées en racemes sur des hampes simples, dressées. Bractées linéaires, généralement assez longues. Pétales semblables au sépale médian, mais plus petits. Labelle quelque peu articulé avec le pied de la colonne, sessile, penché vers la base, les lobes latéraux embrassant la colonne. Colonne dressée, semi-cylindrique, antérieurement concave ou avec 2 ailes étroites, avec un pied.

X. palmifolium (Sw.) Benth.

Maxillaria R. et P.

Plantes épiphytes. Tiges courtes avec rhizomes, s'épaississant en forme de pseudo-bulbes charnus. Feuilles généralement une ou 2, coriaces ou quelque peu charnues, parfois insérées sur deux rangs. Fleurs moyennes — grandes, solitaires sur les hampes. Pétales semblables aux sépales ou plus petits. Labelle trilobé, dressé surgissant du pied de la colonne, avec un très court onglet renflé. Colonne sur un pied court, souvent légèrement incurvé, épais, semi-cylindrique, antérieurement concave.

M. rufescens Lindl.

M. rufescens. Var. *minor* Fawc. et Rendle.

Ornithidium Salisb.

Plantes épiphytes. Tiges feuillées, recouvertes de gaines insérées sur 2 rangs et émettant des pseudo-bulbes latéraux à 1 ou 2 feuilles. Feuilles légèrement coriaces. Pédoncules avec de petites fleurs solitaires, agrégées dans les axes. Pétales semblables aux sépales, mais plus petits. Labelle trilobé, continu avec la colonne ou courtement conné. Colonne courte, épaisse, apode ou pourvue d'un pied très court.

O. coccineum (Jacq.) Salisb.

O. croceorubens Rchb. f.

O. vestitum (Sw.) Rchb. f.

O. confertum. Griseb.

Ionopsis H. B. K.

Plantes épiphytes. Tiges feuillées, très courtes, dépourvues de pseudo-bulbes. Feuilles peu-nombreuses, étroites, coriaces, insérées sur deux rangs. Fleurs de grandeur moyenne disposées en épis grêles peu compacts. Pétales semblables au sépale médian, mais plus larges. Labelle attaché à la base de la colonne.

ne, grand déployé, onguiculé. Colonne courte, épaisse, dressée, antérieurement concave — apode.

I. utricularioides (Sw) Lindl.

I. satyrioides (Sw) Rchb. f.

Trichopilia Lindl.

Plantes épiphytes. Pseudo-bulbes avec une feuille. Feuille charnue, dressée, repliée sur elle-même à la base. Hampe courte, aphyllé. Pétales quelque peu semblables aux sépales. Labelle adné à la base de la colonne. Clinandrium encapuchonné, grand, membraneux.

T. fragrans (Lindl.) Rchb. f.

Brassia R. Br.

Plantes épiphytes. Tige courte terminée par un pseudo-bulbe avec une ou deux feuilles. Feuilles situées sous le pseudo-bulbe, coriaces, en petit nombre ou réduites à des gaines. Fleurs peu nombreuses, plutôt grandes, disposées en racemes peu compacts. Bractées courtes ou en forme de spathe. Pétales semblables au sépale médian ou plus petits. Labelle sessile, composé de 2 lamelles placées à la base de la colonne courte et dressée.

B. caudata (L) Lindl.

Oncidium Sw.

Plantes épiphytes. Tiges feuillées, généralement courtes ou très courtes, avec ou sans pseudo-bulbes. Feuilles pourvues de 3 bordures ou plates. Racemes peu compacts, disposés en pédoncules allongés ou ramifiés. Pétales semblables au sépale médian ou plus grands. Labelle attaché à la base de la colonne, continu; disque au sommet de l'onglet remarquablement huppé ou tuberculeux. Colonne courte, épaisse, pourvue d'ailes pétaloïdes, apode.

O. alatum Cogn.

O. papilio Lindl.

O. henekenii Schomb.

O. pulchellum W. Hook.

O. tuerckheimii Cogn.

O. intermedium Bertero, «Angelito», à St-Domingue.

O. guibertianum A. Rich.

O. guttatum (L) Rchb. f. «Angelita», à St-Domingue.

O. variegatum Sw.

O. velutinum Lindl. «Angelito», à St-Domingue.

O. leiboldi Rchb. f.

O. calochilum Cogn.

Leochilus Knowl. et Weste.

Plantes épiphytes, petites. Tige très courte terminée par un pseudo-bulbe unifolié, recouverte de gaines membraneuses scarieuses, ou avec un petit nombre de feuilles placées sous le pseudo-bulbe. Fleurs petites, tendres, disposées en racemes peu compacts, sur des hampes simples, rarement ramifiées. Pétales semblables aux sépales ou légèrement plus larges. Labelle attaché à la base de la colonne, continu; le disque charnu ou calleux. Colonne courte, dressée, pourvue de 2 auricules.

L. labiatus (Sw) O. Ktze.

Warszewiczella Rchb. F.

Plantes épiphytes; tiges à feuilles courtes. Pas de pseudo-bulbes. Feuilles membraneuses, nombreuses. Fleurs brillantes, solitaires sur des hampes aphyll-

les. Pétales semblables aux sépales. Labelle trilobé, sessile ou attaché au moyen d'un court onglet au sommet du pied de la colonne. Colonne incurvée, charnue, semi-cylindrique, élargie au sommet et produisant à la base un court pied.

W. flabelliformis (Sw) Cogn.

Dichaea Lindl.

Plantes épiphytes. Tiges feuillées, allongées, souvent pendantes, recouvertes de gaines foliacées et de feuilles. Feuilles courtes, membraneuses, insérées sur 2 rangs. Fleurs solitaires, pourvues de 2 ou 3 grandes bractées sur des pédicelles axillaires. Pétales semblables aux sépales, mais plus petits. Labelle charnu, fixé à la base de la colonne, pourvu d'un court onglet. Colonne dressée, semi-cylindrique, très vigoureuse, pourvue d'un pied très court. Toutes les espèces sont épiphytes sur des arbres dans les montagnes. (Comprend *Dichæopsis* Pfitz.)

D. echinocarpa (Sw) Lindl.

D. muricata (Sw) Lindl.

D. trichocarpa (Sw) Lindl.

D. graminoides (Sw) Lindl. [*Dichæopsis graminoides* (Sw) Schlechter].

D. glauca (Sw) Lindl. [*Dichæopsis glauca* (Sw) Schlechter].

D. morrisii Fawc. et Rendle. [*Dichæopsis morrisii* (Fawc. et Rendle) Schlechter] (Comb. nov.).

Dendrophylax Rchb. F.

Plantes épiphytes, aphyllés. Racines agrégées d'une façon très dense. Tige très courte. Pseudo-bulbes absents. Fleurs petites — très grandes, solitaires, ou peu nombreuses, disposées en raceme, sur des hampes minces, simples, pourvues de bractéoles. Pétales quelque peu semblables aux sépales. Labelle sessile, pourvu d'un long éperon à la base de la colonne avec laquelle il est continu. Colonne très courte, large, apode.

D. varius (Gmel.) Urb.

Polyrrhiza Pfitz.

Plantes épiphytes, aphyllés. Pseudo-bulbes absents. Racines densément fasciculées. Fleurs de grandeur moyenne — larges, solitaires ou peu nombreuses, disposées en raceme sur des hampes grêles, ténues. Pétales semblables aux sépales. Labelle sessile, continu avec la colonne. Colonne courte, apode, élargie au sommet.

P. sallei (Rchb. f.) Cogn.

Campylocentrum Benth.

Plantes épiphytes, à tiges feuillées ou acaules et aphyllés, pourvues de racines agrégées. Feuilles oblongues insérées sur 2 rangs. Fleurs très petites, insérées sur 2 rangs et réunies en épis. Bractées petites, persistantes. Pétales aussi longs que les sépales, mais plus étroits. Labelle sessile à la base de la colonne où il produit un éperon plus ou moins clavé. Colonne très courte, apode.

C. micranthum (Lindl.) Rolfe.

C. filiforme (Sw) Rolfe.

C. monteverti (Rchb. f.) Rolfe.

Classe BB. DICOTYLEDONEÆ

Tiges formées d'écorce de bois et de moelle, le bois formant une zone entre l'écorce et la moelle. Feuilles généralement à nervation réticulée. Embryon

avec une paire de cotylédons opposés. Parties florales le plus souvent au nombre de 4 ou de 5 ou d'un multiple de 4 ou de 5.

- x. Segments du périanthe absents ou tous pareils (particulièrement en texture et en couleur) rarement inégaux, au nombre de 5 ou moins. Série C. *Apetalæ*, p. 76
- x. Segments du périanthe en 2 séries. Calice et corolle rarement pareils. Segments au nombre de plus de 5 :
- 2x. Pétales distincts les uns des autres. Série CC. *Polypetalæ*, p. 77
- 2x. Pétales soudés entre eux sur une plus ou moins grande étendue. Série CCC. *Gamopetalæ*, p. 79

Série C. APETALÆ OU MONOCHLAMYDEÆ

Corolle absente ou non différenciée du calice (exception faite de quelques *Euphorbiacæ* et un genre de *Phytolocacæ*) et parfois aussi le calice absent; périanthe simple, les lobes ou segments semblables entre eux et généralement en forme de calice, parfois excessivement petit ou absent (Voir aussi *Ranunculacæ* — *Flacourtiacæ* — *Menispermaceæ* — *Rosacæ* — *Lythraceæ* — *Onagraceæ* — *Rutacæ* — *Rhamnaceæ* — *Cornaceæ* — et *Caryophyllaceæ*, avec corolle parfois absente).

- x. Fleurs unisexuées :
- 2x. Graines — chacune avec une touffe de poils soyeux. Fleurs disposées en chatons; ovules nombreux. Ordre XV. *Salicales*, p. 84
- 2x. Graines et fleurs autres que ci-dessus :
- 3x. Ovaire uniloculaire :
- 4x. Ovule solitaire; étamines 2 — beaucoup. Fruit ne ressemblant pas à un cône :
- 5x. Périanthe mâle libre de la bractée. Étamines aussi nombreuses que les lobes du périanthe et opposées à ces lobes ou moindres par avortement; rarement nombreuses. Ordre XIX. *Urticales*, p. 86
- 5x. Périanthe mâle absent, parfois développé avec la bractée dans la famille *Juglandaceæ*. Étamines très nombreuses, souvent 2 dans les *Myricaceæ* :
- 6x. Feuilles pennées. Inflorescence mâle en chatons. Ordre XVII. *Juglandales*, p. 85
- 6x. Feuilles simples. Inflorescence mâle en épis, presque amentiforme. Ordre XVI. *Myricales*, p. 85
- 4x. Ovules 2; étamine 1. Fruit en forme de cône : Ordre XIII. *Casuarinales*, p. 80
- 3x. Ovaire bi-triloculaire :
- 4x. Endosperme généralement abondant :
- 5x. Disque hypogyne présent. Micro-pyle dirigé extérieurement. Sève souvent laiteuse. Ordre XXVII. *Geraniales*, (Fam. *Euphorbiaceæ*) p. 160
- 5x. Disque hypogyne absent. Micro-pyle dirigé vers l'axe. Sève non laiteuse. Ordre XXVIII. *Sapindales*, (Fam. *Buxaceæ*) p. 195

- 4x. Endosperme absent. Fruit, une noix ou un akène. Ordre XVIII. *Fagales*, p. 86
- x. Fleurs parfaites, rarement unisexuées ou polygames :
- 2x. Périanthe absent (au moins dans les fleurs staminées ou parfaites). Embryon très petit. Ordre XIV. *Piperales*, p. 80
- 2x. Périanthe en forme de calice présent (au moins dans les fleurs staminées ou parfaites) :
- 3x. Ovaire syncarpé avec 4-6 loges et placentation centrale ou uniloculaire avec placentation pariétale. Ovules nombreux dans chaque loge. Fruit, une capsule. Ordre XXI. *Aristolochiales*, p. 97
- 3x. Ovaire monocarpé, uniloculaire ou rarement syncarpé avec 2-4 loges. Ovules solitaires ou peu nombreux. Fruit non capsulaire :
- 4x. Plantes parasites (Voir *Olacaceæ*). Ordre XX. *Santalales*, p. 94
- 4x. Plantes non parasites :
- 5x. Fruit drupacé. Arbres ou arbustes :
- 6x. Anthères s'ouvrant par des valves élevées. Tube du périanthe court. Ordre XXIV. *Ranunculales*, p. 114 (Fam. *Lauraceæ*)
- 6x. Anthères normales. Tube du périanthe long. Ordre XXXIII. *Myrtales*, p. 247 (Fam. *Thymelacaceæ*)
- 5x. Fruit non drupacé. Plantes le plus souvent herbacées :
- 6x. Stipules absentes. Ovules non orthotropes. Embryon courbé ou enroulé. Ordre XXIII. *Chenopodiales*, p. 100
- 6x. Stipules présentes. Ovules orthotropes. Embryon dressé. Ordre XXII. *Polygonales*, p. 98

Série CC. POLYPETALÆ

Calice et corolle présents. Corolle formée de pétales distincts (Voir exception mentionnée dans la Série CCC *Gamopetalæ*).

- x. Ovaire généralement supère ou enfoui dans le disque :
- 2x. Calice le plus souvent inséré sous l'ovaire. Pétales souvent en 2 ou plusieurs séries (rarement en 1 série). Étamines insérées sur un réceptacle non développé en disque glandulaire. DDD. Sous-Série *Thalamifloræ*, p. 78
- 2x. Calice généralement inséré sous l'ovaire. Pétales en 1 série. Étamines insérées dans, sur ou autour d'un réceptacle développé en disque à l'intérieur du calice. DD. Sous-Série *Discifloræ*, p. 78
- x. Ovaire généralement infère. Pétales en 1 série. Étamines insérées avec les pétales et les

sépales sur le bord d'un hypanthium ou sur un disque qui limite l'hypanthium. Ovaire souvent adné à ce réceptacle

D. Sous-Série Calycifloræ, p. 78

Sous-Série D. CALYCIFLORÆ

- x. Ovaire infère ou semi-infère ou enfermé dans un hypanthium ou dans un réceptacle, creux ou environné par le disque:
- 2x. Plantes généralement succulentes, armées d'épines. Feuilles le plus souvent absentes ou squameuses. Ordre XXXII. Opuntiales, p. 242
- 2x. Plantes autrement constituées:
- 3x. Ovule solitaire et pendant dans les loges. Ordre XXXIV. Umbellales, p. 271
- 3x. Ovules généralement 2 ou plus dans chaque loge:
- 4x. Style entier (non divisé). Ordre XXXIII. Myrtales, p. 247
- 4x. Styles unis ou distincts de la base (Familles Passifloraceæ, Loasaceæ, Caricaceæ, Bignoniaceæ). Ordre XXXI. Violales, p. 227
- x. Ovaire généralement supère ou presque supère. Carpelles solitaires ou libres ou unis seulement à la base, parfois au sommet et dans ce cas rarement infères. Styles distincts, rarement unis en colonne et se séparant facilement (styles connés dans quelques Brunelliaceæ—Voir aussi Tropaeolaceæ et Capraridaceæ). Ordre XXVI. Rosales, p. 129

Sous-Série DD. DISCIFLORÆ

- x. Ovules dressés généralement 2 dans chaque loge de l'ovaire. Raphé dorsal, latéral et ventral. Disque renflé ou adné au calice ou couvrant la base. Ovaire généralement entier. Ordre XXIX. Rhamnales, p. 208
- x. Ovules généralement 1-2, épitropes ou pendants ou ascendants, rarement nombreux et horizontaux (Voir Ochnaceæ, Ordre des Violales):
- 2x. Ovule épitrope avec raphé ventral et micropyle dirigé vers le haut ou lorsqu'il y en a plus d'un, un seul ovule parfois avec raphé dorsal et micropyle dirigé vers le bas. Ordre XXVII. Geraniales, p. 160
- 2x. Ovules pendants avec raphé dorsal et micropyle dirigé vers le haut ou dressé avec raphé ventral et micropyle dirigé vers le bas (Voir Olacaceæ). Ordre XXVIII. Sapindales, p. 195

Sous-Série DDD. THALAMIFLORÆ

- x. Carpelles 1 ou plus, généralement libres, rarement unis. Etamines indéfinies ou si définies le périanthe en 3—beaucoup de séries. Ordre XXIV. Ranunculales, p. 114
- x. Carpelles entièrement unis ou plus ou moins unis:
- 2x. Ovaire uniloculaire ou pluriloculaire par suite de fausses cloisons. Placentation pariétale ou centrale:
- 3x. Placentation pariétale:
- 4x. Embryon très petit ou courbé. Ordre XXV. Papaverales, p. 122
- 4x. Embryon plutôt grand, non courbé. Ordre XXXI. Violales, p. 227 (Fam. Cistaceæ, Violaceæ, Bixaceæ, Flacourtiaceæ)

- 3x. Placentation centrale, rarement pariétale. Embryon courbé ou enroulé

Ordre XXIII. Chenopodiales, p. 100 (Fam. Portulacaceæ, Basellaceæ, Caryophyllaceæ)

- 2x. Ovaire régulièrement cloisonné. Placentation axile:

3x. Sépale imbriqués. Ordre XXXI. Violales, p. 227

(Fam. Guttiferæ, Ternstroemiaceæ)

3x. Sépales valvés. Ordre XXX. Malvales, p. 213

Série CCC. GAMOPETALAE.

Calice et corolle les 2 présents. Pétales généralement plus ou moins unis. Stipules présentes dans les Rubiaceæ et les Loganiaceæ, rarement dans les Caprifoliaceæ. Corolle polypétale dans quelques Ericaceæ, Styracaceæ et Oleaceæ. Corolle gamopétale dans quelques Leguminosæ, Polygalaceæ, Oxalidaceæ, appartenant aux polypétalæ.

- x. Ovaire infère (voir Ericaceæ). Etamines aussi nombreuses que les lobes de la corolle, rarement moindres. Sous-Série DDD. Inferæ, p. 80
- x. Ovaire généralement supère:
- 2x. Carpelles généralement 2 (rarement 1 ou 3). Etamines alternes avec les lobes de la corolle, aussi nombreuses ou moindres que les lobes. Sous-Série DD. Bicarpellatæ, p. 79
- 2x. Carpelles plus que 2. Etamines libres de la corolle ou opposées aux lobes, ou 2 fois plus nombreuses, ou indéfinies, ou si elles sont portées sur la corolle alternant avec les lobes et égales en nombre. Sous-Série D. Heteromeræ, p. 79

Sous-Série D. HETEROMERÆ

- x. Ovaire de 2—beaucoup de loges:
- 2x. Ovules nombreux. Ordre XXXV. Ericales, p. 276
- 2x. Ovules généralement peu nombreux. Ordre XXXVIII. Ebenales, p. 283
- x. Ovaire uniloculaire:
- 2x. Ovaire avec 1 ovule. Ordre XXXVII. Plumbaginales, p. 282
- 2x. Ovaire de 2—beaucoup d'ovules. Ordre XXXVI. Primulales, p. 279

Sous-Série DD BICARPELLATÆ

- x. Corolle membraneuse, sans nervures. Fruit, une pyxide. Graines peltées. Ordre XLI. Plantaginales, p. 350
- x. Corolle non membraneuse, veinée. Fruits variés, non une pyxide:
- 2x. Corolle régulière:
- 3x. Feuilles généralement opposées. Ordre XXXIX. Gentianales, p. 288
- 3x. Feuilles généralement alternes. Etamines aussi nombreuses que les lobes de la corolle. Ordre XL. Polemoniales, p. 303 (Fam. Polemoniaceæ, Hydrophyllaceæ, Boraginaceæ, Convolvulaceæ, Solanaceæ)
- 2x. Corolle généralement irrégulière ou oblique. Etamine postérieure diffère des autres. Ordre XL. Polemoniales, p. 303 (Autres familles de l'Ordre)

Sous-Série DD. INFERÆ

- x. Plantes herbacées, avec vrilles. Fruit peponide. Ordre XLIII. Cucurbitales, p. 370
- x. Plantes herbacées et ligneuses, sans vrilles. Fruit, non un peponide:
- 2x. Feuilles généralement opposées ou verticillées. Plantes plus souvent épineuses. Ordre XLII. Rubiales, p. 351
- 2x. Feuilles principalement alternes. Plantes plus souvent herbacées. Ordre XLIV. Campanulales, p. 374

Ordre XIII. CASUARINALES

Cet ordre ne renferme qu'une famille avec un seul genre auquel appartiennent environ 25 espèces, toutes originaires de l'Asie tropicale ou de l'Australie. Grands arbres ressemblant aux pins, avec un tronc mesurant plus de 20 mètres de haut et un mètre de diamètre, des branches grêles, verticillées, déployées. Les branchettes très grêles et ressemblant au genre *Equisetum*, généralement articulées, striées, plus ou moins caduques, peuvent être prises pour des feuilles jonciformes; feuilles représentées par des verticilles, de toutes petites écailles, feuillage généralement absent. Plantes monoïques. Les fleurs staminées sont disposées en épis grêles, terminaux ou rarement latéraux; écailles du périanthe 1-2, étamine 1. Les fleurs pistillées sont axillaires produisant un fruit sec en forme de cône.

Famille 32. CASUARINACEÆ

Les caractères de l'ordre sont ceux de la famille.

Casuarina L.

Les caractères de la famille sont ceux du genre.

C. equisetifolia L. «Pin d'Australie», généralement cultivé comme arbre ornemental. On prétend que le bois est dur, solide, compact et que l'écorce est très recherchée dans la tannerie et la teinturerie, mais apparemment on n'en fait aucun usage en Haïti.

Ordre XIV. PIPERALES

Herbes des endroits humides, ou arbres, ou arbustes. Feuilles à limbe simple. Fleurs parfaites ou unisexuées; périanthe absent; androcée composé de plusieurs étamines; gynécée de 3 ou 4 carpelles distincts ou presque distincts.

- x. Feuilles alternes ou verticillées, rarement opposées, généralement dépourvues de stipules 33. Piperaceæ, p. 80
- x. Feuilles opposées, stipules unies en forme de gaine, enveloppant la tige. 34. Chloranthaceæ, p. 84

Famille 33. PIPERACEÆ

Herbes, arbustes ou rarement arbres. Plantes souvent articulées aux nœuds. Feuilles généralement entières, le plus souvent alternes, mais rarement opposées ou verticillées, fréquemment pellucides ou parsemées de points creux. Fleurs parfaites ou unisexuées, très petites, disposées en épis compacts ou rarement en racemes; étamines 2-6, rarement plus; ovaire uniloculaire, uniovulé; stigmates 1 ou 3-4. Fruit, une petite baie.

- x. Stigmates plusieurs (généralement 3):
- 2x. Plantes herbacées; petites et rampantes ... Verhuelia, p. 82
- 2x. Plantes ligneuses ou sous-arbrisseaux:
- 3x. Epis simples opposés aux feuilles Piper, p. 81
- 3x. Epis généralement nombreux sur des pédoncules axillaires:
- 4x. Epis ombellés sur les pédoncules Pothomorphe, p. 82

- 4x. Epis distincts sur les pédoncules.... Manekia, p. 82
- x. Stigmate 1. Plantes herbacées:
- 2x. Bractées en forme de coupe autour de la fleur..... Piperanthera, p. 82
- 2x. Bractées arrondies, peltées..... Peperomia, p. 82

Piper L.

Arbustes ou arbrisseaux; feuilles alternes, entières, généralement dépourvues de stipules. Fleurs parfaites ou unisexuées, petites, verdâtres, sessiles, disposées en épis cylindriques très compacts ou rarement en forme de grappes. Fruit: une petite baie.

Le genre abonde en principes aromatiques. Le «poivre noir» du commerce provient d'une espèce des Indes Orientales, *Piper nigrum*.

- P. amalago* L. «Sureau plantain» (Haïti).
- P. marginatum* Jacq. Var. *firmum* C. DC.
- P. pseudoconfusum* C. DC.
- P. swartzianum* (Miq.) C. DC.
- P. tuberculatum* Jacq. «Guayuyo» (St-Domingue) d'après Urban.
- P. aduncum* L. «Sureau» (Haïti), «Guayuyo blanco» (St-Domingue).
- P. scabrum* Lam.
- P. fuertesii* C. DC.
- P. constanzanum* (C. DC.) Urb.
- P. cuspidatum* Desv.
- P. macrophyllum* H. B. K.
- P. oviedoii* Urb.
- P. samanense* Urb.
- P. picardæ* C. DC.
- P. peltatum* L. «Collet de Notre-Dame»
- P. jacquemontianum* (Kunth) C. DC.
- P. fontium* Trel.
- P. densibaccum* Trel.
- P. perpallidum* Ekm. Urb. et Trel.
- P. medium* Jacq. «Noyau pays», «Feuilles sirop»
- P. medium* Jacq. Var. *Leonardi* W. Trel.
- P. rugosum* Lam.
- P. cabaianum* Trel.
- P. thebaudianum* Trel.
- P. sulcinerve* Urb.
- P. torbecanum* Trel.
- P. camptostachys* Urb.
- P. parryanum* Trel.
- P. hispidum* Sw.
- P. eocenicum* Trel.
- P. depressibaccum* Trel.
- P. linguæfolium* Ham. Var. *brevifolium* Trel.
- P. trigonocarpum* Trel.
- P. acamptostachys* Trel.
- P. chrysolepidum* Trel.
- P. buchii* Urb.
- P. vanderveldeanum* Trel.
- P. atropremnon* Trel.
- P. hispaniolæ* Trel.
- P. santo-domingense* Trel.

Pothomorphe Miq.

Plantes ligneuses. Feuilles grandes, souvent scutiformes. Fleurs parfaites, avec 2-3 étamines. Epis longs, nombreux, ombellés, sur des pédoncules axillaires. Ovaire avec 3 stigmates. Fruit obové, triangulaire.

P. peltata (L.) Miq.

P. umbellata (L.) Miq. «Feuille à cœur.»

Manekia Trel.

Arbrisseaux grimpants et rampants, glabres. Feuilles alternes, à nervation palmée; pétiole non ailé. Epis 1-3 sur des pédoncules axillaires filiformes, chaque épi revêtu d'une bractée caduque en forme de spathe. Fleurs parfaites, sous-tendues par une bractéole arrondie-peltée. Etamines 2; ovaire apparemment uniloculaire; stigmate 1, apical.

M. urbani Trel.

Piperanthera C. DC.

Herbes glabres, feuilles alternes, rarement opposées. Etamines 2; style très court; stigmate 1; ovaire environné de bractées, sessiles en forme de coupe. Fruit: une baie ovale, tri-ailée.

P. cupularis (Urb.) C. DC.

Verhuellia Miq.

Herbes tendres, parfois rampantes. Feuilles généralement verticillées. Ovaire sessile avec 3-4 stigmates. Fruit: une petite baie ronde. Genre plutôt rare, connu seulement d'Haïti et de Cuba.

V. reniformis (Willd.) C. DC.

Peperomia R. et P.

Herbes généralement épiphytes. Feuilles alternes, opposées ou verticillées, souvent colorées et pellucides, ou parsemées de points creux. Fleurs très petites, disposées en épis compacts, mais très petits et grêles. Etamines 2; stigmate 1, capitulé ou touffu. Fruit: une petite baie, à enveloppe mince.

P. tenella (Sw.) A. Dietr. Var. *deltoïdes* Trel.

P. emarginella (Sw.) C. DC.

P. eggersii C. DC.

P. portoricensis Urb.

P. rotundifolia (L.) H. B. K. Var. *pilosior* (Miq.) C. DC.

P. fuertesii C. DC.

P. montium C. DC.

P. glabella (Sw.) A. Dietr. Var. *jimenesana* C. DC. et *brachyphylla* C. DC.

P. nizaitoensis C. DC.

P. densibacca C. DC.

P. alata R. et P.

P. acuminata (L.) Dahlst.

P. quadrivii Trel.

P. pellucida (L.) H. B. K.

P. maculosa (L.) W. Hook.

P. hernandifolia (Vahl.) A. Dietr.

P. exilis (Miq.) Griseb.

P. urocarpa Fisch. et May.

P. buchii C. DC.

P. buchii C. DC. Var. *macrostachya* Trel.

P. serpens (Sw.) Loud.

P. cubensis C. DC. Var. *haïtiensis* Trel.

P. obtusifolia (L.) A. Dietr.

P. alpina (Sw.) A. Dietr.

P. quadrifolia (L.) H. B. K.

P. galioïdes H. B. K.

P. verticillata (L.) A. Dietr.

P. reflexa (L.f.) A. Dietr.

P. circinnata Link.

P. barahonana C. DC.

P. constanzana C. DC.

P. foraminum C. DC.

P. mornicola C. DC.

P. humilis (Vahl.) A. Dietr.

P. lentibacca C. DC.

P. perinduta C. DC.

P. perinduta C. DC. Var. *Nashii* Trel.

P. myrtillus Miq.

P. dominicana C. DC. Var. *roberjotana* Trel.

P. polystachya (Ait.) W. Hook.

P. polystachya (Ait.) W. Hook. Var. *godetiana* Trel.

P. septemnervis R. et P.

P. cupularis Urb.

P. leonardii Trel.

P. subbasellæfolia Trel.

P. crispipila Trel.

P. unguiculata Trel.

P. brachypoda Urb.

P. basellæfolia H. B. K.

P. quadrifida (L.) H. B. K.

P. ephemera Ekm.

P. tortugana Trel.

P. perherbacea Trel.

P. alveolata Trel.

P. cabaiana Trel.

P. blepharilepida Trel.

P. pterocaulis Miq.

P. propugnaculi Trel.

P. ramosa Trel.

P. crassispica Trel.

P. productamenta Trel.

P. brouetiana Trel.

P. hispidula (Sw.) Dietr.

P. hemionitidifolia Ham.

P. tithymaloïdes (Vahl.) Dietr.

P. parvulifolia Trel.

P. capitis-bovis Trel.

P. ionophylla Griseb.

P. distachya (L.) Dietr.

P. perodiniana Trel.

P. truncata Trel.

P. maleuvreana Trel.

- P. macorisiana* Trel.
P. olafiana Trel.
P. taylorii C. DC.
P. desfontainesi Trel.
P. infravillosa Trel.
P. hirsutifolia Trel.
P. gloriosæfolia Trel.

Famille 34. CHLORANTHACEÆ

Arbustes ou arbres aromatiques, rarement herbes. Feuilles opposées, serrées, penninerves, stipules connés en forme de gaine et enveloppant la tige. Fleurs généralement unisexuées, parfois parfaites, non couvertes de bractées. Fleurs mâles épiées, périanthe absent. Fleurs femelles paniculées, périanthe supère, peu voyant; ovaire uniloculaire. Fruit: une drupe petite, à exocarpe charnu.

Hedyosmum Sw.

Les caractères du genre sont ceux de la famille.

- H. nutans* Sw. Dans les montagnes.
H. domingense Urb. Dans la Selle.

Ordre XV. SALICALES

Arbustes ou arbres à bois mou et à écorce amère. Feuilles alternes, simples, entières ou dentées. Fleurs dioïques, disposées en chatons, solitaires dans l'axe de chaque bractée; périanthe absent; étamines 2 ou plus; ovaire uniloculaire avec 2-4 placentas pariétaux. Fruit: une capsule s'ouvrant par 2-4 valves. Graines nombreuses sans albumen, couvertes de longs poils blancs, soyeux.

Famille 35. SALICACEÆ

Les caractères de la famille sont ceux de l'ordre.

- x. Bractées incisées. Disque en forme de coupe.
 Étamines généralement 10 ou rarement 7-8.
 Stigmates allongés ou étendus..... *Populus*, p. 84
 x. Bractées entières. Disque réduit à une ou plusieurs glandes axillaires. Étamines moins de 10. Stigmates courts, non étendus..... *Salix*, p. 84

Populus L.

Grands arbres avec écorce ridée et de forts rameaux terminés par des bourgeons écaillés souvent résineux. Feuilles à nervation palmée, munies de grosses dents ou lobées; pétiole relativement long, quelquefois aplati sur les côtés et sous-tendu par des stipules membraneuses et caduques. Fleurs en chatons latéraux adaptées à la pollinisation anémophile; bractées membraneuses, lobées ou fimbriées au sommet, généralement caduques; disque en forme de coupe, souvent oblique, entier, denté ou irrégulièrement lobé, adné au pédicelle de la fleur. Étamines adnées au disque, filets distincts, glabres, anthères pourpres ou rouges; ovaire sessile dans le disque, glabre ou rarement villos; style court; stigmates dilatés; ovules anatropes. Capsules s'ouvrant par 2-4 valves recourbées.

P. italica Du Roi. Cultivé à Port-au-Prince.

Salix L.

Arbres et arbustes avec écorce de couleur sombre plus ou moins lamelleuse. Rameaux grêles et flexibles; bourgeons munis chacun d'une écaille. Feuilles alternes à nervation pennée, généralement finement dentées, pétiolées ou pres-

que sessiles, stipules foliacées ou obsoletes. Fleurs en chatons, à pollinisation entomophile, chatons généralement dioïques; bractées entières, plus ou moins en forme d'agrafe à la base avec 1-plusieurs glandes à la base de la fleur. Étamines généralement 2 (1-7); anthères jaunes ou rougeâtres; ovaire plus ou moins stipité; stigmates souvent divisés et filiformes; ovules anatropes. Capsules s'ouvrant au sommet par 2 valves.

S. babylonica L. Cultivé à Jacmel.

Ordre XVI. MYRICALES

Arbres ou arbustes généralement aromatiques. Feuilles alternes, stipules absentes. Fleurs unisexuées, sessiles sous des bractées squameuses, disposées en épis courts et cylindriques. Périanthe absent, cependant les fleurs mâles possèdent 2-4 bractéoles à l'intérieur de la bractée; étamines 2-8; ovaire uniloculaire et uniovulé; gynécée de 2 carpelles soudés. Fruit: une petite drupe couverte de cire blanchâtre.

Famille 36. MYRICACEÆ

Les caractères de la famille sont ceux de l'ordre.

Myrica L.

Les caractères du genre sont ceux de la famille.

- M. cerifera* L. «Palo de cera» (St-Domingue), d'après Urban, Massif du Nord.
M. reticulata Krug. et Urb.
M. microcarpa Benth. Perodin.
M. picardæ Krug. et Urb. Massif de la Selle.
M. apiculata Urb. et Ekm.

Ordre XVII. JUGLANDALES

Arbres aromatiques. Feuilles alternes, composées-pennées. Fleurs monoïques, petites, verdâtres, disposés en longs chatons pendants; périanthe de 2-6 lobes. Fruit: une noix très dure, enfermée dans une coque épaisse, sèche. L'embryon contient dans ses cotylédons une abondante réserve oléagineuse. Certaines espèces fournissent un bois précieux, tandis que d'autres sont cultivées pour leurs noix comestibles.

Famille 37. JUGLANDACEÆ

Les caractères de la famille sont ceux de l'ordre.

- x. Coque du fruit indéhiscente; chatons staminés solitaires..... *Juglans*, p. 85
 x. Coque du fruit valvée; chatons staminés en groupes de 3..... *Carya*, p. 85

Juglans L.

Grands arbres. Les fleurs staminées sont groupées en chatons solitaires avec un calice de 3-6 lobes; étamines 8-40 en deux séries. Fleurs pistillées peu nombreuses, disposées en épis avec un calice à quatre lobes et à 4 sépales adnés à l'ovaire.

J. jamaicensis C. DC. Massif de la Selle, appelé «Nogal» ou «Nuez» à St-Domingue, d'après Urban.

Carya Nutt.

Fleurs staminées, groupées en chatons grêles, pendants, pourvus de 3 branches, avec un calice de 2-3 lobes et 3-10 étamines. Fleurs pistillées peu nombreuses, disposées en épis, apétales, avec ovaire enfermé dans un involucre de 4 lobes.

C. pecan Aschers et Graebn. [*Hicoria pecan* Britt. — *Hicoria* Raf.], récemment introduit, le pecana du commerce.

Ordre XVIII. FAGALES

Arbustes et arbres à bois dur. Feuilles alternes à limbes simples. Fleurs monoïques ou rarement dioïques, les fleurs staminées arrangées en chatons; les fleurs pistillées parfois entourées d'un involucre qui devient une coupe dans le fruit. Calice généralement présent; corolle absente. Fruit: une noix.

Famille 38. FAGACEÆ

Les caractères de la famille sont ceux de l'ordre.

- x. Fleurs staminées en petits capitules pendants.
Fruit: une noix avec 3 angles aigus *Fagus*, p. 86
- x. Fleurs staminées en chatons grêles. Fruit: une
noix arrondie ou plano-convexe *Castanea*, p. 86

Fagus L.

Plantes ornementales. Arbres avec écorce lisse d'un gris pâle. Feuilles dentées à nervures dressées. Fleurs apparaissant avec les feuilles. Fleurs staminées en capitules pendants avec pédoncules grêles d'un vert jaunâtre, sous-tendues par des bractées décidues squameuses; calice campanulé de 5-7 lobes; étamines 8-16. Fleurs pistillées généralement par paires dans un involucre axillaire pédonculé avec un calice de 6 lobes adné à un ovaire trilobulaire; styles 3. Noix de couleur brune, ovoïde, avec 3 angles aigus; 1 ou 2 dans un involucre armé d'épines qui s'ouvre par 4 valves.

F. silvatica L. Cultivé à Furcy.

Castanea Adans.

Arbres ou arbustes avec bois très poreux. Feuilles grossièrement serrées ou serrées-dentées avec des dents grêles et pointues. Chatons staminés, axillaires, allongés, de mauvaise odeur, plumeux; chaque bractée sous-tendant 3-7 fleurs accompagnées de 2 bractéoles; calice campanulé de 6 lobes; étamines 10-20 insérées sur un réceptacle peu voyant, anthères introrsées attachées dorsalement. Chatons pistillés axillaires au-dessus des chatons staminés, portant des involucre imbriqués sessiles ou presque sessiles, chacun renfermant de 2-3 fleurs; calice campanulé avec 6 lobes; staminodes présents; ovaire infère avec 6 loges imparfaites; styles 6; ovules 2 dans chaque loge. Fruit composé d'un involucre accrescent spinescent avec 2-4 valves, renfermant 1, 2 ou 3 noix. Noix avec péricarpe coriace-cartilagineux; cotylédons grands, charnus, plus ou moins ridés.

C. sativa Mill. «Catin» introduit par les français à l'époque coloniale. On trouve encore à Badeau de ces arbres géants, mesurant 2 ou 3 mètres de diamètre. Un grand nombre de jeunes pieds, trouvés dans le voisinage, indiquent qu'ils s'y développent à l'état sauvage.

Ordre XIX. URTICALES

Herbes, arbustes ou arbres. Feuilles alternes (souvent opposées dans les herbes), simples, entières ou dentées, rarement divisées. Fleurs variées, jamais disposées en chatons. Calice présent, corolle absente. Androcée formé généralement d'autant d'étamines qu'il y a de sépales. Gynécée formé d'un seul ou de 2 carpelles soudés.

- x. Fruit: un akène, les akènes parfois dans les
sépales accrescents et disposés en syncarpe:

- 2x. Fleurs non disposées sur un réceptacle; fruit
ne formant pas de syncarpe; sépales ni
épais, ni juteux, ni enveloppant les
grappes 41. *Urticaceæ*, p. 90
- 2x. Fleurs placées à l'extérieur ou à l'intérieur
d'un réceptacle; fruit formant des syn-
carpes; sépales accrescents, enveloppant les
grappes 40. *Moraceæ*, p. 88
- x. Fruit: une samare ou une drupe 39. *Ulmaceæ*, p. 87

Famille 39. ULMACEÆ

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, entières ou dentées, généralement rugueuses, trinerves à la base; stipules fugaces. Fleurs petites, verdâtres, parfaites ou unisexuées; périanthe calicinal. Fruit petit, unispermé.

- x. Fruit: une samare; fleurs sur l'ancienne crois-
sance *Phyllostylon*, p. 87
- x. Fruit: une drupe; fleurs sur la nouvelle crois-
sance:
2x. Cotylédons très larges:
3x. Etamines aussi nombreuses que les sépales. *Celtis*, p. 87
3x. Etamines deux fois aussi nombreuses que
les sépales ou plus *Ampelocera*, p. 87
2x. Cotylédons très étroits *Trema*, p. 87

Phyllostylon Capanema.

Arbres passablement grands, à feuilles alternes et sessiles.

P. brasiliense Capanema. «Bois blanc» commun dans toute l'île, à des élévations plutôt basses. Bois précieux pour la construction. «Baitoa» à St-Domingue, d'après Urban.

Celtis L.

Arbres grands ou petits, ou arbustes, parfois grimpants, pourvus d'épines ou inermes. Feuilles entières ou dentées, souvent inégales à la base, généralement caduques. Fleurs petites, les fleurs pistillées généralement solitaires et pourvues d'un long pédoncule. Fruit globulaire avec une chair mince et une grande graine.

C. trinervia Lam. «Anasillo» ou «Palo amargo» à St-Domingue, d'après Urban; «Bois feuilles blanches» ou «Bois raie» (Haïti) très commun.

C. punctata Urb et Ekm. (comb. nov.).

C. berteriana Urb. «Casser hache gris.»

C. iguanaea Sarg. «Liane crabe» très commun. «Gallito» à St-Domingue, d'après Urban.

Ampelocera Klotzsch.

Arbres plutôt petits, pourvus de peu de branches. Feuilles sessiles, penninerves. Corolle à 5 lobes, étamines 10-16.

A. cubensis Griseb. «Bois blanc grandes feuilles» Massif des Cahos.

Trema Lour.

Arbustes ou arbres petits à feuilles toujours vertes, sessiles. Fleurs polygames, les fleurs fertiles portent souvent des étamines. Fleurs mâles, périanthe de 5 pièces (rarement 4) avec un nombre pareil d'étamines. Fleurs femelles ou fertiles avec périanthe persistant. Fruit: petit, avec cotylédons étroits.

T. domingense Urb. «Anisillo» à St-Domingue, d'après Urban.

T. micranthum (L) Bl. «Memiso» à St-Domingue, d'après Urban. «Bois de soie» (Haïti).

T. molle (H. et B.) Bl.

T. lamarekianum (R. et Sch.) Bl. «Mahaut Piment» (Haïti. «Mahagua de Cuba» (Cuba.) «Memiso» (St-Domingue) d'après Urban.

Famille 40. MORACEÆ

Arbres ou arbustes, généralement à jus laiteux, rarement herbes. Feuilles entières, dentées ou à lobes palmés, stipules caduques. Fleurs unisexuées. Péricarpe simple, calicinal ou absent. Fruit indéhiscent, unispérme, libre ou combiné de diverses manières en un pseudocarpe dont le réceptacle peut former une partie.

Famille d'une importance économique considérable. On utilise les plantes de cette famille pour l'alimentation, pour l'ornementation, pour le caoutchouc, etc.

- x. Inflorescences spéciformes (au moins l'inflorescence mâle):
 - 2x. Fleurs femelles disposées en épis:
 - 3x. Feuilles peltées, limbes à lobes radiés..... *Cecropia*, p. 90
 - 3x. Feuilles non peltées, limbes à lobes non radiés:
 - 4x. Péricarpe à segments distincts:
 - 5x. Feuilles entières..... *Ampalis*, p. 88
 - 5x. Feuilles dentées ou lobées..... *Morus*, p. 88
 - 4x. Péricarpe à segments unis en forme de tube:
 - 5x. Fleurs femelles peu nombreuses..... *Trophis*, p. 88
 - 5x. Fleur femelle solitaire..... *Pseudolmedia*, p. 89
 - 2x. Fleurs femelles non disposées en épis:
 - 3x. Fleurs staminées disposées en chatons grêles..... *Chlorophora*, p. 89
 - 3x. Fleurs staminées disposées en épis rigides, oblongs ou en forme de coupe..... *Artocarpus*, p. 89
 - x. Inflorescences non spéciformes:
 - 2x. Fleurs situées à l'intérieur d'un réceptacle globulaire avec une petite ouverture..... *Ficus*, p. 90
 - 2x. Fleurs non situées à l'intérieur d'un réceptacle:
 - 3x. Fleurs mâles et femelles situées sur la surface du même réceptacle..... *Dorstenia*, p. 89
 - 3x. Fleurs mâles et femelles situées sur des réceptacles séparés..... *Castilloa*, p. 90

Morus L.

Arbres cultivés pour leurs fruits comestibles. Plantes dépourvues d'épines, à jus laiteux. Feuilles alternes, simples, mais lobées de diverses façons, pourvues de 3-5 nervures à la base. Fleurs monoïques ou dioïques. Fleurs disposées en épis petits, cylindriques, en forme de chatons, les fleurs staminées tombent tôt, tandis que les fleurs pistillées deviennent, en mûrissant, un syncarpe juteux. Péricarpe à 4 parties. Etamines 4, incurvées dans le bourgeon.

M. alba L. Récemment introduit.

Ampalis Bojer.

Arbres avec feuilles quelque peu coriaces, grossières, alternes, entières. Plantes dioïques.

A. mauritiana (Jacq.) Urb. [*A. madagascariensis* Bojer]. Plante ornementale introduite, seulement connue par la collection de Poiteau.

Trophis L.

Arbres avec feuilles pétiolées, entières, simples, pourvues de petites stipules latérales caduques. Fleurs mâles nombreuses, disposées en longs épis axillaires;

fleurs femelles peu nombreuses, disposées en courts épis axillaires. Fruit globulaire, charnu.

T. racemosa (L.) Urb. «Ramon» (Haïti et St-Domingue). Commun.

Pseudolmedia Trec.

Arbres avec jus laiteux. Feuilles avec pétiole court, entières, légèrement coriaces, penninerves; stipules intrapétiolaires, petites, très caduques. Fleurs dioïques, les fleurs mâles en capitules sessiles axillaires, les fleurs femelles solitaires, sessiles, axillaires; le réceptacle bisexué, involucre avec des bractées plus ou moins nombreuses. Fleurs mâles, péricarpe absent; étamines (chacune représentant une fleur), nombreuses sur un réceptacle à l'intérieur de l'involucre, avec des écailles spatulées, étroitement pédicellées. Fleurs femelles, péricarpe tubulaire; avec un petit orifice denté au sommet; ovaire adné à la base par un côté; style avec 2 stigmates exerts; ovules pendants. Fruit ovoïde, enveloppé par le péricarpe, quelque peu charnu; péricarpe crustacé; cotylédons épais, charnus, très inégaux.

P. spuria (Sw) Griseb. «Bois mérique» (Haïti), très répandu.

Chlorophora Gand.

Arbres à jus laiteux, jaune. Feuilles entières ou dentées. Fleurs mâles, disposées en longs chatons, plutôt compacts. Fleurs femelles disposées en capitules. Dans le fruit, le péricarpe devient quelque peu charnu et se presse étroitement en forme d'un pseudocarpe globulaire composé.

C. tinctoria (L.) Gand. «Bois jaune» (Haïti), «Fustic en anglais, «Mora», «Mora macho» ou «Palo amarillo» à St-Domingue, d'après Urban. Autrefois, on recherchait beaucoup le bois pour la teinture jaune ou kaki. C'est un beau bois, compact, qu'on peut utiliser avantageusement. Très commun en Haïti.

Dorstenia L.

Herbes acaules, pourvues de longues hampes plates surgissant des rhizomes épaissis. Stipules distinctes, persistantes. Fruits petits, sortant complètement des fonds du réceptacle.

- D. cordifolia* Lam.
- D. domingensis* Urb. et Ekm.
- D. peltata* Spreng.
- D. fawcetti* Urb.
- D. multisquamata* Urb.
- D. flagellifera* Urb. et Ekm.
- D. caimitensis* Urb.
- D. nipensis* Urb. et Ekm.
- D. marginata* Urb. et Ekm.
- D. hotteana* Urb. et Ekm.
- D. ekmanii* Urb.
- D. numularia* Urb. et Ekm.
- D. tricolor* Urb. et Ekm.

Artocarpus L.

Arbres à jus laiteux, avec feuilles alternes, raides, entières ou profondément lobées. Plantes monoïques. Fleurs staminées, petites, nombreuses, disposées en épis raides, oblongs ou en forme de massue; les fleurs pistillées disposées en une capitule dense, globulaire ou oblongue, généralement grande, le péricarpe tubulaire et plongé dans le rachis charnu. Fruit: un syncarpe renfermant de grandes graines ou dépourvu de graines par avortement. Dans les pays tro-

picaux, le fruit des espèces cultivées constitue un article alimentaire assez important.

A. incisa L. f. «Arbre à pain,» «Arbre véritable.»

Ficus L.

Arbres ou arbustes ou plantes grimpantes avec jus laiteux. Feuilles alternes. Le genre se distingue par son syncarpe particulier, les toutes petites fleurs étant à l'intérieur d'un réceptacle clos, pyriforme, ovoïde ou globulaire, qui mûrit en un corps charnu (fruit) pourvu de beaucoup d'akènes dans la paroi interne. Le genre est d'une importance économique considérable, il fournit des fruits comestibles, du caoutchouc et des plantes ornementales.

F. carica L. «Figue France,» la figue ordinaire du commerce, cultivée.

F. mitrophora Warb. «Figuier rouge,» commun. «Hijo» à St-Domingue, d'après Urban.

F. aurea Nutt. «Figuier blanc,» commun.

F. wrightii Warb. Dans les montagnes.

F. eggersii Warb. «Hijo» à St-Domingue, d'après Urban, commun.

F. populnea Willd. Var. *brevifolia* (Nutt) Berg. Var. *hispaniolæ* Urb. Sur les littoraux.

F. populoïdes Warb. Var. *dilatata* Warb. Assez commun.

F. picardæ Warb. Assez rare.

F. rubricosta Warb. «Hamo» ou «Hijo» à St-Domingue, d'après Urban; près des sources, commun.

F. nitida Thunb. Cultivé, particulièrement à St-Domingue.

F. plumerii Urb. Probablement identique à **F. rubricosta**.

F. serrata L. Connu par Plumier seulement.

F. elastica Roxb. «Caoutchouc.»

F. jacquinifolia A. Rich. «Figuier canelle,» très répandu.

F. religiosa L. Cultivé, Bayeux.

F. holteana Urb. et Ekm.

Castilloa Cerv.

Arbres de 20 m. ou plus de hauteur. Feuilles de 25-40 cm. de long, abondamment garnies de poils fins et courts. Fleurs monoïques sur des réceptacles séparés. Le jus laiteux produit le caoutchouc bien connu du Mexique et de l'Amérique Centrale.

C. elastica Cerv. Très peu cultivé.

Cecropia L.

Arbres avec jus laiteux, tronc et branches creux avec des cloisons à intervalles. Feuilles à pétiole long, grandes, peltées, lobées. Fleurs disposées en épis cylindriques et denses; pérïanthe tubulaire. Fruit oblong, enfermé dans un pérïanthe très mince.

C. peltata L. «Bois trompette.»

Famille 41. URTICACEÆ

Herbes, arbres ou arbustes à tissus pellucides, aqueux ou fermes. Feuilles alternes ou opposées; limbes simples, entiers, dentés ou rarement lobés; stipules rarement présentes. Fleurs petites, verdâtres, généralement dioïques ou monoïques, rarement polygames, disposées en cymes axillaires, simples ou composées, souvent agrégées. Calice de 2 à 5 sépales, distincts ou partiellement unis, égaux ou inégaux. Androcée de 2-5 étamines, insérées à la base des sépales ou des lobes calicinaux; étamines réduites à des staminodes ou absentes

dans les fleurs pistillées; filets distincts, infléchis dans le bourgeon; anthères s'ouvrant longitudinalement. Gynécée formé d'un seul carpelle; ovaire supère, uniloculaire; style ou stigmat solitaire, terminal ou latéral, stigmat souvent touffu; ovule dressé ou presque dressé, orthotrope ou semi-amphitrope. Fruit: un akène; endosperme oléagineux, parfois entièrement absent. Embryon dressé à larges cotylédons.

x. Plantes ligneuses, arbustes ou arbres:

2x. Avec poils aculéiformes **Urera**, p. 91

2x. Sans poils aculéiformes:

3x. Pérïanthe absent dans les fleurs pistillées. **Phenax**, p. 93

3x. Pérïanthe présent dans les fleurs pistillées:

4x. Fleurs entières, stigmat sessile **Gyrotaenia**, p. 91

4x. Fleurs dentées, stigmat filiforme ... **Boehmeria**, p. 93

x. Plantes herbacées:

2x. Feuilles opposées..... **Pilea**, p. 91

2x. Feuilles alternes:

3x. Feuilles dentées..... **Fleurya**, p. 91

3x. Feuilles entières:

4x. Stigmat filiforme **Rousselia**, p. 94

4x. Stigmat sessile, penicillé-capité **Sarcopilea**, p. 93

Gyrotaenia Griseb.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles alternes, trinerves; stipules petites, latérales, libres, caduques. Plantes dioïques; fleurs sessiles, disposées en épis axillaires ou en panicules. Fleurs staminées, avec 4 segments imbriquées; étamines 4. Fleurs pistillées, pérïanthe petit, bilobé; stigmat sessile, penicillé-capité. Fruit: un akène avec pérïanthe intact, mais avec un rachis épaissi.

G. myriocarpa Griseb. «Bois d'leau.»

Urera Gaudich.

Arbustes ou arbrisseaux avec poils aculéiformes. Feuilles alternes, entières, sinuées ou dentées, avec 3-5 nervures à la base; stipules libres ou plus ou moins connées. Plantes dioïques; fleurs en petits groupes, disposées en panicules dichotomiques ou irrégulièrement ramifiées. Fleurs staminées, avec pérïanthe de 4-5 segments ovés, légèrement imbriqués; fleurs pistillées avec 4 segments presque égaux. Stigmat presque sessile, penicillé, capité persistant. Akène enveloppé d'un pérïanthe charnu, élargi.

U. domingensis Urb.

U. baccifera (L) Gaudich. «Maman guêpes» (Haïti), «Pringa moza» (St-Domingue), d'après Urban.

Fleurya Gaudich.

Herbes annuelles, pourvues généralement de poils aculéiformes. Feuilles alternes, avec 3 nervures à la base, dentées; stipules connées. Fleurs unisexuées, disposées en panicules solitaires axillaires. Bractées peu nombreuses. Fleurs staminées et pistillées pourvues d'un pérïanthe à 4 segments. Stigmat plus ou moins recourbé en forme de croc. Akène comprimé exert.

F. aestuans (L) Gaudich. Var. *limacana* Wedd.

F. cuneata (A. Rich.) Wedd.

Pilea Lindl.

Herbes annuelles ou vivaces, parfois rampantes. Feuilles opposées, entières ou dentées. Fleurs unisexuées, disposées en cymes axillaires solitaires. Bractées petites. Fleurs staminées avec pérïanthe de 4 segments subvalvés; fleurs pistillées avec pérïanthe de 3 segments, le segment médian beaucoup plus grand que les segments latéraux; staminodes, opposés aux segments. Akène

rondelet ou comprimé. Un genre très commun en Haïti, comprenant un grand nombre d'espèces.

- P. microphylla* (L.) Liebm. «Petites dentelles.»
- P. serpyllacea* (H. B. K.) Liebm.
- P. franquevilleana* Wedd.
- P. alpina* Urb.
- P. herniarioïdes* (Sw) Lindl.
- P. caespitosa* Urb.
- P. lanceolata* (Lam.) Wedd.
- P. melastomoïdes* (Spreng) Urb.
- P. dictyocarpa* Urb.
- P. stelluligera* Wedd.
- P. consanguinea* Wedd.
- P. cyclophora* Urb.
- P. baltenweckii* Urb.
- P. cellulosa* (Spreng) Urb.
- P. polyclada* Urb.
- P. microrhombea* Urb.
- P. cardiophylla* Urb.
- P. pachycephala* Urb.
- P. cephalantha* Wedd.
- P. christii* Urb.
- P. domingensis* Urb.
- P. lurida* Ch. Wright.
- P. parietaria* (L.) Blume.
- P. minguettii* Urb.
- P. puncticaulis* Wedd.
- P. propinqua* Wedd.
- P. setigera* Urb.
- P. stolonifera* (Sw) Wedd.
- P. barahonensis* Urb.
- P. frutescens* Urb.
- P. cephalophora* Urb.
- P. undulata* Urb.
- P. brachyclada* Urb.
- P. caulescens* (L.) Urb.
- P. semidentata* (Juss) Wedd.
- P. geminata* Urb.
- P. erosa* Urb.
- P. palustris* Urb.
- P. bicolor* Urb.
- P. laxa* (Sw) Wedd.
- P. betulifolia* (Sw) Wedd.
- P. repens* (Sw) Wedd.
- P. tippenhaueri* Urb.
- P. dispar* Urb.
- P. rugosa* (Sw) Wedd.
- P. brachypila* Urb.
- P. nummularifolia* (Sw) Wedd.
- P. depressa* (Sw) Blume.
- P. lobulata* Urb.

- P. diandra* Urb.
- P. pachycaulis* Urb.
- P. truncata* Urb.
- P. stenophylla* Urb.
- P. brittoniae* Urb.
- P. muscosa* Sw.
- P. chloroclada* Urb.
- P. leptocardia* Urb.
- P. ekmanii* Urb.
- P. distantifolia* Urb.
- P. norlindii* Urb.
- P. radiculosa* Urb.
- P. gyrophylla* Urb.
- P. trianthemoïdes* (Sw) Lindl.
- P. selleana* Urb.
- P. coronopifolia* Urb. et Ekm.
- P. perfragilis* Urb. et Ekm. Ile de la Navase.
- P. lurida* Ch. Wr.
- P. serpyllacea* (H. B. K.) Liebm.
- P. phenacoïdes* Urb. et Ekm.
- P. stelluligera* Urb. et Ekm.

Sarcopilea Urb.

Herbes vivaces. Feuilles alternes, entières; stipules libres. Fleurs vraisemblablement dioïques; périanthe à 3 segments libres; staminodes opposés aux segments du périanthe; stigmate sessile, pénicellé-capité; ovaire dressé. Bractées petites.

- S. domingensis* Urb.

Boehmeria Jacq.

Arbustes ou arbrisseaux (rarement quelque peu herbacés) plus ou moins pubescents. Pas de poils aculéiformes. Feuilles opposées ou alternes, dentées, trinerves; stipules libres, caduques. Fleurs unisexuées, disposées en grappes globulaires, sessiles, axillaires; périanthe à segments valvés dans les fleurs staminées, tubulaires dans les fleurs pistillées; stigmate filiforme, persistant, poilu d'un côté. Akène enfermé dans un périanthe marcescent.

- B. ehrenbergiana* Urb.
- B. repens* (Griseb) Wedd.
- B. cylindrica* (L.) Sw.
- B. nivea* Gand. «Mme Parquet» ou «Ramie.» Les Roseaux, (Haïti).

Phenax Wedd.

Arbustes. Feuilles alternes, crénelées ou serratées à 3 ou 5 nervures; stipules libres. Fleurs unisexuées, disposées en grappes compactes, axillaires, sessiles, avec de larges bractées scarieuses; périanthe campanulé dans les fleurs staminées; périanthe absent dans les fleurs pistillées; ovaire à l'intérieur d'une bractée; stigmate grêle, allongé, persistant. Akène quelque peu comprimé.

- P. granulatus* Urb.
- P. pauciflorus* Urb.
- P. haïtiensis* Wedd.
- P. urticifolius* (Poir.) Urb.
- P. ekmanii* Urb.
- P. laevis* Urb. et Ekm.

P. sessilifolius Urb. et Ekm.

P. hirtus (Sw) Wedd.

Rousselia Gaudich.

Herbes vivaces, tendres, diffuses, très ramifiées. Feuilles alternes, petites, entières; stipules petites, libres. Plantes monoïques. Fleurs très petites, peu nombreuses, axillaires, sous-tendues par des bractées; périanthe valvé dans les fleurs staminées et pourvu de 2-4 dents dans les fleurs pistillées; stigmate filiforme, courbé, papilleux, plumeux des deux côtés. Akène comprimé, avec le périanthe élargi et attaché; bractée persistante.

R. humilis (Sw) Urb. «Pariétaire.»

Ordre XX. SANTALALES

Herbes, arbustes ou arbres, généralement parasites sur les arbres ou les racines d'autres plantes. Feuilles réduites à des écailles ou pourvues de limbes développés. Fleurs peu voyantes, parfaites ou imparfaites, disposées de différentes manières; calice présent, bien que consistant souvent en un simple limbe; corolle présente ou absente; androcée composé le plus souvent d'autant d'étamines qu'il y a de sépales ou de pétales, ou de 2 fois autant; gynécée composé, plus ou moins infère. Fruit: une drupe, une noix ou une baie; endosperme généralement présent, charnu.

x. Herbes ou arbustes parasites:

2x. Herbes charnues, dépourvues de chlorophylle. 44. *Balanophoraceæ*, p. 97

2x. Petits arbustes, généralement pourvus de chlorophylle 43. *Loranthaceæ*, p. 95

x. Arbustes ou arbres terrestres 42. *Olacaceæ*, p. 94

Famille. 42 OLACACEÆ

Arbustes ou arbres, rarement herbes, avec tiges dressées ou volubiles. Feuilles généralement alternes, limbes entiers ou rarement dentés, stipules absentes. Fleurs parfaites ou polygames, régulières, disposées en cymes axillaires ou en grappes; calice pourvu de 4 ou 5 dents; corolle à 4-6 lobes; étamines insérées avec le périanthe. Fruit: une drupe.

x. Etamines 2 fois aussi nombreuses que les segments du calice; périanthe fendu presque jusqu'à la base, les lobes compactement barbus à l'intérieur *Ximenia*, p. 94

x. Etamines aussi nombreuses que les segments du calice; périanthe lobé jusqu'au milieu ou plus haut, les lobes clairsemés ou non barbus *Schoepfia*, p. 94

Schoepfia Schreb.

Arbustes ou arbrisseaux glabres. Feuilles coriacées. Fleurs disposées en grappes courtes, axillaires, ou solitaires, ou fasciculées dans l'axe de la feuille; calice petit, en forme de coupe, imparfaitement dentelé.

S. obovata Ch. Wright.

S. haïtiensis Urb. et Britton.

S. olivacea Urb. et Ekm. Fond-des-Orangers.

S. chrysophylloïdes (A. Rich.) Planch. Ile de la Tortue.

S. navasana Urb. et Ekm. Ile de la Navase.

Ximenia L.

Arbustes ou arbrisseaux, parfois pourvus de branchettes épineuses. Feuilles presque coriacées. Fleurs blanchâtres, solitaires ou disposées en petites cymes axillaires.

X. americana L. «Croc» ou «Macaby», d'après Urban. Sur les littoraux.

X. horrida Urb. et Ekm. Endroits secs, assez répandu.

Famille 43. LORANTHACEÆ

Arbustes parfois très petits, parasites sur les branches d'arbres ou d'arbustes, généralement verts, mais parfois rougeâtres, brunâtres ou jaunâtres. Feuilles opposées, généralement entières, coriacées ou réduites à de petites écailles dans certaines espèces. Fleurs (dans nos espèces) généralement petites, parfaites ou unisexuées. Fruit: une baie.

Les membres de cette famille s'appellent généralement «Gui.»

x. Corolle de 6 pétales *Dendropemon*, p. 95

x. Corolle de 3 pétales ou partagée en 2:

2x. Fleurs cachées dans les cavités des épis articulés:

3x. Fleurs disposées en épis très denses généralement de plusieurs rangées sur les nœuds de l'inflorescence. Feuilles généralement développées *Phoradendron*, p. 96

3x. Fleurs disposées en une rangée (parfois opposées qu 3 ou 4 en un simple verticille) sur les nœuds de l'inflorescence. Feuilles généralement absentes *Dendrophthora*, p. 96

2x. Fleurs non cachées dans les cavités:

3x. Feuilles absentes ou non développées:

4x. Fleurs en épis *Eubrachion*, p. 97

4x. Fleurs solitaires *Arceuthobium*, p. 96

3x. Feuilles développées, alternes *Ixidium*, p. 95

Dendropemon Bl.

Arbustes. Feuilles opposées, décussées, plus ou moins coriacées. Inflorescence: fleurs solitaires ou en groupes de 3, arrangées en épis terminaux ou axillaires, en grappes ou en panicules; bractées et bractéoles charnues, cupuliformes à la base. Fleurs très petites, verdâtres, parfois teintées de rouge; calice crépu; pétales libres, charnus, déployés; étamines, les plus longues insérées très haut, alternant avec les plus courtes insérées très bas; ovaire avec un disque annulaire. Fruit: une baie couronnée d'un calice persistant.

D. pycnophyllus Krug. et Urb. Sur les pins.

D. picardae Krug. et Urb. Sur *Coffea*, *Persea*, etc.

D. constantiae Krug. et Urb. Sur les pins, St-Domingue.

D. loranthoïdeus (Baill.) v. Tiegh. Sur *Guajacum*, peu connu.

D. parvifolius (Sw) Stend. Sur les pins, etc.

D. laxiflorus (Desv.) Stend.

D. uniflorus (Jacq.) Stend. Sur *Terminalia*, *Persea*, etc. dans le Nord.

D. subsessilis Urb.

D. emarginatus (Sw) Stend. Sur des arbres divers, e. g. *Citrus*.

D. purpureus (L) Krug. et Urb. Sur des arbres divers.

D. rostratus Urb. Sur *Guazuma*, rare, Jérémie.

D. oliganthus Urb. Dans La Selle.

D. alatus v. Tiegh. Sur des arbres divers, Port-au-Prince.

D. sessiliflorus Urb. Sur *Baccharis*, La Selle.

D. coloratus Urb. Sur *Miconia*, La Selle.

D. brachycarpus (Krug. et Urb.) Urb. Sur *Acacia scleroxyla*.

Ixidium Eichl.

Plantes monoïques parasites sur les Dicotyledonæ. Fleurs mâles et femelles portées sur des branches différentes; corolle persistante, munie généralement de 3 lobes. Fleurs et fruits sessiles non cachés dans des cavités.

I. wrightii (Griseb) Eichl. Sur les lauriers, La Selle.

Arceuthobium M. Bieb.

Plantes généralement brunâtres, touffues, très ramifiées, parasites sur les Conifères. Feuilles réduites à de toutes petites écailles. Fleurs disposées en épis.

A. bicarinatum Urb. Sur les pins.

Phoradendron Nutt.

Arbustes, branches articulées aux nœuds. Epis axillaires ou terminaux, articulés avec 2 petites bractées à chaque nœud. Fleurs superposées en 2, 4 ou 6 rangées dans chaque nœud, dioïques ou monoïques, plus ou moins immergées dans le rachis. Fleurs staminées, pétales 3, unis à la base, anthères à la base des pétales, presque sessiles; fleurs pistillées, pétales 3. Fruit: une baie couronnée par les pétales et renfermant une couche épaisse et visqueuse.

P. mucronatum (P. DC.) Krug. et Urb. Sur *Spondias*, *Gymnanthes*, etc.

P. quadrangulare (H. B. K.) Krug. et Urb. [Syn. *P. antillarum* Trel.]. Sur *Guazuma*.

P. trinervium (Lam.) Griseb. Sur *Pisonia*, Môle St-Nicolas.

P. domingense (Desv.) Trel. Sur *Hænianthus*, La Hotte.

P. anceps (Spreng.) Krug. et Urb.

P. haïtiense Urb. Sur *Swietenia*, rare.

P. hexastichum (P. DC.) Griseb. Sur *Alchornea*, *Ocotea*, etc.

P. barahonæ Urb. et Trel.

P. racemosum (Aubl.) Krug. et Urb. Sur *Inga vera*.

P. dichotomum (Bert.) Krug. et Urb. Sur des arbres divers, e. g. *Citrus*.

P. ovatifolium (Krug. et Urb.) Urb.

P. latifolium (Sw.) Griseb. Sur *Ficus*.

P. chrysocarpum Krug. et Urb. Sur *Bursera*, *Cedrela*.

P. fravens (Sw.) Griseb. Sur *Guarea*, La Hotte.

P. ficulneum Trel.

P. tetrapterum Krug. et Urb. Sur *Dendrophthora*.

Dendrophthora Eichl.

Arbustes, branches articulées aux nœuds. Feuilles réduites généralement à de très petites écailles ou absentes. Epis axillaires ou terminaux, articulés, pourvus de petites bractées à chaque nœud. Fleurs solitaires ou plusieurs de chaque côté d'un nœud, généralement superposées en deux rangées (parfois 4), dioïques ou monoïques. Fleurs staminées; pétales 3, unis à la base, anthères sessiles opposées aux sépales; fleurs pistillées: pétales 3, ovaire infère. Fruit: une baie couronnée de tout petits pétales.

D. cupulata (P. DC.) Eichl. Sur les lauriers.

D. domingensis (Spr.) Eichl. Sur *Coccoloba*, *Thouinia*.

D. fuertesii Urb.

D. brachystachya Urb. Sur *Coccoloba*.

D. cupressoides (Macf.) Eichl. Sur *Ardisia*, *Allophylus*, etc.

D. remotiflora Urb. Sur *Coccoloba*, *Melastomataceæ*, etc.

D. flagelliformis (Lam.) Krug. et Urb. Sur *Petitia*, *Tabebuia*, *Catalpa*.

D. biseriata Urb.

D. tetrastachya (Griseb.) Urb. Sur *Rubiaceæ*, *Psidium*.

D. ternata Urb.

D. hians Urb. Sur *Lyonia*.

D. marmeladensis Urb. Sur *Tabebuia*, *Pachira*, etc.

D. brachylepis Urb. Sur *Mimusops*, *Coccoloba*.

D. wrightii Eichl. Sur *Podocarpus*, *Hyplidaphne*, etc.

D. buxifolia (Griseb.) Eichl. Sur *Magnolia*, *Sloanea*.

D. versicolor Urb. et Ekm. Sur *Melastomataceæ*.

D. selleana Urb. et Ekm. Sur *Juniperus*.

Eubrachion Hook. f.

Arbrisseaux très ramifiés. Feuilles réduites à de petites écailles peltées disposées en spirale. Epis agglomérés en une sorte de raceme à l'extrémité des ramules. Bractées squameuses, arrondies-ovées; bractées inférieures vides, persistantes; bractées intermédiaires avec les fleurs mâles décidues; les bractées supérieures persistantes enveloppant les fleurs femelles. Fleurs sessiles dans l'axe des bractées, monoïques dans le même épi; parties florales 3, sortant d'un réceptacle court en forme de huppe. Étamines 3; pistil rudimentaire formant un disque plat, trilobé, les lobes alternant avec les pétales. Fleurs femelles: étamines absentes; ovaire largement obovoïde, disque comme dans les fleurs mâles; style au milieu du disque, très court, avec stigmates obtus. Baies obovoïdes-subglobulaires, couronnées avec les pétales persistants; péricarpe charnu avec une couche visqueuse, épaisse, au-dessus de la graine. Graines déprimées-globulaires; embryon cylindrique dans la ligne médiane de l'endosperme coriace.

E. ambiguum (Hook et Arn.) Engl.

Famille 44. BALANOPHORACEÆ

Herbes charnues, dépourvues de chlorophylle, parasites sur les racines des arbres. Rhizomes tubéreux, donnant naissance à des pédoncules couverts d'écailles et élargis en dessus pour former des spadices qui sont parfois couverts de bractées caduques. Fleurs unisexuées, les fleurs mâles généralement pourvues d'un périanthe de 3-8 lobes valvés; étamines opposées aux lobes du périanthe; filets libres ou connés; anthères libres ou connées. Fleurs femelles: périanthe absent ou bilobé ou tubulaire, épigyne; ovaire 1-3 loges; styles terminaux; ovules solitaires, pendants. Fruit: une noix uniloculaire, monosperme de même forme que l'ovaire, mais un peu plus grand.

Cette famille ne renferme que le genre:

Scybalium Schott et Endl.

Les caractères de la famille correspondent à ceux du genre.

S. jamaïcense (Sw.) Schott et Endl. Plante rouge ou pourpre à anthères blanches. Massif du Nord, rare.

Ordre XXI. ARISTOLOCHIALES

Plantes herbacées ou arbustives, parfois sarmenteuses. Feuilles alternes, entières ou dentées. Fleurs hermaphrodites; périanthe simple, supère, coloré; étamines généralement 6, parfois plus, formant un *gynostemium*; anthères adnées à la colonne, les loges s'ouvrant extérieurement; ovaire infère à 6 loges (parfaites ou imparfaites) les placentas projetant des parois au milieu de l'ovaire et parfois s'y unissant; style avec 3 ou 6 lobes stigmatiques; ovules nombreux, anatropes, horizontaux, ou pendants. Capsule à 6 valves; embryon petit enveloppé d'un endosperme abondant et charnu.

Famille 45. ARISTOLOCHIACEÆ

Les caractères de l'ordre conviennent à la famille.

Aristolochia L.

Feuilles entières ou lobées; pédoncules axillaires, uniflorés, généralement solitaires. Bractée absente ou ressemblant à une stipule. Périanthé irrégulier, supère; gynostemium rond utriculé.

- A. trilobata* L. Dans les haliers littoraux, Bayeux.
- A. caudata* Jacq. Dans le Nord, assez rare.
- A. ehrenbergiana* Cham. Port-au-Prince, abondant.
- A. brachyura* Duchartre. Massif des Matheux.
- A. leptosticta* Urb. St-Domingue.
- A. ekmanii* O. C. Schmidt. Massif du Nord, assez commun.
- A. peltata* L. Répandu.
- A. bilobata* L. Très commun.
- A. oblongata* Jacq. Dans les montagnes.
- A. elegans* Mast. «Fleur cygne», plante ornementale, cultivé.
- A. punctata* Lam. Anses-à-Pitre, connu par Plumier seulement.
- A. fuertesii* Urb. Anses-à-Pitre, assez commun.
- A. bilabiata* L. Presqu'île du Sud-Ouest, rare.
- A. stenophylla* Urb. Presqu'île du Sud-Ouest, commun.
- A. calceiformis* Urb. Dans les montagnes.

Ordre XXII. POLYGONALES

Herbes, arbustes ou arbres. Feuilles alternes ou plus rarement opposées, avec pétioles plus ou moins dilatés, engainantes, accompagnées de stipules qui se soudent en une ochrea, sorte de collerette entourant la tige. Fleurs généralement petites, solitaires ou généralement groupées dans une bractée; pédicelles articulés. Fleurs hermaphrodites ou unisexuées, régulières; périanthé infère vert ou coloré, lobes ou segments 4-6, en 2 verticilles, imbriqués, non altéré après la floraison; étamines 6-9; filets libres ou connés à la base; ovaire supère, uniloculaire; styles 2 ou 3 avec stigmates dilatés; ovule 1, orthotrope. Fruit: une noix triangulaire ou biconvexe, enveloppée par le périanthé. Graine dressée; endosperme abondant, enveloppant un embryon plus ou moins excentrique; cotylédons quelque peu plats.

Famille 46. POLYGONACEÆ

Les caractères de l'ordre conviennent à la famille.

- x. Plantes avec vrilles dans l'inflorescence *Antigonon*, p. 99
- x. Plantes sans vrilles dans l'inflorescence:
 - 2x. Herbes:
 - 3x. Segments du périanthé 6, en 2 séries ... *Rumex*, p. 98
 - 3x. Segments du périanthé 5 *Polygonum*, p. 99
 - 2x. Plantes ligneuses, arbustes ou arbres:
 - 3x. Etamines 8. Feuilles non compactement groupées à l'extrémité des branches *Coccoloba*, p. 99
 - 3x. Etamines 3. Feuilles groupées à l'extrémité des branches *Leptogonum*, p. 100

Rumex L.

Herbes vivaces. Feuilles alternes, parfois radicales. Fleurs en grappes paniculées hermaphrodites ou unisexuées par avortement, parfois dioïques; segments du périanthé 6 en 2 séries; étamines 6; ovaire triangulaire; styles 3, stigmates peltés. Fruit: une noix triangulaire enveloppée par les pièces internes du calice. Embryon latéral; cotylédons linéaires ou oblongs.

- R. obtusifolius* L. Dans les montagnes.
- R. crispus* L. «Oseille marron», dans les montagnes.

- R. crispus* X *obtusifolius*, rare, La Hotte.
- R. acetosella* L. La Selle.
- R. patientia* L. «Oseille», cultivé pour ses feuilles alimentaires.

Polygonum L.

Herbes, parfois arbustives à la base. Feuilles alternes. Fleurs groupées sur des racemes en forme d'épi, parfois paniculées (ou capitées en corymbes). Périanthé à 5 pièces profondément lobées, coloré; étamines 8-6, insérées sur le périanthé; styles 2 ou 3 unis en dessous; stigmates capités, entiers. Fruit: une noix petite; embryon excentrique dans l'endosperme; cotylédons étroits.

- P. glabrum* Willd. Commun.
- P. punctatum* Ell. Commun.
- P. acuminatum* H. B. K. Etang Miragoâne.
- P. pennsylvanicum* L. Commun.

Antigonon Endl.

Plantes fruticuleuses ou herbacées, le plus souvent s'élevant le long des corps voisins à l'aide de vrilles. Feuilles cordées ou deltoïdes. Fleurs fasciculées, les fascicules en forme de racemes. Au début, sépales petits, peu voyants, mais devenant pourpres et très voyants. Plantes ornementales.

- A. leptopus* Hook et Arn. «Belle Mexicaine», Cultivé.
- A. cinerascens* Mart. J. Gal. Cultivé.

Coccoloba L.

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, entières. Fleurs hermaphrodites, solitaires ou groupées à l'intérieur de petites bractées ochreiformes, les bouquets disposés en racemes épiés, les racemes simples, solitaires, ou rarement 2 ou 3 ensemble, ou paniculés, terminaux et axillaires. Périanthé partite en 5 pièces, plus ou moins charnu; enveloppant le fruit et s'y attachant; étamines 8; filets connés à la base; styles 3; stigmates plus ou moins dilatés. Fruit: une noix couronnée avec le limbe du périanthé, mais sortant au-dessus dans l'espèce *C. venosa*.

- C. incrassata* Urb. Endroits secs, stériles, assez commun.
- C. subcordata* (Bert.) Lindau. Assez commun.
- C. scrobiculata* Lindau. St-Domingue.
- C. flavescens* Jacq. Assez commun.
- C. obtusifolia* Jacq. St-Domingue.
- C. nodosa* Lindau. St-Domingue.
- C. taylorii* Urb. Massif du Nord.
- C. fuertesii* Urb. St-Domingue.
- C. mornicola* Urb. Massif du Nord.
- C. picardæ* Urb. Massif de la Selle.
- C. pauciflora* Urb. St-Domingue.
- C. borgesensis* O. C. Schmidt. Ile de la Tortue, Port-de-Paix.
- C. diversifolia* Jacq. St-Domingue
- C. rotundifolia* Meissn. «Uvilla», St-Domingue d'après Urban, commun.
- C. eggersiana* Lindau. St-Domingue.
- C. verruculosa* Lindau. Ile de la Tortue, Port-de-Paix.
- C. laurifolia* Jacq. «Raisin marron» (Haïti), «Uvero» ou «Urilla» (St-Domingue), d'après Urban, très commun.
- C. subtruncata* Urb. St-Domingue.
- C. pubescens* L. «Gamelle», commun.



C. uvifera L. «Raisin la mer» (Haïti), «Uva» ou «uvilla» (St-Domingue) d'après Urban, sur les plages, abondant.

C. venosa L. «Guarape», St-Domingue, d'après Urban. Bayeux.

C. neurophylla Urb. Dans les montagnes.

C. tortuensis Ekm. et O. C. Schmidt. Île de la Tortue.

C. hotteana O. C. Schmidt. Presqu'île du Sud-Ouest.

C. mansfeldii O. C. Schmidt.

C. buchii O. C. Schmidt. Massif du Nord.

C. retusa Griseb. Massif du Nord.

Leptogonum Benth.

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, plus ou moins groupées au sommet des branchettes, limbes entiers ou serrés; nervation pennée très apparente. Fleurs disposées en grappes épiées axillaires, pendantes. Étamines 3.

L. domingense Benth. Acul-du-Nord.

L. buchii Urb. Gros-Morne.

Ordre XXIII. CHENOPODIALES

Herbes, parfois plus ou moins arbustives, rarement aphylls, pourvues d'un feuillage vert pâle ou très coloré. Feuilles alternes ou opposées, parfois réduites à des écailles. Fleurs le plus souvent parfaites, parfois monoïques ou dioïques, disposées de diverses manières, rarement très réduites. Calice généralement présent, les sépales le plus souvent distincts. Corolle absente ou présente, petite et échappant à la vue ou relativement grande et voyante. Androcée formé de 1 ou plusieurs étamines. Gynécée d'un seul carpelle ou de plusieurs carpelles soudés; ovaire de 1 — beaucoup de loges, parfois uniloculaire par suppression; styles le plus souvent distincts; ovules amphitropes ou campylotropes. Fruit: une utricule, un akène ou une baie, parfois un anthocarpe. Embryon courbé annulaire ou enroulé.

x. Fruit non valvé:

2x. Fruit non anthocarpé:

3x. Fruit utriculaire:

4x. Bractées non scarieuses, stipules absentes:

5x. Plantes rarement sarmenteuses; gynécée formé généralement de 2 carpelles; styles 2-5, plus ou moins unis.

5x. Plantes sarmenteuses; gynécée formé de 3 carpelles; styles 3, distincts.

4x. Bractées ou stipules scarieuses.

3x. Fruit non utriculaire:

4x. Fruit: un akène ou une baie; fleurs non disposées en cônes.

4x. Fruit agrégé; fleurs disposées en cônes axillaires.

2x. Fruit anthocarpé.

x. Fruit valvé:

2x. Ovaire pluriloculaire; corolle absente.

2x. Ovaire uniloculaire; corolle le plus souvent présente:

3x. Sépales 2. Feuilles le plus souvent opposées.

3x. Sépales 4-5. Feuilles le plus souvent alternes.

47. *Chenopodiaceæ*, p. 101

54. *Basellaceæ*, p. 112

48. *Amaranthaceæ*, p. 102

51. *Phytolaccaceæ*, p. 108

50. *Batidaceæ*, p. 108

49. *Allioniaceæ*, p. 106

52. *Aizoaceæ*, p. 110

53. *Portulacaceæ*, p. 111

55. *Caryophyllaceæ*, p. 113

Famille 47. CHENOPODIACEÆ

Herbes ou arbustes. Feuilles simples alternes, dépourvues de stipules, réduites à des écailles dans le genre *salicornia*. Périanthe infère de 3-5 segments libres ou connés, imbriqués dans le bourgeon; étamines aussi nombreuses que les segments du périanthé ou moindres, opposées à ces segments; ovaire uniloculaire; stigmates 2-5; ovule solitaire, basilaire ou latéral campylotrope.

x. Plantes à tige feuillée:

2x. Fleurs parfaites ou polygames; périanthés semblables:

3x. Embryon annulaire; endosperme abondant:

4x. Calice devenant dur et ligneux dans le fruit, plusieurs se développant ensemble; fleurs avec bractées.

Beta, p. 101

4x. Calice se développant plus ou moins dans le fruit, mais ne changeant pas de caractère; fleurs sans bractées.

Chenopodium, p. 101

3x. Embryon enroulé en spirale; endosperme absent ou pauvre.

Suæda, p. 102

2x. Fleurs unisexuées; périanthé de 2 sortes sur la même plante ou sur des plantes distinctes:

3x. Étamines 4.

Atriplex, p. 101

3x. Étamines 2.

Heterostachys, p. 102

x. Plantes à tige aphyllé.

Salicornia, p. 102

Chenopodium L.

Herbes à tige angulaire. Feuilles entières, lobées ou dentées. Fleurs très petites, hermaphrodites ou polygames disposées en groupes axillaires dans des épis simples ou ramifiés. Segments du périanthé, généralement 5; étamines aussi nombreuses que les segments du périanthé; ovaire libre; stigmates 2-3. Fruit: un utricule membraneux, enfermé dans le périanthé. Graine horizontale ou verticale, testa crustacé, endosperme farineux; embryon plus ou moins complètement annulaire.

C. murale L.

C. ambrosioides L. «Semin contra» (Haïti) «Apasote» (St-Domingue).

Atriplex L.

Herbes ou arbustes. Fleurs unisexuées, disposées en bouquets axillaires ou en épis terminaux, courts. Fleurs mâles dépourvues de bractées; périanthé divisé près de la base en 4; étamines 4. Fleurs femelles avec 2 bractées; bractées plates, entourant l'ovaire et dilatées dans le fruit, formant une couverture bivalvée à l'utricule; périanthé absent; stigmates 2. Utricule à la base des bractées très élargies et durcies. Graine avec embryon annulaire environnant l'endosperme farineux.

A. crispa (Moq) Urb.

A. pentandra (Jacq.) Standl.

Beta L.

Plantes herbacées, annuelles — bisannuelles — vivaces avec feuilles alternes, entières ou sinuées, glabres ou presque glabres. Fleurs verdâtres sessiles, disposées en longs épis paniculés plus ou moins ouverts, généralement 2 ou 3 ensemble avec des bractéoles au-dessous des 5 sépales du calice; étamines 5; ovaire enfoncé dans un disque ou hypanthium; stigmates généralement 3. Fruit le plus souvent agrégé.

B. vulgaris L. «Betterouge», plante cultivée, alimentaire.

Salicornia L.

Herbes succulentes, aphyllées, glabres avec des branches opposées, articulées. Feuilles représentées par des écailles opposées aux nœuds. Fleurs en épis articulés, terminaux, 3 ou plus enfoncées dans les cavités des nœuds; périanthe un peu plat au sommet avec une petite bouche à travers laquelle sortent les étamines et les stigmates; étamines 2; stigmates 2. Utricule enveloppée par le périanthe devenu spongieux. Graine dressée, comprimée; testa coriacé, hérissé de poils recourbés; endosperme absent; embryon condupliqué.

S. perennis Mill.

Heterostachys Ung-Sternb.

Arbustes à branches succulentes et à feuilles presque opposées, circulaires. Fleurs solitaires, libres; périanthe presque circulaire, quadrilobé au sommet, les extrémités inégales, les latérales plus grosses, fortement recourbées, munies d'une grille au dos, aiguës, les 2 autres plates, obtuses; étamines 2, latérales; ovaire comprimé; styles 2; ovules pendants. Fruit quelque peu spongieux; endosperme riche; embryon semi-circulaire, radicule latérale ascendante.

H. ritteriana (Moq) Ung-Sternb.

Suaeda Forsk.

Herbes annuelles ou vivaces ou plantes arbustives avec tissus charnus. Feuilles alternes, épaisses — cylindriques, étroites, entières. Fleurs parfaites ou polygames, solitaires ou agrégées dans les axes supérieurs, accompagnées de bractéoles. Sépales 5 carénés ou étroitement ailés à maturité; étamines 5; filets courts; ovaire sessile, uniloculaire, arrondi ou plat au sommet; styles souvent 2. Une utricule couronnée par le calice, membraneuse ou spongieuse. Graines dressées, horizontales ou obliques, glabres; endosperme absent ou peu abondant, généralement vert.

S. insularis (Britton) Urb. et Ekm. comb. nov.

S. fruticosa (L.) Forsk.

Famille 48. AMARANTHACEÆ

Herbes, rarement arbustes. Feuilles opposées ou alternes, dépourvues de stipules. Fleurs généralement en épis terminaux simples ou paniculés, en cymes ou en grappes (les fleurs externes de la grappe parfois déformées), chaque fleur avec 1 bractée et 2 bractéoles qui sont scarieuses. Segments du périanthe 5-3, scarieux, persistants, imbriqués dans le bourgeon; étamines 2-5, opposées aux segments du périanthe; filets libres ou connés en dessous ou unis avec les staminodes intermédiaires en forme d'une coupe hypogyne; anthères uniloculaires ou biloculaires; ovaire uniloculaire; styles 1-3; ovules 1 ou plusieurs, basilaires. Fruit utriculaire, enfermé dans le périanthe persistant ou restant dessus. Graine dressée, presque ronde, comprimée, testa crustacé.

x. Feuilles alternes:

2x. Fleurs hermaphrodites:

3x. Fruit utriculaire avec 2 ou plusieurs graines

3x. Fruit utriculaire avec 1 seule graine

2x. Fleurs unisexuées:

3x. Périanthe présent dans toutes les fleurs

3x. Périanthe absent dans les fleurs pistillées

x. Feuilles opposées:

2x. Anthères biloculaires:

Celosia, p. 103

Chamissoa, p. 103

Amaranthus, p. 103

Acnida, p. 104

- 3x. Segments des fleurs imparfaites changés en arrête recourbée au sommet *Cyathula*, p. 104
- 3x. Segments et bractées spinescents *Achyranthes*, p. 104
- 2x. Anthères uniloculaires:
- 3x. Stigmates capités, crénelés ou pénicillés:
- 4x. Filets unis à la base en forme de coupe courte:
- 5x. Staminodes absents *Guilleminea*, p. 104
- 5x. Staminodes présents *Alternanthera*, p. 105
- 4x. Filets unis en forme de long tube *Frœlichia*, p. 104
- 3x. Stigmates 2 ou 3, subulés ou filiformes:
- 4x. Fleurs parfaites disposées en épis capités:
- 5x. Staminodes présents, plantes pubescentes *Gomphrena*, p. 105
- 5x. Staminodes absents, plantes glabres *Philoxerus*, p. 105
- 4x. Fleurs unisexuées, disposées le long des branches d'une panicule *Iresine*, p. 105
- Genre non classifié *Lithophila*, p. 105

Celosia L.

Herbes annuelles, parfois arbustives. Feuilles alternes. Fleurs hermaphrodites, disposées en épis avec bractées persistantes et bractéoles blanches ou roses, brillantes; périanthe scarieux, strié ou garni de côtes; étamines 5, unies en dessous en forme de coupe; anthères biloculaires; staminodes absents; ovaire avec 2 ou plusieurs ovules. Utricule circonscissile, parfois épaissie au dessus, avec 2 ou plusieurs graines. Graines dressées, testa crustacé.

C. nitida Vahl.

C. argentea L. «Crête coq simple», appelé «Cockscomb» en anglais.

C. virgata Jacq. Ile de la Tortue.

Chamissoa H. B. K.

Arbuste grimpant. Feuilles alternes. Fleurs hermaphrodites avec bractées persistantes, disposées en épis paniculés, blanches ou verdâtres; périanthe scarieux; étamines 5, unies en dessous en forme de coupe; anthères biloculaires; staminodes absents; ovaire avec un seul ovule, dressé, pourvu d'un court pédicelle. Utricule circonscissile. Graine dressée, testa crustacé.

C. altissima (Jacq.) H. B. K. «Bois panier», «Liane panier» (Haïti), «Pabellon de rey» (St-Domingue), d'après Urban.

Amaranthus L.

Herbes annuelles. Feuilles alternes, pourvues d'une longue tige. Fleurs monoïques, petites, arrangées en bouquets axillaires ou en épis et parfois avec un long épi terminal; segments du périanthe 5-3, ovés, oblongs, linéaires, lancéolés ou subulés; étamines 2-5, libres, anthères biloculaires; staminodes absents; ovaire comprimé; style court ou absent; stigmates 2-3, filiformes ou subulés; ovule 1, dressé, avec un court pédicelle. Utricule comprimée, indéhiscente ou circonscissile, extrémité entière ou pourvue de 2-3 dents. Graine lenticulaire, testa crustacé, brun noir; embryon annulaire; cotylédons linéaires.

A. tristis L.

A. spinosus L. «Zépina piquant»

A. polygonoides L.

A. crassipes Schlecht.

A. viridis L.

A. paniculatus L. «Zépina» (Haïti), «Tassel amaranth» en anglais.

Acnida L.

Herbes annuelles, hautes, glabres, ramifiées. Feuilles alternes, pédicellées, entières, penninerves. Fleurs en bouquets disposés en épis terminaux et axillaires, dioïques, mâles et femelles dissemblables; bractées et bractéoles plus courtes que le périlanthe. Fleurs mâles; segments de périlanthe 5, scarieux, mucronés; étamines 5, libres; anthères biloculaires. Fleurs femelles dépourvues de périlanthe, enveloppées par les bractées et les bractéoles persistantes; ovaire avec 2-5 stigmates; ovule 1, dressé avec un court pédicelle. Utricule indéhiscente; embryon annulaire; cotylédons linéaires.

A. cuspidata Bert.

Achyranthes L.

Herbes ou parfois plantes ligneuses avec des branches souvent grêles et allongées. Feuilles opposées, simples, entières, pétiolées ou sessiles. Fleurs parfaites, en épis grêles et allongés, souvent interrompus, généralement recourbés; calice ferme, devenant souvent très dur; sépales 4-5, étroits, presque égaux, acuminés ou barbus-pointus; étamines 5 ou rarement moindres; filets filiformes-subulés, anthères biloculaires; ovaire uniloculaire quelque peu aplati, style filiforme; stigmate capité, ovule solitaire. Utricule incluse, membraneuse, indéhiscente.

A. indica Mill. «Queue rat», très répandu.

A. aspera L. Très répandu.

Cyathula Lour.

Herbes parfois arbustives à la base. Feuilles opposées, pédicellées, entières. Fleurs en bouquets, les bouquets en forme d'épis; fleurs parfaites, 1-3 dans chaque bouquet, environnées par d'autres fleurs imparfaites réduites à des segments de périlanthe avec des arêtes rigides, crochues (glochidia). Périlanthe scarieux, avec de longs poils fins, segments 5, mucronés ou pourvus d'arêtes crochues; étamines 5, unies à la base avec les staminodes en forme de coupe; anthères biloculaires; ovaire avec style filiforme et stigmate terminal, ovule 1, pendant d'une longue tige basilaire. Utricule indéhiscente; embryon annulaire, cotylédons oblongs, elliptiques.

C. achyranthoides Moq.

Guilleminea H. B. K.

Herbes vivaces à feuillage lamigineux et à tiges ramifiées, couchées sur le sol. Feuilles le plus souvent basilaires, entières, à bouts non rigides. Fleurs parfaites, sous-tendues par des bractées hyalines, en groupes axillaires; sépales 5, lanugineux, trinerves ou anerves; étamines 5; filets unis à la base en forme d'une coupe courte, staminodes absents entre les anthères uniloculaires; ovaire uniloculaire, aplati; style court, stigmate crénelé, ovule solitaire. Utricule membraneuse, indéhiscente. Graine lenticulaire, brillante.

G. lanuginosa (Poir.) Hook.

Frœlichia Moench.

Herbes. Feuilles opposées. Fleurs hermaphrodites, disposées en épis, enveloppées de bractées membraneuses; périlanthe lanugineux, tubulaire, pourvu de 5 lobes, tube devenant dur et huppé dans le fruit; étamines unies en tube divisé au sommet en 5 lobes, anthères uniloculaires, sessiles sur le tube entre les lobes; ovaire avec un ovule pendant d'une longue tige. Utricule enveloppée par le tube de périlanthe, indéhiscente. Graine avec embryon annulaire.

F. interrupta (L.) Moq.

Alternanthera Forsk.

Herbes, souvent quelque peu ligneuses en dessous, généralement couchées ou décombantes. Feuilles opposées. Fleurs petites, hermaphrodites, capitées. Capitules sessiles, axillaires, solitaires ou en bouquets de 2 ou 3. Bractée plate, plus courte que les segments externes latéraux du périlanthe, bractéoles concaves. Périlanthe avec 5 segments inégaux, les 2 externes aplatis, le segment médian aplati plus court, les 2 segments internes latéraux encore plus courts; étamines 3-5, filets concrets à la base en une coupe courte avec des staminodes alternants, anthères uniloculaires; ovaire avec un ovule pendant à l'extrémité d'une longue tige. Utricule comprimée, presque ronde ou en forme de cœur inversé. Graine avec embryon annulaire.

A. sessilis (L.) R. Br.

A. paronychioides A. St-Hil.

A. peploides (H. et B.) Urb.

A. ficoidea (L.) R. Br.

A. geniculata Urb.

A. serpyllifolia (Poir.) Urb.

A. spinosa R. et Sch.

Gomphrena L.

Herbes. Feuilles opposées, sessiles ou pourvues d'un court pédicelle, entières. Fleurs hermaphrodites en capitules avec une bractée et 2 bractéoles; périlanthe divisé à la base en 5, lanugineux; tube staminal long, pourvu de 5 fentes, anthères uniloculaires insérées au sommet des lobes; stigmates 2, linéaires, ovule 1 à l'extrémité d'une longue tige. Utricule comprimée, ovoïde. Graine avec embryon annulaire.

G. globosa L.

G. dispersa Standl.

Iresine L.

Herbes dressées. Feuilles opposées, entières ou serrulées. Fleurs très petites, polygames ou dioïques, en groupes le long des branches d'une panicule; périlanthe avec 5 segments, dans la fleur femelle il est ceint de poils et bientôt complètement enveloppé; étamines 5, filets concrets à la base par une coupe courte, avec ou sans staminodes alternant, anthères uniloculaires; ovaire avec 2 stigmates, rarement 3, et un ovule à l'extrémité d'une longue tige. Utricule comprimée, presque ronde. Graine avec embryon annulaire.

I. elatior L. C. Rich.

I. paniculata (L.) O. Kuntze.

I. domingensis Urb.

I. herbstii Hook.

Philoxerus R. Br.

Herbes étendues sur le sol. Feuilles opposées, entières, étroites. Fleurs hermaphrodites, scarieuses, capitées, avec une bractée et 2 bractéoles; capitules axillaires et terminaux. Périlanthe avec 5 segments, épaissis à la base, supportés par une tige spongieuse; étamines 5, filets concrets à la base en une coupe courte, sans staminodes alternant, anthères uniloculaires; ovaire avec un style court et 2 stigmates linéaires, un ovule à l'extrémité d'une longue tige. Utricule comprimée ovoïde. Graine avec embryon annulaire.

P. vermicularis (L.) Pal. Beauv.

Lithophila Sw. (Genre non classifié)

L. muscoïdes Sw. var. **caespitosa** Urb. Ile de la Navase.

Famille 49. ALLIONIACEÆ

Herbes, arbustes ou arbres. Feuilles alternes ou opposées, dépourvues de stipules, limbes simples, entiers ou godronnés. Inflorescences variées. Fleurs régulières, parfaites ou parfois unisexuées, souvent sous-tendues par un involucre voyant. Calice généralement en forme de corolle, campanulé, tubiforme ou rotacé, généralement caduc au-dessus de l'ovaire; corolle absente. Androcée de 1 — beaucoup d'étamines; filets filiformes, distincts ou unis à la base, souvent de longueur inégale; anthères biloculaires s'ouvrant par des scissures longitudinales. Gynécée d'un seul carpelle; ovaire uniloculaire, supère, mais environné par le tube calicinal, sessile ou pourvu d'un court pédicelle; style grêle; stigmate généralement capité; ovule solitaire, dressé, campylotrope. Fruit: un anthocarpe, indéhiscent, charnu, coriacé ou dur, angulaire, garni de côtes ou crénelé. Graine dressée à testa hyalin, libre ou adnée au péricarpe; endosperme variable; embryon dressé ou courbé. [*Nyctaginaceæ*].

x. Plantes herbacées:

2x. Involucre voyant composé de 3 à 5 bractées ou plus, distinctes ou unies:

3x. Involucre caliciforme, bractées unies *Mirabilis*, p. 106

3x. Involucre de 3-5 ou plus de bractées, bractées distinctes *Allionia*, p. 107

2x. Involucre absent ou imparfait, 2 ou 3 bractéoles à chaque fleur *Boerhaavea*, p. 106

x. Plantes arborescentes ou arbustives:

2x. Bractées très colorées, plantes plus ou moins grimpantes: *Bougainvillea*, p. 107

2x. Bractées absentes ou peu frappantes:

3x. Plantes pourvues d'épines, parfois grimpantes; étamines ne projetant pas au-delà du tube de la corolle *Pisonia*, p. 107

3x. Plantes inermes; étamines projetant au-delà du tube de la corolle *Neea*, p. 107

Mirabilis L.

Herbes. Feuilles opposées. Fleurs disposées en cymes. Bractées formant un involucre calicinal à 5 lobes; lobes dressés, imbriqués, non développés après la floraison. Péricarpe avec un long tube rétréci et caduc au-dessus de l'ovaire, limbe déployé, pentaloqué, plissé; étamines 5-6, de longueur inégale, exsertes, filets connés à la base en forme de coupe charnue; ovaire avec style exsert, stigmate capitellé, couvert de papilles pédicellées. Anthocarpe crustacé; testa de la graine adhérent au péricarpe; embryon courbé, cotylédons environnant un endosperme farineux.

M. jalapa L. «Belle-de-nuit», appelé «Four-o'clock» en anglais.

Boerhaavea L.

Herbes dressées, diffusés ou grimpantes, ligneuses à la base. Feuilles opposées. Fleurs très petites, sessiles ou subsessiles disposées en panicules ou pourvues d'une longue tige dans les ombelles pédonculées, avec de toutes petites bractées. Péricarpe rétréci au-dessus du tube persistant, limbe infundibuliforme ou campanulé, bord pentaloqué, plissé, caduc; étamines 2, rarement 3, filets connés à la base; ovaire élargi à la base, stigmate pelté sur le style. Anthocarpe petit, garni de côtes; graine adhérent au péricarpe; embryon incurvé; cotylédons grands, plats.

B. erecta L. Forme *subepunctata* Heimerl.

B. paniculata L. C. Rich. Var. *leiocarpa* Heimerl.

B. coccinea Mill.

B. viscosa Lag. et Rodr.

B. scandens L. «Cassé zo.»

Allionia L.

Herbes pubescentes, déprimées, annuelles ou vivaces, à tiges bifurquées. Feuilles opposées, limbes inégaux, entiers, pétioles. Fleurs blanches ou roses, 3 dans chaque involucre; involucre caliciforme, solitaires dans les axes, pédonculés, bractées inégales. Calice membraneux, tube oblique, rétréci au-dessus de l'ovaire, limbe dilaté à lobes inégaux; étamines 4, exsertes, filets très grêles; ovaire uniloculé; style filiforme, stigmate capité. Fruit coriacé, avec une aile ferme, lisse d'un côté et pourvu de 2 rangées de tubercules sur l'autre. Graine emplissant le péricarpe auquel adhère le testa, endosperme farineux.

A. incarnata L.

Bougainvillea Commers.

Plantes sarmenteuses. Feuilles alternes, pétioles, ovées ou elliptiques, lancéolées. Fleurs petites et non voyantes, enveloppées de grandes bractées pourpres ou rouges, généralement 3 ensemble, les pédoncules adnés à la nervure médiane de la bractée. Tube du péricarpe généralement vert, limbe à 5-6 lobes, rose ou jaune; étamines 7-8 ne projetant pas au-delà du tube de la corolle, filets inégaux; ovaire stipité, style latéral. Akène garni de 5 côtes.

B. glabra Choisy.

B. spectabilis Willd.

B. intermedia Heimerl. «Bougainvillier.»

Pisonia L.

Arbres ou arbustes. Feuilles opposées ou partiellement alternes. Fleurs petites, avec 2-3 bractéoles toutes petites, disposées en groupes, en cymes paniculées, corymbiformes, dioïques. Péricarpe à 5 dents, celui de la fleur mâle variant de la forme tubulaire-campanulée à celle d'un entonnoir, le péricarpe de la fleur femelle est oblong-tubulaire. Fleur staminée: étamines 6-10, filets inégaux légèrement à la base, — exsertes; ovaire petit, stérile. Fleurs femelles: ovaire style grêle et stigmate capité ou multifide, exsert; étamines courtes et stériles. Anthocarpe induré ou quelque peu charnu extérieurement; utricule allongée ou ellipsoïdale membraneuse. Testa de la graine hyalin, adhérent au péricarpe; embryon dressé, cotylédons larges, minces.

P. fragrans Dumont Cours. «Palo perico» (St-Domingue) d'après Urban.

P. obtusata Jacq. Var. *domingensis* Heimerl.

P. domingensis Heimerl. «Bois cassave», Morne à Cabrits.

P. ligustrifolia Heimerl.

P. brevipetiolata (Heimerl. Urb. Morne à Cabrits.

P. ochracea Heimerl. Santo Domingo.

P. rotundata Griseb.

P. albida (Heimerl.) Standl. Var. *glutinosa* Heimerl. Près de Ganthier.

P. albida (Heimerl.) Standl. Var. *platyphylla* Heimerl.

P. aculeata L. «Croc chien.»

P. discolor Spreng. Ile de la Tortue. Var. *carnosa* Ehm. et Heimerl. Ile de la Navase.

Neea Ruiz. et Pav.

Arbres ou arbustes. Feuilles opposées. Fleurs petites avec 3 bractéoles toutes petites, dioïques. Inflorescence variée. Fleurs mâles: péricarpe tubulaire-campanulé, légèrement urcéolé, à 5 dents; étamines avec anthères stériles

insérées à la base de l'ovaire; style ne projetant pas, stigmate pénicillé à la bouche du périlanthe. Anthrocarpe quelque peu charnu extérieurement, couronné par le périlanthe persistant.

N. coccinea (Sw) Heimerl. Var. *cubacteolata* Heimerl.

N. coccinea (Sw) Heimerl. Var. *hirtifolia* Heimerl.

N. subcoccinea Heimerl.

N. demissa Heimerl.

N. collina Heimerl. Près de Port-de-Paix.

Famille 50. BATIDACEÆ

Arbustes maritimes avec tiges dressées ou rampantes, ramifiées. Feuilles opposées, charnues, semi-cylindriques, linéaires ou claviformes, entières, sessiles, dépourvues de stipules. Fleurs petites, dioïques, disposées en cônes axillaires. Cônes staminés avec écailles persistantes, imbriquées, chaque écaille sous-tendant une fleur; calice bilobé, en forme de coupe; étamines 4-5 insérées à la base du calice, filets épais, alternant avec les staminodes, anthères introrsées, les sacs attachés les uns aux autres au-dessus du milieu. Cônes pistillés pédonculés, à 4-12 fleurs, les écailles caduques; calice et corolle absents; étamines et staminodes absents; ovaire sessile, quadraloculaire; stigmate sessile, en forme de coussin, légèrement bilobé; ovule 1 dans chaque loge, dressé, anatrope. Fruit agrégé, quadraspermé, provenant de l'inflorescence pistillée. Graines dressées, claviformes, légèrement courbées; testa membraneux; endosperme absent; embryon de même forme que la graine, cotylédons grands.

Batis L.

Les caractères de la famille conviennent au genre.

B. maritima L.

Famille 51. PHYTOLACCACEÆ

Arbustes ou herbes, parfois ligneuses à la base, généralement glabres. Feuilles alternes, entières, stipules absentes ou petites. Fleurs disposées en racemes terminaux ou axillaires, généralement vertes ou blanches avec bractées et 2 bractéoles. Fleurs hermaphrodites. Périlanthe avec 4 ou 5 segments imbriqués dans le bourgeon, persistant; pétales absents, excepté dans le genre *Stegnosperma*. Etamines aussi nombreuses que les segments du périlanthe et alternes, ou plus nombreuses et insérées irrégulièrement ou opposées et en succession réciproque; filets généralement persistants et anthères caduques. Ovaire libre, composé d'un ou de plusieurs carpelles uniovulés (excepté le genre *Microtea*); style court ou absent; ovules à tiges courtes basilaires. Fruit formé d'un carpelle, — une baie — ou de plusieurs carpelles. Graines dressées (enveloppées d'un arille dans le genre *Stegnosperma*). Embryon annulaire ou semi-annulaire, environnant l'endosperme, (excepté dans les genres *Petiveria* et *Stegnosperma*); cotylédons foliacés ou semi-cylindriques, parfois l'un beaucoup plus grand que l'autre, convolutés ou repliés sur eux-mêmes.

x. Périlanthe unisériel:

2x. Segments du périlanthe 4:

3x. Fruit sphérique:

4x. Etamines 4; stigmate capité *Rivina*, p. 109

4x. Etamines 8-16; stigmate pénicillé *Trichostigma*, p. 109

3x. Fruit allongé, avec crochets défléchis au

sommet..... *Petiveria*, p. 109

2x. Segments du périlanthe 5:

3x. Ovaire uniloculaire avec 2 stigmates ... *Microtea*, p. 110

- 3x. Ovaire pluriloculaire, avec autant de stigmates que de loges *Phytolacca*, p. 109
x. Périlanthe comprenant calice et corolle *Stegnosperma*, p. 110

Rivina L.

Herbes dressées, arbustives à la base. Feuilles alternes ou presque opposées sur des branches raccourcies. Fleurs hermaphrodites disposées en racemes; bractées et bractéoles très petites, caduques. Périlanthe corollé, à 4 segments, ceux-ci développés dans le fruit; étamines 4; ovaire unicarpellé, style court, stigmate capité. Fruit: une baie sphérique à péricarpe charnu; embryon annulaire, environnant un endosperme farineux; cotylédons convolutés.

R. humilis L. «Caïmoncillo» (St-Domingue), d'après Urban.

Trichostigma A. Rich.

Sous-arbrisseaux dressés ou grimpants. Feuilles alternes ou presque opposées sur des branchettes raccourcies; stipules très petites, caduques. Fleurs hermaphrodites, disposées en racemes axillaires et terminaux; bractées caduques, bractéoles persistantes. Périlanthe herbacé à 4 segments, ceux-ci se développant légèrement dans le fruit et dirigés en arrière; étamines 8-16; ovaire unicarpellé, stigmate sessile, pénicillé. Fruit: une baie sphérique à péricarpe charnu; embryon annulaire environnant un endosperme farineux.

T. octandrum (L) H. Walt. «Liane barrique» ou «Bonbon coq d'Inde» (Haïti), «Pabellon de rez» (St-Domingue).

Petiveria L.

Herbes, s'enracinant profondément, arbustives à la base, avec forte odeur d'ail. Feuilles alternes, entières; stipules très petites. Fleurs hermaphrodites en épis axillaires et terminaux, ceux-ci solitaires ou deux ensemble, dressés ou nutants. Périlanthe à 4 segments légèrement développés dans le fruit; étamines 4-8 périgynes; ovaire unicarpellé, ellipsoïdal, tomenteux, pourvu de 4 appendices en forme de croc, défléchis au sommet; stigmate sessile, pénicillé sur la face ventrale. Fruit allongé — cunéaire, couvert jusqu'au milieu inférieur d'un périlanthe persistant, avec 4 petits lobes dont chaque extrémité porte un crochet défléchi. Graine dressée, linéaire, adhérent au péricarpe; endosperme étrié; embryon dressé; cotylédons foliacés, inégaux, le plus petit extérieur, roulés sur eux-mêmes; radicule vigoureuse.

P. alliacea L. «Avé» ou «Feuilles avé» (Haïti), «Anamû» (St-Domingue), d'après Urban.

Phytolacca L.

Plantes herbacées ou arbustives à la base, dressées (dans les espèces des Antilles). Feuilles alternes, entières. Fleurs hermaphrodites (dans les espèces des Antilles), disposées en racemes au début terminaux, plus tard opposés aux feuilles. Périlanthe de 5 segments; étamines 8-20 (espèces des Antilles), insérées à la base du périlanthe; ovaire de 8-12 carpelles, styles aussi nombreux que les carpelles, ovules solitaires dans les loges. Fruit charnu au dehors. Graines quelque peu réniformes, comprimées; embryon annulaire, environnant un endosperme farineux; cotylédons semi-cylindriques; radicule longue.

P. thyrsiflora Fenzl.

P. rivinoïdes Kunth, et Bouché.

P. purpurascens A. Braun et Bouché.

P. icosandra L. «Moco de pavo» (St-Domingue), d'après Urban.

Stegnosperma Benth.

Arbuste dressé. Feuilles alternes. Fleurs hermaphrodites disposées en racemes à l'extrémité des branches. Calice avec 5 segments qui s'élargissent dans le fruit; pétales 5; étamines 10, unies à la base en un anneau périgyne, persistantes dans le fruit; ovaire uniloculaire, la loge environnant une colonne centrale; stigmates 3-5; ovules aussi nombreux que les stigmates, basilaires, dressés. Capsule globulaire, dure et cassante, pourvue de 3-5 angles, uniloculaire, 3-5 valves à la base, avec 1 à 5 graines. Graines enveloppées d'un arille blanc, charnu, l'enveloppe externe crustacée, l'enveloppe interne épaisse, membraneuse; embryon étroit; cotylédons aplatis, égaux; radicule cylindrique.

S. halimifolia Benth.

Microtea Sw.

Herbes annuelles. Feuilles alternes, entières. Fleurs très petites, disposées en racemes terminaux et axillaires, hermaphrodites. Péricarpe avec 5 segments; étamines 5-8, unies à la base; ovaire uniloculaire, bicarpellaire; stigmates 2; ovule solitaire. Fruit sphérique, tuberculifère. Embryon semi-annulaire, environnant l'endosperme; cotylédons plats-concaves, l'un 2 fois aussi grand que l'autre; radicule épaisse et courte.

M. debilis Sw.

Famille 52. AIZOACEÆ

Herbes annuelles ou vivaces, avec sève aqueuse et tissus généralement succulents; tiges souvent ramifiées à la base, les branches radiées, parfois rampantes. Feuilles le plus souvent opposées, alternes ou apparemment verticillées. Fleurs parfaites, polygames ou unisexuées, régulières. Calice de 4-5 sépales, corolle absente (dans les espèces des Antilles). Androcée de 4-5 étamines hypogynes ou périgynes, parfois plus nombreuses ou moins nombreuses; anthères biloculaires. Gynécée de 2 ou de plusieurs carpelles unis; ovaire 2 — beaucoup de loges, ou uniloculaire par suppression, supère; stigmates ou styles aussi nombreux que les loges de l'ovaire; ovules 1 — beaucoup. Fruit: une capsule circonscissile ou loculicide, rarement en forme de baie ou de noix. Graines: solitaires ou nombreuses; endosperme abondant; embryon courbé; cotylédons étroits.

x. Hypanthium absent ou presque absent; capsule loculicide:

2x. Plantes couvertes de poils radiés. Étamines

5-10.

2x. Plantes glabres. Étamines 3-5. **Glinus**, p. 111

x. Hypanthium manifeste, cylindrique, turbiné ou campanulé; capsule circonscissile:

2x. Stipules présentes. Ovaire biloculaire ou uniloculaire par suppression:

3x. Sépales dépourvus d'appendices. Étamines 1-3.

3x. Sépales appendiculés. Étamines 5-10. **Gypselea**, p. 111

2x. Stipules absentes. Ovaire 3-5 loges. **Trianthema**, p. 111

Sesuvium, p. 111

Mollugo L.

Herbes annuelles, dressées ou diffuses, glabres. Feuilles radicales ou caulinaires et apparemment verticillées; stipules absentes ou très rares, membraneuses, bientôt caduques. Inflorescence raccourcie en ombellules sessiles aux nœuds ou en cymes paniculées avec pédoncules en forme de hampes. Fleurs pédonculées; péricarpe de 5 segments persistants, vert à bords scarieux; étamines 3-5, hypogynes, persistantes; ovaire triloculaire, styles 3-5, ovules

nombreux attachés à l'angle interne. Capsule enveloppée par le péricarpe, triloculaire, trivalvée à déhiscence loculicide. Graines nombreuses, dépourvues d'arille.

M. verticillata L.

M. nudicaulis Lam.

Glinus L.

Herbes annuelles, tiges rampantes, très ramifiées. Feuilles alternes ou apparemment verticillées, inégales, entières. Fleurs disposées en cymes pauciflores ou réunies en bouquets. Péricarpe avec 5 segments, vert à bords scarieux; étamines 3-5, insérées à la partie inférieure du péricarpe; ovaire 3-5 loges, supère, styles très courts ou absents, stigmates parfois sessiles, ovules nombreux. Capsule loculicide avec 3-5 valves. Graines nombreuses, pédonculées; arille présent au hile avec un appendice libre en forme de tige environnant la graine.

G. radiatus (R. et P.) Rhorb.

Sesuvium L.

Herbes vivaces, parfois plantes quelque peu arbustives, ramifiées, succulentes. Feuilles opposées, charnues, linéaires ou oblongues. Fleurs axillaires; péricarpe persistant, soudé en dessous en forme de coupe, pentalobé, lobes mucronés près du sommet, colorés à l'intérieur; étamines nombreuses (dans les espèces des Antilles), filets insérés au sommet de la coupe du péricarpe; ovaire libre, 3-5 loges; styles 3-5, distincts, filiformes; ovules nombreux. Capsule oblongue, 3-5 loges, circonscissile. Graines nombreuses dans chaque loge.

S. portulacastrum L. «Pourpier bord de mer», d'après Urban.

Trianthema L.

Herbes diffuses, rampantes. Feuilles opposées, entières, la paire inégale; pétiole long, avec base engainante. Fleurs axillaires avec 2 bractéoles; péricarpe avec 5 lobes, mucroné près du sommet, coloré à l'intérieur; étamines 5 ou beaucoup; ovaire libre, uniloculaire et uniloculaire (dans les espèces des Antilles). Capsule uniloculaire avec 6-8 graines, circonscissile, l'opercule incomplètement fermée à la base par une fausse cloison transverse, enfermant 1 ou 2 graines. Embryon annulaire.

T. portulacastrum L.

Cypselæa Turp.

Herbes à racines allongées. Feuilles opposées, inégales dans chaque paire avec stipules scarieuses, laciniées. Fleurs axillaires; sépales 4-5, dressés, verts, inégaux, dépourvus d'appendices; hypanthium campanulé; étamines 1-3, alternes avec les sépales, filets plus courts que le calice; ovaire biloculaire ou uniloculaire par suppression, supère; styles dressés, généralement 2; ovules nombreux. Capsule circonscissile; graines très petites, dépourvues de caroncules, se détachant du funicule dressé qui reste attaché au placenta central.

C. humifusa Turp.

Famille 53. PORTULACACEÆ

Herbes plus ou moins charnues. Feuilles alternes ou subopposées. Fleurs solitaires ou groupées au sommet des tiges et des branches ou disposées en panicules terminales ou en racemes, régulières, hermaphrodites. Sépales 2, adnés à l'ovaire à la base ou libres, caducs ou presque persistants; pétales 4-6. Étamines insérées avec les pétales et souvent adnés à eux à la base, indéfinies. Ovaire libre ou semi-infère, uniloculaire, avec placentation basilaire, centrale; styles de 3-7 branches stigmatiques. Capsule circonscissile ou

trivalvée. Graines nombreuses réniformes, comprimées; embryon courbé autour de l'endosperme.

- x. Fleurs solitaires ou groupées au sommet des branches. Ovaire semi-infère..... **Portulaca**, p. 112
- x. Fleurs en forme de grappes ou de panicules
Ovaire libre..... **Talinum**, p. 112

Talinum Adams.

Herbes glabres. Stipules absentes. Fleurs en panicules ou en grappes terminales; sépales herbacés, caducs ou presque persistants; pétales 5; étamines 10-30, adhérent à la base des pétales; ovaire libre, style trifide. Capsule trivalvée.

- T. triangulare** (Jacq) Willd. «Onze heures.»
- T. panniculatum** (Jacq) Gaertn. «Onze heures.»
- T. domingense** Urb. et Ekm. Massif de la Sellé.

Portulaca L.

Herbes annuelles, diffuses ou ascendantes, les feuilles les plus hautes généralement involuquées tout autour des fleurs terminales; stipules scarieuses, très petites ou converties en poils. Fleurs solitaires ou groupées au sommet de la tige et des branches, jaunes, pourpres ou rosées, s'ouvrant seulement durant la matinée; calice caduc; pétales 4-6, libres, délicats; étamines 8-25, insérées à la base des pétales; ovaire semi-infère, style divisé près de la base en 5-7 parties. Capsule circonscissile.

- P. oleracea** L. «Coupe-pied» ou «Poupier.» Var. *parvifolia* (Haw) Griseb.
- P. pilosa** L.
- P. phaeosperma** Urb.
- P. halimoides** L.
- P. quadrifida** L.

Famille 54. BASELLACEÆ

Herbes charnues, vivaces, grimpantes. Rhizomes tubéreux. Feuilles alternes, généralement pétiolées, larges, entières, le plus souvent charnues, glabres. Fleurs bisexuées, régulières, disposées en racemes, petites, pourvues de 2 bractées. Sépales 2, parfois adnés à la base de la corolle; pétales 5, distincts ou quelque peu soudés, persistants, restant fermés. Étamines 5, opposées aux pétales. Ovaire supère, uniloculaire, uniovulé; styles généralement 3, avec stigmates entiers ou fendus. Fruit indéhiscent, enfermé dans la corolle.

- x. Fleurs sessiles..... **Basella**, p. 112
- x. Fleurs pédicellées..... **Boussingaultia**, p. 112

Basella L.

Herbes charnues, annuelles ou bisannuelles, cultivées comme ornement; lianes glabres, volubiles. Fleurs petites, sessiles, disposées en bouquets sur des pédoncules allongés et épaissis dans une inflorescence ouverte, ramifiée. Sépales quelque peu carénés, mais non ailés dans le fruit. Filets dressés dans le bourgeon.

- B. rubra** L.
- B. alba** L.

Boussingaultia H. B. K.

Lianes vivaces, herbacées, cultivées comme ornement; tiges très ramifiées. Fleurs petites, pédicellées, disposées en racemes épiés, axillaires et terminaux. Sépales presque plats, non ailés. Filets penchés de l'autre côté du bourgeon. Stigmates obtus. Cotylédons larges, plano-convexes.

- B. leptostachys** Moq. «Vigne vierge.»

Famille 55. CARYOPHYLLACEÆ

Herbes généralement charnues à tiges renflées aux nœuds. Feuilles opposées, généralement unies à la base. Inflorescence en forme de cymes. Fleurs régulières, généralement parfaites; sépales 4-5, persistants, libres ou soudés; pétales 4-5 ou rarement absents. Étamines 8-10 ou rarement moindres. Styles 2-5 libres ou plus ou moins soudés; ovaire supère, uniloculaire (rarement 2-5 loges) à placenta libre, central ou basilaire; ovules nombreux. Fruit: généralement une capsule.

- x. Sépales libres ou très courtement soudés à la base:
 - 2x. Style simple en dessous et divisé en 3 au-dessus:
 - 3x. Pétales bilobés..... **Drymaria**, p. 114
 - 3x. Pétales petits, entiers ou parfois crénelés..... **Polycarpon**, p. 114
 - 2x. Styles distincts à partir de la base:
 - 3x. Pétales entiers..... **Arenaria**, p. 114
 - 3x. Pétales bilobés:
 - 4x. Styles 5..... **Cerastium**, p. 113
 - 4x. Styles 3..... **Stellaria**, p. 113
- x. Sépales soudés en calice tubulaire denté:
 - 2x. Styles 5:
 - 3x. Calice et corolle soudés..... **Agrostemma**, p. 113
 - 3x. Calice et corolle distincts..... **Melandryum**, p. 113
 - 2x. Styles 3..... **Silene**, p. 113

Agrostemma L.

Herbes annuelles avec tiges verticales. Feuilles opposées, limbes étroits, sessiles. Fleurs parfaites; calice lanugineux, tube de 10 ou beaucoup de nervures; corolle voyante, pétales 5, limbes plus courts que les lobes du calice; étamines 10; ovaire uniloculaire, styles 5 alternant avec les lobes du calice. Capsule uniloculaire s'ouvrant par des valves en forme de dents. Graines noires.

- A. githago** L.

Silene L.

Herbes. Calice tubulaire, muni de 5 dents et de 10 nervures; pétales 5, avec un onglet étroit avec ou sans couronne; étamines 10; réceptacle allongé au-dessus des pétales; ovaire uniloculaire, styles 3 distincts à partir de la base. Capsule à 3-4 loges à la base, s'ouvrant au sommet par six dents. Embryon périphérique.

- S. venosa** (Gil.) Aschers.

Melandryum Roehl.

Herbes. Calice ovoïde, tubulaire ou renflé, nu à la base, muni de 5 dents et de 10 nervures; pétales 5, à onglet étroit, le limbe entier bifide ou laciné, généralement couronné; étamines 10; styles 5, rarement 4, alternes avec les pétales; ovaire multiovulé. Capsule déhiscente au sommet avec 5 ou 10 dents.

- M. album** (Mill.) Garcke.

Stellaria L.

Herbes. Fleurs axillaires ou disposées en cymes terminales. Sépales 5, bifides; étamines 10, insérées sur un disque; ovaire uniloculaire; styles 3, distincts à partir de la base. Capsule à 6 valves.

- S. antillana** Urb. Var. *domingensis* Urb.

Cerastium L.

Herbes. Fleurs en cymes terminales, dichotomes, souvent reserrées. Sépales 5; pétales 5; bifides; étamines 10; ovaire uniloculaire; styles 5; distincts

à partir de la base, opposés aux sépales. Capsule cylindrique, s'ouvrant au sommet par 10 dents, multispermée.

C. glomeratum Thuill.

Arenaria L.

Herbes. Fleurs en cymes feuillées terminales, paniculées ou solitaires, axillaires. Sépales 5; pétales 5; étamines 10; insérées sur un disque; ovaire uniloculaire, styles 3. Capsule profondément tripartite, pareille à une capsule de 6 valves.

A. lanuginosa (Mich.) Rohrb.

Drymaria Willd.

Herbes. Feuilles pourvues de petites stipules scarieuses. Fleurs disposées en cymes terminales. Sépales 5; pétales 5; bifides; étamines 5-2, opposées aux sépales; ovaire uniloculaire; style simple à la base, trifide au-dessus. Capsule trivalvée.

D. cordata (L.) Willd. «Appétit marron.»

Polycarpon Loeff.

Herbes. Feuilles pourpres, de petites stipules scarieuses. Fleurs disposées en cymes ramifiées, resserrées, pourvues de bractées scarieuses. Pétales 5; étamines 3-5.

P. tetraphyllum L.

Ordre XXIV. RANUNCULALES

Herbes, arbustes ou arbres. Feuilles normales, souvent de 2 formes sur les plantes aquatiques; limbes simples, ou parfois composés. Fleurs parfaites, monoïques ou dioïques, disposées de différentes manières. Calice et corolle formés de pièces distinctes et séparées. Androcée formé d'étamines généralement hypogynes, celles-ci sont la plupart du temps plus nombreuses que les sépales. Gynécée uni, carpellé ou pluricarpellé; carpelles distincts ou rarement plus ou moins soudés; ovaire supère. Fruits variés.

x. Plantes essentiellement aquatiques:

2x. Feuilles peltées 56. *Nymphaeaceae*, p. 114

2x. Feuilles linéaires ou à divisions linéaires, verticillées 57. *Ceratophyllaceae*, p. 115

x. Plantes terrestres, parfois humicoles:

2x. Etamines généralement nombreuses et indéfinies; les sacs de l'anthère s'ouvrent par scissure:

3x. Feuilles simples, entières:

4x. Pétales absents 62. *Myristicaceae*, p. 119

4x. Pétales présents:

5x. Sépales 3; fleurs hermaphrodites:

6x. Sépales plus ou moins unis à la base, valvés 61. *Anonaceae*, p. 118

6x. Sépales libres, imbriqués 60. *Magnoliaceae*, p. 117

5x. Sépales 4-6, souvent en deux séries; fleurs unisexuées 59. *Menispermaceae*, p. 116

3x. Feuilles divisées, pennées, lobées ou composées 58. *Ranunculaceae*, p. 115

2x. Etamines généralement définies (souvent 2, 6 ou 9) les sacs de l'anthère s'ouvrent par valves 63. *Lauraceae*, p. 120

Famille 56. NYMPHAEACEÆ

Herbes aquatiques, rhizomateuses, portant des feuilles peltées et des hampe uniflores. Fleurs grandes et voyantes. Sépales généralement 4; pétales et étamines nombreux, insérés sur le réceptacle auquel s'unissent souvent les

carpelles; anthères à déhiscence interne; carpelles nombreux, libres ou soudés; ovules pendants. Graines souvent arillées.

x. Feuilles et fleurs flottantes. Feuilles fendues presque au milieu *Nymphaea*, p. 115

x. Feuilles et fleurs développées au-dessus de l'eau. Feuilles non fendues *Nelumbo*, p. 115

Nelumbo Adans.

Feuilles et fleurs développées hors de l'eau. Feuilles non fendues, peltées. Sépales, pétales et étamines insérés à la base du réceptacle; connectif des anthères produit en forme d'un appendice émoussé; carpelles enfermés dans des creux sur le sommet du réceptacle; ovules 1 ou 2 dans les carpelles, pendant du sommet. Graines dépourvues de périsperme et d'endosperme.

N. lutea (W.) Pers. [*N. jamaicensis* DC]. «Water bean» à la jamaïque, d'après Fawc. et Rendle.

Nymphaea L.

Feuilles et fleurs flottantes; feuilles fendues presque au milieu. Pétales et étamines en nombreuses séries sur le réceptacle; filets pétaloïdes, les filets externes larges avec de petites anthères, les filets internes étroits avec des anthères plus longues; ovaire semi-infère, pluriloculaire; ovules nombreux, pendants. Fruit, une baie spongieuse, mûrissant sous l'eau. Graines arillées.

N. ampla (Salisb.) P. DC. Var. *plumieri* Planch. Var. *speciosa* (Mart. et Zucc.) Casp. Var. *pulchella* (P. DC.) Casp.

N. amazonum Mart. et Zucc.

N. jamesoniana Planch.

Famille 57. CERATOPHYLLACEÆ

Herbes aquatiques, submergées, pourvues de longues branches feuillées. Feuilles verticillées, bifides ou dichotomes, avec des divisions linéaires, souvent dentées. Fleurs solitaires, monoïques, sessiles dans l'axe des verticilles; périanthe de 6-12 divisions égales, étroites. Fleurs mâles: étamines 10 à 20; anthères presque sessiles, dépassant légèrement le périanthe, biloculaires, extrorsées; connectif produit en un appendice épais, coloré, généralement pourvu de 2 ou 3 dents. Fleurs femelles: ovaire 1, sessile, ovoïde uniloculaire; style long, stigmatique; ovule 1, pendant. Fruit: une noix indéhiscente; péricarpe coriace ou durci, souvent pourvu de 3 ou de plusieurs épines. Graines dépourvues d'endosperme; embryon avec cotylédons oblongs, égaux; plumule bien développée avec plusieurs feuilles.

Ceratophyllum L.

Les caractères de la famille conviennent à l'ordre.

C. demersum L. «Crin.»

Famille 58. RANUNCULACEÆ

Herbes ou arbustes grimpants. Feuilles radicales et alternes ou opposées. Fleurs parfaites ou unisexuées. Sépales généralement 5 ou 4, hypogynes, libres, souvent pétaloïdes, décidus, imbriqués ou valvés; pétales aussi nombreux que les sépales ou quelques-uns ou tous absents, imbriqués; étamines nombreuses, hypogynes, libres; carpelles variant de peu à beaucoup, avec un ovule. Fruit: un akène. Plantes montagneuses en Haïti.

x. Herbes:

2x. Pétales présents et voyants portant une fossette nectarifère ou une écaille à leur base *Ranunculus*, p. 116

2x. Pétales absents. Fleurs petites et très nombreuses *Thalictrum*, p. 116

x. Arbustes grimpants *Clematis*, p. 116

Clematis L.

Arbustes grimpants. Feuilles opposées, généralement ternées ou pinnées; pétiole tournant en sens contraire. Fleurs polygamo-dioïques disposées en panicules. Sépales 4 pétaloïdes, valvés; pétales absents; ovule pendant. Akènes capités, chacun terminé par une longue arête penniforme.

- C. dioeca L. «Liane bon garçon.»
- C. picardæ Urb.
- C. flammulastrum Griseb.
- C. barahonensis Urb.
- C. fuertesii Urb.

Ranunculus L.

Herbes annuelles ou vivaces. Feuilles lobées ou composées. Fleurs solitaires ou disposées en cymes, jaunes. Sépales 5, imbriqués; pétales généralement 5, glandulaires, près de la base; ovule ascendant. Akènes capités, pourvus d'un court bec.

- R. cubensis Griseb.
- R. recurvatus Poir.
- R. parviflorus L. Massif de la Selle.
- R. flagelliformis Smith.
- R. domingensis Urb. et Ekm. Barahona.

Thalictrum L.

Herbes dressées et le plus souvent élevées, vivaces. Feuilles composées ternées et décomposées. Fleurs parfaites ou unisexuées, petites, nombreuses, disposées en panicules profuses ou en racemes. Pétales absents; sépales 4-5 parfois pétaloïdes, généralement décidus; étamines nombreuses, fréquemment voyantes; carpelles peu nombreux, uniovulés.

- T. domingense Urb.

Famille 59. MENISPERMACEÆ

Arbustes ou arbres grimpants. Feuilles alternes, dépourvues de stipules, entières; pétiole enflé au-dessous du limbe. Fleurs très petites, cymeuses, disposées en panicules ou racemes, dioïques. Sépales et pétales dissemblables par le nombre, disposés en verticilles dimères ou trimères, parfois solitaires. Étamines 4 ou 6 dans la fleur mâle (parfois indéfinies), staminodes variés dans la fleur femelle (dans nos genres 6 ou absents), filets libres ou soudés. Carpelles 3 ou 1, ovule solitaire. Fruit drupacé. Graine en forme de fer à cheval.

- x. Feuilles ovées ou elliptiques. Fleurs femelles avec staminodes..... **Hyperbæna**, p. 116
- x. Feuilles un peu rondes, cordées, ou avec 3-7 lobes. Fleurs femelles sans staminodes:
 - 2x. Stigmate trifide..... **Cissampelos**, p. 117
 - 2x. Stigmate entier..... **Disciphania**, p. 116

Disciphania Eichl.

Plantes volubiles. Feuilles cordiformes, le plus souvent avec 3-7 lobes. Epis simples. Sépales 6. Pétales pressés, disposés en disque. Filets très courts. Fruit, une drupe avec des côtes sur le bord et dans la ligne médiane.

- D. domingensis Urb. «Calebassier zombi» d'après Urban.

Hyperbæna Miers.

Arbres ou arbustes grimpants. Feuilles ovées, elliptiques ou oblongues, coriaces. Fleurs mâles, disposées en panicules grêles, les branches cymeuses; fleurs femelles en grappes plus simples. Bractées et bractéoles très menues,

poilues. Sépales 6, en 2 séries, les sépales internes mesurent à peu près le double des sépales externes; pétales 6, plus courts que les sépales; étamines 6, libres, dans les fleurs mâles, staminodes 6, dans les fleurs femelles; carpelles 3, avec des styles en forme de hameçon. Fruit: une drupe.

- H. domingensis (P. DC.) Benth.
- H. pruinosa Urb. et Ekm.
- H. glauciramis Urb. et Ekm.
- H. lindmanii Urb. «Bois coq.»
- H. pellucida Urb. et Ekm.
- H. brevipes Urb. et Ekm.
- H. salicifolia Urb. et Ekm.
- H. apiculata Urb. et Ekm.

Cissampelos L.

Arbustes grimpants. Feuilles rondelettes ou presque rondes ovées, presque cordées, peltées ou avec un pétiole inséré au bord. Fleurs mâles en cymes paniculées-corymbeuses; fleurs femelles généralement en groupes, à l'axe des bractées rondelettes. Fleurs staminées: sépales 4; pétales soudés en forme d'une coupe courte; étamines connées en colonne, peltées au sommet avec 4 anthères sessiles sur le bord. Fleurs femelles: sépale 1; pétale 1; opposé au sépale et plus court que lui; carpelle 1; styles trilobés, les lobes parfois bilobés. Fruit: une drupe presque globulaire, plus ou moins hispide.

- C. pareira L. Var. caapeba (L.) Griseb. «Liane patte cheval.»

Famille 60. MAGNOLIACEÆ

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, le plus souvent entières à nervation pennée, stipulées ou dénuées de stipules. Fleurs parfaites, souvent grandes et voyantes, solitaires ou fasciculées. Sépales 2-6; pétales 6 beaucoup; étamines généralement nombreuses, avec anthères adnées; carpelles nombreux et imbriqués sur un réceptacle allongé; ovules 1 ou 2 parfois plusieurs. Fruit: un follicule ou une samare, souvent allongé en forme de cône.

- x. Stipules présentes et proéminentes, enveloppant les bourgeons. Carpelles nombreux, imbriqués sur un réceptacle en forme d'épi:
 - 2x. Réceptacle portant les carpelles, sessile dans l'inflorescence..... **Magnolia**, p. 117
 - 2x. Réceptacle portant les carpelles, manifestement pédicellé dans l'inflorescence..... **Michelia**, p. 117
- x. Stipules absentes; carpelles peu nombreux en un seul verticille..... **Illicium**, p. 118

Magnolia L.

Grands arbres. Feuilles pétiolées, persistantes ou décidues, le plus souvent entières. Fleurs généralement très voyantes, blanches, jaunes, roses ou pourpres, apparaissant avec ou avant les feuilles, solitaires, terminales. Sépales 3 et pétales 6 à 12. Fruit ressemblant à un cône.

- M. domingensis Urb. Massif du Nord.

Michelia L.

Ce genre se distingue du genre **Magnolia** par l'inflorescence qui est le plus souvent axillaire; le réceptacle qui porte le carpelle ou gynophore est distinctement pédicellé dans l'inflorescence. Ovules généralement plus de 2 dans chaque carpelle.

- M. champaca L. «Ylang-Ylang» Pétienville.

Illicium L.

Arbustes ou arbrisseaux aromatiques, toujours verts, glabres. Feuilles alternes, souvent agglomérées, sans stipules; limbes coriacés, entiers, parsemés de petits points. Fleurs parfaites, solitaires sur des pédoncules axillaires. Sépales 3-6, pétaloïdes, membraneux, imbriqués, bisériés, décidus; pétales nombreux, en 3 ou plusieurs séries, les internes graduellement plus étroits, décidus; étamines nombreuses, plurisériées; carpelles nombreux (6-18), distincts, sessiles, aplatis, insérés en un verticille sur un réceptacle conique; style recourbé; ovule solitaire, ascendant. Fruit: un verticille de follicules durs et crustacés, à déhiscence longitudinale, ressemblant à une drupe. Graine solitaire; testa brillant et lisse.

I. parviflorum Michx. Massif du Nord près de Marmelade.

Famille 61. ANNONACEÆ

Arbustes ou arbres. Feuilles alternes, entières, dépourvues de stipules. Fleurs terminales ou opposées aux feuilles ou axillaires, solitaires ou réunies en bouquets, hermaphrodites. Sépales 3, plus ou moins soudés à la base, valvés; pétales 6, en 2 séries, légèrement imbriqués, la série interne parfois très petite ou tout à fait absente. Etamines généralement nombreuses sur l'épais réceptacle; connectif produit au-delà des loges de l'anthère. Carpelles nombreux ou 1 à 6, libres ou quelque peu soudés; ovule 1, dressé ou 2 à 8 attachés à la suture ventrale. Carpelles charnus, libres ou unis en un seul grand fruit. Graines avec endosperme abondant; embryon très petit situé près du hile.

x. Pétales, au moins les pétales externes, imbriqués:

2x. Carpelles 5; appendice du connectif terminé en longue pointe (conique) **Oxandra**, p. 118

2x. Carpelles nombreux; appendice du connectif élargi **Guatteria**, p. 119

x. Pétales valvés:

2x. Fruit formé de nombreux carpelles étroitement unis en une masse ovoïde ou sphéroïde. Ovule solitaire:

3x. Pétales connés en un tube de 3 ou de 6 lobes, les pétales externes pourvus d'un appendice en forme d'aile **Rollinia**, p. 119

3x. Pétales non connés, les pétales externes non pourvus d'appendices **Annona**, p. 119

2x. Fruit formé de carpelles distincts, généralement stipités, jamais unis pour présenter une forme polygonale. Ovules géminés ou nombreux en 1 ou 2 séries: **Cananga**, p. 119

Oxandra A. Rich.

Arbres ou arbustes. Fleurs solitaires ou agrégées, axillaires ou latérales. Bractées nombreuses, semblables aux sépales, mais plus petites, imbriquées en 2 rangées, insérées soit de la base au sommet du pédoncule, soit seulement dans un involucre à la base. Sépales imbriqués; pétales 6 en 2 séries, imbriqués, les pétales internes légèrement plus courts que les pétales externes, dressés-divergents; étamines nombreuses, connectif produit au-dessus des anthères extrorses en un long appendice conique; réceptacle convexe; carpelles nombreux, distincts; ovule 1, dressé. Baie ellipsoïdale, pétiolée.

O. lanceolata (Sw.) Baill. «Yaya boba» (St-Domingue), d'après Urban; «Bois de lance» (Haïti).

O. laurifolia (Sw) A. Rich. «Yaya» (St-Domingue), d'après Urban.

Guatteria R. et P.

Arbres ou arbustes. Pédoncules uniflores, axillaires, solitaires ou fasciculés, pubescents. Fruit composé de nombreuses baies stipitées.

G. blainii (Griseb.) Urb. «Bois noir»

Cananga Hook. f. et Thoms.

Arbres. Fleurs plutôt grandes en faisceaux axillaires. Sépales 3, ovés et valvés; pétales 6 en 2 séries, longs et plats et presque égaux; étamines nombreuses, agglomérées; anthères avec connectifs prolongés en pointe; carpelles nombreux en deux séries. Fruits charnus, oblongs, stipités, plurispermés.

C. odorata Hook f. et Thoms. «Ilang-Ilang» en anglais.

Annona L.

Arbrisseaux ou arbustes. Fleurs solitaires généralement, pédonculées, terminales ou opposées aux feuilles. Sépales menus; pétales de la série externe charnus, plus ou moins partiellement fermés, les pétales internes quelque peu semblables ou plus petits ou absents; réceptacle hémisphérique; carpelles nombreux, souvent soudés; ovule solitaire, dressé. Fruit grand, formé de carpelles unis.

A. muricata L. «Corossol» (Haïti), «Guanabana» ou «Guanavana» (St-Domingue) d'après Urban.

A. montana Macf. «Corossol zombi» (Haïti), «Guanabana cimarrona» ou «Guanavana» (St-Domingue).

A. glabra L. «Corossol marron» ou «Mammier»

A. squamosa L. «Cachiman cannelle»

A. reticulata L. «Cachiman cœur bœuf»

A. cherimola Mill. «Cachiman la Chine», le meilleur fruit du monde au dire de certains.

A. micrantha Bertero.

A. bicolor Urb. «Guanabanita» (St-Domingue).

A. rosei Safford. «cachiman zombi»

A. cascarilloides R. E. Tr. 2

A. haitiensis R. E. Tr.

A. helicoidea Ekm.

A. gracilis R. E. Tr.

A. urbaniana R. E. Tr. «Cachiman marron»

A. frutescens R. E. Tr.

Rollinia Saint-Hil.

Arbres à branches brunâtres. Feuilles oblongues ou elliptiques-acuminées. Fleurs solitaires, pourvues d'un long pédoncule.

R. mucosa (Jacq.) Baill. «Anon» ou «Candongo» (St-Domingue), d'après Urban.

Famille 62. MYRISTICACEÆ

Arbres à feuilles alternes, entières, dépourvues de stipules. Fleurs petites dioïques, régulières, disposées en fascicules axillaires ou en ombelles. Calice trilobé, corolle absente; étamines 2-30, monadelphes; ovaire 1, sessile et supère, libre, uniloculaire, uniovulé; style court ou absent. Fruit charnu, s'ouvrant par 2 valves, rarement par 4. Graine recourverte d'un arille charnu, laciné.

Myristica L.

Caractères principaux de la famille. Feuilles généralement blanches ou glauques en dessous, les 3 nervures non parallèles et souvent cachées au-dessus. Filets unis en forme de colonne; anthères allongées et connées.

M. fragrans Houtt. «Muscade» (Haïti), «Nutmeg» en anglais.

Famille 63. LAURACEÆ

Arbres ou arbustes aromatiques, persistants, exception faite du genre *Cassytha* qui est une herbe volubile parasite, de couleur jaune verdâtre, ressemblant beaucoup au *Cuscuta* spp. (Amitié). Feuilles alternes, persistantes, glandulaires, ponctuées, dépourvues de stipules, entières. Fleurs parfaites ou unisexuées, petites, vertes ou jaunes, généralement cymeuses, ombellées ou capitées; limbe du périanthe généralement pourvu de 6 lobes; corolle absente; étamines et staminodes deux fois aussi nombreux que les segments et opposés à eux, disposés en 2 ou 4 séries; anthères dressées, pourvues de 2 ou 4 loges. Fruit: une baie ou une drupe, monosperme. Dans cette famille, les fleurs sont généralement nécessaires pour la détermination des genres et des espèces.

- x. Arbres ou arbustes feuillés:
 - 2x. Anthères biloculaires:
 - 3x. Etamines 9..... *Hufelandia*, p. 120
 - 3x. Etamines 3, soudées..... *Misanteca*, p. 120
 - 2x. Anthères quadriloculaires (au moins celles de l'anneau externe):
 - 3x. Staminodes grands, sagittés:
 - 4x. Sépales généralement décidus:
 - 5x. Feuilles pourvues de 3 fortes nervures à partir de la base..... *Cinnamomum*, p. 121
 - 5x. Feuilles à nervation pennée..... *Persea*, p. 121
 - 4x. Sépales persistants..... *Phœbe*, p. 121
 - 3x. Staminodes des étamines internes, très petits ou absents, parfois en forme d'un stipe:
 - 4x. Loges de l'anthère appariées, une paire au-dessus de l'autre..... *Ocotea*, p. 121
 - 4x. Loges de l'anthère insérées presque à la même hauteur..... *Nectandra*, p. 121
- x. Herbes volubiles, parasites, les feuilles représentées par de petites écailles..... *Cassytha*, p. 122

Hufelandia Nees.

Arbustes ou arbres. Feuilles elliptiques ou ovées, aiguës ou acuminées, vertes, glabres. Périanthe de 6 lobes; étamines parfaites 9, celles de la 1ère et de la 2ème séries églanuleuses; anthères biloculaires, introrsées, les anthères de la 3ème série extrorsées; filets pourvus chacun de 2 glandes à la base. Fruit: une baie ellipsoïdale, sans cupule; pédicelle quelque peu épaissi.

H. pendula (Sw.) Nees.

Misanteca Cham. et Schl.

Arbres presque glabres, avec de grandes feuilles, celles-ci pourvues d'un court pétiole, acuminées. Périanthe de 6 lobes; étamines parfaites 3, unies en tube, glandulaires en dessous; anthères biloculaires. Fruit: une grande baie oblongue-ellipsoïdale ou ovoïde, enveloppée par le tube élargi du périanthe affectant la forme d'une cupule.

M. triandra (Sw.) Mez. «Laurier jaune» (Haïti), «*Sigua prieta*» (St-Domingue) d'après Urban, «Sweet wood» (Jamaïque) d'après Fawc. et Rendle.

Cinnamomum Blume.

Arbres ou arbustes. Feuilles opposées ou parfois alternes, pourvues de 3 fortes nervures à partir de la base. Fleurs petites, généralement bisexuées ou parfois polygames et alors les fleurs mâles sont plus petites que les fleurs femelles, disposées en panicules axillaires ou subterminales. Tube calicinal court, périanthe de 6 segments presque inégaux; étamines parfaites 9 ou moindres en 3 séries dissemblables, la 4ème formée de staminodes; anthères quadriloculaires; ovaire sessile. Fruit: une baie.

C. camphora Nees. et Eberm. «Camphor tree» en anglais.

C. zeylanicum Breyn. «Cannelle», «Cinnamon tree», en anglais.

Persea Mill.

Arbres généralement. Feuilles quelque peu coriacées, généralement pubescentes en dessous. Fleurs disposées en panicules pédonculées, axillaires ou subterminales. Périanthe à 6 lobes, les 3 lobes externes souvent plus petits que les lobes internes; étamines parfaites 9, celles de la 1ère et de la 2ème séries églanuleuses, celles de la 3ème série avec une glande de chaque côté à la base; anthères extrorsées, quadriloculaires. Fruit: petit ou souvent très grand.

P. americana Mill. «Zaboca» ou «Avocat» (Haïti), «Aguacale» en espagnol, «Avocado pear» ou «Alligator pear» en anglais.

P. domingensis Mez.

P. krugii Mez. «Pêche marron», d'après Urban.

Phœbe Nees.

Arbres ou arbustes. Feuilles généralement grandes, glabres ou pubescentes, pétioles. Fleurs paniculées, périanthe à 6 lobes; étamines parfaites 9, celles de la 1ère et de la 2ème séries églanuleuses avec des anthères introrsées quadriloculaires, celles de la 3ème série chacune avec 2 glandes à la base, les anthères extrorsées quadriloculaires.

P. elongata (Vahl.) Nees.

P. montana (Sw.) Griseb. «Laurier rose» (Haïti), «Laurel» (St-Domingue), d'après Urban.

Ocotea Aubl.

Arbres ou arbustes avec feuilles coriacées. Fleurs disposées en panicules axillaires ou subterminales. Périanthe pourvu de 6 lobes; étamines parfaites 9, celles de la 1ère et de la 2ème séries églanuleuses, les anthères introrsées, quadriloculaires, celles de la 3ème série excessivement petites ou parfois absentes. Fruit globulaire ou ellipsoïdal enveloppé au début dans le tube induré du périanthe, plus tard exert.

O. floribunda (Sw.) Mez. «Laurier puant» (Haïti), «Laurel» ou «Laurel blanco» (St-Domingue), d'après Urban.

O. leucoxydon (Sw.) G. de la Maza, «Laurier» (Haïti), «Laurel» (St-Domingue) d'après Urban, «White wood» ou «Loblolly sweet wood» (Jamaïque).

O. cuneata (Griseb.) Urb.

Nectandra Rottb.

Arbres ou arbustes avec feuilles coriacées. Fleurs disposées en cymes pédonculées, axillaires ou terminales. Périanthe pourvu de 6 lobes; étamines parfaites, celles de la 1ère et de la 2ème séries églanuleuses, les anthères quadriloculaires, introrsées, celles de la 3ème série avec des glandes à la base, les anthères quadriloculaires extrorsées.

N. sintenisii Mez.

N. antillana Meissn. «Laurier grandes feuilles» (Haïti), «Laurel» (St-Domingue) d'après Urban.

N. membranacea (Sw.) Griseb.

N. patens (Sw.) Griseb. «Cap-berry», «Sweet wood» (Jamaïque).

N. oligoneura Urb.

N. coriacea (Sw.) Griseb. «Laurier blanc» (Haïti), «Laurel» ou «Sigua blanca» (St-Domingue), d'après Urban, «Sweet wood» ou «Small-leaved-sweet-wood» (Jamaïque).

Cassytha L.

Herbes grimpantes, parasites; tiges volubiles grêles, adhérant au moyen de suçoirs (haustoria). Feuilles représentées par de toutes petites écailles. Fleurs disposées en épis ou en racemes. Périanthé à 6 lobes, les 3 externes beaucoup plus petits; étamines parfaites 9, les étamines externes é glanduleuses et les anthères biloculaires introrsés, les étamines internes glanduleuses et les anthères uniloculaires extrorsés; staminodes grands. Fruit globulaire, enveloppé du tube calicinal succulent et couronné par les segments persistants.

C. americana Nees. «Liane amitié» (Haïti), «Fides» (St-Domingue) d'après Urban.

Ordre XXV. PAPAVERALES

Herbes ou rarement arbustes ou arbres, souvent doués de propriétés acrimoneuses et de suc colorés. Feuilles variées, généralement normales; limbes souvent disséqués. Fleurs parfaites, parfois régulières; corolle et calice présents, les pièces distinctes et séparées; androcée formé de plusieurs étamines hypogynes; gynécée formé de 2 ou de plusieurs carpelles soudés; ovaire supérieur. Fruit capsulaire ou baccare.

- x. Sépales 2 ou très rarement 3 ou 4. Endosperme présent 64. Papaveraceæ, p. 122
- x. Sépales 4-8. Endosperme absent:
 - 2x. Capsules biloculaires. Etamines 6, tétradynames 66. Brassicaceæ, p. 125
 - 2x. Capsules uniloculaires. Etamines non tétradynames lorsqu'elles se trouvent au nombre de 6:
 - 3x. Feuilles à limbes simples ou composés-palmés. Gynécée bicarpellaire 65. Capparidaceæ, p. 123
 - 3x. Feuilles à limbes composés pinnés. Gynécée tricarpele. 67. Moringaceæ, p. 128

Famille 64. PAPAVERACEÆ

Herbes, parfois arbustes, souvent à suc coloré. Feuilles alternes, souvent lobées, stipules absentes. Fleurs hermaphrodites, régulières (irrégulières dans le genre *Fumaria*). Sépales 2 ou 3, libres, imbriqués, très caducs; pétales 4-6 ou absents, hypogynes, libres, imbriqués, décidus; étamines hypogynes, nombreuses, libres; ovaire libre, uniloculaire, à placentation pariétale. Fruit capsulaire s'ouvrant par pores ou par valves.

- x. Fleurs régulières; étamines 8 ou nombreuses, suc généralement laiteux ou coloré:
 - 2x. Pétales absents. *Bocconia*, p. 123
 - 2x. Pétales présents:
 - 3x. Limbes des feuilles inermes *Papaver*, p. 123
 - 3x. Limbes des feuilles armés d'épines, dentés. *Argemone*, p. 123
- x. Fleurs irrégulières. Etamines 6, suc généralement aqueux. *Fumaria*, p. 123

Bocconia L.

Herbes ou arbustes à suc d'un jaune sombre. Fleurs en panicules terminales très ramifiées. Sépales 2; pétales absents; étamines 8-24; placentas de l'ovaire 2; ovule solitaire, dressé à partir de la base; stigmates 2, divergents. Capsules s'ouvrant par 2 valves à partir de la base, laissant le replum persistant. Graine couverte obliquement d'un arille mou, pulpeux, à la base; endosperme charnu.

B. frutescens L. «Bois codine» ou «Bois coq» (Haïti), «Yagrumo macho» (St-Domingue), d'après Urban, «John Crow brush», «Parrot weed» ou «Celandine» (Jamaïque) d'après Fawc. et Rendle.

Papaver L.

Herbes annuelles, bisannuelles ou vivaces, rarement sous-arbrisseaux hispides ou glauques avec jus laiteux. Feuilles lobées ou disséquées. Fleurs voyantes, solitaires sur de longs pédoncules, les bourgeons inclinés. Sépales 2, rarement 3; pétales généralement 4; étamines beaucoup. Capsule globulaire, ovale ou oblongue s'ouvrant au-dessous du sommet par des pores transverses placés entre les placentas qui font saillie au milieu de la capsule, les stigmates réunis en un disque persistant, rayonnant.

P. rhoeas L. «Pavot» (Haïti), «Corn poppy» en anglais, «Coquelicot» ou «Pavot rouge» en français.

Argemone L.

Herbes glaucescentes, rarement arbustives, avec un suc d'un jaune clair. Feuilles sessiles, inciso-pinnatifides, avec dent épineuse. Ovaire avec 4-7 placentas; ovules nombreux; stigmates distincts. Capsule s'ouvrant par 4-7 valves courtes, au sommet laissant un replum d'autant de placentas filiformes. Embryon cylindrique.

A. mexicana L. «Chadron béni» (Haïti), «Cardosanto» (St-Domingue) d'après Urban; «Prickly poppy», «Cambodge thistle», «Mexican thistle», (Jamaïque) d'après Fawc. et Rendle.

Fumaria L.

Par suite de certaines grandes différences morphologiques, comme il est indiqué dans la clé ci-dessus, certains auteurs ont placé le genre *Fumaria* et 4 autres (qui ne se trouvent pas en Haïti) dans une famille distincte, appelée *Fumariaceæ*.—Herbes annuelles, glauques, à suc aqueux. Feuilles alternes, finement disséquées. Fleurs irrégulières, parfaites, blanches ou roses, disposées en racemes terminaux ou latéraux. Sépales 2, squameux; pétales 4, en 2 séries dissemblables, la série externe éperonnée; étamines 6, en 2 séries. Fruit: une noix monosperme.

F. muralis Sonder.

Famille 65. CAPPARIDACEÆ

Herbes annuelles, arbustes ou arbres à suc aqueux. Feuilles alternes, simples ou composées-digitées. Stipules souvent présentes. Fleurs hermaphrodites, régulières ou irrégulières. Sépales 4, libres ou plus ou moins soudés; pétales 4; étamines nombreuses, non tétradynames lorsqu'elles sont peu nombreuses; ovaire pédicellé, rarement sessile, uniloculaire ou multiloculaire avec de nombreux ovules campylotropes à placentation pariétale. Fruit: une capsule bivalvée, plurisperme, ou une baie.

- x. Herbes (parfois plus ou moins arbustives). Fruit capsulaire:

- 2x. Etamines libres:
 3x. Etamines 6, rarement 4, toutes fertiles, égales..... **Cleome**, p. 124
 3x. Etamines 4—beaucoup, toutes non fertiles, inégales:
 4x. Etamines 4, parfois beaucoup, mais 2 ou plusieurs fertiles..... **Polanisia**, p. 124
 4x. Etamines 4, mais une seule fertile... **Dactylaena**, p. 124
 2x. Etamines attachées au gynophore..... **Gynandropsis**, p. 124
 x. Arbres ou arbustes. Fruit baccifère:
 2x. Pétales absents..... **Forchhammeria**, p. 125
 2x. Pétales présents:
 3x. Feuilles simples:
 4x. Sépales connés. Fruit grand, sessile, à péricarpe dur..... **Morisonia**, p. 125
 4x. Sépales distincts ou presque distincts. Fruit à péricarpe charnu..... **Capparis**, p. 125
 3x. Feuilles composées (trifoliées)..... **Crataeva**, p. 125

Cleome L.

Herbes ou plantes quelque peu arbustives. Feuilles simples ou composées de 3–7 folioles. Calice avec 4 dents ou lobes ou sépales 4, libres; pétales sessiles ou ongiculés; réceptacle court; étamines 4–6. Fruit: une capsule. Graines reniformes.

- C. spinosa** Jacq. «Masembey» (St-Domingue) d'après Urban, «Caya» (Haïti).
C. pubescens Sims. «Caya» (Haïti).
C. erosa Urb.
C. serrata Jacq.
C. christii Urb.
C. aculeata L.
C. procumbens Jacq.
C. ciliata Schum. et Thonn.

Gynandropsis P. DC.

Herbes annuelles. Feuilles composées de 3–7 folioles. Racemes feuillés. Sépales divergents, décadus; pétales obovés, ongiculés, imbriqués ou ouverts; réceptacle hémisphérique à la base et produit au milieu une sorte de gynophore pétiolé auquel s'unissent les filets des 6 étamines; filets libres au-dessus; ovaire pétiolé. Fruit: une capsule allongée, pétiolée.

- G. gynandra** (L.) Briquet, «Caya» (Haïti) d'après Urban.

Dactylaena Schrad.

Herbes annuelles ou vivaces glandulaires. Feuilles petites, trifoliolées. Fleurs non brillantes, blanches ou roses, disposées en grappes. Calice caduc; pétales elliptiques; disque annulaire élargi postérieurement; étamines 4, les 3 placées derrière sont des staminodes, celle placée en avant est fertile; filet court. Gynophore très court.

- D. ekmanii** Helwig.

Polanisia Rafin.

Herbes annuelles. Feuilles simples ou composées de 3–9 folioles, les supérieures en forme de bractées. Sépales libres ou soudés à la base, décadus. Pétales sessiles ou ongiculés, imbriqués; réceptacle petit; étamines 8–30, hypogynes, inclinées dans le bourgeon. Capsules longues, sessiles ou pétiolées.

- P. viscosa** (L.) P. DC.

Morisonia L.

Arbuste ou arbrisseau pubescent, la pubescence épars, radiée ou squameuse. Feuilles pourvues d'un long pétiole, oblongues ou ovées-oblongues, longues, obtuses ou aiguës, très épaisses, luisantes, presque glabres. Fleurs disposées en corymbes latéraux, assez grandes, blanches; pétales 4. Fruit baccifère, plurisperme, globulaire, brunâtre et raboteux au dehors.

- M. americana** L.

Capparis L.

* Arbres ou arbustes glabres ou pubescents, la pubescence souvent radiée ou squameuse. Feuilles simples, pétiolées généralement épaisses et coriaces. Fleurs généralement grandes et blanches, pédicellées, corymbueuses. Sépales 4; pétales 4. Fruit: une baie subglobulaire, allongée ou siliquiforme, à péricarpe pulpeux, indéhiscence ou s'ouvrant irrégulièrement ou se fendant en 3 ou 4 valves, mais dépourvu de replum. Graines nombreuses ou peu, enfouies dans la pulpe.

- C. cynophallophora** L. «Bois Sénégal», «Bois caca» ou «Bois d'argent» (Haïti), «Olivo» ou «Frijol» (St-Domingue).
C. ferruginea L. «Balai velours» ou «Bois Sénégal»
C. comosa Jacq. «Bois Sénégal»
C. baducca L.
C. flexuosa L. «Mostazo» (St-Domingue) d'après Urban, «Bois rave» (Haïti).
C. eustachiana Jacq. «Palo de Maco» (St-Domingue), d'après Urban.
C. dolichopoda Helwig.
C. amplissima Lam.
C. gonaïvensis Helwig.

Crataeva L.

Arbustes ou arbres. Feuilles décidues, pourvues d'un très long pétiole, folioles 3. Fleurs disposées en forme de racemes ou de corymbes; étamines longues-exertes; pétales 4; étamines 8–20. Fruit: une baie grande, pourvue d'un long support.

- C. apetala** Urb.

Forchhammeria Liebm.

Arbres glabres ou pubescents. Feuilles simples ou composées, pétiolées. Fleurs petites, disposées en grappes ou en panicules; étamines nombreuses.

- F. sphærocarpa** Krug. et Urb.
F. brevipes Urb.

Famille 66. BRASSICACEÆ

Herbes annuelles ou vivaces à jus aqueux. Feuilles simples, alternes; dans un grand nombre d'espèces, les feuilles radicales sont roncées et les feuilles caulinaires auriculées à la base; stipules absentes. Fleurs réunies en grappes, souvent en corymbes, généralement terminales, hermaphrodites. Calice formé de 4 sépales en 2 séries, les 2 sépales latéraux souvent un peu renflés (bossus) à leur base; corolle formée de 4 pétales égaux, disposés en croix. Etamines 6, deux latérales à filet court, 4 rapprochées 2 à 2 ont un filet allongé (tétradynames). Ovaire bicarpellaire, uniloculaire surmonté d'un style court terminé par 2 stigmates antéropostérieurs; placentation marginale, pariétale. Fruit: une capsule étroite, allongée, bivalvée; il s'ouvre par la séparation de la paroi externe des 2 loges qui laisse intact le cadre placentaire, chargé de graines appliquées de part et d'autre de la fausse cloison; ce fruit s'appelle **silique**.

Le fruit demeure court dans un certain nombre de genres où sa longueur

ne dépasse pas son diamètre, il s'appelle alors *silicule*; dans ce cas, le nombre d'ovules peut s'abaisser jusqu'à un dans chaque loge. Certains membres de cette famille possèdent un fruit indéhiscence, renflé au niveau des graines et qui peut se fragmenter à maturité en autant de segments qu'il contient de graines.

Cette famille produit des plantes alimentaires de grande importance cultivées pour leurs feuilles, par exemple, les choux, le cresson, etc., et pour leurs racines, le radis, etc.

- x. Fruit aplati ou comprimé en sens inverse de la cloison. *Silicule*:
 - 2x. Gousses cunéiformes, non ailées **Capsella**, p. 127
 - 2x. Gousses orbiculaires ou obovées ailées au moins au sommet **Lepidium**, p. 126
- x. Fruit ni aplati, ni comprimé en sens inverse de la cloison. *Silique*:
 - 2x. Gousses cylindriques ou prismatiques:
 - 3x. Gousse à déhiscence régulière:
 - 4x. Gousse principalement garnie à l'extrémité d'un style court ou style absent; fruit non rostré:
 - 5x. Fruit cylindrique ou presque cylindrique:
 - 6x. Graines 2, dans chaque cavité de la gousse **Nasturtium**, p. 126
 - 6x. Graine 1, dans chaque cavité de la gousse **Sisymbrium**, p. 127
 - 5x. Fruit quadrilatéral ou quadrangulaire **Barbarea**, p. 127
 - 4x. Gousse remarquablement rostrée:
 - 5x. Gousse indéhiscence **Raphanus**, p. 128
 - 5x. Gousse déhiscence biloculaire:
 - 6x. Fruit avec bec plat et en forme de sabre **Sinapis**, p. 127
 - 6x. Fruit avec bec cylindrique ou conique:
 - 7x. Graines globulaires en une seule rangée dans chaque loge **Brassica**, p. 127
 - 7x. Graines ovoïdes en 2 rangées dans chaque loge **Diplotaxis**, p. 128
 - 3x. Gousse avec cloisons transversales, se séparant par des nœuds **Cakile**, p. 127
 - 2x. Gousses aplaties ou comprimées parallèlement à la grande cloison **Cardamine**, p. 128

Nasturtium Br.

Herbes ramifiées. Feuilles pennées-lobées, pinnatifides ou entières. Fleurs petites, blanches ou jaunes; étamines 6 (ou 1-6). Siliques étroites, valves turgescentes, septum hyalin. Graines petites, turgescentes en 2 rangées, cotylédons accombants.

- N. palustre** (Leyss.) DC. Subs. *hispidum* (Desv.) Fish et May. Var. *glabrum* O. E. Schulz.
- N. aquaticum** L. «Cresson.»
- N. pyrenaicum** (L.) R. Br.
- N. portoricense** Spreng.

Lepidium L.

Herbes dressées. Fleurs petites, blanches. Sépales courts, égaux à la base; pétales égaux, entiers, spatulés ou obovés; étamines 6, légèrement tétradynames, ou seulement 2; ovaire sessile, biloculaire; ovules solitaires dans les

loges. Fruit: une silicule comprimée — orbiculaire. Graine dans chaque loge pendant à proximité du sommet.

L. virginicum L. «Cresson danois.»

Sisymbrium L.

Herbes annuelles ou vivaces avec branches dressées, ramifiées. Feuilles alternes, parfois basilaires; limbes entiers, lobés ou pinnatifides. Fleurs parfaites disposées en grappes. Sépales 4; corolle blanche, rose ou jaune; pétales 4, généralement onguiculés; étamines 6; ovaire sessile, style court ou absent, stigmate parfois bilobé, ovules nombreux. Silicule allongée, presque cylindrique, souvent rétrécie entre les graines. Graines en une rangée dans chaque loge.

S. officinale (L.) Scop. «Moutarde» var. *liocarpum* DC.

S. ekmanii O. E. Schulz.

S. haïtienne O. E. Schulz.

Sinapis L.

Herbes caulescentes avec feuillage pubescent, rugueux. Feuilles alternes lobées ou pinnatifides. Fleurs parfaites en racemes ou panicules. Sépales étendus; corolle le plus souvent jaune, les 4 pétales dépassant les sépales; étamines 6, filets non dentés; ovaire sessile, style persistant, ovules nombreux. Gousses allongées, presque cylindriques, resserrées entre les graines, souvent hispides, prolongées en un bec en forme de sabre contenant parfois une graine. Graines épaisses ou subglobulaires, sans bord et sans aile; cotylédons conduqués.

S. arvensis L.

Barbarea R. Br.

Herbes dressées, glabres, ramifiées avec tiges angulées. Feuilles pinnatifides ou lyratées. Fleurs petites d'un jaune clair ou jaune verdâtre, disposées en racemes allongés. Stigmates presque entiers, capités. Fruit long, linéaire, muni de 4 côtes ou de 4 angles, dressés ou s'étalant; valves en forme de quille. Graines disposées en une rangée, accombantes.

B. præcox (Sm.) R. Br.

Cakile Gærtn.

Herbes charnues, glabres. Feuilles alternes, limbes entiers ou pinnatifides. Fleurs parfaites, disposées en racemes. Sépales dressés, quelque peu gibbeux à la base; pétales 4 surpassant les sépales; étamines 6, filets non dentés; ovaire sessile, style absent, stigmate entier, ovule solitaire. Silicule indéhiscence, pourvue de 2 nœuds, les nœuds uniloculaires, uniovulés ou le nœud inférieur pourvu de 2 graines.

C. lanceolata (W.) O. E. Schulz, subsp. *domingensis* (Tuss.) O. E. Schulz.

Capsella Medik.

Herbes ramifiées. Feuilles radicales. Fleurs petites, blanches, en racemes terminaux et axillaires avec les pétales changés parfois en étamines; sépales égaux à la base. Silicules comprimées latéralement, valves en forme de bateau, quillées. Graines nombreuses, en 2 rangées. Cotylédons incombants.

C. bursa pastoris (L.) Medik. Massif de la Selle près Petit-Goâve.

Brassica L.

Herbes dressées, les feuilles radicales pinnatifides. Racemes longs, dépourvus de feuilles; fleurs généralement jaunes. Sépales 4, parfois égaux à la base; pétales 4, onguiculés; étamines 6, filets libres, dépourvus d'appendices; ovaire

sessile, style persistant, stigmate tronqué ou bilobé; ovules nombreux. Siliques allongées, cylindriques ou quadrangulaires, chaque angle prolongé en forme de bec conique indéhiscant, les valves pourvues de 1 à 3 nervures. Graines en une rangée dans chaque loge.

B. campestris L. «Chou.» *Foma auriculata* (P. DC.) O. E. Schulz.

B. oleracea L. «Chou.»

B. integrifolia (P. DC.) O. E. Schulz. «Chou moutarde» ou «Chou rave.»

B. urbaniana O. E. Schulz.

B. napus L. Massif du Nord.

Diploaxis DC.

Herbes annuelles ou vivaces, rarement sous-arbrisseaux. Feuilles pinnatifides. Fruit avec pédicelle grêle, parfois pendant. Sépales étendus ou dressés; pétales jaunes, parfois violets ou blancs avec des nervures violettes. Fruit elliptique ou elliptique-lancéolé devenant plat, avec nervure médiane distincte sans être trop proéminente. Graines petites en 2 rangées.

D. muralis (L.) DC.

Cardamine L.

Herbes annuelles ou vivaces à tiges dressées ou failles et rampantes. Feuilles alternes, limbes entiers ou pinnatifides. Fleurs parfaites en racemes ou en panicules. Sépales 4 égaux ou presque égaux; corolle blanche ou rose ou pourpre, pétales 4, rétrécis en forme d'onglet; étamines 6 ou rarement 4; ovaire sessile, style court ou allongé, stigmate capité ou bilobé, ovules nombreux. Silique allongée, étroite, aplatie, souvent dressée, les valves dépourvues de nervures ou presque sans nervures s'ouvrant élastiquement à maturité. Graines appliquées sur une rangée, comprimées.

C. africana L.

C. jamesonii Hook.

C. impatiens L.

C. hirsuta L.

C. flexuosa With. subsp. *debilis* (D. Don) O. E. Schulz, subsp. *pennsylvanica* (Muhlenb.) O. E. Schulz. «Cresson savanne» (Haïti).

Raphanus L.

Herbes annuelles ou vivaces, glabres ou avec des poils éparpillés, très ramifiées. Feuilles le plus souvent lyrées-lobées ou pinnatifides. Fleurs le plus souvent voyantes, blanches, roses, pourpres, jaunâtres, pourvues d'un grêle pédoncule, disposées en grappes rameuses; sépales latéraux quelque peu gibbeux; étamines libres, dépourvues d'appendice; style grêle, avec stigmate légèrement lobé. Fruit: une longue silique cylindrique, indéhiscante, plus ou moins étrécie entre les graines, avec un long bec. Graines globulaires.

R. sativus L. «Radis.» var. *radicula* Pers. «Radis marron.»

R. raphanistrum L. Massif du Nord près de Marmelade.

Famille 67. MORINGACEÆ

Arbres gommifères dont la racine a un goût âcre. Feuilles alternes 2 ou 3, imparipennées, les folioles obovées, entières, caduques; stipules absentes ou apparaissant comme des glandes à la base des pétioles et des folioles. Fleurs bisexuées, irrégulières, périgynes, disposées en panicules axillaires, blanches ou rouges. Sépales 5, inégaux, divergents — réflexes, imbriqués; pétales 5, de même forme que les sépales, les 2 supérieurs plus petits, les latéraux ascendants, l'antérieur plus grand. Étamines 5, alternant avec 5 staminodes; anthères uniloculaires. Ovaire supère et stipité, uniloculaire avec 3 placentas

pariétaux; style tubulaire, s'ouvrant au sommet; ovules nombreux, attachés en 2 rangées aux placentas. Fruit: une capsule allongée, pourvue d'un bec, s'ouvrant par 3 valves qui portent de nombreuses graines, sur une seule rangée, le long du milieu de chaque valve. Graines larges, pourvues de 3 ailes ou dépourvues d'ailes.

Moringa Juss.

Les caractères de la famille conviennent au genre.

M. oleifera Lam. «Benzolive» (Haïti), «Horse radish tree» en anglais, commun.

Ordre XXVI. ROSALES

Herbes, arbustes, arbrisseaux, arbres (rarement plantes tout-à-fait aquatiques) ou sarments. Feuilles avec limbes simples ou composés. Fleurs le plus souvent parfaites. Calice et corolle présents et parfois irréguliers ou les deux rarement absents; sépales distincts ou soudés en partie, généralement unis à la base de l'hypanthium. Androcée de plusieurs étamines le plus souvent épigynes ou périgynes. Gynécée de 1 ou de plusieurs carpelles distincts ou unis. Fruits variés.

x. Fruit non en forme de gousse (légume):

2x. Corolle absente..... 69. **Brunelliaceæ**, p. 130

2x. Corolle présente:

3x. Corolle de 4 pétales ou de 4 lobes, (rarement 5 pétales). Feuilles opposées:

4x. Fruit de 4 follicules uniloculaires.

Plantes succulentes..... 68. **Crassulaceæ**, p. 129

4x. Fruit: une petite capsule bivalvée, biloculaire. Plantes non succulentes

70. **Cunoniaceæ**, p. 130

3x. Corolle de 5 pétales. Feuilles alternes:

4x. Fleurs périgynes. Feuilles stipulées, mais les stipules parfois caduques

71. **Rosaceæ**, p. 130

4x. Fleurs hypogynes. Feuilles dénuées de stipules:

5x. Étamines 10..... 72. **Connaraceæ**, p. 133

5x. Étamines 4..... 73. **Krameriaceæ**, p. 133

x. Fruit: une gousse (légume)..... 74. **Leguminosæ**, p. 134

Famille 68. CRASSULACEÆ

Herbes, généralement charnues et succulentes. Feuilles succulentes. Fleurs hermaphrodites, régulières, généralement en inflorescences cymeuses. Calice libre, persistant, quadrilobé dans le genre *Bryophyllum*; pétales aussi nombreux que les sépales, libres ou plus ou moins soudés. Étamines périgynes, égales aux pétales ou 2 fois plus nombreuses. Carpelles aussi nombreux que les pétales, libres ou soudés à la base, avec une écaille à la base de chaque carpelle: stigmate capité; ovules nombreux, attachés à la suture ventrale en 2 ou plusieurs rangées. Follicules uniloculaires avec beaucoup ou peu de graines, s'ouvrant par la suture ventrale. Graines excessivement petites, marquées de petits points; endosperme charnu, souvent étrié.

Bryophyllum Salisb.

Herbes vivaces, élevées, charnues. Feuilles opposées, impari-pennées ou simples, folioles 1-5, elliptiques, crénelées. Fleurs grandes, nutantes, disposées en cymes paniculées, multiflores. Calice campanulé, renflé, à 4 lobes courts, valvés; corolle urcéolée ou sub-campanulée, à 4 lobes courts; étamines 8, en 2 séries insérées sur le tube de la corolle; carpelles 4. Graines nombreuses.

B. pinnatum (Lam.) S. Kurz. «Loup-garou» (Haïti), «Hierba de brujo» (St-Domingue) d'après Urban.

Famille 69. BRUNELLIACEÆ

Arbres. Feuilles opposées ou 3 dans un verticille, simples, trifoliées ou imparipennées, avec de très petites stipules décidues. Fleurs en panicules corymbiformes axillaires et terminales. Fleurs plutôt petites, dioïques ou polygames. Calice divisé près de la base en 4-5 parties, valvé, coloré; corolle absente; disque adné au calice, avec 8-10 lobes. Fleurs mâles: étamines 8-10, insérées à la base du disque; ovaire rudimentaire. Fleurs femelles ou hermaphrodites: carpelles 4-5, distincts, uniloculaires; styles subulés avec stigmates simples; ovules 2, collatéraux. Capsules 4 ou 5, ou moindres par avortement, bivalvées avec 1 ou 2 graines. Graines avec endosperme charnu; cotylédons plats.

Brunellia Ruiz et Pav.

Caractères de la famille.

B. comocladifolia H. et B. «Bois Mabel» (Haïti), «West Indian Sumach» (Jamaïque) d'après Fawc. et Rendle.

Famille 70. CUNONIACEÆ

Arbustes ou arbres. Feuilles opposées ou verticillées, stipulées, simples ou composées. Fleurs petites, parfois polygames ou dioïques. Sépales 4-5; pétales aussi nombreux que les sépales et généralement aussi grands. Étamines 2 fois plus nombreuses, rarement aussi nombreuses que les pétales ou parfois plus, insérées sous le bord du disque. Carpelles généralement 2, soudés en un ovaire biloculaire, ou distincts; ovules généralement nombreux et disposés en 2 rangées sur le placenta. Fruit: le plus souvent une capsule bivalvée. Graines plusieurs ou beaucoup; embryon petit, dans l'axe d'un endos-

Weinmannia L.

Arbres ou arbustes. Feuilles opposées, imparipennées (rarement simples); rachis souvent ailé; stipules décidues. Fleurs petites, blanches, en bouquets, arrangées en racemes dressés, terminaux et axillaires, hermaphrodites ou polygame-dioïques. Sépales 4 (rarement 5), imbriqués, persistants; pétales insérés sous le bord d'un disque périgyne lobé, imbriqués, caducs; étamines 8 (rarement 10); filets exerts, avec de petites anthères; ovaire libre, biloculaire, perme charnu; cotylédons plats ou convexes. pourvu de 2 becs; styles 2, persistants avec stigmates simples; ovules peu ou beaucoup dans les loges, en 2 rangées, insérées sur les bords des carpelles pliés. Capsule petite, biloculaire, bivalvée, à déhiscence septicide.

W. pinnata L. «Bastard Brazilletto», «Wild Brazilletto» (Jamaïque), d'après Fawcett et Rendle.

Famille 71. ROSACEÆ

Herbes, arbrisseaux, arbustes ou arbres. Feuilles généralement alternes, stipulées, mais les stipules parfois caduques. Fleurs régulières, hermaphrodites, périgynes. Sépales 5, imbriqués; pétales égaux au nombre de sépales, imbriqués, décidus. Étamines généralement nombreuses (mais parfois définies) en 1 ou plusieurs verticilles, rarement unilatérales, libres ou parfois connées à la base. Carpelles 1 ou plus en une ou plusieurs séries, uniloculaires; styles aussi nombreux que les carpelles; ovules généralement 2 dans chaque carpelle. Fruits variés, parfois un akène, parfois un follicule, une églantine, une pomme ou une drupe. Embryon généralement dénué d'endosperme; cotylédons généralement en forme d'amande.

x. Arbres, arbustes ou arbrisseaux:

2x. Carpelle solitaire:

3x. Style basilaire; ovules dressés:

4x. Étamines 15 ou plus, en un cercle complet

Chrysobalanus, p. 132

4x. Étamines 3-10; unilatérales

Hirtella, p. 132

3x. Style terminal; ovules pendants

Prunus, p. 132

2x. Carpelles nombreux:

3x. Fruit enfermé dans un réceptacle:

4x. Fruit: une pomme

Pyrus, p. 133

4x. Fruit: akène

Rosa, p. 133

3x. Fruit non enfermé dans un réceptacle

Rubus, p. 131

x. Herbes:

2x. Herbes caulescentes:

3x. Pétales absents; étamines 1-4; stigmate

capité

Alchemilla, p. 131

3x. Pétales présents; étamines 5-15; stigmate

bilobé

Agrimonia, p. 132

2x. Herbes acaules stolonifères

Fragaria, p. 131

Rubus L.

Arbustes épineux. Feuilles alternes, simples ou composées; stipules adnées au pétiole. Fleurs disposées en panicules ou en corymbes, terminales et axillaires; réceptacle en forme de soucoupe, conique au milieu. Sépales persistants; étamines nombreuses, insérées sur le bord du réceptacle; carpelles nombreux insérés sur la partie conique du réceptacle; styles subterminaux; ovules 2, pendants (souvent 1 très petit). Fruit: akènes drupacés, rassemblés sur le réceptacle sec, avec une graine.

R. jamaicensis L. «Blackberry», «Bramble», (Jamaïque).

R. florulentus Focke. Var. «eggersii» Focke, «Rosamora» ou «Zarza-rosa» (St-Domingue), d'après Urban.

R. domingensis Focke. «Rosamora blanca» ou «Zarza rosa» (St-Domingue), d'après Urban.

R. selleanus Helwig.

R. rosifolius J. E. Smith. Var. *coronarius* Sims.

R. barkerianus Helwig. «Mouaou» Massif des Cahos.

Fragaria L.

Herbes acaulescentes souvent stolonifères. Feuilles basilaires avec de longs pétioles, alternes, trifoliées; hampes simples ou ramifiées au-dessus. Fleurs polygame-dioïques, en cymes terminales. Hypanthium persistant, turbiné. Epicalice de 5 segments; sépales 5, persistants, divergents, valvés; pétales 5; étamines environ 20; carpelles nombreux, insérés sur un réceptacle accrescent, conique ou hémisphérique; style latéral, plutôt persistant; stigmate capité; ovule solitaire, ascendant. Fruit: akènes crustacés nombreux, enfouis dans un réceptacle charnu plus ou moins allongé ou placé dessus.

F. vesca L. «Fraise» (Haïti), «Wild strawberry» ou «Alpine strawberry» (Jamaïque).

Alchemilla L.

Herbes annuelles ou vivaces caulescentes. Feuilles alternes; limbes digités-lobés ou composés, pétioles; stipules, une dilatation de la base du pétiole. Fleurs parfaites, petites, en cymes ouvertes ou rassemblées. Hypanthium en forme d'urne. Sépales 4-5 valvés, augmentés de 4-5 bractéoles; disque fermant presque la gorge de l'hypanthium; pétales absents; étamines 1-4; filets

très courts, distincts; pistils 1-4, sessiles ou pourvus d'un court pédicelle; style latéral ou basilaire, glabre; stigmate capité; ovule solitaire, ascendant. Akènes 1-4, renfermés.

A. domingensis Urb.

Agrimonia L.

Herbes vivaces, pubescentes et souvent glandulaires à tiges dressées. Racines parfois tubéreuses. Feuilles alternes, stipules foliacées; limbes inégalement pennés, le rachis portant souvent de petites folioles interposées entre les plus grandes. Fleurs parfaites en racemes semblables à des baguettes. Hypanthium persistant, campanulé ou turbiné, plus ou moins distinctement sillonné, armé au-dessus de poils raides recourbés. Sépales 5, convergents; pétales 5, jaunes, plus longs que les sépales; étamines 5-15 en une série, filets distincts; pistils 2, sessiles, renfermés; style grêle; stigmates bilobés; ovule solitaire pendant. Akènes 1 ou 2 renfermés dans un hypanthium durci, accrescent. Graines pendantes.

A. parviflora Ait.

A. polyphylla Urb.

Prunus L.

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, simples. Fleurs solitaires ou racemeuses; réceptacle obconique, urcéolé ou tubulaire, décidu avec le calice à la maturité du fruit. Étamines 15-20; carpelle solitaire; style terminal; ovules 2, pendants. Drupe charnue avec un noyau ossu, monosperme. Graine pendante; endosperme en une mince couche ou absent.

P. occidentalis Sw. Amandier à grandes feuilles (Haïti), Membrillo (St-Domingue), d'après Urban; «Prune tree» (Jamaïque) d'après Fawcett et Rendle.

P. myrtifolia (L) Urb. Amandier à petites feuilles (Haïti), Membrillito (St-Domingue) d'après Urban; «Wild cassada», «Ants Wood» (Jamaïque) d'après Fawcett et Rendle.

P. persica (L) Stokes, «Pêche».

P. americana Marshall. Massif de la Selle, Croix des Bouquets.

Chrysobalanus L.

Arbres ou arbustes à tiges dressées ou souterraines. Feuilles alternes; limbes simples, coriacés, souvent luisants. Fleurs parfaites, blanches ou verdâtres, disposées en cymes, pédicellées. Hypanthium campanulé ou turbiné. Sépales 5, presque égaux, imbriqués; pétales 5, décidus; étamines nombreuses, parfois 15, insérées avec les pétales; filets distincts ou soudés à la base, glabres ou pubescents; ovaire infère, uniloculaire, sessile; style basilaire filiforme; ovules 2, dressés. Drupe pulpeuse, souvent comestible, le noyau avec 5-6 sillons. Graine solitaire.

C. icaco L. «Zicaque» (Haïti); «Gopher plum» ou «Cocoa plum» en anglais; «Icaco» (St-Domingue) d'après Urban.

C. icaco L. Var. *pellocarpa* (Mey) P. DC.

Hirtella L.

Arbres ou arbustes. Feuilles simples, alternes, entières; stipules caduques. Fleurs disposées en panicules axillaires et terminales ou en racemes; généralement petites; réceptacle tubulaire. Sépales réflexes; pétales décidus; étamines 3-10 ou plus, étamines parfaites disposées sur un seul côté du réceptacle, staminodes sur l'autre côté; filets unis à la base, exerts, circonés dans le bourgeon; carpelle solitaire; ovaire inséré sur un côté du réceptacle, uniloculaire; style

sortant d'un côté près de la base; ovules 2. Fruit drupacé, sec, monosperme. Graine dressée; cotylédons charnus.

H. triandra Sw.

Pyrus L.

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, simples, mais parfois profondément lobées, serrées ou lobées, pourvues de petites stipules caduques. Fleurs normalement bisexuées, régulières. Hypanthium en forme d'urne. Sépales 5; pétales 5, obovés, voyants; étamines 15-20 ou plus; styles aussi nombreux que les carpelles ou les loges, libres ou unis à la base; loges biovulées. Fruit: une vraie pomme, charnue, comprenant 5 loges cartilagineuses, chaque loge contenant normalement 2 graines. Fruit muni d'une vraie tige.

P. communis L. «Poire», en anglais «Pear».

P. malus L. «Pomme».

Rosa L.

Arbustes dressés, parfois grimpants et trainants, généralement épineux. Feuilles alternes, imparipennées; folioles serrées; stipules adnées à la base engainante du pétiole. Fleurs solitaires ou disposées en corymbes ou en panicules, grandes; réceptacle urcéolé. Sépales divergents, feuillus, souvent pinatiséqués, décidus ou persistants; étamines nombreuses, en nombreux verticilles, insérées sur le bord supérieur du réceptacle; styles ventraux exerts; ovule solitaire, pendant. Akènes nombreux, enfermés dans un réceptacle charnu.

R. spp. Cultivé dans les jardins.

R. borboniana Desp. Kenseff.

Famille 72. CONNARACEÆ

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, sans stipules, imparipennées ou avec 1-3 folioles, folioles entières. Fleurs petites, hermaphrodites, régulières. Calice avec 5 segments; pétales 5, imbriqués; étamines 5-10, celles opposées aux pétales sont plus courtes; filets généralement unis à la base; carpelles 5, globulaires, libres, poilus, uniloculaires; ovules 2, collatéraux, ascendants de la base. Fruit: un follicule solitaire. Graine solitaire, dressée, généralement arilée; endosperme absent ou charnu.

Rourea Aubl.

Caractères de la famille.

R. surinamensis Miq. «Luis Gomez» (St-Domingue) d'après Urban.

Famille 73. KRAMERIACEÆ

Arbustes ou herbes vivaces, généralement avec tiges rampantes ou divergentes, rigides et ramifiées et feuillage pubescent, soyeux. Feuilles alternes, dénuées de stipules; limbes entiers ou trifoliés, relativement petits. Fleurs parfaites, irrégulières. Calice de 4-5 sépales pétaloïdes inégaux, décidus; corolle de 4-5 pétales plus courts que les sépales, les postérieurs pourvus de longs onglets, minces, leurs onglets souvent unis, les 2 pétales antérieurs épais, sessiles. Androcée de 3 ou 4 étamines; filets unis à la base ou jusqu'au milieu; anthères biloculaires, sacs s'ouvrant par des pores terminaux. Gynécée d'un seul carpelle; ovaire uniloculaire ou apparemment biloculaire par l'intrusion du placenta; style simple; stigmate tronqué ou aigu; ovules 2, collatéraux, pendants, anatropes. Fruit indéhiscent, ligneux, uniloculaire, armé d'épines. Graine généralement solitaire; endosperme absent.

Krameria Lœfl.

Caractères de la famille.

K. ixina L.

Famille 74. LEGUMINOSÆ

Arbres, arbustes ou herbes. Feuilles alternes ou rarement opposées, presque toujours composées, parfois simples, généralement pourvues de stipules. Pédoncules axillaires ou terminaux avec une ou de nombreuses fleurs. Fleurs irrégulières, généralement hermaphrodites, ou régulières, généralement polygames. Sépales plus ou moins unis, généralement 5 dans les fleurs irrégulières, le 5ème plus abaissé, 5 ou 4 dans les fleurs régulières; pétales aussi nombreux que les sépales, dans les fleurs irrégulières, le 5ème pétale est plus élevé. Étamines généralement 2 fois plus nombreuses que les pétales, parfois aussi nombreuses, parfois indéfinies, en petit nombre ou nombreuses, généralement insérées sur le bord du réceptacle. Carpelle solitaire, uniloculaire; ovules nombreux attachés à l'angle intérieur. Fruit: une gousse (légume), parfois séparée en nœuds monospermes; endosperme peu abondant ou absent; cotylédons généralement plats, foliacés ou épais ou charnus.

Cette famille, d'une grande importance économique, renferme plus de 12,000 espèces cultivées la plupart comme plantes alimentaires ou ornementales.

CLE POUR LES SOUS FAMILLES

- x. Fleurs régulières. Pétales valvés..... *Mimosæ*, p. 134
- x. Fleurs irrégulières. Pétales imbriqués:
 - 2x. Pétale supérieur enfermé par les latéraux dans le bourgeon..... *Cæsalpinæ*, p. 139
 - 2x. Pétale supérieur enfermant les pétales latéraux dans le bourgeon..... *Papilionatæ*, p. 144

Sous-Famille MIMOSÆ

Le plus souvent arbres ou arbustes, parfois herbes vivaces, souvent armés d'épines. Feuilles généralement bipennées. Fleurs régulières, petites; calice valvé; pétales valvés, généralement soudés au-dessous du milieu; étamines distinctes ou unies.

- x. Feuilles pennées..... *Inga*, p. 135
- x. Feuilles bi-pennées:
 - 2x. Anthères garnies à l'extrémité d'une petite glande qui tombe si tôt l'ouverture de la fleur; étamines généralement 10:
 - 3x. Herbes ou arbustes grimpants:
 - 4x. Herbes rampantes ou flottantes..... *Neptunia*, p. 138
 - 4x. Arbustes grimpants pourvus de vrilles..... *Entada*, p. 138
 - 3x. Arbres ou arbustes non grimpants:
 - 4x. Gousses séparées par une cloison entre les graines. Fleurs globulaires, capitées. Arbres armés d'épines. Endosperme présent..... *Prosopis*, p. 138
 - 4x. Gousses non séparées par une cloison entre les graines:
 - 5x. Fleurs globulaires capitées. Arbres spinifères ou inermes. Endosperme absent..... *Piptadenia*, p. 138
 - 5x. Fleurs en racemes. Arbres inermes. Endosperme présent..... *Adenantha*, p. 138
 - 2x. Anthères églanulaires:
 - 3x. Étamines, pas plus de 2 fois aussi nombreuses que les lobes de la corolle:
 - 4x. Valves de la gousse ne se séparant pas du bord continu:
 - 5x. Arbustes ou arbres. Graines transverses dans la gousse..... *Leucæna*, p. 137
 - 5x. Herbes. Graines longitudinales ou obliques dans la gousse..... *Desmanthus*, p. 138

- 4x. Valves de la gousse se séparant du bord continu:
 - 5x. Gousses non aplaties ou très légèrement aplaties, quadrangulaires ou pourvues d'un large bord, avec bec, non articulées..... *Schrankia*, p. 137
 - 5x. Gousses plates, articulées, dénuées de bec..... *Mimosa*, p. 137
- 3x. Étamines, plus de 2 fois aussi nombreuses que les lobes de la corolle:
 - 4x. Étamines libres..... *Acacia*, p. 136
 - 4x. Étamines soudées:
 - 5x. Gousses élastiquement bi-valvées..... *Calliandra*, p. 136
 - 5x. Gousses ne s'ouvrant pas élastiquement:
 - 6x. Valves du fruit se séparant du bord persistant. Plantes inermes..... *Lysiloma*, p. 136
 - 6x. Valves du fruit ne se séparant pas du bord:
 - 7x. Valves de la gousse minces, très larges, verticales..... *Albizzia*, p. 136
 - 7x. Valves de la gousse épaisses, souvent courbées, tordues ou enroulées:
 - 8x. Fruit enroulé, très large, indéhiscent. Plantes inermes..... *Enterolobium*, p. 135
 - 8x. Fruit non enroulé, généralement étroit et indéhiscent. Plantes spinifères ou inermes..... *Pithecolobium*, p. 135

Inga Scop.

Arbres ou arbustes inermes. Feuilles paripennées, les folioles peu nombreuses, grandes, le pétiole souvent ailé, stipules petites. Fleurs grandes, épiées ou capitées. Fruit grand, les graines enfouies dans une pulpe.

I. laurina (Sw.) Willd. «*Jina*» (St-Domingue) d'après Urban.

I. vera Willd. «*Pois doux*,» «*Pois sucrin*,» «*Sucrier*,» «*Sucrin*,» (Haïti); «*Guama*,» «*Jina*,» (St-Domingue) d'après Urban, commun.

Enterolobium Mart.

Grand arbre inerme avec une large couronne divergente; écorce rugueuse. Feuilles bi-pennées, les folioles très nombreuses, linéaires-oblongues, aiguës ou obtuses. Fleurs petites, sessiles, disposées en denses capitules. Fruit plat, enroulé, de couleur brun sombre, luisant. Graines brun sombre.

E. saman (Jacq.) Prain. «*Gouane goul*,» Massif de la Selle.

E. cyclocarpum (Jacq.) Griseb. «*Bois Tanniste rouge*,» Dame-Marie.

Pithecolobium Mart.

Arbustes ou arbres, épineux ou inermes. Feuilles bipennées, les folioles en petit nombre ou nombreuses, les pétioles généralement glandulifères. Pédoncules le plus souvent axillaires et solitaires ou fasciculés ou parfois terminaux et en forme de racemes, les fleurs capitées ou épiées. Fruit très variable.

P. unguis-cati (L.) Benth.

P. circinnale (L.) Benth. «*Campêche marron*» (Haïti), «*Sinaso*» (St-Domingue), d'après Urban.

P. nervosum Urb.

P. glaucum Urb. «*Caracoli*» (St-Domingue) d'après Urban.

P. filipes (Vent.) Benth.

- P. oppositifolium* Urb.
P. micranthum Benth.
P. arboreum (L.) Urb. «Collier» ou «Poison lasinette.» St-Louis du Sud.
P. berterianum (Babb.) Benth. «Bois savanne» (Haïti), «Cobano blanco» (St-Domingue) d'après Urban.
P. tortum Mart. «Losange» (Jacmel).
P. latifolium (L.) Benth. «Bois ca.»

Albizzia Durazz.

Arbres ou arbustes inermes. Feuilles bi-pennées, les pinnées environ 4 paires, les folioles peu nombreuses, obliquement oblongues ou ovales, presque glabres. Fleurs d'un blanc jaunâtre, capitées-pédonculées ou subsessiles. Calice campanulé ou tubulaire, denté ou courtement lobé; corolle tubulaire ou infundibuliforme; étamines indéfinies, exertes, unies en dessous; anthères petites, agrégées en 2-4 masses dans chaque loge. Gousses largement linéaires, verticales ou quelque peu courbées, non tordues, plates, comprimées, minces, non pulpeuses. Graines à peu près rondes, comprimées, attachées par un long pétiole grêle.

- A. lebeck* (L.) Benth. «Bois noir» ou «Tcha-tcha.»

Calliandra Benth.

Arbres ou arbrisseaux inermes (excepté dans le genre *C. hæmatomma*). Feuilles bi-pennées, les folioles petites ou grandes, stipules généralement persistantes. Fleurs disposées en denses capitules, souvent assez grandes et voyantes, rouges ou blanches. Calice campanulé, denté; étamines nombreuses, 10, longues, exertes. Fruit plat, comprimé, généralement vertical, les valves recourbées après la déhiscence.

- C. portoricensis* (Jacq.) Benth. «Granolino» (St-Domingue) d'après Urban;
 «Night flowering acacia» (Jamaïque) d'après Fawcett et Rendle.
C. caracasana (Jacq.) Benth.
C. nervosa (Urb.) Urb. et Ekm. (comb. nov.), «Ptit Gaiac.»
C. pedicellata Benth.
C. colletioides Griseb. Var. *gonavensis* Urb. et Ekm.
C. hæmatostoma (Bertero) Benth. Var. *glabrata* Griseb.
C. gracilis Griseb. Ile de la Tortue.

Lysiloma Benth.

Arbres ou arbustes inermes. Feuilles bi-pennées avec des folioles peu nombreuses et grandes ou généralement nombreuses et petites. Fleurs petites, capitées ou épiées. Fruit plat, large, les valves minées, se séparant du bord persistant.

- L. latisiliqua* (L.) Benth. «Tabernau» ou «Tavernon.»
L. bahamensis Urb.
L. ambigua (Vogel) Urb. (comb. nov.)

Acacia Willd.

Arbres ou arbustes avec ou sans épines. Feuilles bipennées, les folioles généralement petites et nombreuses, le pétiole généralement glandulifère. Fleurs petites, mais souvent voyantes, disposées en capitules globulaires ou en épis cylindriques; pédoncules axillaires, solitaires ou agrégés, ou panicules au sommet des branches. Calice campanulé, denté, lobé ou divisé en sépales distincts; étamines nombreuses, libres ou légèrement unies à la base, exertes, an-

thères petites. Gousse comprimée, rarement cylindrique, bivalvée ou non déhiscence.

- A. lutea* (Mill) Britton. «Acacia» (Haïti), «Carambomba» (St-Domingue), d'après Urban.
A. tortuosa (L.) Willd.
A. farnesiana (L.) Willd.
A. muricata (L.) Willd.
A. scleroxyla Tuss. «Tendre à caillou» ou «Candelon» (Haïti), Cobano (St-Domingue), d'après Urban.
A. vogeliana Steud. «Taquito» (St-Domingue) d'après Urban.
A. riparia H. B. K.
A. barahonensis Urb. et Ekm.
A. zapatensis Urb. et Ekm.

Leucaena Benth.

Arbres. Glandes au milieu du pétiole ou juste au dessous des pinnées, ou parfois absentes, sessiles, quelque peu elliptiques. Fleurs en capitules, globulaires, blanches, pédonculées. Calice tubulaire, campanulé, denté; pétales libres; étamines 10, libres exertes. Gousses courtement pédicellées, largement linéaires, plates, comprimées, rigidement membraneuses, bivalvées. Graines comprimées, transverses aux valves.

- L. glauca* (L.) Benth. «Grains de lin pays» (Haïti), «Granalino» (St-Domingue) d'après Urban.
L. trichodes (Jacq.) Benth. «Bois bourro.»

Schrankia Willd.

Herbes vivaces ou plantes arbustives, le plus souvent à tiges divergentes ou rampantes armées de piquants. Feuilles généralement sensibles; limbes bi-pennés; folioles nombreuses, relativement petites. Fleurs parfaites ou polygames en épis axillaires en forme de capitules. Calice à 4-5 lobes; corolle de 4-5 pétales soudés vers le milieu; étamines 8-10, exertes; filets distincts ou presque distincts; ovaire presque sessile; ovules nombreux. Gousses étroites, couvertes de piquants quadrangulaires, ou avec des bords larges, finalement quadrivalvées par les valves qui se séparent des bords.

- S. leptocarpa* P. DC.

Mimosa L.

Herbes, arbustes ou arbres. Feuilles généralement sensibles, généralement églanuleuses sur les pétioles. Fleurs en capitules pédicellés. Fleurs parfaites ou polygames; calice généralement très petit, peu visible; pétales plus ou moins soudés; étamines aussi nombreuses ou 2 fois aussi nombreuses que les pétales, généralement 2 fois aussi longues, rosées ou blanches, libres. Gousse comprimée, bivalvée; valves se séparant du bord entier et épaissi et se divisant en articulations avec 1 graine dans chaque articulation.

- M. pudica* L. «Honte» (Haïti), «Morir-vivir» (St-Domingue); «Shame weed», en anglais; «Sensitive», en français.
M. mornicola Urb.
M. ceratonia L.
M. domingensis (Bertero) Benth. «Laissez-moi» Haïti).
M. extranea Benth.
M. invisia Mart. Massif du Nord, près de Bayeux.

Desmanthus Willd.

Herbes vivaces ou sous-arbrisseaux. Folioles très petites, une glande sessile en forme de coupe située juste en dessous de la paire inférieure; stipules en forme de soies persistantes. Fleurs en capitules sur des pédoncules solitaires axillaires. Calice campanulé, denté; pétales libres ou légèrement soudés; étamines 10 (rarement 5), libres exertes. Gousses linéaires, plates, comprimées, bivalvées.

D. virgatus (L.) Willd. Var. **strictus** (Bertol.) Griseb.

D. depressus (Poir.) H. et B.

Neptunia Lour.

Herbes. Folioles petites. Stipules obliquement cordées. Fleurs en capitules sur des pédoncules axillaires, les fleurs supérieures hermaphrodites, fleurs inférieures mâles ou neutres avec calice petit et corolle et 10 staminodes pétaloïdes, longs, exerts. Étamines généralement 10, exertes, exertes. Gousse obliquement oblongue, courte, large, plate bivalvée, plus ou moins divisée entre les graines.

N. plena (L.) Benth.

N. pubescens Benth.

Prosopis L.

Arbres ou arbustes. Feuilles, pinnées en 1 ou 2 paires; folioles en paires peu nombreuses ou nombreuses. Fleurs petites, disposées en épis axillaires dans l'espèce **P. juliflora**. Calice campanulé, courtement denté; étamines exertes. Gousse linéaire, indéhiscence, épaisse, spongieuse, avec des graines, chacune dans une loge séparée.

P. juliflora (Sw) P. DC. «**Bayahon**» ou «**Bayarone**» (Haïti), «**Bayahonda**», «**Bohahunda**» ou «**Vallahonda**» (St-Domingue), d'après Urban; «**Cashaw**» (Jamaïque) d'après Fawcett et Rendle.

Adenanthera L.

Arbres. Folioles alternes, 12-18 dans l'espèce **A. pavonina**. Fleurs très petites, pressées en de longues grappes grêles, parfaites ou polygames. Calice campanulé, à dents courtes; étamines légèrement exertes. Gousse en forme de courroie, renflée aux extrémités, bivalvée, les valves très tordues après qu'elles se séparent.

A. pavonina L. «**Circassian Seed**» (Jamaïque) d'après Fawcett.

Piptadenia Benth.

Arbres ou arbustes avec ou sans épines. Feuilles bi-pennées; folioles petites, en paires nombreuses, glandes sur le pétiole et entre les pinnées terminales. Fleurs en capitules globulaires (dans l'espèce **P. peregrina**); pédoncules axillaires, solitaires ou agrégés, devenant paniculés aux extrémités des branches. Calice campanulé, denté; pétales soudés vers le milieu; étamines exertes. Gousse largement plate bivalvée, continue à l'intérieur.

P. peregrina (L.) Benth. «**Bois l'écorce**», **Bois galle** «**Oeuf de poule**» (Haïti); «**Cojoba**» (St-Domingue et Porto-Rico); «**Bastard tamarind**» (Jamaïque).

Entada Adans.

Arbustes grimpants, souvent armés d'épines; tiges souvent très longues. Feuilles bipennées, grandes. Fleurs petites, épiées; calice campanulé — pen-

tadenté; étamines courtes, exertes. Gousse très grande, plate, comprimée, articulée, chaque articulation avec une graine.

E. scandens (L.) Benth. «**Cacorne**».

E. gigas (L.) Fawc. et Rendle, «**Cacorne**» (Haïti); «**Cacoon**», (Jamaïque).

E. polystachya (L.) DC.

Sous Familles CÆSALPINEÆ

Fleurs irrégulières (parfois presque régulières). Calice généralement imbriqué (parfois valvé); pétales imbriqués, le pétale supérieur se trouve plus avant dans l'intérieur; étamines généralement distinctes. Feuilles pinnées ou bipennées (2 folioles unies dans le genre **Bauhinia**).

x. Feuilles jamais bipennées:

2x. Anthères dressées. Feuilles pennées **Cassia**, p. 140

2x. Anthères oscillantes:

3x. Feuilles composées de 2 folioles unies en une seule feuille bilobée **Bauhinia**, p. 140

3x. Feuilles composées de folioles distinctes:

4x. Pétales absents. Feuilles imparipennées. Étamines 10 **Crudia**, p. 140

4x. Pétales présents:

5x. Pétales 3; étamines 3, unies en une gaine. Folioles nombreuses **Tamarindus**, p. 140

5x. Pétales 5; étamines 10. Folioles 2:

6x. Fleurs, pas plus que 7 mm. de long. Calice mince **Cynometra**, p. 139

6x. Fleurs, plus qu'un centimètre de long. Calice épais, coriace **Hymenaea**, p. 140

x. Feuilles bipennées, au moins quelques-unes:

2x. Sépales fortement imbriqués. Graines sans l'endosperme:

3x. Feuilles en partie pennées. Arbres ou arbrisseaux **Hæmatoxylon**, p. 142

3x. Feuilles toutes bipennées:

4x. Sépales inégaux (1 sépale plus grand, pectiné). Le bord de la gousse est aigu **Peltophorum**, p. 143

4x. Sépales presque égaux. Le bord de la gousse est obtus **Cæsalpinia**, p. 143

2x. Sépales valvés ou légèrement imbriqués. Graines avec endosperme:

3x. Plantes inermes. Gousses larges, épaisses et dures **Delonix**, p. 142

3x. Plantes spinifères. Gousses étroites, minces:

4x. Fleurs hermaphrodites:

5x. Gousses linéaires, rétrécies entre les graines. Rachis de la feuille épineux **Parkinsonia**, p. 142

5x. Gousses linéaires, oblongues, non rétrécies. Rachis de la feuille non épineux **Cercidium**, p. 142

4x. Fleurs polygames ou dioïques **Arcoa**, p. 142

Cynometra L.

Arbres inermes. Feuilles presque sessiles, bifoliées, les folioles très obliques, obtuses, épaisses, luisantes, glabres. Fleurs petites, blanches, disposées en grappes courtes et pourvues de longs pédicelles. Fruit ellipsoïde, comprimé, mesurant de 2 cm. 5 à 3 cm. de long.

C. americana Vogel. «**Courbaril**».

C. portoricensis Krug. et Urb.

Crudia Schreb.

Arbres. Feuilles imparipennées, folioles alternes. Racemes simples terminaux ou latéraux sur les branches de la dernière année; réceptacle court. Sépales 4, imbriqués; pétales absents; étamines 10 (ou 8-9), libres; anthères oscillantes; ovules en petit nombre (environ 4). Gousse sessile, ligneuse ou coriacée, plate, comprimée, obovée, presque ronde ou oblongue, s'ouvrant après un certain temps aux bords. Graines grandes, 1 ou 3.

C. antillana Urb. «Cordon» ou «Cacorne marron» près de Port-de-Paix.

Hymenaea L.

Arbres sans piquants. Feuilles bifoliées, folioles coriacées, à bords inégaux, marqués de points pellucides. Fleurs blanches, en courtes panicules terminales, compactement corymbeuses. Réceptacle (tube calicinal) campanulé; sépales 4, très imbriqués; pétales 5, sessiles, ovés — elliptiques, un peu inégaux, le pétale supérieur souvent plus grand; étamines 10, libres, glabres; ovaire courttement pédicellé, le pétiole adhérent au réceptacle creux. Gousse quelque peu ligneuse, grande, indéhiscente. Graines peu nombreuses.

H. courbaril L. «West Indian locust tree» ou «Stinling toe» (Jamaïque), d'après Fawcett et Rendle.

Tamarindus L.

Arbres. Feuilles pennées finissant avec une paire de folioles; folioles petites, en paires nombreuses. Racemes pauliflores, axillaires ou terminaux, sur de courtes branches latérales. Réceptacle (tube calicinal) étroitement turbiné; sépales 4, imbriqués; pétales 3, petits, un plus étroit que les autres avec 2 pétales rudimentaires; étamines parfaites 3, unies en une gaine ouverte au-dessus, le reste abortif; ovaire pétiolé, le pétiole adné au réceptacle creux. Gousse pulpeuse, indéhiscente.

T. indica L. «Tamarin» (Haïti), «Tamarindo» (St-Domingue); «Tamarind» (Jamaïque).

Bauhinia L.

Arbres ou arbustes. Feuilles composées de 2 folioles unies. Fleurs en grappes ou 2-3 ensemble, ou solitaires. Réceptacle (tube calicinal) cylindrique; calice spathacé, pentadenté; pétales 5, presque égaux; étamines 1 fertile ou 10 fertiles (dans **B. tomentosa**). Gousse bivalvée, déhiscente.

B. tomentosa L.

B. monandra S. Kurz. «2 jumelles» ou «Caractère des hommes» (Haïti) «Jérusalem date» ou «Butterfly flower» (Jamaïque).

B. divaricata L. «Bois caleçon», «Ti caleçon», «Matourin», «Collègue Matouri» (Haïti), «Pata de chivo» (St-Domingue) d'après Urban; «Mountain ebony» ou «Bull-hoof» (Jamaïque) d'après Fawc. et Rendle.

B. ungula Jacq.

Cassia L.

Arbres, arbustes ou herbes. Feuilles pinnées se terminant avec une paire de folioles; folioles opposées. Fleurs en racemes, en panicules, agrégées ou solitaires. Calice de 5 segments, imbriqués, décidus; pétales 5, imbriqués, presque égaux, ou le pétale inférieur plus grand, le pétale supérieur à l'intérieur du reste; étamines 10, toutes parfaites et presque égales, ou l'étamine supérieure plus petite ou les plus élevées très petites et imparfaites ou absentes; anthères attachées par la base, toutes pareilles ou celles des étamines inférieures plus grandes, déchargeant le pollen par pores ou par de courtes fissures au som-

met ou par des pores à la base. Gousse cylindrique ou plate ou comprimée, sèche ou pulpeuse, souvent avec de nombreuses loges séparées par des cloisons transverses.

C. fistula L. «Cassé» (Haïti), «Cana fistula» (St-Domingue); «Cassia stick tree» (Jamaïque).

C. grandis L. «Casse» ou «Casse espagnole» (Haïti); «Horse cassia» (Jamaïque).

C. bicapsularis L. «Bois d'anneau» (Haïti).

C. indecora H. B. K.

C. spectabilis P. DC. «Casse marron».

C. mexicana Jacq. Var. *moustiquensis* Urb.

C. occidentalis L. «Pois puante» (Haïti); «Stinking weed» ou «Wild coffee» (Jamaïque).

C. sophora L. «Brusca macho» (St-Domingue).

C. ligustrina L. Var. *jægeriana* Urb. Var. *eggersiana* Urb.

C. tora L. «Pistache marron».

C. uniflora Mill. «Brusca blanca» (St-Domingue).

C. angustiliqua Lam. «Séné».

C. crista Jacq. «Séné» ou «Briser ménage» (Haïti); «Carga agua» (St-Domingue).

C. crista Jacq. Var. *oligophylla* Urb.

C. polyphylla Jacq.

C. emarginata L. «Bois cabrite» ou «Casse marron» (Haïti), «Palo de chivo» (St-Domingue).

C. domingensis Spreng.

C. alata L. «Fleur de St-Christophe», «Fleur palmiste», «Herbe à dartres», «Fleur dartres» (Haïti), «Guajavo» (St-Domingue); «Ringworm shrub» (Jamaïque), d'après Fawcett et Rendle.

C. obovata Collard, «Séné» (Haïti), «Sen» (St-Domingue); «Semma» (Jamaïque).

C. angustifolia Vahl. «Séné».

C. diphylla L.

C. lineata Sw.

C. grammica Spreng.

C. selleana Urb.

C. pinetorum (Britton) Urb. Var. *picardæ* Urb. «Ti zanite».

C. swartzii Wikstr.

C. æschynomene P. DC.

C. brachycarpa Urb.

C. diffusa P. DC.

C. tuerckheimii (Britton) Urb.

C. pygmæa P. DC.

C. buchii Urb.

C. strigillosa Benth.

C. pedicellaris P. DC.

C. adenosperma Urb.

C. quinquangulata L. C. Rich.

C. tortuensis Urb.

C. cahosiana Urb. et Ekm.

Parkinsonia L.

Arbres ou arbustes, armés d'épines. Feuilles apparemment pinnées et agrégées, mais bipennées en fait, avec un très court pétiole; folioles nombreuses, très petites, souvent caduques ou abortives. Fleurs jaunes, disposées en racemes. Calice de 5 segments presque égaux, étroitement imbriqués ou presque valvés; pétales divergents, quelque peu inégaux, le pétale supérieur plus large; étamines poilues à la base; ovules nombreux. Gousse étroite, acuminée aux 2 extrémités, rétrécie entre les graines, bivalvée. Graines oblongues, embryon avec endosperme conné, le long des côtés.

P. aculeata L. «*Madan Naiz*» (Haïti), «*Cambron*» (St-Domingue), d'après Urban; «*Jerusalem Thorn*» (Jamaïque).

Hæmatoxylon L.

Arbres dont le bois contient une précieuse teinture. Feuilles pinnées se terminant par une paire de folioles, ou bipennées, la paire inférieure des folioles devenant pinnée; folioles en paires peu nombreuses (2 à 4). Racemes axillaires. Calice de 5 sépales, les segments quelque peu inégaux, très imbriqués; pétales petits, jaunes, étroitement obovés; étamines poilues à la base; ovules 2 ou 3. Gousse plate, comprimée, s'ouvrant par des fentes au milieu des valves et non aux bords. Graines transversalement oblongues, sans endosperme, hile ventral.

H. campechianum L. «*Bois campêche*» ou «*Campêche*» (Haïti); «*Logwood*» en anglais.

H. brasiletto Karst.

Cercidium Tul.

Arbres ou arbustes avec des branches plus ou moins tortueuses, garnies d'épines. Feuilles bipennées, relativement petites. Fleurs en racemes courts, souvent agrégées. Calice de 5 segments légèrement inégaux, valvés; corolle jaune; pétales 5, avec de larges limbes, imbriqués; étamines 10, filets distincts, poilus à la base. Gousse aplatie, étroite, bivalvée. Graines plusieurs.

C. præcox (R. et P.) Harns, «*Baie à onde*», «*Printemps*» (Haïti) d'après Urban.

Delonix Rafin

Arbres. Feuilles bipennées se terminant par une paire de folioles; folioles nombreuses, petites. Fleurs belles, oranges ou écarlates, disposées en corymbes et en grappes au sommet des branches. Calice avec 5 segments valvés presque égaux; pétales grands, à peu près ronds; étamines poilues à la base; ovules nombreux. Gousse plate — comprimée, dure, avec des veines obliques, bivalvée, avec un tissu mou, ligneux entre les graines. Graines transverses, oblongues, avec endosperme.

D. regia (Boj.) Raf. «*Flamboyant*» (Haïti et St-Domingue); «*Flamboyant*» ou «*Flame tree*» (Jamaïque).

Arcoa Urb.

Arbres d'Haïti à tronc épais; branches dimorphes armées de jeunes épines ressemblant à des stipules. Feuilles naturellement paripennées, é glandulaires; les vieux rameaux portent des ramilles strobiliformes couvertes d'écaillés, imbriquées, compactes, au sommet une masse de feuilles bipennées, les pinnées impaires et les folioles paripennées; folioles petites, entières. Inflorescence simple, épiée ou légèrement racémeuse; bractées petites, triangulaires, obtuses ou semi-lunaires, pédicelle presque nul; bractées 2-4 sous les fleurs et beaucoup plus courtes que le calice. Fleurs jaune sombre, polygames ou dioi-

ques. Tube du calice légèrement cupuliforme revêtu à l'intérieur par le disque; lobes 5, inégaux, imbriqués, lobes internes plus grands, orbiculaires, lobes externes semi-lunaires; pétales 5, rarement 6, très imbriqués, presque égaux, ovés ou obovés, sessiles, insérés sur les bords du disque; étamines 12, unisériées sur les bords du disque (si le nombre va jusqu'à 20 un petit nombre se fixe sur la surface même du disque), uniformes et légèrement inégales; filets libres, presque cylindriques, pubérulents. Anthères versatiles, dorsifixes, subrectangulaires-oblongues, biloculaires, à déhiscence longitudinale; disque légèrement poilu et cupuliforme; ovaire rudimentaire, très petit ou à peine visible. Gousses rouge brun, légèrement tomenteuses, sessiles, logées au fond du calice, ovales, obovées ou légèrement cylindriques, presque rondes, lisses indéhiscentes, très pulpeuses. Graines jusqu'à 6, obovées, émarginées au hile, élevées sur le bord, un peu convexes.

A. gonavensis Urb. «*Tamarin marron*»

Cæsalpinia L.

Arbustes ou arbrisseaux parfois grimpants, généralement inermes, mais parfois épineux. Feuilles bipennées, les folioles grandes ou petites. Fleurs jaunes ou rouges, grandes et voyantes; racemes axillaires ou pédonculés à l'extrémité des branches. Calice de 5 segments imbriqués, presque égaux; étamines généralement villeuses ou glandulaires à la base; ovules peu nombreux. Gousse bivalvée ou indéhiscente, de formes variées avec des bords obtus, non ailée. Graines dépourvues d'endosperme.

C. crista L. «*Maté*» (St-Domingue).

C. bonduc (L.) Roxb.

C. sepiaria Roxb. «*Ti janvier*»

C. brasiliensis L. «*Brésillet*»

C. barahonensis Urb. «*Brésillet*» (Haïti), «*Brazil*» (St-Domingue).

C. domingensis Urb.

C. glandulosa Bertero.

C. pauciflora (Griseb) C. Wright.

C. vesicaria L.

C. sphærosperma Urb. et Ekm.

C. buchii Urb.

C. anacantha Urb.

C. rosei Urb.

C. pulcherrima (L.) Sw. «*Francillade*» (Haïti), «*Carzazo*» (St-Domingue).

C. coriaria (Jacq.) Willd. «*Divi-divi*» (Haïti) «*Guatapana*» (St-Domingue).

C. pellucida Vogel.

C. ciliata (Bergius) Urb. «*Canique*» ou «*quinique*»

C. secundiflora Urb. Ile de la Tortue.

C. barkeriana Urb. et Ekm.

Peltophorum Vogel.

Arbres. Feuilles bipennées; folioles nombreuses. Racemes simples ou paniculés, terminaux. Calice de 5 segments inégaux; étamines poilues à la base, 10, libres; stigmates larges, terminaux; ovules 2, nombreux. Gousse largement oblongue, plate, indéhiscente, légèrement renflée, mince aux bords, comme s'il y avait 2 ailes. Graines peu nombreuses ou une, dépourvues d'endosperme.

P. berterioanum Urb. «*L'abé rouge*» (Haïti), «*Abey*» (St-Domingue).

- x. Poils de la pubescence attachés par la base; connectif de l'anthère non appendiculé:
- 2x. Graines 2 (rarement 3 ou 4). Feuilles glandifères et parsemées de points creux **Dalea**, p. 146
- 2x. Graines plusieurs—nombreuses. Feuilles églanuloses et non parsemées de points creux:
- 3x. Inflorescence terminale:
- 4x. Pétale non onguiculé ou muni d'un onglet court; style barbu seulement "au sommet" **Tephrosia**, p. 147
- 4x. Pétale muni d'un long onglet; style barbu sur le côté interne **Barbieria**, p. 147
- 3x. Inflorescence axillaire:
- 4x. Gousse non ailée:
- 5x. Calice non allongé—tubulaire:
- 6x. Fruit uniloculaire:
- 7x. Folioles dépourvues de stipelles:
- 8x. Lobes de la carène distincts au sommet; carène plus longue que l'étendard **Poitea**, p. 147
- 8x. Lobes de la carène complètement unis; carène pas plus longue que l'étendard **Gliricidia**, p. 147
- 7x. Folioles munies de stipelles **Corynella**, p. 148
- 6x. Fruit avec des cloisons internes transversales **Cracca**, p. 148
- 5x. Calice allongé—tubulaire, presque bilabié **Vilmorinia**, p. 147
- 4x. Gousse ailée **Sesbania**, p. 148

Indigofera L.

Arbrisseaux ou herbes vivaces plus ou moins couverts de poils soyeux. Feuilles alternes, limbes inégalement pennés, ou parfois trifoliolés ou rarement unifoliolés, folioles à limbes entiers. Fleurs parfaites, généralement petites, disposées en grappes ou en épis axillaires. Corolle souvent rose ou pourpre; étendard large, limbe sessile ou onguiculé, persistant, ailes quelque peu allongées, carène éperonnée ou renflée sur l'un ou l'autre côté; étamines 10, généralement monadelphes ou une partiellement distincte; ovaire sessile ou subsessile, style glabre, ovules nombreux ou rarement peu nombreux ou absents. Fruits de formes variées avec de minces cloisons entre les graines.

- I. argentea** L. «Indigo anil.»
- I. tinctoria** L. «Indigo.»
- I. suffruticosa** Mill. «Indigo.»
- I. lespedezioides** H. B. K.
- I. mucronata** Spreng.
- I. viscosa** Lam.
- I. microcarpa** Desv.

Dalea L.

Herbes ou arbrisseaux avec feuillage glanduleux et tiges dressées ou rampantes. Feuilles alternes, limbes inégalement composés ou pennés ou trifoliolés, folioles relativement petites. Fleurs blanches, pourpres ou jaunes disposées en épis terminaux ou latéraux; sépales presque égaux; étendard large, muni d'un long onglet au-dessus, limbe cordé ou auriculé à la base, ailes et carène généralement plus longues que l'étendard, leurs onglets adnés au tube calicinal; étamines 10 ou 9, monadelphes; anthères similaires; ovaire sessile ou muni d'un

court support; ovules 2 ou 3 dans une cavité. Gousse membraneuse, incluse dans le calice, généralement valvacée. Graines le plus souvent solitaires.

D. domingensis P. DC.

Tephrosia Pers.

Herbes arbustives ou arbustes. Folioles nombreuses avec nervures parallèles obliques le dessous souvent soyeux. Fleurs rouges, pourpres ou blanches, disposées en groupes de 2-6, arrangées en grappes terminales ou opposées aux feuilles ou dans l'axe supérieur, souvent feuillées à la base. Etamine supérieure plus ou moins libre. Gousse comprimée se terminant en bec avec le style persistant. Graines nombreuses (rarement 2).

T. toxicaria (Sw) Pers. «Bois enivré.»

T. cinerea (L) Pers. Var. **litoralis** (Jacq.) Benth.

T. domingensis (Willd.) Pers.

T. purpurea (L) Pers. «Indigo» d'après Urban.

T. cathartica (Sessé et Moc.) Urb. «Sen», «Sen amargo», «Sen de la tierra» (St-Domingue), d'après Urban.

T. sessiliflora (Poir.) Urb. (comb. nov.)

Barbieria P. DC.

Arbrisseaux avec feuilles imparipennées. Folioles nombreuses, entières, avec de longues stipelles subulées. Fleurs assez grandes, rouges, disposées en 2 ou 3 groupes, arrangées en grappes terminales et axillaires. Etendard oblong, étréci dans l'onglet; ailes oblongues, attachées à la carène obtuse. Gousse linéaire dressée, plate, comprimée, bivalvée, rétrécie extérieurement entre les graines, cloisonnée intérieurement.

B. pinnata (Pers.) Baill.

Gliricidia H.B.K.

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, presque opposées irrégulièrement; folioles entières, opposées. Racemes apparaissant avant les feuilles ou axillaires. Calice campanulé, entier ou muni de 5 dents peu distinctes; étendard presque rond, réfléchi, onguiculé, avec 2 lobes au dessus de l'onglet; ailes oblongues, libres; carène courbée; étamine supérieure libre. Gousse largement linéaire, plate-comprimée, les bords légèrement épaissis. Graines 3-6 plates, à peu près rondes ou elliptiques.

G. sepium (Jacq.) Steud. «Lilas étranger» (Haïti).

Vilmorinia C. DC.

Arbrisseaux dressés. Feuilles imparipennées; folioles 5-6; stipules légèrement élargies à la base, longues, subulées. Fleurs pourpres, en grappes axillaires. Calice cylindrique, avec 10 dents obtuses, légèrement bilabié; pétales étroits, oblongs; ailes plus courtes que carène; étamines vexillaires libres; ovaire stipité; ovules nombreux; style subulé, pointu, glabre. Gousse stipitée, lancéolée, étrécie à la base, comprimée, extrémité filiforme. Graines 12-16.

V. longiflora Urb. (Comb. nov.)

V. glycyphylla (Poir.) Urb. (Comb. nov.)

V. multiflora (Sw) DC. (Comb. nov.)

V. plumierii Urb. (Comb. nov.)

Poitea Vent

Arbrisseaux. Feuilles imparipennées; folioles membraneuses dénuées de stipelles. Fleurs de couleurs variées, disposées en racemes axillaires. Calice avec des dents très courtes; étendard obovoïde, dressé, plus court que les ailes

oblongues; carène oblongue, légèrement courbée, aiguë, plus longue que les ailes. Gousse presque linéaire, bivalvée. Graines nombreuses.

P. galegoïdes Vent. «Aritos» (St-Domingue).

Corynella P. DC.

Arbrisseaux. Feuilles pennées ou imparipennées; folioles munies de très petites stipelles. Calice avec dents très courtes ou allongées en forme d'âlène; étendard presque circulaire, ailes oblongues, carène plus longue que l'étendard et les ailes. Gousse allongée, lancéolée, bivalvée. Graines nombreuses.

C. dubia (Lam.) Urb. «Bois bourro marron».

C. paucifolia P. DC.

Cracca Benth.

Herbes vivaces ou parfois plantes arbustives. Feuilles imparipennées; folioles avec stipelles, limbes entiers. Fleurs jaunâtres ou blanchâtres, disposées en grappes axillaires. Calice à lobes presque égaux, subulés; pétales presque de longueur égale; étendard circulaire ou reniforme; ailes oblongues ou ovoïdes; carène large, aiguë ou quelque peu rostrée-courbée; ovaire sessile, avec de nombreuses graines. Gousse oblongue, comprimée, bivalvée.

C. caribaea (Jacq.) Benth.

Sesbania Pers.

Herbes ou arbrisseaux, rarement arborescents. Feuilles alternes, également pennées; folioles entières, nombreuses, avec ou sans stipelles. Racemes axillaires, peu compacts. Corolle jaune, rouge, pourpre, diaprée ou blanche; étendard presque rond ou ové; ailes falquées ou oblongues; carène obtuse avec de longs onglets; étamines diadelphes (9 et 1), libres de l'étendard; anthères similaires ou presque pareilles; ovaire souvent stipité. Gousse longue avec des cloisons transversales entre les graines, bivalvée ou parfois valvacée.

S. occidentalis (W.) Pers.

S. sericea (W.) P. DC.

S. grandiflora (L.) Pers. «Pois Vallière».

Tribu HEDYSAREÆ

x. Etamines libres ou unies par le milieu à l'étamine supérieure:

2x. Folioles sans stipelles *Desmodium*, p. 150

2x. Folioles avec stipelles *Alysicarpus*, p. 151

x. Etamines semblables, unies, monadelphes ou diadelphes:

2x. Filets diadelphes:

3x. Folioles peu nombreuses (moins que 8):

4x. Feuilles imparipennées:

5x. Plantes volubiles. Calice et pédoncules munis de longs poils

Chaetocalyx, p. 149

5x. Plantes non volubiles. Calice et pédoncules dépourvus de longs poils:

6x. Ovaire polyspermatique. Périanthecaduc.....

Pictetia, p. 149

6x. Ovaire dispermatique. Périanthepersistant.....

Byra, p. 149

4x. Feuilles paripennées

Poiretia, p. 149

3x. Folioles nombreuses (8 ou plus)

Aeschynomene, p. 149

2x. Filets monadelphes:

3x. Feuilles pennées:

4x. Gousses épigées

Stylosanthes, p. 150

4x. Gousses hypogées

Arachis, p. 150

3x. Feuilles digitées, avec 2 ou 4 folioles

Zornia, p. 150

Chaetocalyx P. DC.

Arbustes volubiles avec feuilles imparipennées. Folioles le plus souvent peu nombreuses, dénuées de stipelles. Fleurs jaunes disposées en racemes axillaires ou groupées dans l'axe. Calice plus ou moins campanulé; étendard presque circulaire ou obovoïde; ailes oblongues, légèrement plus courtes que l'étendard; carène obtuse, presque dressée; ovaire courtement stipité; ovules nombreux. Gousse linéaire, presque cylindrique ou plate-comprimée, légèrement articulée entre les graines.

C. pubescens P. DC.

Pictetia P. DC.

Arbustes. Feuilles imparipennées. Folioles 3 à nombreuses, acuminiées ou subulées; stipelles absentes; stypules subulées. Fleurs jaunes solitaires dans l'axe des feuilles ou disposées en grappes peu denses et grêles. Calice à extrémités inégales, les 2 extrémités supérieures courtes et obtuses, les 3 inférieures plus longues; étendard presque circulaire; ailes obliques à oblongues, quelque peu plus longues que la carène obtuse; ovaire stipité; ovules nombreux. Gousse pédonculée, oblongue ou plate, linéaire, comprimée, dépourvue d'articulations.

P. obcordata P. DC.

P. aculeata (Vahl.) Urb.

P. spinifolia (Desv.) Urb.

P. spinifolia (Desv.) Urb. Var. *desvauxii* (P. DC.) Urb. «Gratte galle» (Haïti), «Palo tabaco» (St-Domingue).

P. spinifolia (Desv.) Urb. Var. *ternata* (P. DC.) Urb. Var. *elongata* Urb. Var. *obovata* Urb. Var. *monophylla* Urb. et Ekm. Var. *plenophylla* Urb.

Brya Bronn.

Arbrisseaux ou arbustes avec feuilles imparipennées; pétiole souvent presque rudimentaire; folioles petites, nombreuses ou 3, rarement 1; stipelles absentes; stipules caduques ou persistantes, épineuses. Fleurs disposées en bouquets axillaires ou subterminaux, peu nombreuses, parfois arrangées d'un seul côté. Calice à dents petites, presque égales ou les dents inférieures plus longues que les supérieures; étendard oblong-ovoïde ou presque circulaire; ailes oblongues ou en forme de faucille; carène obtuse; ovaire sessile ou stipité; ovules 2. Gousse sessile ou pédonculée avec 1-2 larges articulations.

B. buxifolia (Murr.) Urb. «Galle-galle».

Poiretia Vent.

Herbes ou sous-arbrisseaux dressés ou grimpants toujours pourvus de glandes balsamiques. Feuilles pennées avec 4, rarement 3 folioles, celles-ci portent souvent de petites stipelles; stipules présentes. Fleurs jaunes, en racemes axillaires ou groupées en panicules à l'extrémité des branches. Calice légèrement campanulé avec des dents courtes et inégales; étendard large, circulaire; ailes oblongues ou en forme de faucille; carène oblongue rostrée, rarement obtuse; ovaire sessile; ovules nombreux. Gousse linéaire avec articulations plates.

P. scandens Vent.

Aeschynomene L.

Herbes ou arbustes avec tiges dressées ou rampantes. Feuilles irritables imparipennées, mais parfois sans la foliole terminale; folioles nombreuses, petites; stipules lancéolées ou ovées. Fleurs parfaites, disposées généralement en racemes axillaires; bractées généralement en forme de stipules; bractéoles

adpressées au calice. Calice bilabié, presque isosépale. Corolle généralement jaune, parfois diaprée; étendard large avec un court onglet; ailes obliques; carène courbée; étamines diadelphes (5 et 5); anthères similaires; ovaire stipité; style glabre, incurvé. Gousse aplatie, se séparant en autant de sections indéhiscentes qu'il y a d'articulations.

A. sensitiva Sw.

A. evenia Ch. Wright.

A. americana L.

A. americana L. Var. *villosa* (Poir.) Urb.

A. pleuronervia P. DC.

Stylosanthes Sw.

Herbes vivaces, rigides, avec feuillage sétigère ou visqueux — pubescent. Feuilles alternes, limbes pinnés, trifoliolés. Fleurs de 2 sortes, (l'une complète, mais stérile, l'autre dépourvue de périanthe et d'étamines, mais fertile) disposées en épis axillaires ou terminaux ou en capitules. Calice sessile, tube grêle, lobes 5, membraneux ou disposés en 2 lèvres par l'union des 4 lobes supérieurs; corolle jaune ou orange; étendard avec limbe divergent, ailes oblongues, carène incurvée entière; étamines monadelphes, anthères relativement plus longues et attachées à la base et plus courtes et oscillantes; ovaire sessile ou subsessile, style filiforme, ovules 2-3. Fruit lomentacé, avec 1-2 articulations, l'articulation inférieure vide, l'articulation supérieure s'ouvrant au sommet.

S. hamata (L.) Taubert, «Pencil flower», en anglais.

S. viscosa Sw.

Arachis L.

Feuilles avec 2 paires de folioles; stipules adhérent au pétiole. Calice, tube très long, les 4 lobes supérieurs unis, le lobe inférieur distinct, étroit; étendard à peu près rond; anthères alternativement longues, presque attachées par la base et courtes, oscillantes. Gousse quelque peu rétrécie entre les graines, non articulée, continue à l'intérieur. Graines 1-3.

A. hypogaea L. «Pistache» (Haïti), «Peanut», en anglais.

Zornia Gmel.

Feuilles digitées. Folioles 2 ou 4, généralement pourvues de points pellucides; stipules avec appendice basilaire. Fleurs distantes en épis ou axillaires, chaque fleur enveloppée par 2 bractées. Calice hyalin, cilié, les 2 lobes supérieurs unis formant une large lèvre supérieure émarginée, les 2 latéraux beaucoup plus petits, le lobe inférieur égalant la lèvre supérieure; étendard à peu près rond; étamines 10, toutes unies en une gaine fermée; anthères alternativement plus longues, presque attachées à la base et courtes, dorsifixées.

Z. diphylla (L.) Pers.

Desmodium Desv.

Feuilles pennées, trifoliolées; stipules striées, sèches. Racemes terminaux ou parfois aussi axillaires, simples ou paniculés. Fleurs 1 ou 2 ou plus, disposées en petits groupes le long du rachis ou en un seul groupe opposé aux feuilles. Calice, tube court, les 2 lobes supérieurs ou dents plus ou moins unis, les 3 lobes inférieurs aigus ou acuminés; étendard obovoïde ou à peu près rond; étamine la plus élevée unie à la gaine ou plus ou moins libre. Gousse comprimée avec articulations plates, généralement valvacée, mais les articulations s'ouvrent tardivement dans les espèces *D. triflorum* et *D. barbatum*.

D. triflorum (L.) P. DC.

D. barbatum (L.) Benth.

D. intortum (Mill.) Urb. (comb. nov.)

D. canescens (L.) P. DC.

D. ascendens (Sw.) P. DC.

D. ciliare (Muhlenb.) P. DC.

D. supinum (Sw.) P. DC.

D. supinum (Sw.) P. DC. Var. *angustifolium* (Griseb.) Urb.

D. supinum (Sw.) P. DC. Var. *amblyophyllum* Urb.

D. axillare (Sw.) P. DC.

D. axillare (Sw.) P. DC. Var. *obtusifolium* (O. Ktze.) Urb.

D. axillare (Sw.) P. DC. Var. *sintenisii* Urb.

D. affine Schlechtend.

D. cubense Griseb.

D. molle (Vahl.) P. DC.

D. procumbens (Mill.) Hitchc.

D. tortuosum (Sw.) P. DC.

D. scorpiurus (Sw.) Desv.

D. denudatum P. DC.

Alysicarpus Neck.

Herbes vivaces, sous-arbrisseaux, rarement arbustes. Feuilles unifoliolées; stipules sèches, enveloppant 2 stipelles. Fleurs petites, disposées en racemes terminaux et parfois aussi en grappes axillaires. Calice quinquéfide, segments longs, étroits, secs, rigides; corolle incluse; étendard obovoïde ou rondelet, onguiculé; l'étamine supérieure libre, le reste soudé. Gousse cylindrique ou seulement légèrement comprimée; articulations nombreuses, épaisses.

A. nummularifolius (L.) P. DC.

Tribu DALBERGIEÆ

x. Folioles alternes (ou rarement solitaires):

2x. Folioles 1-5..... *Dalbergia*, p. 151

2x. Folioles 5-9:

3x. Gousse épaisse, coriacée. Etendard velu sur le côté extérieur..... *Drepanocarpus*, p. 152

3x. Gousse scarieuse. Etendard non poilu..... *Pterocarpus*, p. 152

x. Folioles opposées:

2x. Fleurs disposées en racemes axillaires. Gousse plate, dénuée d'ailes..... *Lonchocarpus*, p. 152

2x. Fleurs disposées en panicules:

3x. Panicules axillaires. Gousses quadripennées..... *Piscidia*, p. 152

3x. Panicules terminales. Gousses drupacées..... *Andira*, p. 153

Dalbergia Linn. f.

Arbres ou arbustes avec branches volubiles ou trainantes. Feuilles alternes, imparipennées, avec 1 foliole ou 3-5 folioles. Folioles alternes, sans stipelles; stipules le plus souvent petites et caduques, rarement grandes et persistantes. Fleurs pourpres, violettes ou blanchâtres — jaunâtres, disposées généralement en panicules axillaires. Calice campanulé avec 5 segments inégaux — les 2 supérieurs plus larges, les inférieurs plus longs; étendard obové ou rondelet; étamines toutes unies en une gaine fendue sur le côté supérieur, ou l'étamine supérieure libre ou absente, ou la gaine se fendant sur le côté inférieur; anthères petites, dydimées, les loges s'ouvrant par une scissure au sommet; ovaire stipité; stigmate petit, terminal; ovules 2 ou peu nombreux. Gousse oblongue ou rondelette, plate, mince, avec 1-4 graines.

- D. brownei* (Jacq.) Urb. »Liane à clou.»
D. hecastophyllum (L.) Taub. »Liane à clou.»
D. monetaria L. f.
D. berterii (P. DC.) Urb.

Drepanocarpus G. F. W. Mey.

Arbres dressés ou arbustes grimpants. Feuilles imparipennées; folioles le plus souvent alternes; stipules souvent épineuses. Fleurs petites ou relativement grandes, pourpres, violettes ou blanches, disposées en racemes ou en panicules. Calice campanulé, avec de courtes dents; étendard large, ovoïde ou rondet; ailes souvent en forme de faucille; ovaire stipité avec 1 (rarement 2) ovule. Gousse large, plate, comprimée, coriacée, avec 1 grande graine. Graine comprimée, réniforme.

- D. lanatus* (L. f.) G. F. W. Mey.

Pterocarpus L.

Arbres. Feuilles imparipennées; folioles alternes ou irrégulièrement opposées. Fleurs jaunes, généralement en panicules. Calice inégalement quinquédenté, turbiné; étendard rondet, ailes obliquement obovées, carène courtement unie; toutes les étamines unies en une gaine fendue au-dessus ou au dessous et au dessus; anthères oscillantes; stigmate petit, terminal. Gousse rondet, comprimée, valvacée, le style latéral, 1 ou 2 graines au milieu, la gousse plus ou moins épaissie ou durcie, s'amincissant vers l'extrémité.

- P. officinalis* Jacq. »Bois Pâle.»

Lonchocarpus H. B. K.

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, imparipennées; folioles opposées. Fleurs en racemes, pédicelles généralement biflores, parfois 2 pédicelles ensemble. Calice tronqué, dents 5 très courtes ou obsoletes; étendard rondet; étamine supérieure libre seulement à la base, unie au-dessus de la base avec le reste en un tube fermé; anthères oscillantes; stigmate petit, terminal. Gousse plate, valvacée, aptère, avec 1-4 graines.

- L. domingensis* (Pers.) P. DC. »Anon de majagua» (St-Domingue).
L. latifolius (W.) H. B. K. »Battre à caïman.»
L. neurophyllus Urb. »Biajama» (St-Domingue); »Caïman marron.»
L. ehrenbergii Urb. »Bois caïman» (Haïti), »Anoncillo de Majagua» St-Domingue), d'après Urban.
L. pyenophyllus Urb.
L. longipes Urb. et Ekm.
L. monophyllus Urb.

Piscidia L.

Arbre. Feuilles alternes, imparipennées; folioles opposées, 3-5 paires. Fleurs en panicules, apparaissant avant les feuilles. Calice avec 5 dents larges et courtes; étendard rondet, émarginé; ailes et carène munis d'un long onglet; étamine supérieure libre à la base, unie par le milieu avec le reste en un tube fermé; anthères oscillantes, attachées juste au-dessus de la base; stigmate petit, terminal. Gousse linéaire, comprimée, valvacée, sur un pédoncule plus long que le calice, avec 4 larges ailes, longitudinales, légèrement rétrécie entre les graines. Graines 3-7.

- P. piscipula* (L.) Sarg. »Dogwood» (Jamaïque).

Andira Lam.

Arbres. Feuilles alternes, imparipennées; folioles opposées. Fleurs pourpres, odoriférantes; panicules terminales ou subterminales. Calice tronqué avec de courtes dents; étendard rondet; étamine supérieure libre; anthères unifornes, oscillantes; stigmate petit, terminal. Gousse drupacée, non déhiscente, péricarpe ligneux. Graine 1, pendante.

- A. jamaicensis* (W. Wright) Urb. »Bois palmiste.»

Tribu VICIEÆ

- x. Plantes herbacées. Etamines diadelphes (9 et 1):
 2x. Tube staminal oblique..... *Vicia*, p. 153
 2x. Tube staminal dressé..... *Pisum*, p. 153
 x. Plantes ligneuses. Etamines monadelphes (9). *Abrus*, p. 153

Vicia L.

Herbes grimpantes ou rampantes; tiges cylindriques ou angulaires. Feuilles alternes, limbes également pennés; folioles en petit nombre ou nombreuses, les limbes entiers ou dentés au sommet. Fleurs parfaites en grappes sessiles ou munies d'un long pédoncule ou rarement solitaires dans l'axe. Calice souvent oblique, les lobes supérieurs généralement plus courts que les lobes inférieurs; corolle de couleur variée; étendard large, limbe émarginé; ailes obliques attachées au milieu de la plus courte carène; étamines diadelphes; anthères uniformes; style filiforme, pubescent au sommet ou sur le côté opposé à la carène; ovaire souvent sessile ou stipité; ovules nombreux ou rarement 2. Gousse courte ou allongée, aplatie, bivalvée, continue intérieurement. Graines sub-globulaires généralement.

- V. hirsuta* (L.) S. F. Gray.

- V. angustifolia* L.

- V. sativa* L.

Pisum L.

Herbes grimpantes. Feuilles paripennées (1 à 3 paires), le rachis se terminant en une vrille pinnée; stipules grandes et foliacées. Fleurs blanches ou colorées, solitaires ou disposées en grappes pauciflores dans l'axe. Calice oblique ou gibbeux à la base, les lobes plus ou moins foliacés; étendard large, ailes quelque peu attachées à la carène; étamines 9 et 1; ovaire presque sessile avec de nombreux ovules. Fruit, une gousse bivalvée, aplatie, avec de nombreuses graines. Graines globulaires. Plante alimentaire très recherchée.

- P. sativum* L. »Pois France» (Haïti), »Garden pea», en anglais.

Abrus L.

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux grêles, souvent grimpants avec feuilles paripennées, dépourvues de vrilles, mais le rachis se termine en un point; folioles nombreuses. Fleurs petites, roses ou blanches, en grappes le plus souvent denses, courtes, axillaires. Étendard large, plus ou moins uni à la base au tube staminal; ailes plus courtes et plus étroites que la carène; étamines 9, monadelphes; ovaire pluri-ovulé; style court, incurvé, glabre. Fruit généralement court et plus ou moins cloisonné entre les graines.

- A. precatorius* L. »Régliasse» (Haïti), »Peronia» ou »Peronilla» (St-Domingue); »Red bead vine», »Grab's eyes» ou »Wild liquorice» (Jamaïque); »Rosary pea» aux Etats-Unis.

Tribu PHASEOLEÆ

- x. Plantes à folioles stipellées: *Erythrina*, p. 156
 2x. Arbres ou arbustes

- 2x. Herbes ou arbrisseaux:
 3x. Style barbu le long de la face interne ou pénicillé autour du stigmate:
 4x. Etendard beaucoup plus grand que les autres pétales..... *Clitoria*, p. 154
 4x. Etendard presque égal aux autres pétales:
 5x. Carène roulée en spirale:
 6x. Gousse linéaire..... *Phaseolus*, p. 159
 6x. Gousse recourbée en arrière, petite. *Macroptilium*, p. 159
 5x. Carène obtuse, non enroulée en spirale:
 6x. Stigmate oblique ou introrse. Racine non tuberculeuse..... *Vigna*, p. 159
 6x. Stigmate presque globulaire. Racine tuberculeuse..... *Pachyrrhizus*, p. 160
 3x. Style glabre ou très rarement poilu à la partie inférieure:
 4x. Etamine vexillaire libre à la base, mais unie au-dessus avec les autres étamines:
 5x. Arbrisseaux avec feuilles unifoliolées..... *Rhodopis*, p. 156
 5x. Herbes avec feuilles trifoliolées..... *Canavalia*, p. 157
 4x. Etamine vexillaire libre ou unie à la base avec les autres étamines:
 5x. Plantes dressées:
 6x. Plantes à fleurs jaunes..... *Cajanus*, p. 158
 6x. Plantes à fleurs d'une autre couleur:
 7x. Rachis tuberculeux à l'insertion des fleurs..... *Galactia*, p. 157
 7x. Rachis non tuberculeux à l'insertion des fleurs..... *Periandra*, p. 155
 5x. Plantes grimpantes ou rampantes:
 6x. Gousse hispide..... *Mucuna*, p. 156
 6x. Gousse non hispide:
 7x. Calice à lobes supérieurs non complètement unis:
 8x. Etendard beaucoup plus grand que les autres pétales:
 9x. Rachis non tuberculeux..... *Centrosema*, p. 155
 9x. Rachis tuberculeux..... *Calopogonium*, p. 156
 8x. Etendard presque égal aux autres pétales..... *Teramnus*, p. 155
 7x. Calice à lobes supérieurs complètement unis:
 8x. Rachis tuberculeux..... *Galactia*, p. 157
 8x. Rachis non tuberculeux..... *Periandra*, p. 155
 x. Plantes à folioles non stipellées:
 2x. Gousse plus ou moins plate, comprimée:
 3x. Funicule attaché au milieu du hile..... *Rhynchosia*, p. 158
 3x. Funicule attaché au sommet du hile..... *Eriosema*, p. 158
 2x. Gousse renflée, turgescence..... *Flemingia*, p. 159

Clitoria L.

Herbes ou arbrisseaux avec tiges dressées ou volubiles. Feuilles alternes, pennées, trifoliolées ou avec de nombreuses folioles; stipelles généralement présentes; stipules persistantes. Fleurs axillaires, grandes et voyantes, solitaires ou racemeuses, blanches, bleues, rouges ou violettes; bractées grandes, persistantes. Calice campanulé ou tubulaire, avec 5 segments ou dents, les

dents plus courtes que le tube ou ne le dépassant pas. Etendard grand, droit, émarginé ou rondet au sommet, étréci à la base, non appendiculé; ailes courbées adhérent quelque peu à la courte carène, celle-ci incurvée, aiguë; étamines (9-1) plus ou moins imparfaitement diadelphes; style long et incurvé, poilu sur la face interne; ovaire stipité; ovules nombreux. Gousse stipitée, étroite, quelque peu aplatie.

C. ternatea L.

C. rubiginosa Juss.

C. laurifolia Poir.

C. plumieria Tuss. «Fleur languette.»

Centrosema Benth.

Herbes vivaces ou sous-arbrisseaux, tiges rampantes ou grimpantes. Feuilles alternes — pennées; folioles 3, rarement 1, 5 ou 7, avec stipelles; stipules persistantes. Pédoncles axillaires, solitaires ou géminiflores, uniflores ou avec de nombreuses fleurs; bractées adpressées au calice, plus longues que le calice ou presque aussi longues. Calice sessile, campanulé ou infundibuliforme; segments très courts ou plus longs que le tube ou le segment inférieur plus long que le tube; étendard divergent, limbe plus large que haut, ailes courbées, carène incurvée, un peu plus courte que les ailes; étamines diadelphes (9 et 1) ou en partie monadelphes; anthères uniformes; ovaire presque sessile; ovules nombreux; style dilaté au sommet incurvé, quelque peu pubescent. Gousse plate, comprimée, avec un long bec, presque sessile, cloisonnée entre les graines bivalvée; valves munies de côtes près des deux bords.

C. plumieri (Turp.) Benth. «Honte.»

C. pubescens Benth. «Fleur languette.»

C. virginianum (L.) Benth. «Liane violon.» Var. *angustifolium* (D. C.) (Griseb.)

C. haïtienne Urb. et Ekm.

C. dubium (H. B. K.) Hemsl.

Periandra Mart.

Herbes dressées ou volubiles ou arbrisseaux. Feuilles généralement avec 3 folioles, rarement 1, stipellées. Pédoncles axillaires, solitaires, avec 1 ou de nombreuses fleurs bleues ou écarlates. Calice court, campanulé, avec de courtes dents, les dents inférieures plus longues que les dents supérieures; étendard large, obovoïde; ailes obovoïdes ou oblongues plus larges que la carène; étamines libres ou plus ou moins unies avec l'étamine supérieure; ovaire presque sessile; ovules nombreux. Gousse presque sessile, oblongue, plate — comprimée avec des sutures épaisses.

P. berteriana (P. DC.) Benth.

Teramnus Sw.

Herbes grêles, volubiles, quelque peu ligneuses. Feuilles pennées; folioles 3, avec stipelles; stipules petites. Inflorescence souvent de deux formes sur la même plante; fleurs très petites, un petit nombre groupées dans l'axe, ou 2 ou plus agrégées le long du rachis des racemes axillaires. Calice campanulé, segments 5 ou 4; étendard obovoïde, étréci en un long onglet; étamines unies, anthères alternativement stériles; style glabre, ovaire sessile avec de nombreux ovules. Gousse linéaire avec des cloisons entre les graines.

T. uncinatus (L.) Sw.

T. labialis (L. f.) Spreng.

Erythrina L.

Arbres ou arbustes dressés, souvent épineux. Feuilles pennées avec 3 folioles avec 3 folioles; stipelles glanduliformes; stipules petites. Fleurs généralement écarlates, 2 ou plus ensemble, le long du rachis, apparaissant avant les feuilles, en racemes axillaires généralement; bractées et bractéoles petites ou absentes. Calice plus ou moins campanulé tronqué ou spathacé; étendard beaucoup plus grand que les ailes et la carène qui sont souvent incluses à l'intérieur du calice; étamine supérieure libre ou unie à la base avec le reste, les autres unies vers le milieu ou au-dessus; ovaire stipité; ovules nombreux. Gousse pédonculée, rétrécie ou sinuée entre les graines, bivalvée ou s'ouvrant seulement le long du bord supérieur ou s'ouvrant à peine.

E. indica Lam. «Bois immortel.» Ornemental.

E. leptopoda Urb. et Ekm. «Bois immortel.» Ornemental.

E. micropteryx Poepp. «Bois immortel.» Ornemental.

E. berteriana Urb.

Rhodopis Urb.

Arbrisseau volubile. Feuilles unifoliolées avec stipelles, le pétiole articulé au sommet et à la base; stipules légèrement subulées. Fleurs roses; inflorescence à long pédoncule; fleurs nombreuses agrégées sur de petits rameaux raccourcis; bractées et bractéoles légèrement subulées. Calice tubulaire bilabié, à 5 segments, les 2 lobes supérieurs unis, les 2 latéraux plus petits, le lobe inférieur presque aussi long que les lobes supérieurs; étendard oblong—dressé, rétréci en onglet, auriculé; ailes linéaires—oblongues, auriculées, unies à la carène; carène connée au dos, l'onglet des ailes et de la carène adné à la base du tube staminal; étamine vexillaire libre à la base; ovaire avec un court support, ovules nombreux, styles imberbes de même longueur au sommet, stigmate terminal très petit. Gousse avec un court pédoncule, comprimée, bivalvée, munie d'un court bec, dressée ou presque recourbée par en bas.

R. planisiliqua (L.) Urb.

Mucuna Adams.

Herbes ou arbrisseaux grimpants, rarement dressés. Feuilles pennées, folioles 3, stipelles présentes, stipules décidues. Fleurs en racemes qui sont parfois subombellées, grandes, pourpres, rouges ou jaunâtres, solitaires ou agrégées sur le rachis. Calice en forme de coupe, avec 4 segments ou 4 à 5 dents; étendard auriculé à la base, plus court que les ailes; étamine supérieure libre, le reste uni; anthères alternativement fixées à la base et oscillantes, les dernières velues et avec des filets quelque peu épaissis au-dessus. Gousse épaisse, coriacée, poilue, souvent avec des poils qui piquent, les graines séparées par des cloisons ou par un tissu; hile élargi.

M. sloanei Fawc. et Rendle, «Yeux bourrique» (Haïti); «Horse-eye bean» (Jamaïque).

M. pruriens (L.) P. DC, «Pois gratté» (Haïti); «COWHAGE», «Cowich», «Vine Gungo pea» (Jamaïque).

M. urens (L.) Fawc. et Rendle, «Yeux bourrique» (Haïti); «Ox-eye bean» (Jamaïque); «Tortéza» (St-Domingue).

Calopogonium Desv.

Herbes grimpantes ou sous-arbrisseaux. Feuilles pennées; folioles 3, avec stipelles. Fleurs petites ou moyennes, grêles, bleues ou violettes, les fleurs solitaires presque sessiles, les fleurs agrégées en grappes allongées. Calice

campanulé ou en forme de tube court, les 2 lobes supérieurs libres ou plus ou moins soudés; étendard obovoïde, auriculé à la base; ailes grêles; carène obtuse généralement plus courte; étamines libres; ovaire sessile, ovules nombreux. Gousse oblongue, plate—comprimée ou finalement convexe, bivalvée, cloisonnée intérieurement. Graines circulaires, grandes, plates.

C. cearuleum Benth.

C. galactioides (H. B. K.) Benth.

C. domingense Urb. et Ekm.

C. orthocarpum Urb.

Galactia Michx.

Herbes ou arbrisseaux grimpants ou dressés. Feuilles pennées; folioles le plus souvent 3, rarement 1, 5 ou 7 avec stipelles; stipules petites, le plus souvent décidues. Fleurs rouges, violettes ou blanches, agrégées en grappes ou rarement agrégées simples ou solitaires, les bouquets naissent des tubercules sur le rachis. Calice à 4 segments, acuminés, aussi longs que le tube, ou 2 fois plus longs; étamine supérieure libre ou rarement unie légèrement par le milieu avec le reste; anthères uniformes, oscillantes; style grêle, dépourvu de poils; stigmate petit, terminal; ovaire avec de nombreux ovules. Gousse linéaire, comprimée, les graines séparées par un tissu.

G. parvifolia A. Rich.

G. buchii Urb.

G. striata (Jacq.) Urb.

G. striata (Jacq.) Urb. Var. *tomentosa* (Bertol.) Urb.

G. striata (Jacq.) Urb. Var. *cubensis* (H. B. K.) Urb.

G. jussæana Kunth.

G. filiformis (Jacq.) Benth.

G. filiformis. Var. *abbreviata* Urb.

G. leucocarpa Desv.

G. glomerata Urb.

G. fuertesii Urb.

G. schomburgkii Urb.

G. excisa Urb. et Ekm.

G. synandra Urb.

G. caimitensis Urb. et Ekm.

G. lignosa (Pers.) Urb.

G. dubia DC. Var. *ehrenbergii* Urb.

G. longifolia (Jacq.) Benth.

Canavalia P. DC.

Herbes vivaces avec tiges rampantes ou grimpantes. Feuilles alternes, pennées; folioles 3, avec stipelles; stipules petites, papillaires ou glanduliformes. Fleurs le plus souvent grandes, blanches, roses, bleuâtres ou violettes en racemes axillaires tuberculeux. Calice bilabié, la lèvre supérieure tronquée ou bilobée, la lèvre inférieure entière ou trilobée; étendard orbiculaire, réfléchi, grand; ailes étroites et libres; carène incurvée plus large que les ailes, obtuse ou avec un bec infléchi ou spirale; étamines diadelphes (9 et 1) ou monadelphes au milieu; style incurvé avec la carène, glabre; stigmate petit, terminal; anthères uniformes, oscillantes; ovaire sessile ou avec un court support; ovules nombreux. Gousse plate ou légèrement renflée, oblongue ou largement

linéaire, bivalvée, avec une forte nervure longitudinale de chaque côté près du bord supérieur. Graines grandes et plates.

C. rusiosperma Urb. «Mato colorado» (St-Domingue).

C. ensiformis DC. «Pois maldic.»

C. maritima (Aubl.) Thou. «Pois maldic lan mer.»

Cajanus P. DC.

Arbrisseau dressé avec feuilles pennées; folioles 3, avec de tout petits points creux, résineux en dessous; stipules caduques, subulées. Fleurs jaunes, le plus souvent pourpres en racemes axillaires. Calice campanulé avec 2 lobes supérieurs unis; étendard large et grand auriculé à la base; carène obtuse et incurvée; étamines libres (9 et 1); ovaire presque sessile avec de nombreux ovules; style épaissi au sommet, glabre; stigmate terminal. Gousse allongée, comprimée, turgide, bivalvée, avec des dépressions diagonales. Plante alimentaire très recherchée.

C. indicus Spreng. «Pois Congo» (Haïti), «Guandula» (St-Domingue); «Pigeon pea,» en anglais.

Rhynchosia Lour.

Herbes vivaces, volubiles, rampantes ou dressées, ou arbrisseaux. Feuilles pennées (très rarement digitées); folioles 3 (rarement 1); stipelles absentes; folioles ponctuées de creux résineux, généralement coriaces et pourvues de fortes nervures. Fleurs à corolle jaune, disposées en racemes terminaux ou axillaires ou agrégées axillaires. Calice quelque peu bilabié, les 2 lobes supérieurs généralement plus unis que les 3 lobes inférieurs; étendard large, divergent ou réfléchi, le plus souvent auriculé à la base; ailes étroites; carène incurvée au sommet; étamines diadelphes; ovaire avec un support court; ovules 2, très rarement 1. Gousse aplatie, bivalvée, orbiculaire, oblongue. Graines 2 rarement 1 seule dans la gousse.

R. parvifolia P. DC.

R. reticulata (Sw.) P. DC.

R. phaseoloides (Sw.) P. DC. «Liane bandé.»

R. pyramidalis (Lam.) Urb. «Guatabo» ou «Pimande» (St-Domingue).

R. minima (L.) P. DC.

R. swartzii (Vail.) Urb.

R. stenophylla Urb. et Ekm.

Eriosema DC.

Herbes ou sous-arbrisseaux dressés, rampants, rarement volubiles. Feuilles pennées, folioles 3, rarement 1 seule; stipules plus ou moins lancéolées, libres ou soudées dorsalement. Fleurs jaunes, le plus souvent petites, en racemes axillaires, parfois capitées, rarement solitaires dans l'axe des feuilles ou unies par paires; bractées rarement présentes. Calice campanulé, rarement tubulaire-campanulé, avec 5 segments presque égaux, dont les 2 supérieurs parfois légèrement soudés; étendard oblong ou obové, auriculé à la base; aile étroite; carène avec extrémité légèrement recourbée; étamines vexillaires libres; ovaire sessile ou très légèrement stipité; ovules 2; style filiforme ou quelque peu épaissi au sommet, recourbé avec stigmate terminal petit, capité. Gousse oblique, circulaire, rhomboïdale ou large-oblongue, bi-valvée, avec 2 graines, rarement 1 seule, le plus souvent non séparées à l'intérieur. Graines obliques, oblongues.

E. crinitum (H. B. K.) G. Don.

E. domingense Urb. et Ekm.

E. adulterinum Urb. et Ekm.

E. simplicifolium (DC.) G. Don.

Flemingia Roxb.

Sous-arbrisseaux ou arbrisseaux dressés, très rarement herbes. Feuilles pennées; folioles 3, très rarement 1; stipules avec nervures visibles, caduques le plus souvent. Fleurs rouges, pourpres ou pourpres et jaunes, en racemes compacts, épiés ou paniculés; bractées linéaires ou lancéolées. Calice court, campanulé, segments étroits, acuminés, les lobes inférieurs souvent plus longs que les lobes supérieurs; étendard auriculé à la base; étamine supérieure libre, le reste uni; stigmate petit, terminal; ovaire sessile ou avec un support court, ovules 2. Gousse courte, oblique, bivalvée, renflée. Graines 1-2.

F. strobilifera (L.) R. Br. «Wild hops» (Jamaïque).

Phaseolus L.

Herbes, parfois ligneuses à la base, grimpantes ou dressées. Feuilles pennées; folioles 3, très rarement 1, avec stipelles; stipules persistantes, garnies de côtes. Fleurs de couleurs variées, disposées en racemes pédonculés axillaires ou en panicules; bractées généralement caduques, stipuliformes ou très petites; bractéoles souvent plus larges. Calice campanulé à 4 dents plus courtes que le tube; étendard sub-orbiculaire, à limbe divergent ou recourbé; carène tordue en spirale avec un long bec obtus; étamines 10 diadelphes (9 et 1); anthères uniformes; style barbu, stigmate oblique ou latéral, ovaire presque sessile, ovules nombreux. Gousse légèrement aplatie, droite ou courbée, rostrée avec un léger tissu entre les graines.

P. lunatus L. «Pois de souche.» Alimentaire.

P. adenanthus G. F. W. Mey.

P. peduncularis H. B. K.

P. antillanus Urb.

P. lathyroides L.

P. vulgaris L. «Pois rouge, noir, blanc.» Alimentaire.

P. ricciardianus Tenore, «Pois Jérusalem.»

P. chryanthus Savi «Pois Jérusalem.»

P. sp. «Pois lentille.» Alimentaire.

Macroptilium Benth.

Gousse petite, recourbée en arrière avec valves solides, convexes — presque cylindriques. Stipules non allongées à la base, en forme d'éperon. Calice presque tubulaire, avec dents aiguës; ailes avec long pédoncule, plus longues que la carène.

M. domingense Urb.

M. ekmanianum Urb.

Vigna Savi.

Herbes rampantes ou volubiles, très rarement dressées. Feuilles alternes pennées; folioles 3, stipellées; stipules généralement sessiles à la base du pétiole. Fleurs jaunâtres, rarement pourpres, en grappes axillaires pédonculées. Calice campanulé, légèrement bilabié, les lobes 4-5, inégaux, relativement courts; étendard suborbiculaire, auriculé à la base; ailes courbées, non rostrées, ou le bec ne formant pas une spire complète; carène presque aussi longue que les ailes; étamines diadelphes (9 et 1); anthères uniformes; style filiforme, épaissi ou dilaté; stigmate oblique ou latéral; ovaire sessile; ovules

nombreux. Gousse étroite, presque cylindrique, droite ou courbée, souvent très longue. Graines variées, petites, pas larges et plates.

V. vexillata (L) A. Rich.

V. repens (L) O. Ktze.

V. sinensis (L) Endl. «Pois inconnu.» Alimentaire.

V. sp. «Pois mangé cochon.» Non encore identifié.

Pachyrrhizus L. C. Rich.

Herbes volubiles. Feuilles pennées; folioles 3, généralement plus ou moins sinuées, dentées, stipellées. Fleurs bleues ou blanches, sur des pédoncules fasciculés, en racemes avec des nœuds renflés; bractées sétacées et caduques. Etendard très large, auriculé à la base; ailes aussi longues que la carène; carène obtuse et incurvée; étamines diadelphes (9 et 1), style comprimé au dessus et poilu, stigmaté plus ou moins globulaire, extrémité involutée; ovaire presque sessile, ovules nombreux. Gousse grande, étroite, comprimée ou turgide, déprimée ou rétrécie entre les graines. Graines ovées ou très larges, aplaties.

P. erosus (L) Urb. «Pois manioc» ou «Pois cochon.»

Ordre XXVII. GERANIALES

Herbes, arbustes ou arbres. Feuilles variées, rarement réduites à des écailles. Fleurs parfaites ou unisexuées, disposées de différentes manières, le plus souvent régulières. Calice composé de sépales distincts ou absent; corolle formée de pétales distincts ou presque distincts, parfois absente; androcée composé rarement de deux fois plus d'étamines qu'il y a de sépales; gynécée de 2 ou plusieurs carpelles soudés, supère. Fruit et graines variés.

- x. Anthères s'ouvrant par des pores terminaux ou fissures 86. *Polygalaceæ*, p. 176
- x. Anthères s'ouvrant longitudinalement ou transversalement:
 - 2x. Sève mordicante ou laiteuse. Calice absent ou discoïde. Capsule trilobée:
 - 3x. Styles ou stigmates distincts ou presque distincts, fendus ou foliacés; ovaire trilobulaire ou rarement unilobulaire ou bilobulaire; étamines plusieurs, sauf quand elles se trouvent à l'intérieur d'un involucre:
 - 4x. Fruit généralement déhiscent. Périanthé simple ou absent 88. *Euphorbiaceæ*, p. 177
 - 4x. Fruit incomplètement déhiscent. Périanthé double—à corolle souvent gamopétale 87. *Dichapetalaceæ*, p. 177
 - 3x. Styles unis par paires; ovaire quadrilobulaire; étamine solitaire 89. *Callitrichaceæ*, p. 195
 - 2x. Sève aqueuse et calice de plusieurs sépales. Fruits variés:
 - 3x. Calice pentafide, imbriqué, 4 des lobes avec 2 glandes externes. Feuilles opposées 85. *Malpighiaceæ*, p. 172
 - 3x. Calice avec sépales dénués de glandes dorsales:
 - 4x. Feuilles peltées 77. *Tropaeolaceæ*, p. 162
 - 4x. Feuilles non peltées:
 - 5x. Feuilles stipulées:
 - 6x. Feuilles composées:
 - 7x. Feuilles alternes 76. *Oxalidaceæ*, p. 161
 - 7x. Feuilles opposées 80. *Zygophyllaceæ*, p. 163

- 6x. Feuilles simples:
 - 7x. Feuilles opposées 75. *Geraniaceæ*, p. 161
 - 7x. Feuilles alternes 79. *Erythroxylaceæ*, p. 163
- 5x. Feuilles dénuées de stipules:
 - 6x. Limbes des feuilles ponctuées de glandes oléifères 81. *Rutaceæ*, p. 164
 - 6x. Limbes des feuilles non ponctués de glandes oléifères:
 - 7x. Herbes: 78. *Linaceæ*, p. 162
 - 7x. Arbres, arbustes ou arbrisseaux:
 - 8x. Filets plus ou moins unis en tube ou adhérent au disque de la colonne 84. *Meliaceæ*, p. 170
 - 8x. Filets distincts presque ou tout à fait à la base:
 - 9x. Ecorce amère contenant des sacs oléifères. Pétales généralement imbriqués 82. *Simarubaceæ*, p. 167
 - 9x. Ecorce résinifère. Pétales valvés 83. *Burseraceæ*, p. 169

Famille 75. GERANIACEÆ

Herbes ou arbrisseaux; branches renflées aux nœuds. Feuilles simples, stipulées. Sépales et pétales 5, généralement distincts et imbriqués; étamines 10 ou 15 (5) souvent unies à la base; ovaire à 5 loges, carpelles unis avec l'axe, prolongés au-dessus en un bec avec les styles plus ou moins unis avec lui. Fruit: une capsule s'ouvrant élastiquement en 5 coques monospermes; endosperme mince ou absent.

- x. Fleurs sans éperon *Geranium*, p. 161
- x. Fleurs avec éperon adné au pédicelle *Pelargonium*, p. 161

Geranium L.

Plantes basses généralement diffuses avec des tiges bifurquées. Feuilles généralement orbiculaires — réniformes, lobées ou disséquées palmées, les feuilles radicales munies d'un long pétiole. Fleurs régulières, sans éperon, les 5 pétales imbriqués et hypogynes; étamines 10, généralement anthérifères. Fruit comprenant des carpelles turgescents qui, le plus souvent, sont attachés aux styles de façon permanente.

- G. rotundifolium* L.
- G. robertianum* L.
- G. dissectum* L.

Pelargonium L'Her.

Plantes souvent succulentes. Feuilles à nervation digitée ou pennée, lobées ou disséquées, dégageant une odeur très forte. Fleurs multicolores; calice muni d'un éperon nectarifère réuni au pédicelle; sépales et pétales généralement 5, les 2 pétales supérieurs le plus souvent plus grands et de couleur plus frappante; étamines 10, quelque peu connées à la base, quelques-unes d'entre elles ne portent pas d'anthères. Fruit pentavalvé, les valves se replient généralement au moment de la déhiscence.

P. hortorum Bailey. «*Geranium*» (Haïti), «*Fish geranium*» en anglais.

Famille 76. OXALIDACEÆ

Herbes, arbrisseaux, arbustes ou arbres. Feuilles composées, alternes; stipules libres du pétiole ou non, ou absentes. Sépales 5, imbriquées; pétales 5, tordus dans le bourgeon; étamines 10, unies à la base, filets alternativement

inégaux, 5 opposés aux sépales plus longs; ovaire à 5 loges; styles 5, distincts avec stigmates terminaux, capités; ovules placés dans l'angle interne de chaque loge, 1 ou beaucoup.

- x. Feuilles digitées. Herbes. Fruit capsulaire *Oxalis*, p. 162
 x. Feuilles paripennées. Arbres. Fruit bacciforme *Averrhoa*, p. 162

Oxalis L.

Herbes. Feuilles digitées, généralement trifoliolées; folioles sensibles à la lumière, s'inclinant vers la terre lorsque la lumière disparaît. Ovules le plus souvent nombreux. Fruit capsulaire loculicide.

- O. eggersii* Urb.
O. barrelieri L.
O. repens Tumb. «*Vinagrillo*» (St-Domingue).
O. domingensis Urb.
O. hemitoma Urb.
O. oligosperma Urb.
O. scoparia Norlind.
O. trouiniana Urb.
O. martiana Zucc.

Averrhoa L.

Arbres. Feuilles alternes, paripennées, quelque peu sensibles; folioles plusieurs — beaucoup, alternes ou semi-opposées, entières. Fleurs très petites, odoriférantes, disposées en courts bouquets parfois sur des branches nues ou au-dessous des feuilles. Sépales 5, les sépales externes plus courts; pétales 5; étamines 10, les étamines alternes plus longues et plus courtes; styles 5 et distincts. Fruit charnu, comestible.

- A. bilimbi* L. «*Blimblin*.»
A. carambola L. «*Zibline*.»

Famille 77. TROPÆOLACEÆ

Herbes souvent grimpantes au moyen de pétioles enroulants. Racines tubéreuses. Tiges molles, plus ou moins succulentes. Feuilles alternes, digitées, anguleuses ou peltées, parfois lobées ou disséquées. Fleurs solitaires sur de longs pédoncules axillaires, très irrégulières, généralement voyantes. Sépales 5, l'un prolongé en un long éperon grêle; pétales 5 ou parfois moins nombreux par avortement, ongiculés, souvent coupés ou frangés, les 2 pétales supérieurs ne ressemblant pas aux autres et généralement plus petits et insérés dans l'ouverture de l'éperon; étamines 8, distinctes, inégales; ovaire trilobé et triloculaire. Fruit de 3 carpelles unis, indéhiscent, monosperme.

Tropæolum L.

Caractères de la famille.

T. majus L. généralement cultivé à Kenscoff, appelé «*Garden Nasturtium*» en anglais.

Famille 78. LINACEÆ

Herbes ou arbrisseaux. Feuilles alternes, simples, généralement entières. Fleurs parfaites, régulières, en racemes ou en cymes paniculées ou corymbueuses. Les parties de la fleur: 5; sépales imbriqués; pétales imbriqués, généralement tordus dans le bourgeon, fugaces; étamines généralement 5, unies en dessous, hypogynes; glandes staminodiales 5, sur la colonne staminale; ovaire libre, entier, 3-5 loges; ovules 1 ou 2 dans l'angle de chaque loge; styles 3-5. Fruit capsulaire.

Linum L.

Caractères de la famille.

L. humile Mill.

Famille 79. ERYTHROXYLACEÆ

Arbustes ou arbres glabres. Feuilles alternes, simples, entières. Fleurs blanches 1 à plusieurs, dans l'axe des feuilles, parfois apparaissant avant les feuilles, régulières, parfaites, mais parfois les anthères ou le pistil stériles. Parties de la fleur: 5; calice persistant, segments 5, imbriqués; pétales 5, libres, décidus, généralement avec une ligule à la base; étamines 10, filets unis en dessous en coupe; ovaire triloculaire avec 1 ou 2 ovules pendants dans chaque loge, styles 3, généralement avec des stigmates terminaux capités. Fruit drupacé. Graines généralement avec endosperme.

Erythroxylum L.

Caractères de la famille.

- E. rufum* Cav. «*Topillo*» (St-Domingue).
E. areolatum L. «*Poirier*» (Arcahaie), «*Arabo*» (St-Domingue).
E. minutifolium Griseb.
E. havanense Jacq. Var. haïtienne *O. E. Schulz*.
E. suave *O. E. Schulz*.
E. brevipes P. DC.
E. urbanii *O. E. Schulz*.
E. barahonense *O. E. Schulz et Ekm.*

Famille 80. ZYGOPHYLLACEÆ

Herbes, arbrisseaux, arbustes ou arbres. Feuilles opposées ou alternes par l'avortement d'une feuille de la paire, pinnées, stipulées; folioles entières. Pédoncules 1 ou 2 ensemble ou souvent plus dans le genre *Guajacum*, uniflores. Fleurs hermaphrodites; sépales et pétales généralement 5, imbriqués, distincts; étamines généralement 10, distinctes; ovaire 2-12 loges; styles unis en un seul; ovules 2 à beaucoup, plus rarement 1, pendants ou ascendants, avec raphé ventral et micropyle supérieur. Fruit composé de 2-12 capsules; capsules avec 1 ou peu de graines.

- x. Arbres ou arbustes. Fruit charnu au début, anguleux ou ailé *Guajacum*, p. 163
 x. Herbes. Fruit sec:
 2x. Sépales décidus. Fruit épineux *Tribulus*, p. 164
 2x. Sépales persistants. Fruit tuberculifère *Kallstroemia*, p. 164

Guajacum L.

Arbres ou arbustes avec bois dur, résineux; ramilles souvent avec des nœuds renflés ou articulés. Feuilles pennées se terminant par une paire de folioles; folioles coriaces en 2-14 paires; stipules très petites, caduques. Pédoncules uniflores solitaires ou 2 ou plus, avec de toutes petites bractées décidues, situées à la base. Sépales inégaux; pétales obovés; ovaire stipité 2 ou 5 loges; ovules 8-10 dans chaque loge, pendants. Fruit quelque peu charnu au dehors, composé de 2 ou 5 capsules; capsules anguleuses ou ailées au dos, monospermes.

G. officinale L. «*Gaïac*,» «*Gaïac franc*,» «*Gaïac mâle*» (Haïti), «*Guayacan*» (St-Domingue); «*Lignum vitæ*,» en anglais.

G. sanctum L. «*Gaïac femelle*» ou «*Gaïac bâtard*» (Haïti), «*Guayacan bastarde*» ou «*Vera*» (St-Domingue).

Tribulus L.

Herbes avec branches procumbantes. Feuilles opposées, pinnées, se terminant par une paire de folioles, une de chaque paire alternativement plus petite que l'autre ou parfois absente, stipules obliquement lancéolées. Fleurs solitaires sur des pédoncules axillaires. Sépales lancéolés — ovés, caducs; pétales obovés, décidus; étamines 10 en 2 séries, les 5 opposées aux pétales extérieures et généralement un peu plus longues, les 5 étamines alternes avec une petite glande à la base extérieurement; ovaire pentalobé, pentaloculaire, chaque loge divisée par des cloisons transverses en 3-5 compartiments; ovules, un dans chaque compartiment, attaché à l'angle central. Fruit penta-capsulaire.

T. cistoides L. «Fleur capre» (Haïti) «Abrojo» (St-Domingue); «Turkey blossom» (Jamaïque).

Kallstroemia Scop.

Herbes, branches ascendantes ou procumbantes. Feuilles opposées, pinnées, une de chaque paire de folioles alternativement plus petite que l'autre ou absente; stipules linéaires, acuminées. Sépales persistant dans le fruit; pétales obovés; étamines 10, celles opposées aux pétales plus ou moins adhérent à leur base, les étamines alternes plus petites, avec une glande stipitée à la base extérieurement; ovaire 10-12 lobes, 10-12 loges; ovules, 1 dans chaque loge, pendant dans l'angle central. Fruit composé de 10-12 capsules; capsule tuberculifère avec une loge et une graine.

K. maxima (L.) Wight et A. «Abrojo» (St-Domingue).

K. caribaea Rydberg.

K. incana Rydberg.

Famille. 81. RUTACEÆ

Arbustes ou arbres, rarement herbes, généralement glandulaires et parsemés de points creux et fortement aromatiques. Feuilles avec des points pellucides, dénuées de stipules, généralement opposées et composées, digitées ou pennées, avec 1, 3, 5 folioles ou plus. Fleurs hermaphrodites, polygames ou dioïques. Les parties florales généralement au nombre de 4 ou de 5. Sépales et pétales imbriqués; étamines aussi nombreuses ou 2 fois plus nombreuses que les pétales; carpelles généralement 4 ou 5 unis en un seul ovaire de 4-5 loges, ou libres à la base et unis dans les styles ou stigmates, ou tous ensemble libres et uniloculaires; ovules généralement 2 dans chaque carpelle. Fruits variés.

Cette famille est très riche en propriétés aromatiques et produit des huiles essentielles et des fruits comestibles. Certaines plantes de cette famille sont employées comme ornement.

- x. Fruit sec, capsule ou samare:
 - 2x. Herbes Ruta, p. 165
 - 2x. Arbres ou arbustes:
 - 3x. Etamines 8 Plethadenia, p. 165
 - 3x. Etamines 2-5:
 - 4x. Feuilles alternes Fagara, p. 165
 - 4x. Feuilles opposées ou verticillées:
 - 5x. Calice régulier, cilié Pilocarpus, p. 167
 - 5x. Calice irrégulier, avec 2 sépales plus grands Ravenia, p. 166
- x. Fruit pulpeux, drupe ou baie:
 - 2x. Androcée de plus de 10 étamines Citrus, p. 167
 - 2x. Androcée de 10 étamines ou moins:
 - 3x. Fruit, une drupe Amyris, p. 166
 - 3x. Fruit, une baie:
 - 4x. Etamines 8-10:

- 5x. Style très court; pétales unis à la moitié de leur longueur Glycosmis, p. 166
- 5x. Style aussi long ou plus long que l'ovaire; pétales unis à moins d'un tiers de leur longueur Murraea, p. 166
- 4x. Etamines 6 Triphasia, p. 167

Plethadenia Urb.

Arbres ou arbustes inermes. Feuilles alternes, rarement opposées, pinnées; folioles 6-8, petites, oblongues ou obovées, glandulaires et ponctuées. Fleurs petites, blanches, hermaphrodites, peu nombreuses en cymes axillaires. Sépales 4; pétales 4, valvés; étamines 8, filets libres, anthères suborbiculaires, biloculaires, à déhiscence longitudinale; ovaire sessile, quadrilobé et quadriloculaire; ovule solitaire dans chaque loge, ascendant; styles 4.

P. granulata (Krug. et Urb.) Urb.

Fagara L.

Arbres ou arbustes plus ou moins aromatiques; écorce parfois subéreuse et armée d'épines. Feuilles alternes, composées, pinnées; folioles ponctuées, entières ou dentées. Fleurs blanches ou blanchâtres, polygames, en cymes terminales ou rarement axillaires paniculées ou corymbeuses, ou rarement agrégées. Sépales 4-5, imbriqués; pétales 4-5; étamines 4-5, réduites dans les fleurs pistillées; carpelles 1-4, uniloculaires, plus ou moins soudés; styles parfois presque distincts; ovules 2 dans chaque loge. Fruit, une capsule, bivalvée, glandulaire et ponctuée.

F. elephantipes (Macf.) Krug. et Urb. «Pinné jaune» (Haïti), «Pina macho» (St-Domingue).

F. martinicensis Lam. «Bois piné» (Haïti), «Pino» (St-Domingue).

F. nashii (P. Wills.) Urb. (comb. nov.).

F. monophylla Lam. «Pino» (St-Domingue).

F. flava (Vahl.) Krug. et Urb. «Espinillo» (St-Domingue).

F. pterota L.

F. spinifex Jacq.

F. tragodes (L.) Jacq.

F. trifoliata Sw.

F. domingensis Krug. et Urb.

F. pimpinelloïdes Lam.

F. coriacea (A. Rich) Krug et Urb.

F. venosa (Leonard) Urb.

F. obcordata Urb. et Ekm.

F. tetraphylla Urb. et Ekm.

F. furcensis Urb.

F. nigrescens Urb. et Ekm.

F. leonardi Urb.

F. haïtiens Urb.

F. obtriangularis Urb.

F. azuensis Urb. et Ekm.

Ruta L.

Herbes vivaces, caulescentes, parfois plus ou moins ligneuses. Feuillage glandulaire, ponctué, souvent fortement aromatique. Fleurs en cymes terminales corymbeuses ou paniculées. Sépales 4-5, persistants; pétales 4-5, jaunes ou verdâtres, imbriqués; disque épais 8-10 lobes; étamines 8-10;

ovaire sessile avec 4-5 loges et 4-5 lobes, styles unis, stigmate terminal, ovules plusieurs dans chaque loge de l'ovaire. Capsule avec 4-5 loges et 4-5 lobes, s'ouvrant généralement au sommet. Graines nombreuses.

R. chalepensis L. «Citronnelle marron.»

Ravenia Vell.

Arbres ou arbustes. Feuilles opposées, trifoliolées (dans nos espèces). Pédoncules axillaires, pauciflores. Sépales 4-5, les 2 externes plus grands, renfermant le bourgeon; corolle tubulaire, droite, limbe oblique avec 4-5 segments quelque peu inégaux; disque en forme de coupe, crénelé, avec 4-5 lobes, renfermant l'ovaire; étamines 4-2, filets adnés au tube de la corolle, anthères 2-4, attachées à la gorge de la corolle; staminodes 3-1, linéaires, exerts; ovaire de 4-5 carpelles submergés dans le disque; style 1, grêle; stigmate à 4-5 lobes; ovules 2 dans chaque loge, superposés. Capsule enveloppée par le calice persistant avec 5-1 cocci, cocci bivalvés; endocarpe dur et cassant. Graine 1-2 dans chaque coccus.

R. spectabilis (Lindl.) Planch.

Amyris L.

Arbres et arbustes glabres, résineux. Feuilles alternes ou opposées et alternes, avec 1-3 folioles ou imparipennées; folioles opposées avec de nombreux petits points pellucides. Panicules axillaires et terminales avec de nombreuses fleurs; fleurs petites, blanches, souvent 3 ensemble, hermaphrodites ou polygames. Parties florales 4; calice urcéolé, quadridenté, persistant; pétales 4, imbriqués, divergents ou recourbés; étamines 8; ovaire uniloculaire avec 2 ovules pendants. Drupe petite, aromatique, oléagineuse; noyau papyracé, monosperme.

A. diatrypa Spreng. «Bois chandelle.»

A. elemifera L. «Bois chandelle.»

A. maritima Jacq. «Bois chandelle» ou «Chandelle blanc» (Haïti), «Guaconejo» (St-Domingue).

A. abegii Ekman Msc.

A. blasamifera L. «Bois chandelle.»

A. sylvatica Jacq.

A. phlebotænioides Urb. et Ekm.

A. apiculata Urb. et Ekm.

A. intermedia Urb. et Ekm.

A. pungens Urb. et Ekm.

Glycosmis Correa.

Arbres ou arbustes inermes. Feuilles alternes, pinnées ou unifoliolées, avec de nombreux points pellucides. Panicules axillaires; fleurs petites. Calice quinquafide, lobes imbriqués; pétales 5, libres, imbriqués; étamines 10, libres; ovaire sessile sur le disque, 2-5 lobes; ovules pendants, 1 dans chaque loge. Fruit, une baie avec 1-3 graines.

G. pentaphylla (Retz.) Correa.

Murraea König.

Arbres ou arbustes inermes. Feuilles alternes, imparipennées. Fleurs solitaires ou en cymes, quadri-pentamères, plutôt grandes. Calice très petit, profondément denté; étamines 8-10; ovaire avec 2-5 loges, ovules 1-2 dans chaque loge. Fruit, une petite baie avec peu ou beaucoup de graines.

M. exotica L. «Bun» (Haïti), «Myrte» (St-Domingue); «Orange-jessamine» en anglais.

Triphasia Lour.

Arbustes ou arbrisseaux épineux. Feuilles alternes, trifoliolées, avec de nombreux petits points pellucides; folioles latérales plus petites. Fleurs solitaires, axillaires, blanches, odoriférantes. Calice trilobé; pétales 3, libres, imbriqués; étamines 6, libres; ovaire sessile sur le disque, triloculaire; ovules, 1 dans chaque loge. Fruit, une baie avec 1 ou 2 loges et 1 ou 2 graines.

T. trifolia (Burn. f.) P. Wilson.

Citrus L.

Arbres ou arbustes, généralement épineux. Feuilles unifoliolées, (composées, en réalité, mais ressemblant à des feuilles simples) le pétiole généralement ailé; folioles avec de petits points pellucides. Fleurs hermaphrodites, odoriférantes, axillaires, solitaires, agrégées, racémeuses ou courtement paniculées (souvent aussi avec des fleurs mâles). Calice en forme de coupe peu profonde, 3-5 dents; pétales 4-8, libres, linéaires — oblongs, épais, imbriqués; étamines 20-60; disque grand, supportant l'ovaire; ovaire multiloculaire, ovules 4-8 disposées sur 2 rangées dans chaque loge. Fruit, une hespéridie.

C. lima Lunan.

C. vulgaris Risso.

C. peretta Risso. Var. *domingensis* Tuss.

C. medica L.

C. limonium Osbeck. «Limon France.»

C. aurantifolia Swingle, «Citron.»

C. maxima Merr. «Chadèque.»

C. aurantium L. «Orange sure.»

C. sinensis Osbeck. «Orange douce.»

C. nobilis Louv. Var. *deliciosa* Swingle. «Mandarine.»

C. limetta Risso. «Calmouc.»

Pilocarpus Vahl.

Arbrisseaux ou arbustes. Feuilles opposées ou verticillées, succulentes ou coriaces, simples ou imparipennées. Fleurs hermaphrodites, petites, verdâtres, sessiles ou pédonculées, terminales ou axillaires, disposées en épis ou en grappes. Calice court, avec 4 ou 5 lobes, cilié; pétales 4-5, égaux, persistants, coriacés, ovoïdes ou lancéolés, valvés ou légèrement imbriqués; étamines 4-5 sous le disque avec des filets glabres, subulées; anthères bilobées; ovaire avec 4-5 lobes, carpelles unis avec 2 graines superposées, style court, stigmate capité avec 5 lobes. Fruit folliculaire.

P. racemosus Vahl.

Famille 82. SIMARUBACEÆ

Arbustes ou arbres. Feuilles alternes, rarement opposées, pinnées, rarement avec 1-3 folioles ou simples; stipules absentes. Inflorescence axillaire le plus souvent paniculée ou racémeuse; fleurs petites, diclines ou polygames. Calice avec 3-5 lobes ou segments; pétales 3-5; étamines insérées à la base du disque, aussi nombreuses ou 2 fois aussi nombreuses que les pétales; anthères introrsées, avec déhiscence longitudinale; ovaire 2-5 lobes, 1-5 loges ou 3-5 carpelles libres; styles 2-5; ovules solitaires dans les loges (2 dans les genres *Picramnia* et *Alvaradoa*), attachés à l'angle interne. Graines solitaires, pendantes (dressées dans les genres *Suriana* et *Alvaradoa*).

x. Feuilles simples:

2x. Fleurs hermaphrodites *Suriana*, p. 168

2x. Fleurs unisexuées *Castela*, p. 168

x. Feuilles composées:

2x. Ovaire lobé:

3x. Ovaire quinquéfide..... *Simaruba*, p. 1683x. Ovaire 2-3 lobes..... *Picrasma*, p. 168

2x. Ovaire entier:

3x. Inflorescence opposée aux feuilles..... *Picramnia*, p. 169

3x. Inflorescence axillaire:

4x. Fruit capsulaire. Pétales généralement présents..... *Alvaradoa*, p. 1694x. Fruit drupacé. Pétales absents..... *Picrodendron*, p. 169*Suriana* L.

Arbrisseau qui croît au bord de la mer. Feuilles alternes groupées ensemble, simples, linéaires, spatulées, épaisses, dénuées de stipules. Fleurs subterminales, cachées par les feuilles, solitaires ou peu nombreuses, racemeuses, jaunes, hermaphrodites. Calice quinquéfide, imbriqué, persistant; pétales 5, aussi longs que le calice, imbriqués; étamines 10, hypogynes, les 5 étamines opposées aux pétales sont plus courtes et parfois dépourvues d'anthères; ovaire de 5 carpelles distincts; styles surgissant près de la base, libres; ovules 2 dans chaque loge, ascendants; carpelles mûrs 3-5, enveloppés par le calice, monospermes; endocarpe dur et cassant. Graines ascendantes.

S. maritima L. «Crisse marine» (Haïti), «Jobero» (St-Domingue).

Simaruba Aubl.

Arbres. Feuilles alternes, pinnées, pari ou imparipennées; folioles le plus souvent alternes, entières. Panicules axillaires et terminales; fleurs petites, dioïques ou monoïques; calice avec 5 lobes; pétales 5 imbriqués; disque vilieux. Fleurs mâles: étamines 10, insérées à la base du disque, incluses; filets avec une courte écaïlle à la base. Fleurs femelles: staminodes squamiformes; ovaire quinquéfide, styles unis, stigmates divergents ou recourbés, ovule solitaire. Drupes 1-5, sur le réceptacle élargi.

S. berteroa Krug. et Urb. «Daguillo» ou «Olive» (St-Domingue).

S. glauca DC. «Frêne»

S. officinalis P. DC. «Bois blanc»

Castela Turp.

Arbustes ou arbrisseaux; branches souvent réduites à des épines. Feuilles alternes simples, entières, coriaces. Fleurs petites, peu voyantes, agrégées ou solitaires dans l'axe, dioïques; calice petit, quadrafide; pétales 4, imbriqués; disque charnu, crénelé. Fleurs mâles: étamines 8; ovaire absent. Fleurs femelles: staminodes 8; ovaire composé de 4 carpelles unis au sommet; styles 4, courts, unis en dessous, recourbés et stigmatiques en dessus; ovule solitaire dans chaque loge. Drupes 1-4, charnues; endocarpe dur, cassant.

C. depressa Turpin.

Picrasma Bl.

Arbres avec jus amer. Feuilles alternes, pinnées avec une foliole dépareillée; folioles opposées, entières. Panicules axillaires, corymbeuses; fleurs verdâtres, polygames. Sépales petits 4-5; pétales 4-5, subvalvés, ne grossissant pas après la floraison; disque en forme de saucière dans la fleur mâle, arrondi, avec 4-5 lobes dans les fleurs hermaphrodites; étamines 4-5 insérées sous le disque; ovaire de 2-3 lobes, lobes libres; styles 2-3 unis en dessous, libres en dessus; ovule solitaire dans chaque loge. Drupes 1-3, presque charnues; endocarpe dur et cassant.

P. excelsa (Sw.) Planch. «Goric»

P. selleana Urb.

Picramnia Sw.

Arbustes ou arbres, souvent très amers. Feuilles alternes, pinnées avec une foliole dépareillée; folioles généralement alternes. Epis ou grappes opposés aux feuilles, pendants; fleurs dioïques, parfois polygames, petites, agrégées, en grappes ou en panicules. Calice trifide—quinquéfide, imbriqué; pétales 3-5, rarement absents; étroits, imbriqués; étamines des fleurs mâles 3-5 opposées aux pétales, insérées sous le disque; étamines des fleurs femelles réduites à des staminodes linéaires; pistil généralement absent dans les fleurs mâles; ovaire 2-3 loges; styles courts bi-trifides, ovules 2, collatéraux près du sommet des loges. Baie 1-2 loges, loges monospermes.

P. antidesma Sw.

P. pentandra Sw. «Vaillant garçon» ou «Bois poison» (Haïti), «Palo peje» ou «Palo de pez» (St-Domingue).

P. macrocarpa Urb. et Ekm.

P. domingensis Urb.

Alvaradoa Liebm.

Arbustes ou arbrisseaux avec jus amer. Feuilles alternes, imparipennées; folioles alternes. Racemes axillaires et terminaux, multiflores; fleurs très petites, tomenteuses, dioïques. Calice quinquéfide, valvé; pétales 5, filiformes ou absents. Fleurs mâles: disque grand, profondément pentalobé; étamines 5, alternes avec les lobes du calice, insérées entre les lobes du disque; anthères biloculaires, connectif épaissi, au dos. Fleurs femelles: pétales 5; étamines absentes; ovaire 2-3 loges, une seule loge fertile; styles 2-3; ovules 2 dans la loge fertile, dressés. Capsule très comprimée ou munie de 2 ailes, bi ou tri-loculaire; loges monospermes. Graine 1, dressée, comprimée.

A. haïtiensis Urb. «Abbé marron»

Picrodendron Planch.

Arbrisseaux. Feuilles décidues, alternes, digitées—trifoliolées; stipules petites, caduques. Fleurs dioïques, apétales. Fleurs mâles: calice absent; étamines en groupes de 3-54, sur un réceptacle convexe, qui peut se former de l'union des bases des filets, sous-tendu par une ou plusieurs ou 7 bractées imbriquées; fleurs agrégées sur des épis axillaires pédonculés; réunies à l'extrémité des jeunes branches et apparaissant avec les jeunes feuilles; filets courts, anthères biloculaires, fixées par la base à déhiscence longitudinale. Fleurs femelles pédonculées, solitaires, axillaires; calice de 4-5 sépales libres valvés, inégaux, portant de très petites glandes à la base; staminodes absents; ovaire supère biloculaire, la paroi externe contenant de nombreux vésicules; style terminal, grêle, portant deux grands stigmates divergents; ovules 2 dans chaque loge, pendant du sommet de l'axe central anatropes. Fruit: une drupe; exocarpe mince, charnu, contenant un jus amer; endocarpe cassant.

P. macrocarpum (A. Rich.) Britton. «Simarouba» (Ile de la Gonâve).

Famille 83. BURSERACEÆ

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, dépourvues de stipules, simples ou imparipennées; folioles opposées. Inflorescence racemeuse ou paniculée; fleurs parfaites ou polygamo-dioïques. Calice de 3-6 sépales imbriqués ou valvés, persistants; disque annulaire ou en forme de coupe, libre ou adné au tube du calice; corolle de 3-6 pétales décidus, imbriqués ou valvés, distincts ou légèrement unis. Androcée de 6-12 étamines insérées sous le disque; filets subulés distincts, nus; anthères souvent oscillantes, introrsées. Ovaire de 2-5

loges, libre; styles unis, parfois absents; stigmate 2-5 lobes; ovules 2 ou rarement 1 dans chaque loge, pendants, anatropes. Fruit drupacé, parfois avec un épicarpe plus ou moins valvulé.

x. Pétales unis jusqu'au milieu, pubescents **Tetragastris**, p. 170

x. Pétales valvés:

2x. Stigmate trilobé, ovaire trilobulaire **Bursera**, p. 170

2x. Stigmate 4-5 lobes, ovaire 4-5 loges **Protium**, p. 170

Protium Burm.

Arbres. Feuilles imparipennées avec folioles entières en 1-5 paires. Fleurs hermaphrodites ou polygames, subsessiles ou sessiles, réunies sur les courtes branches d'une panicule. Calice petit à 4-5 lobes, lobes imbriqués à la base dans le bourgeon; pétales 4-5 valvés; étamines 8-10, insérées à la base du disque; disque avec 8-10 crénelures, annulaire ou en forme de coupe dans les fleurs hermaphrodites, plat-convexe dans les fleurs mâles; ovaire à 5-4 loges, styles variant de longueur, stigmate à 4-5 lobes. Drupe globulaire ou ovoïde, souvent apiculée avec le style persistant, composée de 1-5 cocci, chaque coccus uniloculaire, monosperme.

P. glaucescens Urb.

Tetragastris Gærtn.

Arbres glabres. Feuilles imparipennées avec court pétiole. Fleurs petites, disposées en épis axillaires peu compacts; pédoncules courts; bractées petites, sessiles. Sépales 4-5 unis en coupe; pétales 4-5 unis, les segments 3-4 fois plus courts que le tube, valvés dans le bourgeon; étamines 8-10 à la base du disque avec 8-10 rainures; filets très courts; ovaire enfoncé à moitié dans le disque, ovoïde, avec 4-5 loges, et 2 ovules dans chaque loge; style très court avec stigmate à 4-5 lobes, capité. Drupe globulaire ou ovoïde avec 3-4 rainures et 3-4 loges; mésocarpe épais et résineux.

T. balsamifera (Sw.) O. Ktze. «Bois cochon» (Haïti), «Amacey» (St-Domingue).

Bursera Jacq.

Arbres avec suc résineux, balsamiques. Feuilles composées ou simples. Fleurs petites, polygames, en panicules latérales ou en grappes, parfois agrégées. Calice petit avec 3-6 lobes; pétales 3-6 valvés; étamines 2 fois aussi nombreuses que les pétales, insérées à la base du disque annulaire; ovaire 3-5 loges, style très court, stigmates 3-5, ovules 2. Drupe ovoïde ou globulaire, oblique quelque peu triangulaire, indéhiscente ou parfois avec 2 ou 3 valves. Graines solitaires.

B. simaruba (L) Sarg. «Gommier blanc» ou «Chiboué» (Haïti), «Almacigo» ou «Almacigo blanco» (St-Domingue) d'après Urban.

B. nashii (Britton) Urb. (comb. nov.)

B. spinescens Urb. et Ekm.

B. ovata Urb. et Ekm.

B. gracilipes Urb. et Ekm.

B. brunea Urb. et Ekm.

Famille 84. **MELIACEÆ**

Arbres ou arbustes ou parfois herbes ligneuses avec un bois souvent dur et odoriférant. Feuilles alternes, sans stipules, généralement composées, pinnées, parfois trifoliolées; folioles entières ou dentées. Inflorescence paniculée; fleurs parfaites ou polygamo-dioïques, régulières. Calice de 3-5 sépales imbriqués ou rarement valvés; disque variable; corolle de 3-5 pétales distincts ou quel-

que peu unis, contordés ou imbriqués qui sont parfois adnés au tube staminal et valvés. Androcée de 8-10 étamines ou rarement moins ou plus, insérées à la base du disque; filets unis en tube dont le bord est denté ou fendu de différentes manières; anthères sessiles ou stipitées sur le tube, parfois apiculées. Gynécée de 2-5 carpelles unis; ovaire de 2-5 loges, libre; styles unis; ovules 2 ou plus, dans chaque loge, anatropes. Fruit: une baie, une capsule ou une drupe.

x. Étamines plus ou moins unies en forme de tube:

1x. Fruit capsulaire:

2x. Graines ailées **Swietenia**, p. 171

3x. Graines non ailées:

4x. Feuilles imparipennées. Capsule n'ayant pas plus de 3 valves **Trichilia**, p. 172

4x. Feuilles paripennées. Capsules ayant plus de 3 valves:

5x. Graines grandes, généralement plus de 2 graines dans chaque cavité.

Capsule quinquévalve **Carapa**, p. 171

5x. Graines petites, généralement 1 ou 2 dans chaque cavité. Capsule généralement quadrivalve

Guarea, p. 172

2x. Fruit drupacé **Melia**, p. 171

x. Filets libres **Cedrela**, p. 172

Swietenia Jacq.

Arbre avec bois rouge sombre. Feuilles pennées se terminant par une paire de folioles alternes, glabres; folioles opposées, pétioles. Fleurs petites, sur les branches corymbeuses des panicules axillaires et subterminales. Calice pentalobé; pétales 5, convolutés dans le bourgeon; étamines unies en un tube en forme d'urne avec 10 dents, anthères attachées intérieurement entre les dents; ovaire pentaloculaire, ovules environ 12 dans chaque loge, horizontaux sur l'axe central. Fruit capsulaire ligneux, à déhiscence septicide par 5 valves de la base, valves bilamellées, axe pentagonal avec 5 ailes à la base. Graines nombreuses, pendantes, avec une aile terminale oblongue.

S. mahogani (L) Jacq. «Acajou» (Haïti), «Caoba» (St-Domingue); «Mahogany», en anglais.

Carapa Aubl.

Magnifique arbre avec de grandes feuilles pennées. Folioles opposées à pétiole court, entières. Fleurs petites, très nombreuses, disposées en épis axillaires; bractées présentes. Calice avec 4-5 lobes; pétales 4-5, libres; tube staminal campanulé en forme d'urne avec 8-10 lobes larges, ovoïdes sur le bord; anthères 8-10, insérées sur le côté interne du tube entre les lobes; disque épais en forme de coupe; ovaire avec 4-5 loges; ovules anatropes, 6-8 dans chaque loge, superposés en 2 rangées. Fruit, une grande capsule, épaisse, à déhiscence septicide, avec 5 valves. Graines 6-8, épaisses, avec enveloppe brune.

C. guianensis Aubl. (Sto. Domingo).

Melia L.

Arbres ou arbustes. Feuilles simplement pinnées ou bipennées avec une foliole dépareillée, bipennées dans **M. azedarach**. Panicules axillaires, avec de nombreuses fleurs. Calice avec 5-6 lobes, imbriqué dans le bourgeon; pétales 5-6, linéaires — spatulés convolutés, divergents; tube staminal grêle, long, coupé au sommet en de nombreuses bandes linéaires; anthères 10, sessiles

dans le tube au sommet; disque annulaire; ovaire avec 5-6 loges; ovules 2 superposés dans chaque loge; style long, grêle; stigmate capité avec 5-6 lobes. Fruit, une drupe quelque peu charnue; noyau avec 1-5 loges, avec 1 graine dans chaque loge. Graines pendantes.

M. azedarach L. «Lilas» (Haïti et St-Domingue); «Bead tree», en anglais.

Guarea L.

Arbres ou arbustes. Feuilles pennées, continuant pendant des temps à produire de nouvelles folioles au sommet. Panicules axillaires; fleurs plutôt petites. Calice court, en forme de coupe, avec 4 dents; pétales 4-5; étamines 8, la bouche du tube staminal entière ou légèrement crénelée; anthères sessiles; ovaire quadriloculaire; ovules 1 ou 2 dans chaque loge, superposés. Fruit: une capsule coriacée ou ligneuse à la longue à déhiscence loculicide avec 4 valves. Graines 1 ou 2 dans chaque loge, enveloppées dans un arille.

G. trichilioides Sw. «Bois rouge» (Haïti), «Cabidma» ou «Cabirme» (St-Domingue); «Alligator wood» en anglais.

G. sphenophylla Urb.

Trichilia L.

Arbres ou arbustes. Feuilles imparipennées. Panicules axillaires ou terminales et axillaires avec de nombreuses fleurs. Calice petit avec 5 ou 4 dents ou segments; pétales 5 ou 4, imbriqués ou valvés; étamines 10 ou 8, filets unis à la base et plus ou moins adhérents au-dessus, anthères terminales; ovaire sur un disque avec 3 ou 2 loges, ovules 2 ou 1 à l'angle ventral de chaque loge, stigmate capité, généralement avec 3 ou 2 lobes. Fruit, une capsule subglobulaire, coriacée, avec 3 ou 2 loges, déhiscence loculicide avec 3 ou 2 valves, généralement avec 1 ou 2 graines dans chaque loge, enveloppées d'un arille charnu généralement écarlate.

T. pallida Sw. «Bois arada», «Dombou» ou «Marie-Jeanne» (Haïti), «Almendrillo» (St-Domingue).

T. hirta L. «Mombin bâtard».

T. glabra L.

T. dictyoneura Urb.

T. cuneifolia (L.) Urb. «Bois diou marron» (Haïti), «Chicarron» ou «Chicarron de tres espinas» (St-Domingue).

T. monacantha Urb.

T. truncata Leonard.

T. stenophylla Urb. et Ekm.

Cedrela L.

Arbres élevés avec bois coloré. Feuilles pennées se terminant par une paire de folioles, rarement imparipennées; folioles en nombreuses paires. Panicle grande, terminale; calice pentalobé; pétales 5, imbriqués, plus ou moins carénés à l'intérieur et attachés par la carène à la colonne; disque formant une colonne; étamines 5, adhérent à la colonne, devenant libres à son sommet; ovaire sessile au sommet de la colonne pentaloculaire; ovules 8-12 dans chaque loge, en 2 séries, pendant de la base. Fruit capsulaire, pentaloculaire, à déhiscence septicide avec 5 valves, à partir du sommet; valves bilamellées. Graines pendantes, ailées en dessous.

C. odorata L. «Cèdre» (Haïti).

Famille 85. MALPIGHIACEÆ

Arbres, arbustes ou arbrisseaux. Feuilles opposées et entières, dans nos espèces (mais dentées et épineuses dans *Malpighia coccigera*). Inflorescence indé-

finie, généralement terminale; fleurs hermaphrodites. Calice pentafide, imbriqué, 4-5 des lobes avec 2 glandes extérieures, rarement absent; pétales 5, onguiculés, convolutés. Étamines 10, hypogynes ou presque périgynes; filets généralement plus ou moins unis à la base. Carpelles 3, plus ou moins unis en un ovaire triloculaire, ou séparés, chacun avec un ovule; styles 3, séparés, mais unis en un style avec un stigmate trilobé dans le genre *Bunchosia*; ovules ascendants, dressés ou courbés. Fruit parfois plus ou moins charnu (drupe), contenant un seul noyau triloculaire, ou 2 ou 3 ou 1 noyau uniloculaire, chaque noyau avec une graine (pyrène); parfois plus ou moins sec ou une capsule s'ouvrant par chacun de ses 3 segments, ou chaque carpelle en maturité est sec et ailé, indéhiscence (samare).

x. Arbustes ou arbrisseaux dressés ou arbres.

Fruit drupacé ou capsulaire:

xx. Fruit capsulaire. Feuilles avec 2 glandes sur le bord près de la base **Galphimia**, p. 174

xx. Fruit drupacé:

3x. Filets barbus à la base; styles libres. Drupe avec un seul noyau triloculaire **Byrsonima**, p. 176

3x. Filets glabres:

4x. Styles libres. Drupe avec 3, rarement 2 pyrènes huppées. **Malpighia**, p. 175

4x. Styles unis. Drupe avec 3 (rarement 1-2) pyrènes lisses **Bunchosia**, p. 175

x. Plantes grimpantes, ligneuses, se développant au-delà des rochers ou des arbres:

xx. Fruit avec une seule aile dorsale, ou huppé et non ailé:

3x. Aile épaissie sur le bord inférieur **Heteropteris**, p. 174

3x. Aile épaissie sur le bord supérieur ou huppée. **Stigmatophyllum**, p. 174

xx. Fruit ailé, latéralement et dorsalement:

3x. Ailes semi-circulaires ou obversement deltoïdes. **Mascagnia**, p. 173

3x. Ailes ni semi-circulaires, ni obversement deltoïdes:

4x. Ailes trilobées en forme d'Y **Triopteris**, p. 173

4x. Ailes 4, en forme d'X **Tetrapteris**, p. 174

Mascagnia Bertero.

Arbrisseaux trainants et grimpants (dans nos espèces). Stipules très petites, à la base du pétiole, décidues; glandes près du sommet du pétiole. Inflorescence en racemes axillaires et terminaux, souvent paniculée; pédicelles articulés vers le milieu. Calice: sépales 5, larges, persistants, glandes 10 ou 8; pétales 5, entiers ou frangés; étamines 10, toutes parfaites; ovaire trilobé, les lobes surmontés de 3 crêtes excessivement petites sur le dos; styles 3, distincts, inégaux, sommet en forme de pied. Samares 1-3, chacune avec une crête membraneuse sur le dos et ailée à chaque bord; ailes obversement deltoïdes ou semi-circulaires.

M. buchii Urb. et Ndz.

Triopteris L.

Arbrisseaux grimpants. Feuilles dénuées de stipules. Racemes ou panicules axillaires et terminaux. Glandes du calice 8; pétales roses ou pourpres; étamines toutes parfaites; ovaire trilobé, les lobes surmontés de 3 crêtes sur le

dos; et munies de 3 ailes, les ailes latérales dressées, unies avec la 3ème inférieure en une aile profondément trilobée, en forme d'Y.

T. jacquemontii Urb. et Ndz.

T. ovata Car. Var. *domingensis* Ndz.

T. rigida Sw.

T. buchii Urb. et Ndz. Var. *mascagnioïdes* Urb. et Ndz.

T. aequalis Ch. Wr.

Tetrapteris Cav.

Plantes grimpantes, ligneuses, trainant par dessus les rochers et les arbres. Feuilles églanuleuses, stipules peu voyantes. Ombelles ou racemes généralement paniculés, terminaux. Calice généralement avec 8 glandes; pétales jaunes; filets unis en dessous; calice trilobé, lobes huppés sur le dos et avec 2 appendices sur chaque côté; le sommet des styles légèrement élargi. Samares 1-3, huppées sur le dos avec 4 ailes latérales, placées en forme d'X, 2 en dessus et 2 en dessous.

T. buxifolia Cav.

T. citrifolia (Sw.) Pers.

T. aequalis Ch. Wright.

T. haïtiensis Urb. et Ndz.

Heteropteris Juss.

Arbustes et arbrisseaux trainants et volubiles, grimpant sur les arbres (dans nos espèces). Feuilles avec ou sans glandes sur le pétiole, stipules peu voyantes. Fleurs petites, généralement en panicules. Calice généralement avec 8 glandes; pétales jaunes 3—5mm. de diamètre; étamines inégales, toutes parfaites; filets unis à la base; sommet des styles quelque peu comprimé et dilaté, avec un tranchant au dos. Samares 1-3, l'aile dorsale épaissie sur le bord inférieur.

H. purpurea (L.) H. B. K.

H. laurifolia (L.) A. Juss. «Liane jaune» ou «Liane taureau»

Stigmatophyllum A. Juss.

Arbrisseaux volubiles, trainants, grimpant sur les arbustes et les arbres. Feuilles souvent soyeuses au-dessous, avec des poils attachés par leur milieu, avec 2 glandes au sommet du pétiole ou à la base de la nervure médiane; stipules très petites. Fleurs en corymbes ombelliformes pédonculés. Calice avec 8 glandes; pétales jaunes; étamines inégales, 6 parfaites, 4 imparfaitement développées; styles 3, tronqués au sommet ou plus ou moins anguleux, ou développés au-delà du stigmate en un appendice en forme de pied ou déployé. Samares 1-3 avec l'aile épaissie sur le bord supérieur.

S. lingulatum (Poir.) Small. «Corne cabrite» d'après Urban.

S. lingulatum (Poir.) Small. Var. *sericans* Ndz.

S. haïtiensis Urb. et Ndz. Var. *ovata* Urb. et Ndz. Var. *linearis* Urb. et Ndz.

S. diversifolium (H. B. K.) A. Juss.

S. angulosum (L.) A. Juss. f. *III laciniatum* Ekm. (forma nov.)

S. puberum (L. C. Rich.) A. Juss.

S. sagittatum (Cav.) A. Juss.

S. palmatum (Cav.) A. Juss.

S. ovatum (Cav.) Ndz.

S. periplocifolium (Desf.) Juss. f. *intermedium* Ndz.

Galphimia Cav.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles glaucescentes, avec une glande sur chaque

bord près de la base; stipules libres dans nos espèces. Fleurs en racemes terminaux; pédicelles articulés au-dessous du milieu, avec une bractée à la base et 2 bractéoles au-dessous du nœud. Calice pentafide, églanulaire; pétales jaunes, sub-égaux; étamines 10, toutes parfaites; filets distincts ou soudés à la base; styles 3, distincts, subulés, aigus. Capsule de 3 carpelles, cocci déhiscents; épicarpe légèrement charnu, endocarpe dur et cassant.

G. gracilis Bartl. «*Consulita*» (St-Domingue), d'après Urban. Ornemental.

Malpighia L.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles églanuleuses, parfois avec des poils qui piquent; stipules très petites, décidues. Fleurs en ombelles ou corymbes axillaires et terminaux, rarement solitaires. Calice avec 6-10 glandes; pétales rouges ou pourpres, ou blancs, limbe rondelet; filets glabres à la base; étamines 10, toutes parfaites; ovaire trilobulaire, sessile; styles 3, distincts, sommet tronqué ou avec un appendice en forme de pied au-delà du stigmate. Fruit: une drupe dont la chair se dessèche à la longue pour mettre en liberté 3 pyrénes, chaque pyréne avec 3-5 crêtes dorsales.

M. glabra L.

M. puniceifolia L. «Cerisier»

M. domingensis Small. «Capitaine»

M. angustifolia L. Var. *oblongata* Ndz.

M. nummularifolia Ndz. Var. *pusillifolia* Ekm. et Ndz.

M. urens L. Var. *megacantha* Juss.

M. haïtiensis Urb. et Ndz. Ile de la Tortue.

M. ovatifolia Small.

M. martinicensis Jacq.

M. biflora Poir.

M. cnide Spreng. Var. *ovalis* Ekm. et Ndz.

M. aquifolia L.

M. setosa Spreng.

M. coccigera L.

M. velutina Ekm. et Ndz. Var. *typica* Ekm. et Ndz. f. *intermedia* Ekm. et Ndz.

M. galeottiana A. Juss.

M. macracantha Urb. et Ndz. Massif de la Selle.

M. ilicifolia (Wr.) Ndz.

Bunchosia L. C. Rich.

Arbustes ou arbres dressés. Feuilles généralement avec 2 glandes sur la surface intérieure, légèrement au-dessus de la base; stipules très petites, parfois unies en une seule. Inflorescence, un raceme axillaire. Calice persistant, avec 8-10 glandes, sessiles, environ 1/2 fois aussi longues que le calice; pétales jaunes; filets glabres, unis à la base; ovaire de 2-3 loges; styles unis avec un stigmate triangulaire. Drupe, la chair se dessèche et libère les pyrénes; pyrénes 2-3 (rarement 1) sans crêtes.

B. ekmanii Urb. et Ndz.

B. nitida (Jacq.) L. C. Rich. «Bois senti»

B. media (Ait.) P. DC. «Bois senti»

B. glandulosa (Cav.) L. C. Rich. Var. *typica*, f. *P.*

B. obovata Ndz. (forma nov.) Massif de la Hotte.

B. haïtiensis Urb. et Ndz.

B. puniceifolia Ekm. et Ndz.

- B. hotteana* Ndz. et Ekm.
B. macrophylla Ekm. et Ndz.

Byrsonima L. C. Rich.

Arbres ou arbustes dressés. Feuilles églanuleuses; stipules généralement unies dans l'axe, persistantes. Inflorescence, un racème terminal dans lequel les fleurs sont souvent géminées, la paire sortant parfois d'un seul pédicelle. Calice persistant avec 10 grandes glandes sessiles; pétales jaunes, rouges ou pourpres, ongiculés, limbe plus ou moins reniforme; filets poilus à la base, plus ou moins légèrement unis à la base; ovaire trilobulaire; styles 3, distincts; stigmates aigus. Drupe avec un noyau trilobulaire; endocarpe ossu ou ligneux.

- B. spicata* (Cav.) L. C. Rich.
B. lucida (Mill.) L. C. Rich.
B. crassifolia (L.) H. B. K.
B. tenuifolia Urb. et Ndz.
B. coriacea (Sw.) Kunt. «Bois corne.»

Famille 86. POLYGALACEÆ

Herbes ou arbrisseaux souvent grimpants, ou arbres. Feuilles généralement alternes, simples, sans stipules. Fleurs en épis ou en racèmes, hermaphrodites, irrégulières. Sépales 5, imbriqués, les 2 sépales qui sont plus avant dans l'intérieur plus grands, pétaloïdes, en forme d'ailes, tous persistants autour du fruit (dans le genre *Polygala*; pétales 3 ou 5, le grand pétale concave, enveloppant les étamines et le pistil (carène) presque 2 fois aussi longs que la carène, 2 dans nos espèces, absents ou très petits et squameux. Étamines 8; filets unis en une gaine fendue et adhérent plus ou moins aux pétales à la base; anthères bilobulaires, quelque peu largement tubulaires, chaque loge avec une ouverture oblique au sommet. Ovaire bilobulaire (1 loge parfois abortive); ovules solitaires, pendants, anatropes. Fruit, une capsule bilobulaire à déhiscence loculicide, ou un fruit sec, unilobulaire, ailé, indéhiscent.

- x. Ovaire et fruit trilobulaires; fruit capsulaire *Polygala*, p. 176
 x. Ovaire et fruit unilobulaires; fruit, une samare *Securidaca*, p. 177

Polygala L.

Herbes, arbrisseaux, arbustes ou arbres. Feuilles alternes, opposées ou verticillées. Fleurs parfaites, souvent voyantes, souvent en épis denses ou en racèmes. Sépales 5, inégaux, les 2 latéraux (ailes) pétaloïdes, plus grands que les 3 autres; pétales 3 ou rarement 5, unis en dessous, celui du milieu (carène) généralement lobé au sommet et huppé, les autres plus petits; étamines 8, rarement 6; filets unis en tube ou en 2 groupes de 3 ou 4 chacun, parfois adnés aux pétales; anthères 1-2 loges; style courbé, souvent clariforme; stigmates à 2-4 lobes. Capsule aplatie, bilobulaire. Graine 1 dans chaque loge.

- P. panaea* L. «Ptit Buis.»
P. fuertesii (Urb.) Blake.
P. americana Mill.
P. sancta-luciae Chod.
P. grandiflora Walt. Var. *orbicularis* Chod. Var. *leptophylla* Chod.
P. crucianilloides P. DC.
P. hecatantha Urb.
P. longicaulis H. B. K.
P. paniculata L. Pistache marron.

Securidaca L.

Arbrisseaux généralement grimpants. Feuilles alternes, entières, généralement avec des glandes stipulaires. Racèmes terminaux et axillaires souvent paniculés. Sépales et ailes décidus; pétales 4, 2 plus grands adhérent à la base au tube staminal, mais distants de la carène, 2 rudimentaires, squamiformes; carène, la portion centrale du sommet déployée, parfois en forme de crête; ovaire unilobulaire par l'avortement de la seconde loge avec un appendice sur un côté qui devient l'aile du fruit; style courbé en forme de croc, presque bilobé au sommet stigmatique. Fruit indéhiscent avec une longue aile terminale.

- S. virgata* Sw. «Mabelie.»

Famille 87. DICHAPETALACEÆ

Arbrisseaux ou arbustes, souvent grimpants, parfois très poilus, avec feuilles alternes disposées en 2 rangées, coriacées ou herbacées, simples, entières, penninerves et réticulées. Pétiole court; stipules petites, étroites, subulées, caduques. Fleurs plutôt petites, le plus souvent avec pédicelle court, placées sur un pédoncule axillaire court formé de faisceaux semblables ou encore inflorescence très ramifiée, d'apparence ombellé; fleurs parfaites ou unisexuées par avortement, avec un axe le plus souvent charnu, mais rarement en forme de plat, choripétales ou sympétales, rayonnantes ou zygomorphes. Sépales 5, libres ou soudés à la base, couverts dans le bourgeon, souvent inégaux; pétales 5, plus longs ou plus courts que les sépales, rarement entiers, le plus souvent crénelés ou plus ou moins bifides, égaux ou inégaux, libres ou plus ou moins unis. Disque avec 5 effigurations presque quadrangulaires ou bilobées, situées à la base des pétales, libres ou unies l'une à l'autre, rarement unilatérales; étamines 5 ou libres ou unies avec les pétales, avec filets linéaires oblongs et anthères ovales avec connectif élargi au dos et anthères linéaires qui s'ouvrent entièrement à l'intérieur, plus rarement étamines 3 et 2 staminodes plus petits, pétaloïdes, linéaires ou bifides. Carpelles 2-3, unis en un ovaire bi-trilobulaire avec 2 ovules renversés, pendant côte à côte au sommet de la loge, avec raphé ventral et un microphyle renversé à la partie supérieure et souvent protégé par une petite protubérance. Fruit oblong ou obové, parfois bilobé avec exocarpe mince, charnu ou coriacé et endocarpe crustacé ou osseux, souvent mince, monosperme, rarement avec 2 graines. Graines pendantes, comprimées, avec tégument mince et sans endosperme; embryon avec tigelle courte et recourbée à la partie supérieure et cotylédons charnus, plano-convexes.

Tapura Aubl.

Caractères de la famille.

- T. haïtiensis* Urb. et Ekm. Massif de la Hotte, partie occidentale.

Famille 88. EUPHORBIACEÆ

Arbres, arbustes ou arbrisseaux ou parfois herbes, avec sève souvent laiteuse, parfois vessicante. Feuilles généralement alternes, parfois opposées ou verticillées, entières ou dentées, parfois digitées-lobées ou avec 3 ou plusieurs folioles digitées, ou réduites à des écailles; stipules souvent présentes, petites, caduques, ou persistantes, rarement grandes et parfois enveloppant le bourgeon. Fleurs unisexuées, monoïques ou dioïques, régulières ou légèrement irrégulières; périanthe souvent petit, parfois absent, parfois dissemblable dans les fleurs mâles et femelles (ou seulement un calice ou calice et corolle.) Fleurs mâles: réceptacle parfois étalé en forme de disque à l'intérieur des étamines ou les glandes ou les lobes du disque alternant avec les étamines de la série externe; étamines parfois indéfinies en nombre, parfois aussi nombreuses que

les sépales ou les pétales ou moindres, ou réduites à une seule; filets libres ou plus ou moins unis; rudiment d'ovaire présent ou absent. Fleurs femelles: disque hypogyne, annulaire, lobé ou en forme de coupe ou représenté par des glandes distinctes ou absent; ovaire généralement trilobulaire; styles aussi nombreux que les loges de l'ovaire; ovules 1 ou 2, collatéraux dans chaque loge, descendants, anatropes, attachés à l'angle central des loges; raphe ventral; funicule étalé très souvent en une excroissance en forme de coussin. Fruit généralement capsulaire, se fendant en autant de carpelles (coques) qu'il y a de loges dans l'ovaire; l'axe persistant, chaque carpelle s'ouvre au-dessus et le long du dos par 2 valves. Fruit parfois drupacé, divisé en loges, indéhiscence. Graines généralement aussi nombreuses que les ovules, souvent avec caroncule au sommet; endosperme généralement abondant, charnu, rarement pauvre ou absent.

- x. Ovules 2 dans chaque loge; étamines opposées aux sépales ou (dans le genre *Phyllanthus*) au centre de la fleur:
- 2x. Fleurs apétales:
 - 3x. Ovaire avec 3 loges ou plus:
 - 4x. Etamines au milieu de la fleur *Phyllanthus*, p. 181
 - 4x. Etamines opposées aux sépales:
 - 5x. Arbrisseaux épineux *Chascotheca*, p. 182
 - 5x. Arbustes ou arbres inermes *Securinega*, p. 182
 - 3x. Ovaire bilobulaire (ou unilobulaire):
 - 4x. Fleurs en bouquets (agrégées) *Drypetes*, p. 182
 - 4x. Fleurs en panicules *Hyeronima*, p. 182
- 2x. Fleurs avec pétales:
 - 3x. Disque glandulaire ou lobé *Andrachne*, p. 181
 - 3x. Disque annulaire *Savia*, p. 180
- x. Ovule 1 dans chaque loge; une seule étamine ou étamines en une ou plusieurs séries, les étamines externes alternant avec les sépales ou fixées au centre de la fleur:
- 2x. Etamines 2 ou plus, en une ou plusieurs séries pas un vrai involucre:
- 3x. Pétales présents au moins dans les fleurs mâles:
 - 4x. Etamines pas plus que 5 *Argithamnia*, p. 184
 - 4x. Etamines plus que 5:
 - 5x. Pétales 8-12 *Garcia*, p. 189
 - 5x. Pétales moins que 8:
 - 6x. Inflorescence essentiellement terminale: *Croton*, p. 183
 - 6x. Inflorescence essentiellement latérale:
 - 7x. Fleurs peu nombreuses parmi les feuilles; pétales pourvus d'épines stipulaires ou rarement inermes *Acidocroton*, p. 189
 - 7x. Fleurs nombreuses dans l'inflorescence:
 - 8x. Sève pourpre. Feuilles soyeuses *Ditaxis*, p. 184
 - 8x. Sève non pourpre:
 - 9x. Fruit grand, charnu, péricarpe indéhiscence. Arbres généralement avec poils stellaires *Aleurites*, p. 189
 - 9x. Fruit déhiscence:
 - 10x. Feuilles bigarrées linéaires. Etamines 15-30 *Codiaeum*, p. 191

- 10x. Feuilles vertes. Etamines 10 ou moindres:
 - 11x. Plantes marécageuses. Graines sans caroncules *Caperonia*, p. 185
 - 11x. Plantes non marécageuses. Graines avec caroncules *Jatropha*, p. 190
- 3x. Pétales absents:
- 4x. Sépales des fleurs mâles distinctement valvés, généralement 3-5 segments:
- 5x. Feuilles opposées *Mercurialis*, p. 186
- 5x. Feuilles alternes:
 - 6x. Etamines 1-4:
 - 7x. Feuilles peltées *Tragia*, p. 188
 - 7x. Feuilles non peltées *Ricinus*, p. 189
 - 6x. Etamines 5 ou plus ou d'un nombre indéfini:
 - 7x. Ovaire rudimentaire présent dans les fleurs mâles *Leucocroton*, p. 186
 - 7x. Ovaire rudimentaire ou excessivement petit ou absent dans les fleurs mâles:
 - 8x. Styles 3, libres:
 - 9x. Filets libres:
 - 10x. Sépales de la fleur femelle 3-4 *Acalypha*, p. 187
 - 10x. Sépales de la fleur femelle 6 (5-9) *Bernardia*, p. 185
 - 9x. Filets unis en dessous ou à une colonne centrale:
 - 10x. Calice de la fleur mâle avec 4 (3-2) sépales *Alchornea*, p. 186
 - 10x. Calice de la fleur mâle avec 5 sépales *Adelia*, p. 187
 - 8x. Styles unis à leur base:
 - 9x. Bord des feuilles glabre *Lasiocroton*, p. 186
 - 9x. Bord des feuilles pubescent:
 - 10x. Etamines 5 (rarement 4, 6 ou 8) *Acidoton*, p. 188
 - 10x. Etamines très nombreuses *Platygyne*, p. 188
 - 4x. Sépales des fleurs mâles non valvés (absents, dentés ou imbriqués):
 - 5x. Plantes à exsudation résineuse *Dittia*, p. 191
 - 5x. Plantes non résineuses:
 - 6x. Feuilles composées *Hevea*, p. 190
 - 6x. Feuilles simples:
 - 7x. Etamines 2-4 (rarement 5-6):
 - 8x. Ovaire et capsule de 2-3 loges:
 - 9x. Calice 3-5 segments imbriqués, égaux. Fruit à péricarpe charnu, indéhiscence au début:
 - 10x. Ovaire rudimentaire poilu (fleur mâle) *Alchorneopsis*, p. 186
 - 10x. Ovaire rudimentaire absent (fleur mâle):

- 11x. Sépales 2-3 Bonania, p. 192
 11x. Sépales 4-5. Omphalea, p. 191
 9x. Calice sans segments distincts, avec 2-5 petites dents, parfois segments inégaux. Capsule tout de suite déhiscente (Sapium charnu au début):
 10x. Feuilles à nervures latérales presque perpendiculaires à la nervure médiane. Capsule au début charnue, indéhiscente. Sapium, p. 192
 10x. Feuilles à nervures latérales non perpendiculaires à la nervure médiane. Fruit non charnu:
 11x. Segments du calice inégaux Sebastiania, p. 191
 11x. Calice absent ou segments du calice égaux:
 12x. Filets recourbés dans le bourgeon. Pera, p. 185
 12x. Filets dressés dans le bourgeon. Gymnanthes, p. 193
 8x. Ovaire de 6-9 loges. Fruit, une drupe. Hippomane, p. 192
 7x. Étamines 8 ou plus:
 8x. Arbres épineux. Ovaire et capsule 5-20 loges Hura, p. 193
 8x. Herbes ou arbrisseaux. Ovaire et capsule de 2-3 loges:
 9x. Plantes dressées, tuberculeuses. Manihot, p. 190
 9x. Plantes grimpantes, non tuberculeuses Dalechampia, p. 188
 2x. Une seule étamine. Vrai involucre:
 3x. Inflorescence ombellée. Cubanthus, p. 194
 3x. Inflorescence non ombellée:
 4x. Involucre régulier, calicinal. Euphorbia, p. 193
 4x. Involucre irrégulier, oblique Pedilanthus, p. 194

Savia Willd.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles alternes, entières, membraneuses, rigides ou coriaces. Fleurs dioïques avec pétales rudimentaires, axillaires; fleurs mâles, agrégées, presque sessiles; fleurs femelles, solitaires ou peu nombreuses avec des pédoncules longs ou courts. Fleurs mâles: sépales 5, presque égaux, imbriqués; pétales petits, presque linéaires; disque annulaire, placé hors des étamines dans la fleur mâle; étamines 5, opposées aux sépales; filets libres; les loges de l'anthère très rapprochées, s'ouvrant longitudinalement; ovaire rudimentaire; styles 3, courts. Fleurs femelles: sépales et pétales semblables à ceux de la fleur mâle; disque annulaire; ovaire trilobulaire; styles séparés, divergents au dessus, avec 2 branches subulées, acuminées; ovules 2 dans

chaque loge. Capsule s'ouvrant par 2 coques bivalvées. Graines ovoïdes ou trigones.

S. sessiliflora (Sw.) Willd.

S. erythroxyloides Griseb.

Andrachne L.

Arbrisseaux ou plantes frutescentes, vivaces. Feuilles petites, pétiolées. Fleurs petites, blanchâtres; fleurs monoïques, axillaires. Fleurs mâles généralement agrégées; calice de 5 ou 6 sépales; pétales 5-6; disque glandulaire ou lobé; étamines 5 ou 6, alternant avec les pétales; filets distincts; ovaire petit. Fleurs femelles solitaires; calice de 5-6 sépales; pétales très petits ou absents; ovaire trilobulaire; styles distincts bifides ou bipartis; ovules 2 dans chaque loge. Capsule se séparant en 3 coques bivalvées. Graines quelque peu courbées, avec testa rugueux, sans caroncule.

A. cuneifolia Britton.

Phyllanthus L.

Herbes, arbrisseaux ou arbustes, ou arbres. Feuilles alternes (rarement opposées), entières, en 2 rangées verticales; pétiole court ou absent (long dans l'espèce *P. glabellus*). Fleurs généralement monoïques (dioïques dans l'espèce *P. nobilis*), petites, agrégées dans l'axe ou sur les branches florales modifiées. Fleurs mâles: sépales 5 (rarement 4-6), imbriqués, en 2 séries, égaux ou les sépales externes plus courts ou presque pétaloïdes; disque formé de 6 glandes séparées; étamines 2-5 au centre de la fleur; ovaire rudimentaire absent. Fleurs femelles: sépales semblables à ceux de la fleur mâle; disque en forme de saucière ou de coupe (glandes séparées dans l'espèce *P. latifolius*); ovaire trilobulaire (6 à 12 loges dans l'espèce *P. reticulatus*); styles variés; ovules 2 dans chaque loge. Capsule déhiscente en coques bivalvées. Graines sans caroncule.

P. grandifolius L. «Espagnol marron.»

P. nummularioides Mull. Arg.

P. nivosus Bull. Cal. «Neige.»

P. aquaticus Ch. Wr.

P. saxicola Small.

P. carolinensis Walt.

P. lathyroides H. B. K.

P. niruri L. «Derrière-dos.»

P. cyclanthera Baill.

P. berterianus Mull. Arg.

P. polycladus Urb.

P. trigonus Urb. et Ekm.

P. buchii Urb.

P. leptoneurus Urb.

P. fuertesii Urb.

P. brachyphyllus Urb.

P. micranthus A. Rich.

P. nobilis (L. f.) Mull.-Arg. Var. *antillana* (Juss.) Mull.-Arg.

P. epiphyllanthus L.

P. myriophyllus Urb.

P. anisophyllus Urb.

P. maleolens Urb. et Ekm.

P. hotteanus Urb. et Ekm.

Securinega Juss.

Arbrisseaux; branches avec des épines au sommet dans notre espèce. Feuilles alternes, entières, plus ou moins coriées. Fleurs agrégées dans les axes, monoïques ou dioïques, apétales; fleurs mâles nombreuses, presque sessiles; fleurs femelles solitaires et moins nombreuses. Fleurs mâles: sépales 5, imbriqués; disque formé de 5 glandes alternant avec les étamines; étamines 5, opposées aux sépales; ovaire rudimentaire avec 3 branches styliformes. Fleurs femelles: calice semblable à celui de la fleur mâle; disque presque entier; ovaire trilobulaire; styles distincts, recourbés, bifides; ovules 2 dans chaque loge. Capsule déhiscente, en coques bivalvées. Graines sans caroncules.

S. acidoton (L.) Fawc. et Rendle.

S. abegghii Urb. et Ekm.

Chascotheca Urb.

Arbres ou arbustes glabres, avec de petites stipules biauriculées à la base. Feuilles alternes, entières, membraneuses, rigides, distiques. Fleurs avec de nombreuses bractéoles agrégées ou fasciculées; fleurs femelles plus longues; fleurs dioïques, apétales. Fleurs mâles: sépales 5, imbriqués, presque égaux, plus ou moins réfléchis; disque placé en dehors des étamines, avec une seule crénelure; étamines 5, opposées aux sépales; filets soudés à la base; anthères à déhiscence longitudinale; ovaire rudimentaire, soudé à la base avec le filet; styles 3, subulés, libres. Fleurs femelles: sépales et disque pareils à ceux de la fleur mâle; ovaire trilobulaire avec 2 ovules dans chaque loge; styles 3, bifides; stigmate papilleux. Capsule déhiscente en coques bivalvées. Graine solitaire dans chaque coque.

C. domingensis Urb.

Hyeronima Allem.

Arbres écailleux, parfois avec des poils brunâtres. Feuilles alternes, grandes, entières; stipules généralement petites. Fleurs petites, dioïques, apétales, en panicules axillaires. Fleurs mâles: calice campanulé, avec 3-6 dents; disque en forme de coupe en dehors des étamines; étamines 2-5 opposées aux dents du calice; filets libres; ovaire petit. Fleurs femelles: calice et disque pareils à ceux de la fleur mâle; ovaire bilobulaire; styles 2-3, très courts, bifides, divergents; ovules 2 dans chaque loge. Fruit petit, légèrement charnu avec endosperme dur et cassant, bilobulaire avec une loge vide. Graine généralement solitaire, sans caroncules.

H. domingensis Urb.

Drypetes Vahl.

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, entières, coriées ou légèrement dentelées; stipules très petites, caduques. Fleurs dioïques, apétales, agrégées dans les axes; fleurs mâles généralement nombreuses, fleurs femelles moindres. Fleurs mâles: sépales 4-6, imbriqués; disque épais, plat — concave; filets insérés dans les lobes du disque; étamines insérées entre le disque et le calice, opposées aux sépales, 4-6 ou 2 fois plus nombreuses; ovaire rudimentaire ou absent. Fleurs femelles: calice pareil à celui de la fleur mâle; disque en forme de saucière, crénelé; ovaire bilobulaire ou unilobulaire; stigmates 2-1, plus ou moins réniformes, sessiles ou subsessiles; ovules 2 dans chaque loge. Fruit bilobulaire ou unilobulaire, plus ou moins charnu extérieurement, puis coriacé, tomenteux, avec un endocarpe dur et cassant, indéhiscence, avec 2 graines ou une seule.

D. picardæ Krug. et Urb.

D. alba Poit. «Bois côtelette» ou «Laboue cochon.»

D. glauca Vahl.

D. lateriflora (Sw.) Krug. et Urb. «Bois côtelette.»

D. piriformis Urb. «Côtelette.»

Croton L.

Arbres, arbustes ou arbrisseaux plus ou moins poilus ou squameux. Feuilles généralement alternes avec 2 — plusieurs glandes au sommet du pétiole. Fleurs monoïques ou rarement dioïques; pétales généralement présents dans les fleurs mâles et absents dans les fleurs femelles; inflorescence généralement terminale ou parfois axillaire aussi bien que terminale; les fleurs mâles et les fleurs femelles ne se trouvent pas généralement à la même place dans la même inflorescence. Fleurs mâles: réceptacle généralement poilu; calice de 5 (rarement 4-6) segments valvés ou étroitement imbriqués; pétales 5 (rarement 4); disque représenté par des glandes; étamines généralement 10-20; filets recourbés et anthères pendantes dans le bourgeon, dressés tous deux dans la fleur; ovaire absent. Fleurs femelles: segments du calice généralement égaux; disque annulaire ou formé d'écailles distinctes à la base du calice; ovaire trilobulaire; styles bifides ou trifides; ovule solitaire dans chaque loge. Capsule déhiscente en coques bivalvées. Graines lisses pourvues d'une petite caroncule.

C. multicostatus Mull.

C. glabellus L. «Bois blanc» ou «Bois guêpes.»

C. corylifolius Lam.

C. microdon Urb.

C. cascarilloïdes Geisel.

C. sidifolius Lam. «Bois cabritte.»

C. microstachyus Desv.

C. lucidus L.

C. betulinus Vahl. «Palo bellaco» ou «Palo berraco» (St-Domingue).

C. waltharioïdes Urb.

C. nummularifolius A. Rich.

C. polytomus Urb.

C. coronatus Urb.

C. inæquidens Urb. «Palo berraco» (St-Domingue).

C. kœhneanus Urb.

C. buchii Urb.

C. azuensis Urb.

C. krugianus Urb. «Copahy»

C. flocculosus Geisel.

C. pallidus Mull-Arg.

C. vaillanti Geisel.

C. discolor Willd.

C. linearis Jacq. «Romarin.» Var. *dilatatus* Urb.

C. angustatus Urb. «Copahy.»

C. picardæ Urb.

C. allæophyllus Urb.

C. plumieri Urb. «Copahy.» Var. *acuminata* Urb. Var. *brevifolia* Urb.

C. megaladenus Urb.

C. organifolius Lam. «Copahy.»

C. brachytrichus Urb.

- C. barahonensis* Urb.
- C. jagerianus* Mull-Arg.
- C. poitai* Urb. «Copahy.»
- C. spiralis* Mull-Arg.
- C. chaetodus* Urb; var. *gonavensis* Urb. «Feuille père.»
- C. fuertesii* Urb.
- C. ovalifolius* Vahl.
- C. strigosus* Spreng.
- C. populifolius* Lam.
- C. sublucidus* Mull-Arg.
- C. lobatus* L.
- C. curvipes* Urb.
- C. pachysepalus* Griseb.
- C. lindmanii* Urb.
- C. humilis* L. «Feuille père» ou «Paobelie.» Plante vénéneuse.
- C. aridicola* Urb.
- C. glandulosus* L.
- C. angustifolius* Desv.
- C. citrifolius* Lam.
- C. microcarpus* Desv.
- C. prunifolius* Vahl.
- C. velutinus* Bertero.
- C. jacmelianus* Urb.
- C. mansfeldii* Urb.
- C. niveus* Jacq.
- C. artibonitensis* Urb.
- C. belanseanus* Urb. et Ekm.
- C. gonaïvensis* Urb. et Ekm.
- C. astrophorus* Urb.
- C. kenskoffii* Urb.
- C. moustiquensis* Urb.
- C. abeggii* Urb. et Ekm.
- C. flavens* L.
- C. nanus* Urb. et Ekm.
- C. brevifolia* Urb. «Copahy.»

Ditaxis Vahl.

Herbes ou arbrisseaux très souvent vivaces, au moyen des rhizomes. Plantes monoïques (rarement dioïques) avec feuilles velues avec pigment pourpre. Feuilles alternes entières, rarement dentées. Fleurs axillaires ou axillaires et terminales, agrégées, très souvent en racemes, généralement sous-tendues par des bractées. Fleurs mâles souvent agrégées au sommet des racemes; sépales 4-5, valvés; pétales 4-5 alternant avec les sépales et les lobes du disque; étamines aussi nombreuses ou 2-3 fois plus nombreuses que les pétales; filets unis en forme de colonne. Fleurs femelles: sépales imbriqués; pétales rudimentaires ou plus petits que ceux de la fleur mâle; ovaire trilobulaire avec 1 ovule dans chaque loge; styles 3, distincts, trifides. Capsule trilobée, déhiscente, en 3 coques bivalvées. Graines subglobulaires, rugueuses.

- D. haïtiensis* Urb.

Argithamnia Sw.

Arbrisseaux ou herbes vivaces contenant un pigment pourpre. Feuilles alternes, entières ou avec peu de dents, trinerves à la base. Fleurs monoïques avec

pétales, disposées en racemes bisexués axillaires, sous-tendues par une bractée, les fleurs mâles situées au sommet, les glandes du disque s'alternent avec les pétales. Fleurs mâles: calice à 4 segments (rarement 5) valvés; pétales 4-5; étamines 4-5; filets unis à la base. Fleurs femelles: sépales 5, imbriqués; pétales 5, très petits; ovaire trilobulaire; styles divergents, fendus de diverses manières; ovules solitaires dans les loges. Capsule déhiscente en 3 coques bivalvées. Graines sans caroncule.

- A. candicans* Sw.
- A. oblongifolia* Urb.
- A. ovalifolia* Urb.

Caperonia St-Hil.

Herbes dressées, annuelles, marécageuses, tiges succulentes. Feuilles alternes; stipules persistantes. Fleurs monoïques, avec pétales, disposées en épis ou en racemes épiés, axillaires, bisexués, chaque fleur sous-tendue par une bractée; fleurs mâles au sommet; disque absent. Fleurs mâles: calice de 5-6 segments valvés; pétales 5, imbriqués, attachés à la base de la colonne staminale; étamines généralement 10, en 2 séries; anthères ovoïdes très rapprochées; ovaire rudimentaire, petit. Fleurs femelles: sépales 5-6, imbriqués, généralement inégaux, les sépales externes plus petits; pétales 5; ovaire trilobulaire; style court très segmenté; ovules solitaires dans les loges. Capsule déhiscente en 3 coques bivalvées. Graines subglobulaires, ponctuées, sans caroncules.

- C. palustris* (L.) St-Hil.
- C. castaneifolia* (L.) St-Hil.

Pera Mutis.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles alternes, avec pétioles courts, coriacés, penninerves. Involucre unisexué ou bisexué, axillaire; fleurs 2-4 dans chaque involucre, parfois 6-8 chez les fleurs mâles; plantes monoïques ou dioïques; disque absent. Fleurs mâles: calice petit, avec 2-3 segments ou rudimentaire, ou absent; étamines 2-6; ovaire absent. Fleurs femelles: calice absent ou rudimentaire; ovaire trilobulaire; capsule pyriforme, déhiscente, en 2-3 coques bivalvées. Graines comprimées, noires.

- P. glomerata* Urb. «Cotelle.»
- P. domingensis* Urb. «Palo damaso» (St-Domingue).
- P. depressa* Urb. et Ekm. «Casser rage» Ile de la Gonave.

Bernardia Adans.

Arbrisseaux ou rarement herbes avec poils stellaires ou simples. Feuilles alternes, dentées. Fleurs monoïques ou dioïques, apétales, disposées en épis axillaires; épis parfois très courts et très compacts, plus ou moins enveloppés par les bractées; disque absent ou formé de glandes séparées. Fleurs mâles généralement très petites; calice à 3-4 segments valvés; étamines indéfinies 3-25; filets libres; anthères quadriloculaires; ovaire absent. Fleurs femelles; sépales 6-5 9, imbriqués; ovaire trilobulaire; styles 3, très segmentés, filiformes; ovules solitaires. Capsule déhiscente, en 3 coques bivalvées. Graines subglobulaires, sans caroncules.

- B. dichotoma* (W.) Mull.-Arg.
- B. leprosa* (W.) Mull.-Arg.
- B. tenuifolia* Urb.
- B. corensis* (Jacq.) Mull-Arg.

Mercurialis L.

Arbrisseaux ou herbes annuelles ou vivaces. Feuilles opposées, entières ou parfois dentées. Fleurs généralement dioïques, apétales. Fleurs mâles en racemes ou en épis plus ou moins allongés; calice membraneux de 3 sépales valvés; étamines 8-20, filets distincts, anthères à déhiscence longitudinale. Fleurs femelles: calice de 3 sépales; ovaire biloculaire; styles 2, distincts ou presque distincts; stigmate entier; ovules solitaires dans chaque loge. Capsule généralement bilobée. Graine solitaire dans chaque loge, lisse ou tuberculeuse.

M. annua L.

Leucocroton Griseb.

Arbrisseaux avec poils radiés ou squamiformes. Feuilles alternes, coriaces, glabres à la partie supérieure. Fleurs en épis ou en racemes axillaires plus courtes que le pédoncule; fleurs mâles agrégées sous chaque bractée; fleurs femelles solitaires, peu nombreuses, ou solitaires et terminales dans l'inflorescence; fleurs dioïques; disque petit avec une seule glande. Fleurs mâles: calice avec 3-5 sépales; étamines 6-10; filets libres et courts; ovaire rudimentaire poilu. Fleurs femelles: calice avec 5 segments, valvé; ovaire trilobulaire. Fruit capsulaire. Graines subglobulaires, lisses.

L. leprosus (W.) Pax et K. Hoffm.

Alchorneopsis Mull. Arg.

Arbres. Feuilles avec un long pétiole, entières ou légèrement dentées, trinerves, glandulaires à la base du pétiole. Inflorescence épiée, glabre, axillaire; fleurs mâles nombreuses; fleurs femelles très peu nombreuses; les fleurs mâles petites, agrégées sous chaque bractée, les fleurs femelles solitaires sous chaque bractée; fleurs dioïques; disque absent. Fleurs mâles: calice à 4 lobes; étamines 5-6; filets libres généralement; connectif épais, glandulaire; anthères à déhiscence longitudinale et transversale; ovaire rudimentaire trilobé. Fleurs femelles: calice profondément quadrilobé; ovaire trilobulaire. Fruit capsulaire, charnu au début, plus tard déhiscent.

A. portoricensis Urb.

Lasiocroton Griseb.

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, penninerves. Fleurs monoïques ou dioïques, apétales, disposées en épis ou en racemes ou en panicules qui sont solitaires dans l'axe supérieur; dans l'inflorescence mâle les fleurs sont compactement agrégées, dans l'inflorescence femelle, les fleurs sont plus ou moins distantes, pédicelles articulés. Fleurs mâles: calice ovoïde, clos dans le bourgeon, plus tard divisé en 5 segments valvés; disque rudimentaire; étamines 8-18; ovaire absent. Fleurs femelles: calice petit à 5 segments, divergent; disque épais, entier; ovaire trilobulaire; styles très courtement soudés en bas, courts, épais, entiers ou bilobés; sommet très courtement frangé; ovule solitaire dans chaque loge. Capsule profondément trilobée, déhiscente, en 3 coques bivalvées. Graines globulaires sans caroncules.

L. micranthus Pax et K. Hoffm.

Alchornea Sw.

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, avec 3-5 nervures et glandulaires à la base. Fleurs dioïques ou monoïques, apétales, en épis ou racemes axillaires ou latéraux, les épis mâles grêles, simples ou paniculés, avec de petites fleurs agrégées le long du rachis, les épis ou racemes femelles simples, avec 1 seule fleur sous chaque bractée; disque généralement absent. Fleurs mâles: calice

globulaire et fermé dans le bourgeon, avec 4 (3-2) lobes valvés pendant la floraison; étamines 8 ou moindres, unies à la base, formant une membrane en forme de saucière; ovaire absent. Fleurs femelles: segments du périgone 4 (3-6), imbriqués; ovaire 2 (-3) loges; styles 2 (-3), distincts entiers ou rarement bilobés; ovules solitaires. Capsule s'ouvrant en 2 (ou 3) coques bivalvées. Graines subglobulaires, sans caroncules.

A. latifolia (Sw.) «Bois crapaud» (Haïti), «Aguacatello» (St-Domingue) d'après Urban; appelé aussi «Bois vache» en Haïti.

A. haïtiens Urb. «Grain d'or» ou «Bois vache.»

Adelia L.

Arbrisseaux glabres (sauf l'inflorescence) plus ou moins épineux. Feuilles alternes ou pressées aux nœuds, membraneuses ou papyracées (quand elles sont sèches), entières; pétioles très courts. Fleurs petites, dioïques, apétales, agrégées dans les axes des feuilles, les fleurs mâles sessiles ou courtement pédonculées, les fleurs femelles avec long pédoncule, solitaires ou en groupes de 2 ou 3. Fleurs mâles: calice fermé dans le bourgeon, avec 5 lobes valvés pendant la floraison; disque attaché à la base du calice; étamines 8-15, filets attachés à une colonne centrale, anthères oscillantes à déhiscence longitudinale. Fleurs femelles: calice à 5 lobes valvés; disque aplati; ovaire trilobulaire, styles 3 recourbés — divergents, très frangés; ovules solitaires. Capsule s'ouvrant en 3 coques bivalvées. Graines subglobulaires, sans caroncules.

A. ricinella L. «Grenade marron.»

Acalypha L.

Herbes, arbustes ou arbrisseaux. Feuilles alternes, penninerves, parfois avec 3-5 nervures à la base, généralement serratées et munies d'un long pétiole. Fleurs généralement monoïques et apétales; fleurs mâles petites, agrégées dans l'axe de petites bractées disposées en épis, en forme de chatons ou grêles ou allongées; fleurs femelles solitaires ou 2-4 ensemble dans l'axe d'une bractée foliacée; disque absent. Fleurs mâles: calice fermé dans le bourgeon, mais avec 4 lobes valvés dans la fleur; étamines 8 (-16); filets libres; loges de l'anthère libres s'ouvrant au sommet; ovaire absent. Fleurs femelles: sépales 3-4, imbriqués, très petits; ovaire trilobulaire; styles 3, libres, filiformes, généralement très ramifiés; ovule solitaire. Capsule s'ouvrant en 3 coques bivalvées. Graines sans caroncules.

A. carpinifolia Poit.

A. angustifolia Sw.

A. tomentosa Sw.

A. setosa A. Rich.

A. persimilis Mull.

A. cuspidata Jacq.

A. chamædrifolia (Lam.) Mull-Arg.

A. glechomifolia A. Rich.

A. hispaniolæ Urb.

A. alopecuroïdea Jacq. «Petit pompon» ou «Derrière gonflé.»

A. hispidata Burmf.

A. wilkesiana Mull-Arg. «Manteau St-Joseph.» Ornamental.

A. arcuata Urb.

A. pycnantha Urb.

A. hotteana Urb.

A. platyodonta Urb.

Platygyne Mercier.

Arbrisseaux grimpants avec des poils irritants. Feuilles alternes avec pétiole très court, le plus souvent petites, dentées, penninerves. Inflorescence au sommet des rameaux, pressée, tantôt opposée dans les feuilles; fleurs mâles pédonculées, en touffe; fleurs femelles sessiles, solitaires ou 2-monoïques; disque 0. Fleurs mâles: sépales 5, rarement 4, recourbés pendant la floraison; étamines le plus souvent 5, rarement 4 ou 6-8, réunies en un réceptacle convexe épais et garni de poils; étamines courtes, recourbées au sommet; anthères ovales; réceptacle glabre à l'intérieur du cercle staminal. Fleurs femelles: sépales petits, imbriqués; ovaire court, duveté, trilobulaire; styles beaucoup plus gros, réunis en une tige épaisse concave, dilatés à la partie supérieure, épais et papilleux. Capsule s'ouvrant en coques bivalvées; endocarpe dur. Graines sphériques avec testa crustacé et endosperme charnu.

P. hexandra (Jacq.) Muñ.-Arg. «Attrape sotté.»

Acidoton Sw

Arbustes ou arbrisseaux à branches peu denses, avec des poils qui causent une rude démangeaison, ces poils se trouvent particulièrement sur le bord des feuilles, du calice et de la capsule. Feuilles alternes, entières, coriaces, penninerves. Inflorescence axillaire; fleurs monoïques, ou dioïques, apétales, solitaires dans l'axe d'une bractée; inflorescence mâle courte, agrégée, fleurs avec longs pédoncules; inflorescence femelle plus longue, pendante; les fleurs solitaires dans l'axe d'une bractée, distantes le long du rachis; disque absent ou rudimentaire. Fleurs mâles: sépales 3-5 valvés; étamines nombreuses, indéfinies; ovaire absent. Fleurs femelles: sépales 5-6 imbriqués; ovaire trilobulaire; styles unis à la base en une colonne épaisse, entiers au dessus ou légèrement bilobés; ovules solitaires. Capsule s'ouvrant en 3 coques bivalvées. Graines sans caroncules.

A. microphyllus Urb.

A. variifolius Urb. et Ekm.

A. lanceolatus Urb. et Ekm.

A. hotteanus Urb. et Ekm.

Tragia L.

Herbes ou sous-arbrisseaux vivaces, grimpants ou volubiles, généralement hispides, hérissés de poils qui causent souvent une forte démangeaison. Feuilles alternes, dentées, souvent cordées, penninerves, stipulées. Fleurs monoïques, apétales; racemes axillaires, généralement avec les fleurs mâles en haut; fleurs généralement solitaires dans l'axe d'une bractée. Fleurs mâles: calice globulaire, fermé dans le bourgeon, avec 3-5 lobes valvés à la floraison; disque absent ou indistinct; étamines 3, 2 ou 1; ovaire absent ou excessivement petit. Fleurs femelles: sépales généralement 6, imbriqués; ovaire trilobulaire; styles 3 unis en forme de colonne, entiers au sommet; ovules solitaires. Capsule déhiscente, formant 3 coques bivalvées. Graines sans caroncules.

T. volubilis L. «Pois gratté.»

T. biflora Urb. et Ekm. «Attrape sotté» ou «Liane flamant.»

Dalechampia L.

Herbes ou arbrisseaux grimpants ou rampants, rarement dressés. Feuilles alternes, avec une grande stipule pétiolée, entières, lobées—digitées. Inflorescence entourée de 2 bractées, disposée en cymes, les fleurs mâles en haut; plantes monoïques, apétales. Fleurs mâles: disque absent; calice de 4-6

lobes; étamines généralement 20-30; filets libres ou soudés; ovaire absent. Fleurs femelles: calice de 5-12 lobes imbriqués; ovaire de 3-4 lobes; styles unis, entiers ou lobés. Capsule avec endocarpe dur et cassant s'ouvrant en coques bivalvées. Graines plus ou moins globulaires, dépourvues de caroncules.

D. scandens L. «Liane gratté», «Machacha», «Poil à gratter», ou «Liane fourmi.»

Ricinus L.

Herbe élevée, annuelle, glabre, plus ou moins arborescente. Feuilles alternes, peltées, palmées, lobées, serratées; stipules unies autour du bourgeon. Fleurs monoïques, apétales; racemes plus ou moins paniculés à l'extrémité des branches, les fleurs mâles en bas; disque absent. Fleurs mâles: calice globulaire dans le bourgeon, à 3-5 lobes valvés; étamines très nombreuses avec des filets très ramifiés, les loges de l'anthère subglobulaires, attachées séparément au connectif; ovaire absent. Fleurs femelles: calice se séparant en forme de spathe caduc; ovaire trilobulaire; styles bifides; ovules solitaires dans chaque loge. Capsule déhiscente, en 3 coques bivalvées. Graines avec caroncules très visibles.

R. communis L. «Ricin» ou «Palma Christi.»

Aleurites Foist.

Arbres le plus souvent avec des poils radiés. Feuilles alternes, grandes avec long pétiole, entières ou lobées, avec 2 glandes au sommet du pétiole. Fleurs monoïques ou subdioïques, avec pétales, disposées en panicules cymeuses; fleurs femelles solitaires dans le principal rameau; calice globuleux, fermé dans le bourgeon, s'ouvrant en 2 ou 3 lobes valvés; pétales 5, plus longs que le calice. Fleurs mâles: étamines généralement 15-20, attachées à un réceptacle conique; les 5 étamines externes opposées aux pétales et alternant avec de petites glandes; ovaire absent. Fleurs femelles: ovaire généralement bilobulaire (2-5); styles aussi nombreux que les loges, bifides; ovules solitaires. Fruit grand, charnu au dehors, indéhiscence. Graines sans caroncules, avec une enveloppe épaisse, ligneuse; endosperme épais, dur.

A. moluccana (L.) Willd. «Noyer des Indes.» Ornemental.

Garcia Rohr.

Arbres. Feuilles alternes, grandes, entières. Inflorescence terminale, très peu nombreuse; plantes monoïques (ou dioïques); disque annulaire ou parfois glandulaire; calice de 2-3 lobes, valvé; pétales 8-12, petits, plus longs que le calice. Fleurs mâles: étamines nombreuses, poilues, soudées à la base; connectif large; ovaire absent. Fleurs femelles: calice très caduc; pétales généralement moins nombreux que dans les fleurs mâles; ovaire trilobulaire; styles courts, épais, larges, comprimés, bilobés. Capsule grande, s'ouvrant en coques bivalvées. Graines globulaires.

G. nutans Rohr.

Acidocroton Griseb.

Arbrisseaux armés d'épines stipulaires ou inermes. Feuilles petites, penninerves, obovoïdes, épaisses, entières. Fleurs peu nombreuses parmi les feuilles, plutôt petites, avec des pédoncules très courts, monoïques, avec pétales. Fleurs mâles: calice avec 5-6 segments, divergent; pétales 5-7, plus grands que le calice, divergents, contordus—imbriqués; étamines nombreuses, attachées à un réceptacle poilu discoïde; les loges de l'anthère distinctes, attachées à un

connectif assez large; ovaire absent. Fleurs femelles: calice pareil à celui de la fleur mâle; pétales rudimentaires; ovaire triloculaire; styles plats, divergents, épais, largement obovoïdes, rétus; ovules solitaires. Capsule s'ouvrant en coques bivalvées. Graines plutôt grandes avec une caroncule blanche.

A. litoralis Urb. et Ekm.

A. montanus Urb. et Ekm.

A. horridus Urb. et Ekm.

Jatropha L.

Herbes élevées ou arbrisseaux rarement arborescents. Feuilles alternes, entières ou lobées ou fendues; stipules petites ou découpées en filaments. Fleurs monoïques, généralement avec pétales, nombreuses en panicules corymbeuses, terminales, régulièrement bifurquées; les fleurs femelles solitaires dans les principales branches. Fleurs mâles: calice à 5 lobes ou segments, imbriqué; pétales 5, contordus — imbriqués, unis en une corolle pentalobée, ou distincts ou absents si le calice est pétaloïde; disque entier ou de 5 glandes; étamines 10 ou moindres, attachées au réceptacle en 2 ou plusieurs séries; filets plus ou moins unis en colonne (particulièrement les filets centraux), les 5 filets externes opposés aux pétales; ovaire absent. Fleurs femelles: calice pareil à celui de la fleur mâle; pétales généralement présents; ovaire généralement biloculaire — triloculaire; styles unis à la base, chaque style divisé en 2 lobes ou branches stigmatiques; ovules solitaires. Capsule s'ouvrant en 2 ou 3 coques bivalvées. Graines caronculées.

J. hernandifolia Vent. var. *epeltata* Pax.

J. curcas L. «Médecinier béli» (Haïti), «Pinon» (St-Domingue).

J. gossypifolia L. «Médecinier barachin» ou «Petit médecinier», «Petit mapou», «Moussara», etc.

J. multifida L. «Médecinier espagnol», «Papaye sauvage» ou «Médecinier d'Inde» (Haïti), «Juca cimarrona» (St-Domingue).

J. acuminata Desr.

J. acrandra Urb. «Pringa leche» (St-Domingue).

J. hastata Jacq. Ornemental.

J. integerrima Jacq.

Hevea Aubl.

Arbres grands avec un suc laiteux abondant. Feuilles alternes ou presque opposées à l'extrémité des branches, trifoliolées, entières, penninerves; pétioles longs, glandulaires au sommet. Fleurs monoïques, apétales, petites, disposées en cymes paniculées; calice court avec 5 lobes ou 5 dents; disque formé de 5 glandes libres ou unies; étamines 5-10; filets unis en colonne, anthères sessiles. Fleurs femelles: ovaire ovoïde, triloculaire, avec un ovule dans chaque loge; stigmates bilobés, presque sessiles; styles courts. Capsule grande s'ouvrant en coques bivalvées. Graines grandes, oblongues, lisses, sans caroncules.

H. brasiliensis (H. B. K.) Mull-Arg.

Manihot Adans.

Herbes élevées ou arbrisseaux. Feuilles alternes avec 3-7 lobes ou segments digités, parfois entières. Fleurs grandes, monoïques, apétales, une dans l'axe de chaque bractée, en racemes, grappes terminales ou axillaires au sommet; fleurs mâles supérieures; calice souvent coloré, campanulé, avec 5 lobes imbriqués. Fleurs mâles: étamines 10, en 2 séries, attachées entre les lobes ou glandes du disque; anthères fixées à la partie dorsale; ovaire absent ou petit, trilobé. Fleurs femelles: disque hypogyne; ovaire triloculaire; styles courte-

ment unis à la base, divergents, plurilobés; ovules solitaires. Capsule globulaire s'ouvrant en 3 coques bivalvées. Graines lisses avec grande caroncule.

M. utilisissima Pohl. «Manioc» (Haïti), «Juca» (St-Domingue).

M. glaziovii Mull-Arg. Cultivé à Bayeux.

M. dichotoma Ule. Cultivé à Bayeux.

Codiaeum Rumph.

Arbrisseaux ou arbustes. Feuilles alternes, pétioles, entières, coriaces, penninerves. Inflorescence en grappes, unisexuée ou rarement bisexuée; fleurs mâles petites, agrégées dans l'axe des bractées, fleurs femelles solitaires; plantes monoïques. Fleurs mâles: calice de 3-6 lobes, le plus souvent 5; pétales 5-6 petits, les glandes du disque alternent avec les pétales; étamines 15-30, filets libres; ovaire absent. Fleurs femelles: calice à 5 lobes, petits, imbriqués; pétales absents; disque entier; ovaire triloculaire; styles libres ou soudés légèrement ou entiers. Capsule globulaire s'ouvrant en coques bivalvées. Graines lisses, avec caroncules.

C. variegatum (L) Bl. «Croton.» Ornemental.

Omphalea L.

Arbres ou arbustes et arbrisseaux volubiles ou grimpants. Feuilles alternes avec 2 glandes au sommet du pétiole, entières, penninerves, souvent avec 3-5 nervures à la base; stipules petites, caduques. Fleurs monoïques, apétales, en petites cymes unisexuées (mâles) ou avec la fleur femelle centrale, disposées le long des branches d'une panicule terminale; chaque cyme de la panicule est sous-tendue par des bractées foliacées; disque absent ou indistinct; sépales 4-5, larges, très imbriqués. Fleurs mâles: étamines 2-3; filets unis en une colonne très courte; connectif épais, large, uni en une masse peltée, capitée, bilobée ou trilobée au bord; les loges de l'anthère situées sur la périphérie près des bords des lobes; ovaire absent. Fleurs femelles: ovaire triloculaire (biloculaire); ovules solitaires; styles épais, en forme de colonne, obtus ou avec 2-3 lobes très courts. Fruit épais, charnu extérieurement, avec un endocarpe dur, indéhiscant, à la fin déhiscant en coques bivalvées. Graines presque globulaire, sans caroncules.

O. triandra L. «Noisetier.» Alimentaire.

O. commutata Mull-Arg. «Noisetier.»

Sebastiania Spreng.

Arbrisseaux, rarement frutescents, avec des branches plutôt grêles. Feuilles alternes, généralement petites, avec limbes entiers ou très légèrement dentés. Fleurs peu voyantes, apétales, disposées en épis ou en racemes; fleurs mâles 2-4 sous chaque bractée, placées en haut, fleurs femelles peu nombreuses ou solitaires; bractées avec ou sans glandes; disque absent. Fleurs mâles: calice membraneux avec 3-5 sépales inégaux; étamines 2 ou 3, rarement 4; filets courts, libres ou soudés à la base; ovaire absent; anthères à déhiscence longitudinale. Fleurs femelles: calice avec 3 sépales plus ou moins unis plus court que l'ovaire; ovaire triloculaire, styles libres ou unis à la base. Capsule déhiscence formant 3 coques bivalvées. Graines lisses subglobulaires.

S. corniculata (Vahl.) Mull-Arg.

S. picardæ Urb.

Dittia Griseb.

Arbustes ou arbrisseaux résineux. Feuilles alternes, pétioles, petites, penninerves, coriaces, glandulaires — crénelées; sommet du pétiole églanulaire.

Fleurs femelles petites, sessiles, dans l'axe, solitaires ou 2 ensemble; fleurs dioïques. Fleurs femelles: calice très petit ou absent; ovaire biloculaire, styles 2, très courts, épais. Capsule s'ouvrant en coques bivalvées ou par avortement en 1 seule coque. Graines solitaires; subglobulaires, sans caroncules, avec testa rugueux.

D. myricoides Griseb.

Sapium Jacq.

Arbres ou arbustes glabres, avec jus laiteux. Feuilles alternes, entières ou à peine denticulées, nervures presque perpendiculaires à la nervure médiane, avec 2 glandes absentes ou présentes au sommet du pétiole; stipules présentes. Fleurs monoïques, apétales en épis ou racemes terminaux ou latéraux ou en grappes; fleurs mâles généralement 3 dans l'axe de chaque bractée, fleurs femelles solitaires dans l'axe de chaque bractée; bractées souvent glandulaires de chaque côté et à la base. Fleurs mâles: calice petit avec 2-3 dents ou lobes courts et inégaux; étamines 2 ou 3, filets libres, anthères globulaires; ovaire absent. Fleurs femelles: calice tridenté ou généralement trilobé; ovaire 2-3 loges; styles 3-2 distincts ou unis à la base, recourbés—divergents, entiers; ovule solitaire dans chaque loge. Capsule globulaire ou pyriforme, plus ou moins charnue, puis s'ouvrant en 2 coques bivalvées. Graines sans caroncules.

S. haïtienne Urb.

S. jamaïcense Sw. «Bois lait» (Haïti), «Lengua de vaca» (St-Domingue).

S. buchii Urb. (comb. nov.), «Bois brûlant».

Bonania A. Rich.

Petits arbrisseaux très ramifiés. Feuilles alternes, avec pétiole court, généralement petites, entières ou dentées—glandulaires. Inflorescence bisexuée; fleurs femelles solitaires, fleurs mâles généralement 3 sous chaque bractée; fleurs monoïques (ou rarement dioïques); disque absent. Fleurs mâles: calice avec 2-3 lobes; étamines 2, rarement 3; filets courts; ovaire absent. Fleurs femelles: calice profondément trilobé; styles libres ou légèrement soudés, grêles, entiers. Capsule avec péricarpe charnu, s'ouvrant en coques bivalvées. Graines dépourvues de caroncules.

B. domingensis Urb.

B. linearifolia Urb. et Ekm.

Hippomane L.

Arbres avec jus laiteux vesicant et mordicant. Feuilles alternes avec long pétiole glandulaire au sommet. Fleurs monoïques, apétales, disposées en épis terminaux; bractées distantes l'une de l'autre avec une glande peltée de chaque côté à la base; fleurs mâles 3 à beaucoup dans l'axe de chaque bractée, fleurs femelles solitaires (ou rarement avec les fleurs mâles) dans l'axe de la bractée inférieure, ou absentes, rarement associées avec les fleurs mâles dans la même bractée; disque absent. Fleurs mâles: calice petit, avec 2-3 lobes courts, imbriqués; étamines 2-3; filets unis en colonne, légèrement libres au sommet; ovaire absent. Fleurs femelles: calice petit avec 3 segments; ovaire avec 6-9 loges; styles unis à la base, libres au dessus, linéaires, entiers, étalés en forme d'étoile; ovule solitaire dans chaque loge. Drupe assez grande, indéhiscence; péricarpe charnu; endocarpe très épais, ossu, avec plusieurs loges. Graines sans caroncules.

H. spinosa L. «Pomme zombi».

H. horrida Urb. et Ekm.

H. mancinella L. «Mancenillier» (Haïti), «Manzanillo» (St-Domingue).

Gymnanthes Sw.

Arbres ou arbustes, glabres. Feuilles alternes, entières ou crénelées, — serrulées. Fleurs monoïques, sans sépales ou pétales, racemeuses; racemes ou épis axillaires, parfois aussi terminaux, solitaires ou agrégés, souvent bisexués; bractées ovoïdes, enveloppant les fleurs dans le bourgeon, parfois glandulaires au dos ou aux côtés; fleurs mâles solitaires ou 2-7 ensemble, dans l'axe d'une bractée; fleurs femelles solitaires dans l'axe d'une bractée, une ou 2 à la base du raceme ou plusieurs dans un raceme distinct; disque absent. Fleurs mâles: chaque fleur généralement sous-tendue par 1 ou 2 bractéoles caduques; étamines 2-4, filets libres ou unis; ovaire absent. Fleurs femelles: bractéoles 2-4; ovaire sessile ou stipité, uniloculaire; styles distincts ou unis au milieu ou à la base, recourbés, entiers; ovule solitaire dans chaque loge. Capsule déhiscente en 3 coques bivalvées. Graines généralement caronculees.

G. lucida Sw. «Bois marbre» (Haïti), «Palo de tabaco» (St-Domingue).

G. pallens (Griseb) Mull-Arg.

Hura L.

Arbres spinifères. Feuilles alternes, grandes. Fleurs monoïques, apétales. Epis mâles, terminaux, avec fleurs agrégées, solitaires à chaque bractée; fleurs femelles solitaires dans l'axe supérieur ou sous l'épi mâle; disque absent. Fleurs mâles: calice absent ou formant une coupe plus ou moins complète, bord irrégulier ou denté; étamines 8-20; filets unis avec les connectifs en forme de colonne; loges de l'anthère distinctes, attachées en 2-4 ou 8-10 verticilles en dehors de la colonne au-dessus du sommet; ovaire absent. Fleurs femelles: calice en forme de coupe, tronqué, entier; ovaire de 5-20 loges; styles unis en une longue colonne charnue, infundibuliformes au-dessus et divergents en forme d'étoile au sommet; ovule solitaire dans chaque loge. Capsule grande, déprimée au milieu, s'ouvrant avec fracas et éparpillant les nombreuses coques bivalvées. Graines comprimées latéralement, lenticulaires, sans caroncules.

H. crepitans L. «Sablier» (Haïti), «Javillo» (St-Domingue); «Sand-box tree» (Jamaïque).

Euphorbia L.

Herbes ou sous-arbrisseaux, ou arbrisseaux, avec jus laiteux, âcre. Feuilles tantôt alternes, tantôt opposées (généralement les feuilles supérieures opposées et les feuilles inférieures alternes). Plusieurs fleurs mâles et une fleur femelle enveloppées dans un involucre (cyathium); involucre calicinal, campanulé cylindrique, régulier ou légèrement inégal, avec 4-5 lobes; glandes placées en dehors des lobes et alternant avec eux. Fleurs mâles pédonculées, infiniment nombreuses dans l'involucre; périanthe absent ou parfois représenté par une toute petite écaille au nœud; étamine 1, filets courts, unis au pédicelle; bractéoles linéaires ou sétacées, parfois unies en partie. Fleur femelle 1, au centre de l'involucre; pédicelle allongé au delà de l'involucre; périanthe absent ou formé de 3 petites écailles; ovaire sessile au sommet du pédicelle, triloculaire; styles 3, distincts ou plus ou moins unis, divergents au-dessus, entiers ou divisés en 2; ovules solitaires. Capsule déhiscente, en 3 coques bivalvées. Graines généralement sans caroncules.

E. buxifolia Lam.

E. pilulifera L. «Malnommé».

E. cassythoïdes Boiss.

E. villosula Urb.

- E. berteriana* Balb. «Sanguinaria» (St-Domingue).
E. hypericifolia L. «Romain»
E. nutans Lag.
E. lasiocarpa Klotzsch.
E. hyssopifolia L.
E. parciflora Urb.
E. serpens H. B. K.
E. turpini Boiss.
E. prostrata Ait.
E. adenoptera Bertol, «Bois de rose», d'après Urban.
E. umbrosa Bertero.
E. petiolaris Sims. «Bon garçon» Plante vénéneuse.
E. defoliata Urb.
E. pulcherrima Willd. «Feuilles St-Jean»
E. heterophylla L. «Poinsetta» Dézhomme, «Désaison» ou «St-Jean d'hiver»
E. heterophylla L. var. *graminifolia* (Mx.) Engelm.
E. peplus L.
E. eggersii Urb.
E. tuerckheimii Urb.
E. splendens Bojer, «Couronne du Christ»
E. barkeri Urb et Ekm.
E. inflexa Urb. et Ekm.
E. helwigii Urb. et Ekm.
E. excisa Urb. et Ekm.
E. hepatica Urb. et Ekm.
E. lactea Haw. «Candélabre»

Pedilanthus Neck.

Arbustes ou arbrisseaux avec branches charnues et jus laiteux. Feuilles alternes, entières; bractées foliacées opposées; stipules représentées par de petites glandes. Plusieurs fleurs mâles et une fleur femelle enveloppée dans l'involucre (un cyathium); involucre obliques, en forme de souliers, très irréguliers; appendice à la base du tube, renflé en bas et avec 2 ou 3 lobes au sommet; glandes 4, 2 placées dans la partie inférieure de l'appendice et 2 près de la jonction de l'appendice et du tube. Fleurs mâles nombreuses dans l'involucre; périanthe absent; étamine 1, filets courts articulés au pédicelle. Fleur femelle solitaire au milieu de l'involucre; périanthe absent ou formé de 3 petites écailles; ovaire trilobulaire; styles unis presque jusqu'au sommet en forme d'une longue colonne, entiers ou bifides; ovule solitaire dans chaque loge. Capsule déhiscente en 3 coques bivalvées. Graines sans caroncules.

- P. tithymaloïdes* (L.) Poit.
P. itzaeus Millsp.
P. latifolius Millsp. et Britton.
P. angustifolius Poit.

Cubanthus Urb.

Arbre petit. Feuilles à peine pétiolées, linéaires ou oblancéolées linéaires; stipules absentes. Inflorescence ombellée à l'extrémité des rameaux. Involucre pourpre — brun; bractées florales nombreuses dépassant légèrement l'involucre. Filets articulés au-dessus du milieu, anthères exertes, reniformes — subcarrées, à déhiscence loculicide latérale; sépales 3 dans les fleurs femelles, triangu-

laire; ovaire glabre; style presque entier au sommet. Capsule valvée, ridée à la partie dorsale. Graines ovales — globulaires.

C. umbelliformis Urb. et Ekm. Ile de la Tortue à Boucan Guêpe.

Famille 89. CALLITRICHACEÆ

Petites plantes terrestres ou aquatiques avec des feuilles simples, entières, opposées. Fleurs petites, unisexuées, axillaires, solitaires, sans sépales ou pétales, mais généralement pourvues de 2 bractées. Les fleurs mâles comprennent 1 seule étamine; les fleurs femelles possèdent un ovaire quadriloculaire avec 2 styles, chaque loge contient un ovule pendant. Le fruit est indéhiscent, quadriloculaire avec 4 graines. Les graines sont pendantes, avec endosperme charnu.

Callitriche L.

Caractères de la famille.

C. tuerckheimii Urb.

Ordre XXVIII. SAPINDALES

Arbustes ou arbres (ou herbes pour les *Balsaminaceæ*). Feuilles variées, limbes simples et entiers, dentés ou composés. Calice de sépales distincts; corolle de pétales distincts, régulière ou rarement irrégulière ou absente; androcée comprenant autant d'étamines qu'il y a de pétales ou 2 fois autant, ou rarement plus ou moins; filets distincts; gynécée d'un carpelle ou de plusieurs carpelles unis en un pistil composé; ovaire supère; ovules 1 ou 2 ou plusieurs dans chaque loge de l'ovaire, pendants, avec le raphe éloigné de l'axe de l'ovaire, ou dressés ou ascendants.

- | | |
|--|------------------------------------|
| x. Corolle ou style absent | 90. <i>Buxaceæ</i> , p. 195 |
| x. Corolle ou style présent: | |
| 2x. Plantes résineuses | 91. <i>Anacardiaceæ</i> , p. 196 |
| 2x. Plantes non résineuses: | |
| 3x. Herbes | 99. <i>Balsaminaceæ</i> , p. 207 |
| 3x. Plantes ligneuses, sarments, arbres ou arbustes: | |
| 4x. Feuilles avec stipules. Fruits variés: | |
| 5x. Feuilles simples, nervation pennée: | |
| 6x. Anthères introrsées | 94. <i>Celastraceæ</i> , p. 199 |
| 6x. Anthères extrorsées | 95. <i>Hippocrateaceæ</i> , p. 201 |
| 5x. Feuilles composées ou si simples, nervation palmée (exception pour le genre <i>Dodonaea</i>): | |
| 6x. Feuilles opposées | 97. <i>Staphyleaceæ</i> , p. 202 |
| 6x. Feuilles alternes | 98. <i>Sapindaceæ</i> , p. 203 |
| 4x. Feuilles sans stipules. Fruit drupacé: | |
| 5x. Etamines opposées aux pétales: | |
| 6x. Pétales égaux | 92. <i>Cyrtaceæ</i> , p. 197 |
| 6x. Pétales inégaux, les 2 pétales internes très réduits | 100. <i>Sabiaceæ</i> , p. 208 |
| 5x. Etamines alternant avec les pétales: | |
| 6x. Calice très petit, persistant | 93. <i>Aquifoliaceæ</i> , p. 198 |
| 6x. Calice non très petit souvent caduc | 96. <i>Icacinaceæ</i> , p. 201 |

Famille 90. BUXACEÆ

Arbrisseaux ou arbustes ou arbres ou herbes vivaces avec sève aqueuse. Feuilles alternes ou opposées, souvent persistantes; limbes simples, souvent coriacés. Fleurs monoïques ou dioïques, régulières, solitaires ou agrégées; calice présent ou absent; corolle absente. Fleurs mâles avec un androcée de 4-7 étamines, filets distincts, anthères biloculaires. Fleurs femelles avec un gyné-

cée composé; ovaire triloculaire ou parfois biloculaire ou quadriloculaire, stigmates 2 ou 4 distincts, ovules anatropes 1 ou 2 dans chaque loge. Fruit capsulaire ou drupacé avec des carpelles de 1-2 graines. Endosperme charnu parfois très peu abondant; embryon dressé.

Buxus L.

Arbrisseaux très ramifiés. Feuilles opposées, coriacées, entières, à pétiole court, penninerves. Fleurs en groupes ou épis axillaires. Fleurs staminées latérales dans l'inflorescence, de 4 sépales imbriqués et de 4 étamines opposées aux sépales. Filets épais, libres. Les fleurs pistillées terminales de 6 sépales imbriqués; ovaire triloculaire, avec 2 ovules dans chaque loge; styles 3 courts. Fruit: une capsule ovoïde, à déhiscence loculicide, avec 3 pointes provenant des 3 styles persistants. Graines luisantes, noires.

B. glomerata (Griseb) Mull.

Famille 91. ANACARDIACEÆ

Arbrisseaux, arbustes ou arbres, avec écorce résineuse; sève plus ou moins laiteuse, parfois acide ou caustique, devenant noire en séchant. Feuilles alternes, rarement opposées, simples ou composées. Plantes généralement monoïques ou dioïques, parfois polygames; inflorescence épiée, racémeuse ou paniculée. Fleurs petites généralement régulières; calice de 3-5 segments (rarement 6-7); pétales insérés sur la base du calice, alternant avec les sépales, imbriqués, rarement valvés; étamines 3-10, généralement alternant avec les pétales; anthères introrsées; disque généralement annulaire; ovaire de 1-6 loges, avec un ovule dans chaque loge; styles 1-6, stigmates entiers. Fruit, drupe ou baie.

Les membres les plus importants de cette famille sont représentés en Haïti par le manguiier et la pomme d'acajou.

- x. Feuilles simples:
 - 2x. Étamines 7-10..... *Anacardium*, p. 196
 - 2x. Étamines 1-5..... *Mangifera*, p. 196
- x. Feuilles composées:
 - 2x. Ovaire 4-5 loges..... *Spondias*, p. 197
 - 2x. Ovaire uniloculaire:
 - 3x. Parties florales au nombre de 3-4... *Comocladia*, p. 197
 - 3x. Parties florales au nombre de 5..... *Metopium*, p. 197

Mangifera L.

• Arbres cultivés pour leurs fruits comestibles. Feuilles alternes, entières, pétioles, coriacées, simples. Fleurs polygames, petites, pédonculées, disposées en panicules terminales; calice avec 4-5 segments, décidu; pétales 4-5 libres ou adnés au disque; étamines 1-5, généralement 1 seule ou 2 fertiles; ovaire uniloculaire avec style latéral. Fruit: une grande drupe charnue avec un noyau fibreux comprimé.

M. indica L. «Manguier.» Alimentaire.

Anacardium L.

Arbustes ou arbres cultivés pour leurs noix. Feuilles alternes, pétioles, simples, entières, coriacées. Fleurs polygames en panicules terminales; calice avec 5 segments, décidu; pétales 5, très étroits; étamines 7-10, toutes fertiles ou seulement quelques-unes; ovaire uniloculaire, sessile, style 1. Fruit reniforme porté sur un réceptacle très élargi.

A. occidentale L. «Acajou», «Noix d'acajou» ou «Pomme cajou» (Haïti), «Cacajuil», ou «Cajuil» (St-Domingue); «Cashew» en anglais. Alimentaire.

Spondias L.

Arbres cultivés pour leurs fruits comestibles. Feuilles généralement agrégées non loin des extrémités des petites branches, alternes, imparipennées. Fleurs petites, avec pédoncule court, disposées en racemes ou panicules. Calice petit, décidu, avec 4-5 segments; pétales 4-5, divergents; étamines 8-10; ovaire sessile avec 4-5 loges; styles 4-5. Fruit: une drupe charnue.

S. dulcis Forst. f. «Mombin espagnol» ou «Robe.»

S. purpurea L. «Cirouelle.»

S. brunea Urb.

S. mombin L. «Mombin franc» (Haïti), «Jobo» (St-Domingue); «Hog-plun» ou «Yellow mombin» en anglais.

S. cytherea Sonn. «Pomme cythère.»

S. robe Urb. (Sp. hyb. nov.) «Robe» ou «Mombin espagnol.» Plaine centrale.

Comocladia L.

Arbres ou arbustes. Feuilles composées pinnées; folioles entières ou irrégulièrement dentées. Fleurs petites, parfaites ou polygames, disposées en panicules axillaires. Calice généralement de 3-4 segments; pétales 3-4, imbriqués, divergents; étamines 3-4. Fruit: une drupe.

La sève de toutes les espèces est très vesicante.

C. elenbergii Engl.

C. pinatifolia L. «Brésillet.»

C. dentata Jacq. «Brésillet.»

C. dodonaea (L.) Urb.

C. cuneata Britton, «Brésillet» ou «Bois pagnol.»

C. domingensis Britton, «Bois espagnol.»

C. glabra Spreng. «Brésillet» (Haïti), «Chicharron» (St-Domingue).

C. glabra Spreng. var. *acuminata* (Moç. et Sessé) Urb. «Brésillet» (Haïti), «Guao» (St-Domingue).

C. mollifolia Ekm. et Helwig.

C. ekmaniana Helwig. Massif du Nord.

C. gracilis Helwig. Massif de la Selle.

C. gilgiana Helwig. Massif de la Selle.

Metopium Engl.

Arbres avec sève vesicante ou toxique. Feuilles alternes, composées-pinnées, folioles coriacées, entières. Fleurs dioïques, disposées en racemes axillaires. Sépales 5, larges, imbriqués; pétales 5, 2 fois plus longs que les sépales, imbriqués; disque annulaire, parfois légèrement lobé; étamines 5, plus courtes que les sépales; anthères s'ouvrant longitudinalement; ovaire uniloculaire; style court; stigmate trilobé; ovules solitaires. Drupe quelque peu allongée, glabre, brillante, apiculée.

M. brownei (Jacq.) Urb. «Bois mulâtre» (Haïti), «Cochenilla» (St-Domingue).

M. toxiferum (L.) Krug. et Urb. «Mancenillier.»

Famille 92. CYRILLACEÆ

Arbustes ou arbrisseaux avec sève aqueuse, poussant dans les endroits marécageux. Feuilles alternes dénuées de stipules; limbes entiers, simples, le plus souvent près de l'extrémité des branches, assez persistants. Fleurs parfaites, régulières, sur des pédicelles qui portent 2 écailles. Calice de 5 sépales imbriqués persistants, égaux ou inégaux; corolle de 5 pétales hypogynes, sessiles

ou munis d'un court onglet, parfois cohérent, décidus. Androcée de 5 ou 10 étamines, celles-ci opposées aux pétales plus courts; filets aplatis, distincts; anthères biloculaires, s'ouvrant longitudinalement; disque annulaire, cylindrique ou en forme de coupe. Gynécée d'un seul pistil; ovaire 2-5 angles, 2-5 loges; styles généralement absents; stigmates de 2-5 lobes; ovules 1 ou 4 dans chaque loge, anatropes, pendants. Fruit petit, crustacé ou spongieux, déhiscent ou indéhiscent, parfois ailé. Graines souvent solitaires dans chaque cavité, allongées, avec un testa mou, quelque peu mucilagineux.

Cyrilla Garden.

Arbustes ou arbrisseaux glabres avec une écorce pâle. Feuilles alternes; limbes coriacés, généralement de beaucoup plus larges au-dessus du milieu. Fleurs petites, en racemes grêles, latéraux, épiés; pédoncules dressés ou divergents. Sépales 5, coriacés, égaux; pétales 5, quelque peu coriacés, plus longs que les sépales, involutés vers le sommet, aigus, contordus; étamines 5, insérées à la base de la corolle; disque cylindrique; ovaire allongé, biloculaire; stigmate bilobé; ovules 2-3, dans chaque loge. Capsule légèrement allongée, biloculaire, à déhiscence loculicide. Graines pointues à une extrémité; testa membraneux.

C. racemiflora L.

Famille 93. AQUIFOLIACEÆ

Arbustes ou arbres avec sève aqueuse. Feuilles alternes, dénuées de stipules; limbes simples, entiers ou dentés, parfois épineux. Inflorescence normalement cymeuse; fleurs parfaites ou polygames, régulières. Calice de 4-6 sépales, persistants, imbriqués; corolle blanche ou verdâtre, de 4-6 pétales imbriqués, décidus, qui alternent avec les sépales et souvent unis à la base. Androcée de 4-6 étamines, insérées à la base de la corolle, alternant avec les pétales, toutes fertiles; filets droits, plus courts que les pétales; anthères introrsées, les sacs s'ouvrant longitudinalement. Gynécée, un pistil composé; ovaire de 2-6 loges (rarement avec plus de loges); stigmate généralement sessile, avec autant de lobes qu'il y a de cavités dans l'ovaire; ovules 1-2 dans chaque loge, suspendus, anatropes. Fruit, une drupe avec 4-8 petits noyaux cornés ou crustacés. Graines avec testa membraneux.

Ilex L.

Arbustes ou arbres généralement glabres. Feuilles alternes; limbes entiers, dentés ou rarement épineux. Fleurs parfois inclinées à être dioïques, régulières; les fleurs staminées en groupes axillaires, les fleurs pistillées le plus souvent solitaires. Sépales 4-6 persistants; pétales 4-6, généralement unis à la base, formant ainsi une corolle rotacée; étamines aussi nombreuses que les pétales, alternant avec eux; filets distincts; ovaire de 4-6 loges ou rarement de 7-8 loges. Drupe subglobulaire avec 4-8 petits noyaux cornés ou crustacés. Graines sans arille.

I. montana (Sw.) Griseb.

I. montana (Sw.) Griseb. var. occidentalis Loes. var. domingensis Loes.

I. tuerckheimii Loes.

I. tuerckheimii Loes. var. constanzæ Loes. var. subalpina Loes.

I. grisebachii Maxim. var. haïtiens Loes.

I. microwrightioides Loes. var. b. calvescens Loes.

I. krugiana Loes. forme b. paciportensis Loes.

I. fuertesiana Loes. var. b. selleana Loes.

I. barahonica Loes.

I. riedlaei Loes.

I. caroliniana (Lam.) Loes. var. fuertesiana Loes.

I. formonica Loes.

I. guianensis (Aubl.) O. Ktze.

I. azuensis Loes.

I. berteroi Loes. var. buchiana Loes.

I. clementis Britt. et Wils.

I. cubana Loes.

Famille 94. CELASTRACEÆ

Arbustes ou arbres avec tiges dressées ou volubiles, parfois armés d'épines. Feuilles alternes, opposées ou verticillées, avec ou sans stipules; limbes simples. Inflorescence normalement cymeuse, parfois agrégée; fleurs parfaites, polygames ou dioïques, régulières, généralement pédicellées. Calice de 4-5 sépales imbriqués; disque charnu, ou rarement absent; corolle de 4-5 pétales généralement insérés sous le disque, imbriquée, non onguiculée. Androcée de 4-5 étamines insérées en dessous du disque ou encore sur le bord ou sur le côté supérieur du disque; filets cylindriques ou presque cylindriques; anthères introrsées. Gynécée, un pistil composé; ovaire généralement immergeant dans le disque avec 2-5 loges; styles courts ou absents; stigmate 2-5 lobes; ovule solitaire ou 2 ou plusieurs dans chaque loge, dressés ou suspendus, anatropes. Fruit: une capsule, une drupe ou une baie, parfois ailée. Graines solitaires ou plusieurs dans chaque cavité, souvent enveloppées d'un arille brillant; endosperme abondant, charnu ou oléagineux; embryon dressé.

x. Fruit déhiscent. Graines arillées:

x. Ovaire isomère, quadriloculaire

Torralbasia, p. 199

2x. Ovaire oligomère avec 2-3 loges

Maytenus, p. 199

x. Fruit indéhiscent. Graines non arillées:

2x. Ovaire 2 ou 4 loges; ovule 1 dans chaque loge. Fleurs toujours quadrimères:

3x. Fleurs hermaphrodites:

4x. Ovaire quadriloculaire.

Rhacoma, p. 200

4x. Ovaire biloculaire

Myginda, p. 200

3x. Fleurs dioïques; sépales libres ou presque libres:

4x. Feuilles opposées. Inflorescence cymeuse pédonculée.

Gyminda, p. 200

4x. Feuilles alternes. Fleurs fasciculées dans l'axe des feuilles

Schaefferia, p. 200

2x. Ovaire de 2-3 loges; ovules 2 dans chaque loge. Fleurs pentamères

Elaeodendron, p. 201

Torralbasia Urb.

Arbres glabres. Feuilles alternes, parfois opposées ou presque opposées; stipules absentes. Inflorescence cymeuse; fleurs petites, blanches, quadrimères. Sépales dressés; pétales insérés sous le disque; anthères à déhiscence longitudinale et transversale; ovaire quadriloculaire; styles 4, libres, subulés; ovules solitaires, ascendants, anatropes. Capsule coriacée avec 1-2 loges (par avortement).

T. domingensis Urb.

Maytenus Juss.

Arbres ou arbustes ou arbrisseaux. Feuilles alternes, limbes coriacés ou charnus coriacés, entiers ou dentés; stipules très petites, caduques. Fleurs polygames ou dioïques, solitaires, agrégées ou cymeuses, axillaires. Sépales 5; pétales 5, insérés sur le bord du disque; étamines 5, insérées sous le disque;

ovaire de 2-3 loges, style absent ou en forme de colonne, stigmate de 2-3 lobes, ovules 1-2 dans chaque loge, dressés. Capsule coriacée, 1-3 loges, déhiscence loculicide, 2-3 valves. Graines dressées, enveloppées à la base ou entièrement d'un arille.

- M. jamaicensis* Krug. et Urb. var. *orbicularis* Krug. et Urb.
- M. domingensis* Krug. et Urb.
- M. elliptica* (Lam.) Krug. et Urb.
- M. haïtiensis* Urb.
- M. hotteana* Urb.
- M. buxifolia* (A. Rich.) Griseb. «Bois fourmi.»
- M. cassinoïdes* (Poir.) Urb.
- M. impressa* Urb. et Ekm.
- M. reynosioïdes* Urb.
- M. mornicola* Urb. et Ekm.
- M. microphylla* Urb. et Ekm.

Rhacoma L.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles alternes, opposées ou verticillées; limbes entiers ou dentés, généralement petits. Fleurs parfaites, solitaires ou disposées en cymes dans les axes. Hypanthium en forme d'urne; sépales petits 4-5; pétales 4-5; disque de 4-5 lobes; étamines 4-5 insérées entre les lobes du disque; ovaire, quadriloculaire; stigmate 3-4 lobes; ovule solitaire et dressé dans chaque loge. Fruit, une drupe.

- R. crossopetalum* L.
- R. gonoclada* Urb.
- R. illicifolia* (Poir.) Trelease.

Myginda Jacq.

Plantes ligneuses avec feuilles dentées ou serrées, opposées en croix, rarement alternes également ou parfois 3 verticillées. Inflorescence cymeuse, axillaire; ovaire biloculaire, style plus ou moins distinctement bilobé avec des stigmates commissuraux. Endosperme nul ou très pauvre et le tégument de la graine y adhère; cotylédons très épaissement charnus.

- M. uragoga* Jacq.

Gyminda Sarg.

Arbres ou arbustes glabres, dioïques, avec écorce pâle et rameaux quadranguleux. Feuilles opposées; limbes allongés, entiers ou légèrement dentés au-dessus du milieu, arrondis ou émarginés au sommet; stipules caduques. Fleurs dioïques, en cymes axillaires. Sépales 4 (rarement 3), arrondis, persistants, imbriqués; disque en forme de coupe, quadrilobé, remplissant l'hypanthium; pétales 4, réfléchis, entiers, plus longs que les sépales; étamines 4, exertes; filets grêles, convergents; ovaire allongé, confluent avec le disque, biloculaire, une colonne rudimentaire bifide dans les fleurs staminées; stigmates sessiles, bilobés; ovules solitaires, suspendus. Fruit en forme de drupe avec une pulpe mince et un noyau biloculaire crustacé.

- G. latifolia* (Sw.) Urb. «False boxwood,» en anglais.

Schaefferia Jacq.

Arbustes ou arbrisseaux rigides, glabres, dioïques, à écorce pâle et à branches cylindriques. Feuilles alternes ou fasciculées; limbes coriacés, entiers. Fleurs dioïques, sessiles ou pédicellées, agrégées dans l'axe des feuilles. Sépales 4, larges, imbriqués; disque petit, en forme de bosse dans les fleurs staminées; pétales 4, hypogynes, insérés sur le disque; étamines 4, opposées aux sé-

pales; filets incurvés; ovaire biloculaire, style très court ou absent; stigmate bilobé, ovules solitaires dressés. Fruit en forme de drupe avec pulpe absente ou peu abondante, biloculaire, avec un noyau corné et une enveloppe tuberculifère. Graine 1 dans chaque loge, arillée.

- S. frutescens* Jacq. «Petit bois blanc,» «Bois capable,» «Bois petit garçon» (Haïti), «Cabra» (St-Domingue).

S. frutescens Jacq.

S. ephedroides Urb. «Bois pin marron,» ou «Balai de la montagne.»

S. angustifolia Urb. et Ekm.

Elaeodendron Jacq. fil.

Arbustes ou arbrisseaux ou arbres. Feuilles alternes ou opposées; limbes entiers ou légèrement dentés, coriacés; stipules petites. Fleurs dioïques, petites, blanches ou verdâtres; inflorescence axillaire ou latérale. Calice de 5 segments; pétales 5; disque épais; étamines 5, insérées sous le disque ou entre les lobes du disque; filets courts; ovaire immergé dans le disque de 2-3 loges, avec 2 ovules dans chaque loge. Fruit indéhiscent, globulaire ou obovoïde, jaune ou orange.

E. xylocarpum (Vent.) P. DC.

E. ehrenbergii Urb.

E. lanceolatum Urb. et Ekm.

Famille 95. HIPPOCRATEACEÆ

Arbustes ou arbrisseaux ou sarments avec des branches plus ou moins tor dues. Feuilles opposées, plutôt persistantes; limbes entiers; stipules caduques. Inflorescence axillaire, racemeuse, paniculée ou cymeuse; fleurs parfaites, régulières, peu voyantes. Calice de 5 petits sépales, persistants, imbriqués; disque grand, conique, en forme de coupe ou divergent; corolle de 5 pétales sessiles, imbriqués, divergents, insérés entre les sépales. Androcée de 3 étamines insérées sur le bord du disque et de l'ovaire; filets aplatis et dilatés à la base; anthères de 2-4 loges, extrorses. Gynécée de 3 carpelles unis; ovaire triloculaire plus ou moins immergé dans le disque, mais libre; styles unis; stigmate simple ou trilobé; ovules peu ou nombreux insérés en 1-2 ou 3 rangées, anatropes ou semi-anatropes. Fruit: une baie, drupe ou capsule de 3 (ou moins) de carpelles aplatis, soudés à la base. Graines généralement peu, aplaties, souvent ailées à la base; testa membraneux ou crustacé.

Hippocratea L.

Arbustes ou arbrisseaux volubiles, avec des branches cylindriques. Feuilles opposées; limbes coriacés, pétioles renflés à la base. Fleurs en cymes ou panicules axillaires. Sépales et pétales généralement 5, divergents; étamines 3, insérées sur le disque; filets aplatis et dilatés à la base; ovaire triloculaire; stigmate trilobé; ovules 2-6 dans chaque loge, en 2 séries, ascendants. Capsule trilobée (lobes parfois supprimés) aplatie, coriacée, uniloculaire, les lobes bivalvés. Graines aplaties, ailées en dessous.

H. volubilis L. «Liane blanc» (Haïti), «Haquimey» ou «Jaquimey» (St-Domingue).

H. comosa Sw. «Amandier des bois,» d'après Urban.

H. domingensis Urb. et Ekm. «Liane mébi.» Massif de la Hotte.

Famille 96. ICACINACEÆ

Arbres et arbustes, très rarement herbes. Feuilles principalement alternes, généralement entières, dénuées de stipules. Fleurs petites, parfaites ou uni-

sexuées. Calice petit, infère, de 4-5 lobes, les lobes généralement imbriqués; corolle de 4-5 pétales, le plus souvent libres, parfois unis à la base, valvés. Étamines aussi nombreuses que les pétales et alternant avec eux, étamines fertiles ou parfois toutes stériles dans les fleurs femelles; filets subulés parfois poilus, anthères quadriloculaires. Ovaire généralement uniloculaire (par avortement des autres loges). Fruit drupacé, uniloculaire, monosperme.

- x. Pétales poilus à l'intérieur..... **Mappia**, p. 202
 x. Pétales glabres à l'intérieur..... **Ottoschulzia**, p. 202

Mappia Jacq.

Arbres ou arbustes. Feuilles membraneuses, entières ou légèrement ondulées. Fleurs petites, en épis axillaires peu compacts ou en fausses ombelles terminales; fleurs parfaites et unisexuées. Calice petit, en forme de coupe, pentadenté; pétales 5, poilus à l'intérieur; étamines 5; filets filiformes ou charnus à la base; disque en forme de coupe, pentalobé; ovaire uniloculaire avec 2 ovules pendants; style conique; stigmate quelque peu plus large que l'extrémité du style. Fruit drupacé. Graine solitaire.

M. racemosa Jacq.

Ottoschulzia Urb.

Arbres. Feuilles alternes, coriaces, limbes entiers; stipules absentes. Fleurs peu nombreuses, mais solitaires dans l'axe des feuilles, superposées 2 à 2, en racemes axillaires; fleurs pentamères. Sépales unis à la base; corolle gamopétale, glabre à l'intérieur, tube cupuliforme, lobes valvés; étamines insérées au sommet ou presque au sommet du tube de la corolle et alternant avec chaque lobe; filets larges, égaux, glabres; disque très court, peu voyant; ovaire libre, sessile, uniloculaire; style terminal, court; stigmate peu développé; ovules 2, fixés au sommet de la loge. Fruit: une drupe ovoïde, peu charnue, putamen ligneux, poilu à l'intérieur. Graine solitaire.

O. domingensis Urb.

Famille 97. STAPHYLEACEÆ

Arbustes ou arbres avec tiges dressées. Feuilles opposées ou alternes, généralement avec stipules et stipelles; limbes composés, imparipennés; folioles opposées, involutées dans la nervation. Inflorescence racémeuse ou paniculée; fleurs parfaites ou polygames, régulières, pédicellées, sous-tendues par des bractées caduques. Calice de 5 sépales; disque en forme de coupe, à bord libre; corolle de 5 pétales imbriqués, allongés, insérés sous le bord du disque et généralement un peu plus longs que les sépales; étamines 5, insérées sous le bord du disque; filets distincts; anthères introrsées; carpelles 2-3; ovaire sessile; styles 3, stigmates simples; ovules anatropes, horizontaux ou ascendants, insérés en 1 ou 2 rangées sur la suture ventrale. Fruit: une capsule membraneuse, renflée, ou une baie. Graines peu ou nombreuses.

- x. Feuilles opposées..... **Turpinia**, p. 202
 x. Feuilles alternes..... **Huetea**, p. 203

Turpinia Vent.

Arbres ou arbustes. Feuilles opposées, imparipennées, très rarement simples; stipules petites, très caduques; folioles coriaces, dentées, souvent avec stipelles. Inflorescence épiée, grande, terminale et axillaire. Calice avec 5 lobes imbriqués; pétales 5, larges, en forme de spatule ou circulaires; disque grand, lobé, intrastaminal; étamines 5, légèrement périgynes; ovaire trilobé,

triloculaire, avec 3 styles libres ou soudés. Fruit charnu ou coriacé, trilobulaire, avec 1 ou plusieurs graines.

T. panniculata Vent.

T. picardæ Urb.

Huetea R. et P.

Arbres avec feuilles alternes, imparipennées; folioles dentées. Inflorescence épiée, terminale et axillaire; fleurs polygames, petites. Calice avec 5-6 dents; corolle petite, légèrement poilue, imbriquée; étamines 5-6, périgynes comme la corolle; filets courts, subulés, les glandes du disque alternant avec les étamines; ovaire imparfaitement biloculaire; ovule 1 dans chaque loge, ascendant, anatropé. Fruit monosperme.

H. cubensis Griseb. «Alfiler» (St-Domingue), d'après Urban.

Famille 98. SAPINDACEÆ

Arbustes et arbres ou rarement herbes avec tiges dressées ou grimpantes. Feuilles opposées ou alternes, généralement avec stipules, le plus souvent composées — pinnées ou palmées, parfois simples; folioles généralement opposées. Inflorescence racémeuse ou paniculée ou corymbeuse; fleurs dioïques, polygames, polygamodioïques ou rarement parfaites. Calice de 4-5 sépales imbriqués ou valvés; disque entier ou lobé; corolle de 4-5 pétales ou absente. Androcée de 5 ou 8-15 étamines insérées sur le disque; filets distincts ou unis à la base; anthères introrsées, parfois oscillantes. Gynécée de 2-4 carpelles plus ou moins unis; ovaire trilobulaire ou de 2-4 loges (parfois plus); styles partiellement unis; stigmate capité ou lobé; ovules 1 ou plusieurs, anatropes, ou semi anatropes, horizontaux, ou quelque peu ascendants ou pendants. Fruits très variés. Graines 1 ou plusieurs dans chaque loge, avec un testa osseux, coriacé ou crustacé; endosperme mince, charnu ou absent.

- x. Plantes sarmenteuses:
 2x. Fruit ailé, une samare **Serjania**, p. 204
 2x. Fruit non ailé, une capsule:
 3x. Capsule renflée, déhiscence loculicide **Cardiospermum**, p. 204
 3x. Capsule pyriforme, déhiscence septicide **Paullinia**, p. 204
 x. Plantes dressées:
 2x. Feuilles simples ou composées — imparipennées:
 3x. Fruit non ailé **Allophylus**, p. 205
 3x. Fruit ailé:
 4x. Pétales présents. Feuilles composées **Thouinia**, p. 204
 4x. Pétales absents. Feuilles simples **Dodonaea**, p. 207
 2x. Feuilles composées, imparipennées:
 3x. Fruit indéhiscent, baie, drupe ou samare:
 4x. Pétales absents **Litchi**, p. 206
 4x. Pétales présents:
 5x. Fruit de 3 samares généralement **Thouinidium**, p. 205
 5x. Fruit drupacé ou bacciforme:
 6x. Fruit, une baie monosperme avec pulpe jaune, translucide **Sapindus**, p. 205
 6x. Fruit, une drupe avec pulpe charnue **Melicocca**, p. 206
 3x. Fruit déhiscent, capsule:
 4x. Graines 2 dans chaque loge:
 5x. Ovaire biloculaire, ovules collatéraux. Folioles 2, 4 ou 6 **Exothea**, p. 207
 5x. Ovaire trilobulaire, ovules superposés. Folioles 3 **Hypelate**, p. 207
 4x. Graines solitaires dans chaque loge:
 5x. Sépales distincts, largement imbriqués **Cupania**, p. 206

5x. Sépales unis, lobés:

6x. Fleurs en panicules terminales et latérales..... **Matayba**, p. 206
6x. Fleurs en racemes axillaires **Blighia**, p. 206

Serjania Schum.

Arbrisseaux grimpants. Feuilles alternes, trifoliolées, 2 ou 3 fois ternées, pinnées ou bipennées. Fleurs polygames, disposées en racemes axillaires, blanches ou blanchâtres. Sépales 5, les 2 sépales externes plus petits; pétales 4, appendiculés; étamines 8, filets unis à la base; ovaire trilobulaire, styles unis au-dessus du milieu, ovule 1 dans chaque loge. Fruit de 3 samares attachées dorsalement les unes aux autres, chaque samare porte une graine au sommet.

S. cuneolata Radlk.

S. diversifolia (Jacq.) Radlk.

S. diversifolia (Jacq.) Radlk. var. *parvula* (C. Whight) Radlk. Sub. var. *multifoliolata* Radlk.

S. sinuata (Lam.) Schum f. *plumeriana* Radlk. form. *ilicifolia* (Taush.) Radlk. f. *plumieriana* (Spreng) Radlk.

S. polyphylla (L.) Radlk. «Liane persil» (Haïti), «Bejuco de costilla» (St-Domingue).

S. subdentata Juss.

S. filicifolia Radlk.

S. acupunctata Radlk.

S. angustifolia Willd.

Paullinia L.

Arbrisseaux grimpants. Feuilles alternes, pinnées ou composées ternées, les folioles généralement dentées ou lobées; stipules présentes; les pétioles souvent ailés. Fleurs polygamo-dioïques, en racemes axillaires portant généralement des vrilles. Sépales 5, inégaux; pétales 4; étamines 8. Fruit capsulaire pyriforme, quelque peu charnu, trigone ou avec 3 ailes, avec 1-3 loges et 1-3 graines; déhiscence septicide par 3 valves.

P. cururu L.

P. pinnata L. «Liane carrée.»

Cardiospermum L.

Herbes ou arbrisseaux grimpants avec tiges cannelées ou anguleuses très ramifiées. Feuilles alternes; limbes biternés ou décomposés; folioles généralement dentées, ponctuées. Fleurs polygamo-dioïques, irrégulières, en racemes ou corymbes axillaires dont les pédoncules portent 2 vrilles. Sépales 4, herbacés, imbriqués, les 2 pétales externes plus petits; disque unilatéral, extra-staminal, élargi en 2 glandes opposées aux pétales inférieurs; pétales 4, inégaux, les 2 plus grands avec une écaille à la base, la plus petite paire avec une crête; étamines 8, obliques; filets inégaux, distincts ou unis à la base; ovaire trilobulaire, trigone; styles unis à la base; stigmates 3; ovule solitaire dans chaque loge, ascendant. Capsule trigone, renflée, membraneuse et veinée, à déhiscence loculicide. Graine solitaire dans chaque loge.

C. halicacabum L. «Pois de merveille.»

C. halicacabum L. Var. *microcarpum* (H. B. K.) Bl.

C. corindum L. f. *villosa* Radlk.

Thouinia Poit.

Arbres ou arbustes dressés. Feuilles trifoliolées, les folioles serrées. Fleurs

petites, symétriques, disposées en panicules latérales. Sépales et pétales 4, chacun; disque unilatéral avec 4 glandes, souvent confluentes; étamines 8; pistil trilobé, trilobulaire. Fruit de 2 ou 3 samares, chaque samare avec 1 graine.

T. simplicifolia Poit.

T. domingensis Urb. et Radlk.

T. trifoliata Poit. «Bois poivre» ou «Bois la fièvre»

T. tomentosa P. DC.

T. racemosa Radlk. «Bois couré» ou «Malaguette marron.»

T. multinervis Radlk.

T. inaequalis Radlk.

T. rigidissima Radlk. et Ekm.

T. milleri Leonard.

T. spicata Radlk. et Ekm.

T. scoparia Radlk.

T. deflexa Radlk.

T. revoluta Radlk.

Allophylus L.

Arbres ou arbustes dressés. Feuilles alternes, persistantes ou décidues, généralement trifoliolées, les folioles dentées. Fleurs polygamo-dioïques, disposées en racemes simples ou paniculés. Sépales 4; pétales 4; étamines 8; ovaire généralement bilobulaire. Fruit généralement d'un seul carpelle sec ou charnu, monosperme.

A. rigidus Sw. «Chic-chic» ou «Bois nègre.»

A. rigidus Sw. f. *incana* Radlk.

A. crassinervis Radlk. f. *ovata* Radlk.

A. occidentalis (Sw.) Radlk. «Trois paroles» (Haïti); «Tres palabras» (St-Domingue), d'après Urban.

A. haïtiensis Radlk. et Ekm.

A. cominia Sw. «Trois feuilles» ou «Trois paroles.»

Thouinidium Radlk.

Arbres ou arbustes dressés. Feuilles paripennées; folioles coriaces, entières ou serrées. Fleurs petites, régulières, disposées en panicules terminales. Sépales 5; pétales 5; étamines 8 ou 10. Fruit de 2 ou 3 samares monospermes, comprimés latéralement.

T. pinnatum (Turp.) Radlk. «Gros peau.»

T. pulverulentum (Griseb.) Radlk. «Bois brûlé» d'après Urban.

Sapindus L.

Arbres ou arbustes avec tiges dressées ou quelque peu grimpantes. Feuilles alternes, généralement composées-pinnées, dénuées de stipules, les folioles entières ou serrées. Fleurs très petites, régulières, polygames, en racemes ou panicules axillaires ou terminaux. Sépales 4-5 en 2 rangées; pétales 4-5 insérés sous le disque annulaire et charnu, nus ou portant une écaille au sommet de l'onglet; étamines 8-10, insérées sur le disque; filets distincts; ovaire de 2-4 loges avec 1 ovule dans chaque loge; styles unis ou distincts; stigmat de 2-4 lobes. Fruit, une baie charnue ou coriaccée, les graines osseuses, noires ou presque noires sont dépourvues d'arille.

S. saponaria L. «Savonette pays» ou «Graine canique» ou «Bois savonette.»

S. saponaria L. forma *inaequalis* (P. DC.) Radlk.

Melicocca L.

Arbres cultivés pour leurs fruits comestibles. Feuilles pennées se terminant par une paire de folioles, dénuées de stipules. Fleurs petites, régulières, polygames ou dioïques, disposées en racemes allongés simples ou ramifiés. Calice profondément quadri-pentalobé; pétales 4-5; disque aplati avec 4-5 lobes; étamines 8; filets filiformes, distincts; ovaire de 2-3 loges avec 1 ou 2 ovules dans chaque loge; style court; stigmate bilobé ou trilobé. Fruit: une drupe avec pulpe charnue.

M. bijuga L. «Quénêpe.» Comestible.

Litchi Sonn.

Arbres cultivés pour leurs fruits comestibles. Feuilles pennées, se terminant par une paire de folioles, glabres et brillantes au-dessus, glaucescentes en dessous. Fleurs régulières, polygames, petites, verdâtres-blanches ou jaunâtres, en panicules terminales, parfois d'un pied de long. Sépales petits, valvés; pétales absents; disque charnu; étamines généralement 8, avec des filets poilus; ovaire sur un court support, bi ou trilobé et bi ou triloculaire avec 1 ovule dans chaque loge, pubescent; stigmate bilobé. Fruit: une drupe couverte de tubercules angulaires très frappants.

L. chinensis Sonn. «Letché» ou «Quénêpe chinois.» Introduit (Pétionville). Comestible.

Cupania L.

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, pinnées, dénuées de stipules; folioles alternes ou opposées, entières ou légèrement dentées. Fleurs régulières, polygamodioïques, en racemes ou en panicules. Sépales 4-5, rarement 3-6, larges; corolle verte, blanche, rougeâtre, ou absente, pétales 4-5, chacun portant parfois 1 ou 2 écailles; étamines 8 ou 5, 6, 10 ou 12; ovaire de 2-3 loges, ou rarement quadriloculaire; ovule solitaire dans chaque loge. Capsule de 2-4 lobes, généralement trilobée, coriacée ou plus dure; déhiscence loculicide. Graines globulaires ou oblongues.

C. americana L. «Bois de satanier» (Haïti), «Guarana» (St-Domingue), d'après Urban.

C. triquetra A. Rich.

Matayba Aubl.

Arbustes ou arbres dressés. Feuilles alternes ou opposées, persistantes, pinnées. Fleurs disposées en panicules terminales et latérales. Calice petit, court, pentaloqué; pétales 5; étamines 8; ovaire triloculaire, rarement biloculaire. Fruit capsulaire avec 3 angles aigus ou obtus.

M. domingensis (P. DC.) Radlk. «Raton» (St-Domingue), d'après Urban.

M. scrobiculata (H. B. K.) Radlk. «Satanier», «Chataignier» (Haïti), «Guara» (St-Domingue).

M. denticulata Radlk. «Satanier.»

M. apetala (Macf.) Radlk. «Bois graines noires.»

Blighia Koenig.

Arbre cultivé pour ses fruits comestibles. Feuilles pinnées se terminant par une paire de folioles. Fleurs régulières, polygames, en racemes axillaires. Calice petit, quinquéparti, valvé ou légèrement imbriqué; pétales 5, plus longs que le calice, portant des écailles sur le côté interne; disque annulaire, poilu; étamines 8-10, longues, exertes dans les fleurs mâles; filets filiformes; ovaire avec court support, triloculaire, avec 1 ovule dans chaque loge; stigmate

tridenté. Fruit: une capsule, avec des parois épaisses, dures, s'ouvrant du sommet à la base par 3 valves.

B. sapida Koen, «Aki» ou «Arbre fricassé.» Alimentaire et ornemental.

Dodonaea L.

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, simples ou pinnées, dénuées de stipules. Fleurs régulières, polygames, souvent dioïques, axillaires ou terminales, solitaires ou en racemes ou en panicules. Sépales 3-7, imbriqués ou valvés; pétales absents; disque absent ou très petit; étamines généralement 8, avec de courts filets distincts, rarement plus ou moins; ovaire de 3-6 loges avec 2 ovules dans chaque loge; stigmate lobé. Fruit: une capsule membraneuse ou coriacée de 2-6 angles, à déhiscence septicide par 2-6 valves généralement ailées sur le dos.

P. viscosa Jacq. «Manglier petites feuilles.»

P. viscosa Jacq. var. vulgaris Benth. f. repandra Radlk.

P. viscosa Jacq. var. spathulata (Smith) Benth.

P. viscosa Jacq. var. angustifolia (L. f.) Benth. «Pativier.»

Hypelate Sw.

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes; limbes palméstrifoliolés; folioles avec des limbes coriacés, avec nervures très prononcées. Fleurs polygamodioïques, disposées en panicules terminales ou presque terminales. Sépales 5, imbriqués, presque glabres; pétales 5, sans appendices, sessiles; étamines 8-10, imparfaites ou absentes dans les fleurs femelles; filets glabres; ovaire triloculaire, sessile; styles unis; ovules 2 dans chaque loge, superposés, l'ovule supérieur ascendant, l'ovule inférieur plutôt pendant. Fruit uniloculaire (par avortement). Graines solitaires.

H. trifoliata Sw. «Chandelle marron.»

Exothea Macf.

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, pennées, se terminant par une paire de folioles. Fleurs généralement polygames, irrégulières, paniculées. Sépales 5, en partie unis, imbriqués, pubescents, devenant réfléchis; pétales 5, non appendiculés, étrécis en forme d'onglets très courts; ovaire biloculaire, sessile; ovules 3 dans chaque cavité, collatéraux, plutôt pendants. Fruit uniloculaire (par avortement). Graine solitaire; embryon avec des cotylédons épais et une courte radicule.

E. panniculata (Juss.) Radlk. «Bois mûlet» (Haïti) «Cuervo de buey» (St-Domingue).

Famille 99. BALSAMINACEÆ

Herbes molles ou succulentes. Feuilles simples, alternes, opposées ou verticillées, dénuées de stipules, pétioles. Fleurs bisexuées, très irrégulières, solitaires dans l'axe ou quelque peu agrégées. Sépales 3, rarement 5, les 2 sépales latéraux petits et verts, le sépale postérieur grand, pétaloïde; pétales 5 ou 3 par l'union de 2 paires, inégaux. Étamines 5, alternant avec les pétales; filets courts, plats; anthères cohérentes ou conniventes. Ovaire de 5 loges avec 3 — beaucoup d'ovules dans chaque loge; style court; stigmate pentaloqué. Fruit capsulaire ou baccare.

Impatiens L.

Les caractères techniques du genre sont ceux de la famille. Fruit: une cap-

sule oblongue ou linéaire s'ouvrant élastiquement en 5 valves enroulées, chassant les graines.

I. *balsamina* L. «Belle z'amie.» Ornemental.

Famille 100. SABIACEÆ

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, dénuées de stipules, simples, ou pennées. Inflorescence terminale ou axillaire, les fleurs sont rarement solitaires; fleurs parfaites ou polygamo-dioïques, généralement en racemes composés. Calice de 5 sépales (rarement 3); pétales généralement 5, les 3 externes larges, imbriqués, les 2 internes étroits. Étamines généralement opposées aux pétales externes. Ovaire supère, biloculaire, rarement triloculaire avec 2 ovules (rarement 1) dans chaque loge; style petit ou absent. Fruit: une drupe uniloculaire (rarement biloculaire), monosperme. Noyau osseux.

Meliosma Bl.

Caractères de la famille.

M. herbertii Rolfe. «Cacao bobo» (St-Domingue).

M. impressa Krug. et Urb. «Gounelle.»

M. recurvata Urb.

M. abbreviata Urb.

Ordre XXIX. RHAMNALES

Arbustes ou arbrisseaux ou généralement sarments. Feuilles le plus souvent alternes. Fleurs régulières, parfois imparfaites ou incomplètes. Calice et corolle présents, ou corolle absente. Androcée comprenant autant d'étamines qu'il y a de sépales, les étamines alternant avec les sépales. Gynécée formé d'un pistil composé, supère ou presque supère. Fruit: une capsule ou une baie ou drupacé.

x. Sépales manifestes; pétales involutés. Fruit capsulaire ou drupacé..... 101. *Rhamnaceæ*, p. 208

x. Sépales très petits ou obsoletés; pétales valvés. Fruit baccaire..... 102. *Vitaceæ*, p. 211

Famille 101. RHAMNACEÆ

Arbres ou arbustes épineux ou inermes, ou sarments pourvus d'un principe amer et astringent. Feuilles alternes ou parfois opposées; limbes simples, généralement multinerves; stipules petites, souvent décidues. Inflorescence variée; fleurs souvent verdâtres, parfaites ou polygames ou parfois dioïques. Calice de 4-5 sépales valvés; disque bordant ou remplissant l'hypanthium, parfois développé en forme de cornes; corolle généralement présente, de 4-5 pétales, insérés à la gorge de l'hypanthium ou sur le bord du disque. Androcée de 4-5 étamines opposées aux pétales et insérées avec eux; filets distincts; anthères oscillantes, biloculaires. Gynécée de 2-3 carpelles unis; ovaire de 2-3 loges, libre ou immergé en partie dans le disque; styles et stigmates plus ou moins unis; ovule solitaire ou rarement 2 dans chaque loge, anatropes, dressés. Fruit, capsulaire ou drupacé, rarement ailé, se séparant généralement en plusieurs petits noyaux.

x. Plantes avec vrilles..... *Gouania*, p. 211

x. Plantes dépourvues de vrilles:

2x. Feuilles essentiellement alternes:

3x. Fruit drupacé avec 1 noyau de 1-4 loges: *Zizyphus*, p. 209

4x. Feuilles triplinerves:

4x. Feuilles penninerves:

5x. Pétales absents, drupe uniloculaire *Krugiodendron*, p. 209

5x. Pétales présents, drupe de 2-3 loges *Sarcomphalus*, p. 209

3x. Fruit capsulaire ou drupacé avec plus d'un noyau:

4x. Fruit capsulaire avec 3 coques..... *Hybosperma*, p. 210

4x. Fruit drupacé:

5x. Fruit pulpeux..... *Rhamnus*, p. 210

5x. Fruit sec..... *Colubrina*, p. 210

2x. Feuilles opposées ou subopposées:

3x. Pétales présents..... *Karwinskia*, p. 210

3x. Pétales absents..... *Reynosia*, p. 209

Zizyphus Juss.

Arbustes spinescents. Feuilles alternes, généralement sur 2 rangées; limbes fermes, généralement trinerves; une ou les 2 stipules généralement spiniformes. Fleurs verdâtres en cymes axillaires ou en faisceaux ombellés. Hypanthium largement turbiné. Sépales 5, triangulaires, carénés sur le côté supérieur, valvés; disque légèrement pentalobé, presque plat; pétales 5, alternant avec les sépales, en forme de capuchon; étamines 5, insérées avec les pétales au bord du disque; filets subulés; anthères introrsées, à déhiscence longitudinale; ovaire de 2-3 loges, presque immergé dans le disque; styles 2-6; stigmates terminaux ou latéraux sur les faces internes des styles; ovule solitaire dressé. Drupe parfois en forme de baie, charnue.

Z. rhodoxylon Urb. «Bois de rose» (Gonaïves), «Casser hache» (Haïti), «Yagua» (St-Domingue).

Z. jujuba (L.) Lam. «Pomme malcadi» (Haïti).

Krugiodendron Urb.

Arbustes ou arbres. Feuilles alternes — subopposées, légèrement poilues; stipules très petites; feuilles penninerves. Inflorescence axillaire pédonculée, cymes ombellées; fleurs hermaphrodites d'un vert jaunâtre. Calice généralement de 5 segments (rarement 4-6); pétales absents; disque avec 5 crénelures; étamines aussi nombreuses que les sépales; ovaire pseudo-biloculaire; style obsolet; ovules 2. Fruit, une drupe uniloculaire.

K. ferreum (Vahl.) Urb. «Bois de fer» (Haïti) «Paño de hierro» (St-Domingue).

Sarcomphalus Griseb.

Arbres. Feuilles glabres, entières. Panicules axillaires et terminales, branches alternes, pauciflores, corymbeuses; fleurs petites. Calice pentalobé, en forme de huppe, tube persistant au dessous du fruit, lobes étendus, quilles à l'intérieur; pétales 5, huppés — avec long onglet; disque couvrant la base du calice; étamines 5, libres, aussi longues que les pétales; anthères s'ouvrant latéralement; ovaire entouré par le disque, libre; style simple avec 2 lobes courts. Drupe sèche, supère, putamen biloculaire, épais, corné; loges monospermes.

S. domingensis (Spreng.) Krug. et Urb. «Saona» (St-Domingue).

S. crenatus Urb.

S. reticulatus (Vahl.) Urb. «Coque-molle» (Haïti), «Sopaipo» (St-Domingue).

S. microdictyus Urb. et Ekm.

S. punctatus Urb. et Ekm.

S. parvifolius Urb. et Ekm.

Reynosia Griseb.

Arbres ou arbustes inermes avec des branches rigides. Feuilles opposées; limbes coriacés, entiers, émarginés; stipules petites, caduques. Fleurs par-

faites, très petites, vert-jaunâtre, agrégées, sessiles, axillaires, ombellées. Hypanthium hémisphérique, persistant. Sépales 5, valvés, divergents; disque charnu, remplissant l'hypanthium; pétales absents; étamines 5, insérées sur le bord du disque; filets subulés, incurvés, plus courts que les sépales; anthères introrsées; ovaire presque supère, de 2-3 loges; styles courts, épais unis, stigmaté de 2-3 lobes; ovule solitaire dans chaque loge, dressé. Drupe garnie à l'extrémité avec la base du style, pulpe mince, charnue, noyau crustacé. Graine solitaire.

R. uncinata Urb. «Brillol» ou «Galle-galle» (Haïti).

R. domingensis Urb.

R. regia Urb. et Ekm.

R. cuneifolia Urb. et Ekm.

R. affinis Urb. et Ekm.

Karwinskia Zucc.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles subopposées, entières, penninerves, pellucides ponctuées. Fleurs axillaires, solitaires ou en cymes ou ombelles. Parties florales 5; pétales plus courts que les étamines; ovaire biloculaire avec 2 ovules dans chaque loge; styles entiers ou courtement bilobés. Fruit drupacé, apiculé; exocarpe glandulaire. Noyau uniloculaire ou biloculaire.

K. caloneura Urb. Département du Nord-Ouest.

Rhamnus L.

Arbustes ou arbres avec rameaux inermes. Feuilles alternes; limbes entiers ou dentés; stipules décidues, multinerves. Fleurs parfaites ou polygamodioïques, axillaires, souvent agrégées, en racemes ou en cymes. Sépales 4-5, carénés intérieurement, triangulaires — ovoïdes; disque entourant l'hypanthium, cupuliforme; pétales 4-5 ou absents, dénués d'onglets, insérés sur le bord du disque; filets très courts; ovaire de 2-4 loges, presque libre; styles 2-4, unis à la base; stigmates généralement 2. Fruit: une drupe charnue succulente avec 2-4 petits noyaux longs ou cartilagineux.

R. sphærosperma Sw.

Hybosperma Urb.

Arbustes ou arbrisseaux épineux. Feuilles alternes, coriaces, trinerves, à large pétiole; stipules intrapétiolaires. Fleurs hermaphrodites, solitaires, placées à l'aisselle des épines. Calice de 4-5 lobes égaux; pétales 4-5 insérés entre les lobes du disque; disque avec 10 crénelures; étamines 4-5; filets subulés; anthères à déhiscence longitudinale; ovaire triloculaire; ovules solitaires; styles trigones, courts, trilobés. Fruit capsulaire se séparant en 3 coques.

H. spinosum Urb.

H. verrucosum Urb.

Colubrina Brongn.

Arbustes ou arbrisseaux avec tiges dressées ou sarmenteuses, plus ou moins poilus, rarement glabres. Feuilles généralement alternes, cordiformes, ou oblongues, penninerves ou trinerves à la base. Fleurs agrégées en ombelles axillaires avec pédoncule court, rarement solitaires. Sépales, pétales et étamines 5; ovaire immergé dans le disque, triloculaire; disque large, annulaire, plus ou moins charnu; styles trilobés ou trifides. Drupe en forme de baie, légèrement

trilobée, avec un épicarpe sec ou légèrement charnu qui se sépare élastiquement en 3 petits noyaux membraneux crustacés ou cartilagineux.

C. ferruginosa Brongn. «Bois pelé» ou «Bois ferblanc.»

C. berteriana Urb.

C. reclinata (L'Her.) Brongn. «Bois de fer» ou «Bois mabi» (Haïti), «Palo amargo» St-Domingue).

Gouania Jacq.

Arbrisseaux grimpant généralement très haut, rameaux grêles, allongés. Feuilles alternes, pétioles, généralement coriaces, avec stipules allongées, caduques. Fleurs polygames, en épis ou racemes axillaires ou terminaux, parfois paniculés, le rachis de l'inflorescence généralement pourvu de vrilles. Hypanthium, pentagone ou développé en 5 cornes; pétales 5, insérés dans les panthium obconique. Sépales 5, divergents; disque épigyne, remplissant l'hypanthium du bord du disque, plus courts que le calice, les limbes des pétales encauchonnés; étamines 5, filets cachés par les pétales; ovaire immergé dans le disque, triloculaire; styles 3, unis à la base. Drupe en forme de capsule, coriagée, avec 3 ailes se séparant en 3 petits noyaux.

G. lupuloides (L.) Urb. «Liane savon» (Haïti), «Bejuco de indio» (St-Domingue), d'après Urban.

G. lupuloides (L.) Urb. var. *aptera* Urb. forma *macroptera*.

G. polygama (Jacq.) Urb. «Liane savon.»

Famille 102. VITACEÆ

Sarments ligneux, généralement grimpant à l'aide de vrilles; sève abondante, aqueuse et parfois gélatineuse. Tiges renflées aux nœuds, enveloppées d'une écorce déchiquetée ou serrée. Feuilles simples ou composées, les feuilles inférieures opposées, les feuilles supérieures alternes; limbes pétioles, grossièrement dentés ou lobés; stipules présentes ou absentes. Inflorescence variée; fleurs souvent odoriférantes, parfaites, polygames ou dioïques, régulières. Calice de 4-5 sépales ou parfois obsolete; disque remplissant l'hypanthium ou absent; corolle de 4-5 pétales valvés et souvent caducs, parfois cohérents par leurs extrémités. Étamines 4-5 opposées aux pétales, filets distincts, anthères introrsées. Ovaire biloculaire ou parfois de 3-6 loges, libre ou adné à la base du disque; styles unis, stigmaté capité ou pelté; ovules 1-2 dans chaque loge, anatropes, ascendants. Fruit: une petite baie, souvent avec une pulpe très aqueuse. Graines 1-2 dans chaque loge, dressées, avec un testa osseux.

x. Feuilles simples ou trifoliolées, entières ou lobées:

2x. Pétales attachés, formant un petit capuchon caducs, ne se séparant jamais. Inflorescence paniculée, avec axe principal indéterminé, les branches cymeuses.

Vitis, p. 212

2x. Pétales distincts, divergents durant la floraison. Inflorescence en forme d'épi ou corymbeuse:

3x. Inflorescence en forme d'épi. Disque avec 10 stries

Ampelocissus, p. 212

3x. Inflorescence corymbeuse. Disque quadrilobé.

Cissus, p. 212

x. Feuilles divisées formant des segments remarquablement obtriangulaires à bords recourbés. Pterocissus, p. 212

Vitis L.

Sarments trainants ou grimpants avec une écorce déchiquetée et des vrilles qui se divisent en 2 comme une fourche; moelle interrompue aux nœuds par des diaphragmes. Feuilles alternes; limbes simples, palmés lobés, anguleux ou grossièrement dentés, pétioles; stipules généralement petites, caduques. Fleurs dioïques, polygamo-dioïques, ou rarement parfaites, disposées en racemes allongés ou en panicules. Disque hypogyne, souvent glandulaire; calice très petit; corolle caduque, pétales unis au sommet en forme de bonnet; étamines exertes, alternant avec les lobes ou glandes du disque; ovaire biloculaire ou rarement de 3-4 loges, styles courts ou coniques, ovules 2 dans chaque loge. Baie juteuse, généralement comestible. Graines peu nombreuses, pyriformes, avec la base étrécie en forme de bec.

V. tiliifolia H. et B. «Pejuco caro» ou «Parra» ou «Parra cimarrona» (St-Domingue).

V. vinifera L. «Raisin»

Ampelocissus Planch.

Plantes grimpantes; branches avec vrilles. Feuilles simples, entières ou lobées. Fleurs polygamo-monoïques ou hermaphrodites; inflorescence en forme d'épi. Calice en forme de coupe, avec 4-5 lobes ou presque entier; pétales 4-5; disque hypogyne formant un anneau qui adhère à la base de l'ovaire; ovaire biloculaire, chaque loge avec 2 ovules; style court, conique, pourvu le plus souvent de 10 sillons longitudinaux; stigmate très peu développé, presque imperceptible. Baie presque globulaire avec 2-4 graines. Graines en forme de bateau ou triangulaires ou triangulaires-ovoïdes.

A. robinsonii Planch. «Para cimarrona» (St-Domingue).

Pterocissus Urb. et Ekm.

Plantes ligneuses, grimpantes, glabres; branches arrondies, succulentes; rameaux avec vrilles dilatées et en forme de disque à l'extrémité. Feuilles bipennées; folioles opposées, sessiles, ovales ou légèrement ovales avec une nervure qui les parcourt à égale distance du rachis jusqu'à la partie inférieure séparée en forme de coin; de ce fait, elles forment un limbe allongé, divisé, obtriangulaire, recourbé de chaque côté; extrémité oblongue, entière, ou très légèrement bilobée. Fleurs rouges, hermaphrodites; ovaire biloculaire avec 2 ovules dans chaque loge; style subulé; stigmate obsolete. Fruit: une baie uniloculaire, monosperme.

P. mirabilis Urb. et Ekm. (Morne Brigand, dans le département du Nord).

Cissus L.

Sarments grimpants avec tissus charnus et fortes vrilles. Feuilles alternes; limbes simples ou trifoliolés ou au moins tripartis, les segments ou folioles, entiers ou dentés, décidus. Fleurs parfaites ou parfois polygames, en cymes petites, les enveloppes florales généralement quadrimères. Pétales distincts, s'épanouissant durant l'anthèse; disque cupuliforme, quadrilobé; étamines généralement 4, insérées sur le bord du disque; ovaire biloculaire, adné à la base du disque; style subulé; ovules 2 dans chaque loge. Baies plutôt petites, non comestibles, pulpe peu abondante. Graines plus ou moins 3 ailes.

C. cordifolia L.

C. sicyoides L. «Liane molle» (Haïti), «Caro» (St-Domingue). Var. *parvifolia* Griseb.

C. micrantha Poir.

C. buchii Urb.

C. fuertesii Urb.

C. picardæ Urb.

C. macilenta (Planch.) Urb.

C. trifoliata L. «Bois soldat» ou «Madame Gloire» (Haïti), «Bejuco carito» (St-Domingue).

C. caustica Tuss.

C. gonavensis Urb. et Ekm.

C. dissecta Urb. et Ekm.

C. haïtiensii Urb. et Ekm.

C. parviflora Urb. et Ekm.

C. carnifolia Urb. et Ekm.

C. mornicola Urb. et Ekm.

C. micrantha Poir. var. *tripartita* Urb. et Ekm.

C. intermedia A. Rich.

C. erosa L. C. Rich.

C. hotteana Urb. et Ekm.

C. oblongo-lanceolata (Krug. et Urb.) Urb.

Ordre XXX. MALVALES.

Herbes, arbrisseaux, arbustes ou arbres. Feuilles variées; limbes simples, généralement lobés. Fleurs généralement parfaites, régulières, souvent voyantes, très souvent involucrees. Calice de sépales valvés, distincts ou partiellement unis; corolle de pétales distincts. Androcée d'étamines nombreuses avec filets monadelphes ou groupés, les étamines sont peu nombreuses dans la famille **Sterculiaceæ**. Gynécée de plusieurs carpelles unis ou distincts. Fruit capsulaire, folliculaire, en forme de baie ou de drupe.

x. Etamines hypogynes; disque absent, mais des glandes séparées ou un gynophore parfois présents:

2x. Anthères uniloculaires, s'ouvrant par un pore ou une fente longitudinale:

3x. Feuilles simples. Fleurs généralement caliculées; filets unis au sommet ou presque au sommet 105. **Malvaceæ**, p. 215

3x. Feuilles digitées ou simples. Fleurs non caliculées; filets unis seulement à la base 106. **Bombacaceæ**, p. 222

2x. Anthères biloculaires, s'ouvrant par 2 pores ou par des fentes longitudinales:

3x. Filets plus ou moins unis; staminodes présents 107. **Sterculiaceæ**, p. 223

3x. Filets libres ou légèrement unis à la base, mais les staminodes sont alors présents. 104. **Tiliaceæ**, p. 214

x. Etamines hypogynes, mais insérées à la base ou sur la surface d'un disque ou périgynes. 103. **Elæocarpaceæ**, p. 213

Famille 103. ELÆOCARPACEÆ

Arbres. Feuilles alternes ou subopposées, simples, stipulées. Fleurs généralement parfaites, très rarement solitaires, le plus souvent disposées en épis subopposés ou en racemes axillaires. Parties florales 4-5; sépales valvés; pétales absents ou présents. Etamines nombreuses; anthères biloculaires, s'ouvrant par 2 paires au sommet ou par une fente longitudinale. Ovaire sessile avec 2-beaucoup de loges, rarement uniloculaire; ovules généralement nombreux dans chaque loge; styles simples, filiformes, avec autant de branches stigmatiques

qu'il y a de loges dans l'ovaire. Fruit, une capsule à déhiscence loculicide ou septicide, avec beaucoup de graines ou une seule graine par avortement ou une baie.

- x. Fruit: une baie; pétales présents *Muntingia*, p. 214
 x. Fruit: une capsule; pétales absents *Sloanea*, p. 214

Sloanea L.

Arbres avec feuilles alternes ou opposées, entières ou dentées, généralement grandes. Fleurs rarement solitaires, disposées en cymes; inflorescence axillaire ou terminale. Parties florales, le plus souvent 4; sépales rarement unis, pétales généralement absents; étamines nombreuses, anthères quadrangulaires; ovaire avec 4 loges (rarement 1 ou 5-6), avec de nombreux ovules pendants. Fruit, une capsule couverte d'épines ou de soies, avec 1-4 loges.

S. castor Urb. et Ekm. «Castor» (Haïti). Massif de la Hotte.

S. berteriana Choisy.

S. domingensis Urb. «Chapeau carré» ou «Bois coq.»

S. ilicifolia Urb.

Muntingia L.

Arbres petits, de 6-10 mètres. Feuilles alternes, lancéolées — oblongues, longues, acuminées, obliques à la base, trinerves, glabres en dessous, tomenteuses, en dessous. Fleurs blanches, parfaites; pédicelles longs, solitaires ou fasciculés dans l'axe des feuilles. Sépales 5; pétales 5; étamines nombreuses, libres. Fruit en forme de baie, globulaire, d'environ 1 cm. de diamètre, pluriloculaire.

M. calabura L. «Bois de soie marron» (Haïti), «Memiso» (St-Domingue), d'après Urban.

Famille 104. TILIACEÆ

Arbustes ou arbres magnifiques, ou rarement herbes, pubescents, avec des poils simples ou ramifiés. Feuilles alternes ou rarement opposées, limbes simples, stipules libres, souvent décidues. Inflorescence parfois opposée aux feuilles, souvent racémeuse, cymeuse ou corymbeuse; fleurs généralement parfaites, régulières. Sépales 4-5, valvés, décidus; pétales 4-5, hypogynes, imbriqués ou convolutés, souvent ongiculés, développant parfois à la base une écaille plus ou moins pétaloïde. Étamines généralement nombreuses ou parfois 2 fois aussi nombreuses que les sépales; filets distincts, parfois réunis en groupes opposés aux pétales, simples ou divisés en 2 comme une fourche; anthères biloculaires, dressées ou oscillantes; pollen lisse. Pistil composé, ovaire libre, sessile ou stipité avec 2-10 loges, chaque loge avec une cloison secondaire, imparfaite; styles unis; stigmate capité, dilaté ou plurilobé; ovules 2 — beaucoup, en 2 rangées dans chaque loge, anatropes. Fruit: une capsule loculicide, rarement septicide ou parfois semblable à une drupe ou une baie. Graines nombreuses ou parfois solitaires avec testa membraneux ou crustacé.

x. Arbres *Carpodiptera*, p. 214

x. Herbes ou sous-arbrisseaux:

2x. Fruit inerme. Ovules nombreux dans chaque loge *Corchorus*, p. 215

2x. Fruit armé d'épines ou de soies. Ovules 2 dans chaque loge *Triumfetta*, p. 215

Carpodiptera Griseb.

Arbres. Feuilles entières, cordiformes. Fleurs petites, blanches, disposées en courts épis latéraux ou terminaux; fleurs dioïques par avortement. Calice campanulé, irrégulier, avec 2-3 lobes; corolle nue à la base; étamines innombrables (parfois 15), libres à la base ou très légèrement unies; staminodes absents;

ovaire biloculaire, bivalvé, avec 1 ovule pendant au sommet de chaque loge; style absent, stigmate grand, lobé. Fruit capsulaire, s'ouvrant par 2 valves, chaque valve avec 2 ailes perpendiculaires.

C. cubensis Griseb. «Bois d'ortie.»

C. simonis Urb. «Bois d'ortie rouge.»

C. hexaptera Urb. et Ekm.

Corchorus L.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles alternes; limbes serrés. Fleurs solitaires ou nombreuses, généralement sur de courts pédoncules opposés aux feuilles. Sépales 5 ou rarement 4; pétales jaunes 5 ou rarement 4, nus à la base, convolutés; étamines nombreuses, ou 2 fois aussi nombreuses que les sépales, insérées avec les pétales; filets filiformes, entiers; anthères introrsées; ovaire 2-5 loges; stigmate dilaté, ondulé; ovules nombreux dans chaque loge. Capsule généralement allongée et en forme de silique, lisse ou échinée.

C. acutangulus Lam.

C. olitorius L. «Lalo» ou «Lalou» (Haïti).

C. siliquosus L. «Balai glissé» ou «Balai lalou» ou «Ti lalou.»

C. hirtus L.

C. hirsutus L. «Sifflet.»

Triumfetta L.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles alternes, limbes entiers, dentés, ou pourvus de 3-5 lobes. Fleurs parfaites, en cymules plus ou moins agrégées, axillaires ou opposées aux feuilles. Sépales 5, étroits, souvent mucronés. Pétales jaunes 5, convolutés, avec une fossette à la base ou rarement absents; étamines nombreuses ou 2 fois aussi nombreuses que les sépales, insérées sur un réceptacle allongé au dessus de 5 glandes; filets filiformes, inégaux, entiers; anthères introrsées; ovaire de 2-5 loges; stigmate de 2-5 lobes; ovules 2 dans chaque loge. Capsule subglobulaire, échinée, généralement séparable en 2-5 carpelles. Graines solitaires.

T. rhomboïdea Jacq.

T. semitriloba Jacq.

T. lappula L. «Cousin gros nègre.»

T. hispida L. C. Rich, «Cousin gros nègre.»

Famille 105. MALVACEÆ

Herbes, arbrisseaux ou arbustes, rarement arbres, d'une grande importance économique, les parties végétatives ne possèdent aucune substance nuisible. Feuillage souvent pubescent avec poils simples ou branchus; feuilles alternes, stipulées; limbes palminervés et souvent lobés, généralement crénelés ou dentés. Inflorescence axillaire, racémeuse, paniculée ou corymbeuse, parfois agrégée; fleurs régulières, parfaites, souvent sous-tendues par un involucre ressemblant à un second calice. Calice de 5 sépales plus ou moins unis, valvés, le plus souvent persistants; corolle de 5 pétales hypogynes, convolutés, ceux-ci alternant avec les sépales, unis, limbes souvent inéquilatéraux. Étamines nombreuses; filets monadelphes, unis avec les onglets des pétales; anthères reniformes, uniloculaires; grains de pollen hispides. Carpelles nombreux; ovaire pluriloculaire ou les divers pistils distincts; styles terminaux; stigmates capités; ovules amphitropes ou semi-anatropes, pendants ou ascendants, insérés dans les angles internes des cavités. Fruit capsulaire ou les carpelles séparés ou séparables. Graines solitaires ou nombreuses.

- x. Fruit, une capsule loculicide. Involucelles présents:
- 2x. Styles distincts, divergents. Graines généralement reniformes:
- 3x. Capsules aussi longues que larges ou plus longues, les cavités avec 2 ou plusieurs graines *Hibiscus*, p. 220
- 3x. Capsules très déprimées, les cavités sont monospermes *Kosteletzkya*, p. 221
- 2x. Styles unis; graines non reniformes:
- 3x. Bractéoles des involucelles entières, plutôt peu voyantes *Thespesia*, p. 221
- 3x. Bractéoles des involucelles laciniées, voyantes *Gossypium*, p. 221
- x. Fruit de plusieurs carpelles verticillés qui se séparent à maturité, mais formant dans le *Bastardia*, une capsule sans involucre:
- 2x. Stigmates aussi nombreux que les carpelles:
- 3x. Carpelles de 2 ou plusieurs graines:
- 4x. Involucelles absents:
- 5x. Carpelles uniloculaires:
- 6x. Carpelles coriacés ou parcheminés, jamais vésiculeux *Abutilon*, p. 217
- 6x. Carpelles membraneux, vésiculeux *Gayoïdes*, p. 217
- 5x. Carpelles biloculaires, parfois imparfaitement biloculaires *Wissadula*, p. 217
- 4x. Involucelles de 3 bractéoles:
- 5x. Carpelles uniloculaires *Sphaeralcea*, p. 218
- 5x. Carpelles biloculaires par une lamelle horizontale *Modiola*, p. 217
- 3x. Carpelles avec une seule graine:
- 4x. Involucelles présents:
- 5x. Stigmates décurrents sur le côté interne des styles *Malva*, p. 218
- 5x. Stigmates terminaux capités *Malvastrum*, p. 218
- 4x. Involucelles absents:
- 5x. Cloisons latérales entre les carpelles persistantes:
- 6x. Fruit de 5 ou plus de carpelles, ceux-ci se séparant à maturité:
- 7x. La cloison dorsale des carpelles se sépare à maturité des cloisons latérales *Gaya*, p. 219
- 7x. La cloison dorsale des carpelles ne se sépare pas des cloisons latérales *Sida*, p. 218
- 6x. Fruit capsulaire à déhiscence loculicide *Bastardia*, p. 219
- 5x. Cloisons latérales entre les carpelles évanescences *Anoda*, p. 219
- 2x. Stigmates 2 fois plus nombreux que les carpelles:
- 3x. Involucelles absents *Malachra*, p. 219
- 3x. Involucelles présents:
- 4x. Involucelles de 5 bractéoles partiellement unies; carpelles entièrement épineux *Urena*, p. 220
- 4x. Involucelles de 5-15 bractéoles distinctes; carpelles inermes ou avec 1-3 épines *Pavonia*, p. 220

Gayoïdes Small.

Herbes vivaces, souvent en forme de sarments, avec feuillage pubescent. Feuilles alternes, limbes généralement plus larges au dessous du milieu, généralement dentés, souvent crénelés, cordiformes; pétioles généralement plus courts que les limbes. Fleurs parfaites, sur des pédoncules axillaires plus ou moins allongés; involucelles absents. Sépales unis en dessous; pétales 5, distincts; carpelles nombreux, uniloculaires; styles grêles; stigmates terminaux; ovules 2-6 dans chaque cavité; carpelles membraneux, vésiculeux à maturité, arrondis au sommet. Graines 2-3 dans chaque cavité.

G. crispum (L.) Small.

Abutilon Gaertn.

Herbes, arbustes, ou arbrisseaux ou rarement arbres, avec un feuillage mollement pubescent et des tiges branchues. Feuilles alternes; limbes entiers, dentés, angulés ou lobés, généralement cordés à la base. Fleurs parfaites, le plus souvent axillaires; involucelles absents. Sépales 5, unis en dessous, pétales 5, de couleurs variées, souvent jaunes, distincts; carpelles 5-30, styles filiformes ou claviformes, stigmates terminaux, ovules 3-9 dans chaque cavité, carpelles uniloculaires, coriacés ou parcheminés, non vésiculeux, disposés autour d'un axe central, plus ou moins rostrés, bivalvés au sommet ou sur le dos, se séparant tardivement. Graines 1-6, dans chaque carpelle, presque reniformes.

A. umbellatum (L.) Sweet.

A. hirtum (Lam.) Sweet.

A. abutiloïdes (Jacq.) C. Schum. «Pété vié grand moun» ou «Colle-Colle.»

A. inclusum Urb. «Guimaube.»

A. picardæ Urb.

A. haïtiense Urb.

A. pubescens (Cav.) Urb.

A. trisulcatum (Jacq.) Urb.

A. giganteum (Jacq.) Sweet.

A. leonardii Urb.

A. buchii Urb.

A. indicum (L.) Sweet.

Wissadula Medic.

Herbes vivaces, dressées, ressemblant aux espèces d'*Abutilon*. Feuilles alternes, limbes plus larges au dessus du milieu, entiers ou dentés. Fleurs parfaites en panicules terminales; involucres absents. Sépales 5, partiellement unis; pétales 5, jaunes ou blanchâtres, distincts; carpelles 5, transversalement biloculaires ou parfois imparfaitement biloculaires ou seulement rétrécis au milieu; styles courts; stigmates terminaux; ovules 1 ou 2 dans la cloison supérieure, solitaires dans la cloison inférieure. Graines marquées de tout petits creux et généralement avec des touffes de poils.

W. hernandioïdes (L'Her.) Garcke.

W. amplissima (L.) R. E. Fries.

W. contracta (Link.) R. E. Fries.

W. stellata (Cav.) C. Schum.

W. periplocifolia (L.) Presl.

Modiola Moench.

Herbes annuelles ou vivaces avec des tiges ou des branches étendues, rampantes. Feuilles alternes, limbes divisés-palmés, angulaires ou lobés. Involucelle de 3 bractéoles distinctes; fleurs parfaites, peu voyantes, pédicellées, axil-

lares. Sépales 5, unis en dessous; pétales 5, entiers, généralement plus larges au dessus du milieu; carpelles nombreux; styles filiformes, stigmates capités; ovules 2 dans chaque loge des carpelles transversalement septés; carpelles mûrs disposés autour d'un axe central bivalvé, chaque valve grêle au sommet. Graines réniformes, 2 dans chaque carpelle, c'est-à-dire 1 dans chaque loge.

M. caroliniana (L.) G. Don.

Malva L.

Herbes annuelles, bisannuelles ou vivaces, généralement avec feuillage pubescent. Feuilles alternes, limbes lobés ou disséqués. Fleurs solitaires ou agrégées dans l'axe ou rarement en épis ou racemes terminaux. Involucelle de 3 ou rarement de 2 bractéoles distinctes. Sépales 5, partiellement unis; pétales 5, de couleurs variées, émarginés, parfois érodés; carpelles nombreux, uniloculaires; styles 9-20, stigmatiques sur le côté interne; ovules solitaires; carpelles mûrs réniformes, nombreux, indéhiscents, disposés autour d'un axe central, formant un fruit discoïde, sans bec. Graines ascendantes.

M. neglecta Walh.

Sphaeralcea St. Hil.

Arbrisseaux, sous-arbrisseaux ou herbes souvent couvertes de pubescence stellaire de couleur grise. Feuilles anguleuses ou lobées. Fleurs violettes, couleur de chair ou rouges, solitaires ou en bouquets cymeux placés dans les axes ou parfois en racemes terminaux ou en épis; bractéoles 3, unies à la base ou distinctes. Calice pentafide, colonne staminale partagée au sommet en de nombreux filets; ovaire pluriloculaire; stigmates capités. Fruit presque globulaire, formé de nombreux carpelles bivalvés et comprimés (2-3 graines) unis en un anneau autour d'un axe central dont ils se séparent lentement.

S. abutiloïdes (L.) G. Don.

Malvastrum A. Gray.

Herbes annuelles ou vivaces ou plantes arbustives, avec feuillage pubescent. Feuilles alternes; limbes variés, étroits ou larges, lobés ou divisés. Involucelles de 1-3 petites bractéoles ou absents; fleurs parfaites axillaires ou en racemes épiés terminaux. Sépales 5, partiellement unis; pétales 5, jaunes, dorés ou écarlates, distincts; carpelles 5 ou plus, uniloculaires; styles filiformes ou claviformes; stigmates tronqués ou capités; ovules solitaires, ascendants; carpelles mûrs, parfois avec des becs dressés, convergents, indéhiscents ou bivalvés. Graines remplissant la cavité.

M. coromandelianum (L.) Garcke.

M. corchorifolium (Desrouss.) Urb. «Herbe à balai.»

M. spicatum (L.) A. Gray.

Sida L.

Herbes annuelles ou vivaces ou plantes arbustives, avec feuillage pubescent. Feuilles alternes; limbes variés, généralement relativement étroits, le plus souvent dentés, parfois avec des bords nuancés. Fleurs parfaites, solitaires ou agrégées dans l'axe des feuilles ou parfois disposées en épis ou racemes terminaux; involucelles absents ou rarement de 1-3 bractéoles. Sépales 5, partiellement unis en une base généralement angulaire; pétales 5, de couleur variée, délicats; carpelles 5 à beaucoup, uniloculaires; styles filiformes ou presque; stigmates généralement capités; ovules solitaires, les carpelles mûrs disposés autour d'un axe, inermes ou prolongés en forme d'un bec ou d'une épine simple ou double, indéhiscents ou partiellement bivalvés. Graine pendante, trigone, remplissant la cavité.

S. linifolia Juss.

S. ciliaris L.

S. tridentata Cav.

S. spinosa L.

S. jamaïcensis L.

S. glomerata Cav.

S. acuta Burm. «ti lalo» (Haïti).

S. acuta Burm. var. *albiflora* Ekm.

S. rhombifolia L.

S. procumbens Sw. var. *pilosa* Cav.

S. cordifolia L.

S. maculata Cav.

S. hederifolia Cav.

S. humilis Cav.

S. glabra Mill.

S. glabra Mill. var. *setifera* Helwig.

S. glutinosa Commers.

S. urens L.

S. acuminata P. DC.

S. pyramidata Desportes.

Gaya H. B. K.

Arbrisseaux ou herbes, avec feuillage légèrement pubescent. Feuilles simples, cordiformes, dentées ou serratées. Fleurs jaunâtres ou pourpres, généralement solitaires dans l'axe des feuilles, parfois racémeuses; péricleinium et bractéoles absents. Carpelles 8 ou plus, membraneux, avec 1 ovule pendant; style papilleux avec stigmate capité ou stipité. Fruit capsulaire, les carpelles bivalvés, monospermes.

G. domingensis Urb.

G. occidentalis (L.) H. B. K.

Bastardia H. B. K.

Arbrisseaux ou herbes. Feuilles cordées, pétioles, simples, à bords légèrement dentés. Fleurs jaunes, axillaires, les pédoncules uniflores; péricleinium et bractéoles absents. Ovaire pentaloculaire avec un seul ovule pendant dans chaque loge; style papilleux avec stigmate capité. Fruit, une capsule déprimée, sphérique, dépourvue de bec (ou rostrée dans *B. bivalvis*) pourvue de 5 rainures; déhiscence loculicide, avec 5 valves, les valves portant au centre des cloisons latérales.

B. viscosa (L.) H. B. K. «Pété.»

B. bivalvis (Cav.) H. B. K.

Anoda Cav.

Herbes annuelles, glabres ou poilues, avec des feuilles généralement lancéolées. Fleurs pédonculées, solitaires dans l'axe des feuilles et constituant parfois un raceme; péricleinium et bractéoles absents. Carpelles nombreux avec un ovule pendant; style papilleux avec stigmate capité ou stipité. Fruit capsulaire.

A. hastata Cav.

Malachra L.

Herbes ou plantes arbustives avec un feuillage hispide ou couvert de poils rigides qui piquent parfois. Feuilles alternes, limbes avec des lobes angulés ou arrondis, pétioles. Fleurs parfaites, en bouquets capités, denses, axillaires ou terminaux; involucres de 3-5 bractées, souvent bariolés ou parfois absents. Sé-

pales 5, partiellement unis, lobes trinerves; pétales blancs, jaunes ou rouges; carpelles 5, uniloculaires; ovules solitaires; les 5 carpelles mûrs se séparent de l'axe central, indéhiscents ou valvés à l'angle ventral. Graines réniformes, ascendantes.

M. capitata L.

M. alceifolia Jacq. «Guimauve» (Haïti), «Malva» (St-Domingue).

M. urens Poit. «Pois» (Haïti), «Malva» (St-Domingue).

M. radiata L.

Urena L.

Arbrisseaux souvent plus ou moins herbacés avec des branches rigides et un feuillage pubescent. Feuilles alternes, limbes angulés ou lobés. Fleurs parfaites, généralement peu voyantes, sessiles ou courtement pédicellées, disposées dans l'axe des feuilles, solitaires ou agrégées; involucre absent; involucre de 5 bractéoles plus ou moins unies. Sépales 5, unis en dessous, souvent adnés à l'involucre; pétales 5, jaunâtres ou pourpres; carpelles uniloculaires; stigmates capités; ovules solitaires, ascendants; les carpelles mûrs se séparant de l'axe central, indéhiscents, hérissés de poils durs, formant ainsi un fruit en forme de bogue, ou parfois inermes.

U. lobata L. «Cousin.»

U. sinuata L. «Cousin.»

Pavonia Cav.

Arbustes ou herbes ligneuses, avec feuillage pubescent; tiges généralement verticales. Feuilles alternes, stipulées, angulées ou lobées. Fleurs parfaites, généralement solitaires sur des pédicelles axillaires; involucre de 5-15 bractéoles. Sépales 5, partiellement unis; pétales 5, de couleur variée; carpelles 5, uniloculaires; styles 10; stigmate capité; ovule solitaire, les carpelles mûrs se séparant de l'axe, 1-3 becs sur le dos ou inermes, rarement 2 ailes, indéhiscents ou plus ou moins bivalvés. Graines solitaires, ascendantes.

P. spinifex (L.) Cav. «Cousin» (Haïti), «Cadillo amarillo» (St-Domingue).

P. typhalaea (L.) Cav.

P. leiocarpa Urb.

P. spicata Cav. «Mahaut» (Haïti), «Majaguilla» (St-Domingue).

P. coccinea Cav.

P. punctata Urb.

P. panniculata Cav.

P. ekmanii Helwig.

P. hotteana Helwig.

Hibiscus L.

Herbes vivaces, arbustes ou arbres. Feuilles alternes, limbes entiers, lobés ou divisés; pétioles généralement sous-tendus par des stipules. Fleurs parfaites, voyantes, sur de courts pédoncules axillaires; involucre de plusieurs bractéoles distinctes ou unies (rarement 3-5 bractéoles). Sépales 5, plus ou moins unis; pétales 5, de couleur variée, souvent couverts de pustules; ovaire pentaloculaire, sessile; styles 5, généralement divergents; stigmates capités ou peltés; ovules 2—beaucoup dans chaque loge. Capsule oblongue—globulaire, pentaloculaire; déhiscence loculicide par 5 valves. Graines de formes variées.

H. tiliaceus L. «Coton marron» ou «Mahaut franc» (Haïti), «Mahagua» (St-Domingue).

H. brasiliensis L. «Cadillo» ou «Cadillo de tre pine» (St-Domingue).

H. furcellatus Lam. var. *azuensis* Urb. et Helw. var. *scabricalis* Helwig. Massif de la Hotte.

H. maculatus Lam.

H. horridus Urb.

H. trilobus Aubl. «Gombo marron.»

H. clypeatus L.

H. brachypus Urb. «Algodon cimarron» (St-Domingue).

H. esculentus L. «Calalou gombo.»

H. abelmoschus L. «Algalia» (St-Domingue).

H. vitifolius L.

H. rosa sinensis L. «Shoeblack» (Haïti).

H. schizopetalus (Mart.) Hook. f. «Chandelier.»

H. sabdariffa L.

H. hottensis Helwig. «Bonnet carré.»

H. cannabinus L.

Kosteletzkya Presl.

Herbes vivaces ou plantes arbustives avec tiges dressées, branchues, et feuillage souvent pubescent. Feuilles alternes, angulairement lobées ou parfois sagittées, pétioles. Fleurs parfaites, axillaires ou en racemes ou panicules terminaux; involucre de 7-10 bractéoles ou parfois presque absents. Sépales 5, plus ou moins unis; pétales 5, de couleur variée; ovaire pentaloculaire; styles 5, grêles, divergents; stigmate capité; ovule solitaire dans chaque loge. Capsule avec 5 angles, déprimée, à déhiscence loculicide. Graines solitaires dans chaque loge, réniformes.

K. sagittata Presl.

K. pentasperma (Bertero) Griseb.

Thespesia Soland.

Arbustes ou arbres ressemblant aux espèces d'*Hibiscus*. Feuilles alternes, limbes entiers ou angulairement lobés, amples, généralement cordés, pétioles. Fleurs parfaites; involucre de 2-5 bractéoles étroites, décidues. Sépales 5, plus ou moins unis ou complètement unis; pétales 5, de couleur variée; ovaire sessile de 5 loges; styles 5, unis ou rarement distincts; stigmates décurrents sur les styles; ovules peu nombreux dans chaque cavité. Capsule ferme, ligneuse-coriacée, pentaloculaire, à déhiscence loculicide par 5 valves ou indéhiscence. Graines nombreuses dans chaque loge.

T. populnea (L.) Soland. «Gros Mahaut.»

Gossypium L.

Herbes annuelles ou vivaces ou arbustes ou arbrisseaux avec tiges dressées, branchues. Feuilles alternes, palmées-lobées ou rarement entières, un peu épaisses, pétioles. Involucre de 3 grandes bractées cordées, dentées ou incisées; fleurs voyantes, sur des pédoncules axillaires. Sépales 5, unis en un calice cupuliforme; pétales 5, blancs ou jaunâtres, souvent devenant roses; ovaire sessile, pentaloculaire; styles unis en une colonne à 5 rainures; ovules nombreux dans chaque loge. Capsule à déhiscence loculicide, avec 3-5 valves. Graines variées, enveloppées de longs poils blancs.

G. hirsutum L. «Coton.»

G. barbadense L. «Coton.» (Haïti), «Algodon» (St-Domingue).

G. ekmanianum Wittmach.

Famille 106. BOMBACACEÆ

Arbres avec feuilles simples ou composées-digitées, avec stipules caduques; pubescence principalement formée de poils stellaires. Fleurs grandes ou parfois petites, souvent bractéolées, toujours parfaites. Calice pentalobé ou tronqué ou s'ouvrant irrégulièrement; pétales 5; étamines 5 à beaucoup; filets libres ou unis en forme de tube; ovaire de 2-5 loges; styles simples; ovules 2 à beaucoup dans chaque loge. Fruit sec ou charnu, de 2-5 loges, déhiscent ou indéhiscent. Graines 2 — beaucoup dans chaque loge; les graines, quand elles sont glabres, enfouies dans une substance pulpeuse.

x. Feuilles simples:

2x. Fruit indéhiscent. Anthères dressées Quararibaea, p. 223

2x. Fruit déhiscent. Anthères en forme d'intestin Ochroma, p. 223

x. Feuilles composées-digitées:

2x. Tube staminal, se divisant en 5 parties, chacune porte plusieurs anthères sessiles. Tronc souvent épineux. Folioles souvent serrées:

3x. Graines de 5 mm. ou moins de diamètre.

Tronc non arrondi à la base

Ceiba, p. 222

3x. Graines de 10 mm. ou plus de diamètre.

Tronc arrondi à la base

Neobuchia, p. 223

2x. Tube staminal se divisant en de nombreux filets; anthères sur de longs filets. Tronc inerme. Folioles entières:

3x. Fruit indéhiscent: Adansonia, p. 223

3x. Fruit déhiscent:

4x. Graines de 15 mm. ou plus de diamètre. Tube staminal allongé; filets ramifiés

Pachira, p. 222

4x. Graines de 6 mm. de diamètre. Tube staminal court, filets simples

Bombax, p. 222

Bombax L.

Grands arbres inermes. Feuilles composées; folioles généralement 5, entières. Pédoncules axillaires, solitaires ou fasciculés, uniflores. Calice tronqué, irrégulier; pétales oblongs ou linéaires; étamines nombreuses, tube staminal très court, filets simples; ovaire pentaloculaire; ovules nombreux dans chaque loge; style avec 5 branches courtes ou presque sessile. Fruit, une capsule ligneuse ou coriacée, pentaloculaire, compactement laineuse à l'intérieur. Graines petites, complètement enveloppées de laine ou de coton.

B. tussacii Urb. «Fromagier» (Haïti).

B. ellipticum H. B. K.

Pachira Aubl.

Grands arbres. Feuilles composées-digitées; folioles 3-9, entières. Pédoncules axillaires, uniflores; calice tronqué; pétales linéaires ou oblongs-linéaires; étamines nombreuses, tube staminal de 4, 5 à 10 cm. de long, les faisceaux des étamines maintes fois ramifiés; ovaire pentaloculaire; ovules nombreux dans chaque loge. Fruit, une grande capsule ligneuse, pentavalvée, nue à l'intérieur. Graines de 1 à 5 cm. ou plus de diamètre.

P. aquatica Aubl. «Pachira.» Ornamental.

P. emarginata A. Rich. «Colorade.»

Ceiba Gaertn.

Arbres souvent très grands, le tronc et les branches souvent armés d'épines. Feuilles composées-digitées, les folioles 5-7, généralement serrées. Pé-

doncules axillaires, uniflores, les fleurs grandes ou petites. Calice tronqué ou pentalobé; pétales oblongs ou oblongs-linéaires, poilus extérieurement, tube staminal très court, se divisant en 5 longues branches dont chacune porte au sommet un petit nombre d'anthères pressées les unes contre les autres; ovaire pentaloculaire avec de nombreux ovules horizontaux dans chaque loge; style avec stigmate capité. Capsule ligneuse, pentaloculaire, très laineuse à l'intérieur. Graines petites, complètement enveloppées de laine ou de coton.

C. pentandra (L.) Gaertn. «Mapou.»

Neobuchia Urb.

Arbres avec feuilles composées-digitées; folioles 7, entaillées. Fleurs grosses, voyantes. Calice campanulé, tronqué au-dessus ou avec 3 lobes courts; corolle tordue dans le bourgeon, oblongue ou légèrement oblongue; étamines 15, une seule stérile; filets unis à la base en une sorte de colonne qui porte au-dessus 5 apophyses dressées, épaisses, cornifères, le plus souvent libres; anthères biloculaires, tordues; ovaire supère, incomplètement pentaloculaire; ovules nombreux dans chaque loge, le plus souvent horizontaux; style apparent, non divisé au sommet.

N. paulinæ Urb. «Mapou blanc.»

Quararibaea Aubl.

Arbres ou arbustes. Feuilles entières ou presque entières, penninerves. Pédoncules uniflores, solitaires, opposés aux feuilles. Calice tubulaire, obconique, de 3-5 dents; pétales étroits, blancs; colonne staminale allongée, anthérifère au sommet; ovaire biloculaire; ovules 2 dans chaque loge. Fruit biloculaire, dur, indéhiscent, parfois uniloculaire par avortement, avec 1-2 graines. Graines dépourvues d'endosperme.

Q. turbinata (Sw.) Poir.

Ochroma Sw.

Grand arbre avec feuilles lobées. Fleurs grandes. Calice pentalobé; colonne staminale infundibuliforme; ovaire pentaloculaire avec de nombreux ovules dans chaque loge, disposés sur 2 rangs. Capsule s'ouvrant par 5 valves. Graines avec endosperme charnu, recouvertes de laine.

O. pyramidalis (Cav.) Urb. «Coton fleurs,» «Mahaudème» (Haïti).

Adansonia L.

Grands arbres avec feuilles composées-digitées; folioles 3-9, entières. Fleurs grandes, solitaires, sous-tendues de 2 bractéoles. Calice grand, pentalobé, poilu sur le côté interne; pétales 5; étamines nombreuses; ovaire de 5-10 loges avec de nombreux ovules dans chaque loge; styles avec autant de stigmates qu'il y a de loges dans l'ovaire. Fruit oblong, indéhiscent, avec enveloppe ligneuse. Graines enfouies dans une substance pulpeuse.

A. digitata L. «Mapou zombi.»

Famille 107. STERCULIACEÆ

Arbres, arbustes, arbrisseaux ou herbes, parfois sarments; pubescence principalement stellaire. Feuilles alternes, simples ou rarement composées, stipulées. Fleurs petites ou grandes, principalement en cymes généralement parfaites, régulières ou parfois zygomorphes. Calice gamosépale, généralement quinquéparti; pétales 5 ou absents, libres ou soudés avec le tube staminal; étamines connées au moins à la base, le tube généralement avec 5 staminodes, les anthères portées dans les sinus; anthères biloculaires, à déhiscence longitudinale ou par pores; ovaire supère, généralement pentaloculaire, avec 2 ou de

nombreux ovules dans chaque loge (parfois 3-10 loges); styles entiers avec autant de stigmates qu'il y a de carpelles ou plus. Fruit sec ou rarement baccifère, généralement pentaloculaire, à déhiscence variée.

- x. Pétales présents; fleurs hermaphrodites ou polygames:
 - 2x. Androgynophore très long, plus long que le fruit ou égal; carpelles souvent tournés en spirale:
 - 3x. Pétales caducs, ovules nombreux *Helicteres*, p. 226
 - 3x. Pétales marcescents; ovules solitaires dans les carpelles *Neoregnellia*, p. 226
 - 2x. Androgynophore court, toujours plus court que le fruit; carpelles jamais tournés en spirale:
 - 3x. Pétales plats, marcescents:
 - 4x. Ovaire à 5 loges *Melochia*, p. 224
 - 4x. Ovaire à une seule loge *Waltheria*, p. 224
 - 3x. Pétales encapuchonnés, caducs:
 - 4x. Étamines simples:
 - 5x. Pétales développés dorsalement en un limbe ligulé. Plantes souvent spinoscentes et grimpantes *Buettneria*, p. 225
 - 5x. Pétales nus sur le dos ou garnis d'une glande. Plantes inermes, jamais grimpantes *Ayenia*, p. 225
 - 4x. Étamines en 2-5 faisceaux:
 - 5x. Pétales avec appendice linéaire, bifide *Guazuma*, p. 225
 - 5x. Pétales avec appendice spathulé *Theobroma*, p. 225
 - x. Pétales absents; fleurs unisexuées ou polygames:
 - 2x. Anthères disposées sans ordre. Graines avec endosperme *Sterculia*, p. 226
 - 2x. Anthères parallèles régulièrement disposées en un anneau. Graines sans endosperme *Cola*, p. 226

Melochia L.

Herbes ou arbrisseaux, rarement arbres, généralement pubescents, avec des poils simples ou stellaires. Feuilles alternes, dentées. Fleurs généralement petites, cymeuses, ou glomérules axillaires, compactes; involucelles absents. Calice pentalobé; pétales 5, spathulés; étamines 5; filets plus ou moins unis en forme de coupe; staminodes parfois aussi nombreux; ovaire pentaloculaire, avec 2 ovules dans chaque loge; styles 5, distincts, au moins à la base; stigmates claviformes. Fruit: une capsule pentaloculaire à déhiscence loculicide par 5 valves. Graine solitaire dans chaque loge, ascendante.

- M. pyramidata* L.
- M. tomentosa* L.
- M. hirsuta* Cav.
- M. nodiflora* Sw.

Waltheria L.

Herbes, arbrisseaux ou arbres, avec pubescence simple ou stellaire. Fleurs petites, parfaites, généralement en bouquets ou en petites cymes axillaires; involucelle de 3 bractées décidues. Sépales 5, unis à la base en un tube turbiné; pétales 5, spathulés, convolutés, persistants dans le fruit; étamines 5, filets unis en dessous, non accompagnés de staminodes; anthères avec des sacs parallèles; ovaire uniloculaire, sessile; style simple, non central; stigmate cla-

viforme ou pénicillé; ovules 2 dans la cavité. Fruit: une capsule monosperme bivalvée longitudinalement. Graine ascendante; endosperme charnu.

- W. americana* L. Var. *elliptica* (Cav.) C. Schum. et var. *glaberrima* Ekm.
- W. calcicola* Urb.

Buettneria Loefl.

Arbrisseaux grimpants ou procumbants, souvent armés de piquants. Feuilles simples, pétioles, généralement crénelées ou serratées, glabres ou légèrement pubescentes. Fleurs petites, pédicellées, le plus souvent en ombelles ou en cymes latérales. Calice de 5 lobes; pétales 5, encapuchonnés, ongulés, le limbe bilobé, infléchi au sommet, développé dorsalement en une longue ligule; anthères solitaires dans les sinus du tube staminal; ovaire pentaloculaire avec 2 ovules dans chaque loge; style simple avec stigmate capité. Fruit: une capsule pentaloculaire couverte de longues épines; les carpelles se séparant facilement, bivalvés, monospermes.

- B. microphylla* Jacq.

Ayenia L.

Herbes ou sous-arbrisseaux, rarement arbustes, généralement couverts de poils stellaires. Feuilles alternes, limbes serratés ou dentés. Fleurs très petites, avec longs pédicelles, axillaires, fasciculées en cymes ou en ombelles; involucelles absents. Sépales 5; pétales 5, avec longs onglets, encapuchonnés à la base, le sommet adné au tube staminal, souvent avec une glande dorsale; étamines 5, alternant avec 1-2 staminodes; filets unis en dessous en forme de coupe; ovaire pentaloculaire, avec 2 ovules dans chaque loge; styles simples, stigmate capité. Fruit: une capsule pentaloculaire, se séparant en 5 carpelles bivalvés. Graines solitaires dans chaque loge.

- A. pusilla* L.
- A. violacea* Urb.
- A. virgata* Urb. et Ekm.

Theobroma L.

Arbres. Feuilles grandes, entières, penninerves ou trinerves ou pentanerves à la base. Fleurs petites, en bouquets axillaires ou latéraux, souvent le long du tronc. Calice pentalobé; pétales 5, ongulés, encapuchonnés à la base, développés en dessus en un limbe spathulé; étamines fertiles 2-3, sessiles; ovaire pentaloculaire avec de nombreux ovules dans chaque loge; style simple avec stigmate plus ou moins profondément quinquéfide. Fruit en forme de baie, grand, sessile, charnu, pentaloculaire, chaque loge contenant de 5-12 graines enfouies dans une pulpe acide.

- T. cacao* L. «Cacao.»

Guazuma Adans.

Arbres ou arbustes. Feuilles simples, à courts pétioles, oblongues ou ovoïdes, aiguës — acuminées — arrondies — cordées, généralement très obliques à la base, serrulées, vertes et glabres ou généralement avec poils stellaires au moins en dessous. Fleurs petites, vert jaunâtre ou blanchâtres, en cymes axillaires. Calice de 2-3 segments avec de petits poils stellaires; pétales 5, encapuchonnés, avec de courts onglets; étamines 2 ou 3, unies; ovaire pentaloculaire, avec de nombreux ovules dans chaque loge; styles simples avec stigmates pentafides. Fruit: une capsule ligneuse, globulaire ou ovale, tuberculifère, imparfaitement pentavalvée au sommet. Graines nombreuses dans chaque loge.

- G. ulmifolia* Lam. «Bois d'orme.»
- G. tomentosa* H.B.K. «Orme d'Amérique» (Haïti), «Guasima» (St-Domingue).

Helicteres L.

Arbrisseaux, arbustes ou arbres, généralement avec pubescence stellaire. Feuilles simples, généralement serrées. Fleurs axillaires, solitaires ou fasciculées. Calice tubulaire, pentadenté; pétales 5, ongulés, égaux ou inégaux, rarement très petits; androgynophore allongé, tronqué ou pentalobé au sommet, chaque sinus avec 1 ou 2 anthères; étamines 6-10; ovaire pentaloculaire; styles 5, plus ou moins unis; ovules nombreux, dans chaque loge. Fruit muni d'un long support composé de 5 carpelles avec de nombreuses graines, les carpelles sont dressés ou généralement enroulés en spirale.

H. jamaicensis Jacq.

H. semitriloba Bertero. «Jeucon.»

Sterculia L.

Arbres. Feuilles simples et lobées ou composées-digitées. Fleurs unisexuées ou polygames, paniculées, généralement axillaires. Calice campanulé avec 5 lobes, généralement coloré et en forme de corolle; pétales absents; androgynophore avec généralement 15 anthères au sommet. Fruit de 5 carpelles, les carpelles distincts, divergents, ligneux, rarement coriacés, s'ouvrant le long du côté interne. Graines 1 — beaucoup dans chaque carpelle, grandes.

S. apetala (Jacq.) Karst. «Pistache des Indes.»

Cola Schott.

Arbres. Feuilles entières ou lobées. Fleurs unisexuées ou polygames, en fascicules ou panicules axillaires. Calice campanulé de 4-5 segments; pétales absents; androgynophore souvent très court, portant au sommet un anneau de 10-12 anthères sessiles; ovaire de 3-10 loges avec autant de styles qu'il y a de carpelles; ovules nombreux dans chaque loge. Fruit de 4-5 follicules coriacés ou ligneux.

C. acuminata (Beauv.) R. Br.

Neoregnellia Urb.

Arbustes, pubescence stellaire. Feuilles distiques, alternes, légèrement pétio-lées, avec 3-5 nervures à la base, cependant penninerves, dentées au bord supérieur; stipules filiformes. Inflorescence axillaire, courte, solitaire ou par paires, plusieurs — 2 fleurs; bractées filiformes, éloignées du calice, pédicelle court; périanthe de couleur de feu; fleurs polygames, sub-régulières. Calice gamosépale, légèrement recourbé, obconique, membraneux, avec 5 lobes courts, valvés dans le bourgeon, persistants; pétales libres, imbriqués dans le bourgeon, onguiculés au dessous du milieu et dilatés au sommet, membraneux, avec 2 ou 1 auricule, marcescents; androgynophore dressé, allongé, filiforme; disque orbiculaire, légèrement concave. Etamines dans les fleurs femelles (ou hermaphrodites) jusqu'à 10, insérées sur le bord du disque en séries libres; filets courts; les loges de l'anthère séparées 2 à 2; staminodes 5; ovaire sessile; carpelles 5, libres, semi-orbiculaires; ovules solitaires dans les carpelles, rarement par paires, ascendants, anatropes; styles insérés au dessus du milieu des carpelles, libres à la base; stigmate obsolete. Etamines dans les fleurs mâles mieux développées, les loges de l'anthère parallèles; les carpelles plus ou moins abortifs; styles attachés au sommet, plus jeunes; les carpelles mûrs 5, reniformes, secs. Endocarpe dur, mince, cartilagineux, induréscent. Graine 1 (rarement 2 superposées), lisse, ponctuée au sommet, noirâtre, non ailée, testa crustacé.

N. cubensis Urb.

Ordre XXXI VIOLALES

Herbes, arbustes, arbres ou sarments. Feuilles variées. Fleurs spirocycliques ou cycliques, généralement avec un nombre indéterminé d'étamines et de carpelles, hétérochlamydées, rarement apétales, hypogynes — épigynes. Calice de sépales le plus souvent libres ou seulement unis légèrement; pétales distincts. Gynécée de carpelles plus ou moins unis, généralement avec des placentas pariétaux qui peuvent aussi se rencontrer au milieu, très rarement avec ovules basilaires. Fruits très variés.

x. Pétales souvent en 2 séries ou en plusieurs rarement en 1 seule; étamines insérées sur un petit réceptacle non développé en disque glandulaire; ovaire généralement libre:

2x. Graines arillées. Feuilles scabreuses sur les 2 faces

2x. Gaines non arillées. Feuilles non scabreuses sur les 2 faces:

3x. Placentation pariétale:

4x. Arbres avec écorce aromatique. Feuillage avec des points pellucides

4x. Herbes, arbustes ou arbres sans écorce aromatique. Feuillage sans points pellucides:

5x. Radicule éloignée du hile. Ovules généralement orthotropes

5x. Radicule très rapprochée du hile. Ovules anatropes ou amphitropes:

6x. Fleurs irrégulières; anthères à déhiscence introrse. Plantes herbacées

6x. Fleurs régulières; anthères s'ouvrant par des fentes apicales ou à déhiscence poricide. Plantes ligneuses:

7x. Fruit, une capsule spinifère; cellules visqueuses présentes

7x. Fruit non spinifère, baie, drupe; cellules visqueuses absentes

3x. Placentation centrale ou axile, rarement pariétale:

4x. Etamines définies, rarement indéfinies:

5x. Styles absents; stigmates introrses:

6x. Feuilles opposées ou verticillées, stipulées

6x. Feuilles alternes, petites ou squameuses, sans stipules

5x. Styles présents, distincts ou unis; stigmates terminaux:

4x. Etamines généralement indéfinies:

5x. Feuilles opposées ou verticillées. Fleurs cymeuses ou paniculées

5x. Feuilles alternes. Fleurs racemeuses:

6x. Etamines libres des pétales. Arbustes épiphytes ou grimpants

6x. Etamines adnées aux pétales. Arbustes ou arbres

x. Pétales en une série; étamines insérées dans, sur ou autour d'un réceptacle développé en disque à l'intérieur du calice ou sur un hypanthium; ovaire libre ou enfoui dans le disque ou adné au réceptacle et infère:

108. Dilleniaceæ, p. 228

117. Canellaceæ, p. 234

115. Cistaceæ, p. 233

118. Violaceæ, p. 234

116. Bixaceæ, p. 233

119. Flacourtiaceæ, p. 235

113. Elatinaceæ, p. 233

114. Tamaricaceæ, p. 233

112. Hypericaceæ, p. 230

110. Marcgraviaceæ, p. 229

111. Ternstroemiaceæ, p. 229

- 2x. Ovaire généralement libre ou enfoui dans le disque:
 3x. Sépales libres; ovaire plus ou moins lobé 109. *Ochnaceæ*, p. 228
 3x. Sépales unis en un tube; ovaire non lobé 120. *Turneraceæ*, p. 238
 2x. Ovaire infère ou semi-infère ou enfermé dans un réceptacle creux:
 3x. Couronne insérée sur le tube du calice ou à l'intérieur des pétales. Plantes généralement sarmenteuses avec vrilles 121. *Passifloraceæ*, p. 239
 3x. Couronne absente:
 4x. Fleurs parfaites. Feuillage muni de poils irritants ou rigides ou disposés de façon bizarre 123. *Loasaceæ*, p. 240
 4x. Fleurs unisexuées:
 5x. Plantes ayant le port d'un palmier avec jus laiteux abondant. Étamines 5-10 122. *Caricaceæ*, p. 240
 5x. Plantes n'ayant pas le port du palmier. Étamines nombreuses 124. *Begoniaceæ*, p. 241

Famille 108. DILLENACEÆ

Arbres, arbrisseaux, souvent grimpants, ou rarement herbes vivaces. Feuilles alternes, rarement opposées, entières ou dentées, rarement pinnatifides. Fleurs bisexuées ou parfois polygames ou dioïques; inflorescence variée. Sépales généralement 5, imbriqués, persistants et souvent élargis après la floraison; pétales généralement 5, imbriqués, caducs, décidus. Étamines nombreuses, rarement moindres que 10. Ovaire composé d'1 ou de plusieurs carpelles plus ou moins unis; ovules 1 à plusieurs; styles aussi nombreux que les carpelles, généralement libres et divergents avec le stigmate terminal simple. Fruit: une capsule dure, déhiscente ou un fruit charnu, indéhiscant, bacciforme.

Curatella L.

Caractères de la famille.

C. americana L. «Peralejo» (St-Domingue).

Famille 109. OCHNACEÆ

Arbres, arbrisseaux ou arbustes, rarement herbes. Feuilles alternes, simples ou rarement digitées, toujours avec stipules; limbes plus ou moins coriacés, généralement glabres et brillants, légèrement serrés ou entiers; nervures principales très voyantes. Fleurs généralement jaunes, rarement blanches ou rougeâtres, disposées en racemes ou panicules terminaux ou latéraux. Sépales 5, rarement 10, libres ou légèrement soudés à la base, plus ou moins coriacés; pétales généralement 5, très rarement 10, libres. Étamines aussi nombreuses que les pétales ou 2 fois plus nombreuses, ou très nombreuses; filets très courts; staminodes absents ou parfois nombreux; anthères biloculaires à déhiscence porifère. Ovaire généralement 2-5 loges, très rarement 10-15, distinctes, rarement soudées; styles aussi nombreux que les loges de l'ovaire. Fruit drupacé ou bacciforme, ou capsulaire. Graines solitaires ou nombreuses dans chaque loge.

- x. Fruit drupacé. Ovaire 5-10 loges. Étamines toutes fertiles 120. *Ouratea*, p. 228
 x. Fruit capsulaire. Ovaire en réalité uniloculaire. Staminodes présents 121. *Sauvagesia*, p. 229

Ouratea Aubl.

Arbres ou arbustes glabres. Feuilles alternes, persistantes, coriacées, brillantes ou légèrement serrulées ou entières; stipules filiformes. Fleurs jaunes,

disposées en racemes ou panicules terminaux ou latéraux; pédicelles unis à la base. Sépales 5, les 3 externes coriacés; pétales 5, égaux, un peu plus longs que les sépales; étamines 10, anthères beaucoup plus longues que les filets; ovaire de 5 à 10 loges. Fruit drupacé.

- O. jageriana* Urb.
O. ilicifolia (P. DC.) Baill.
O. spinulosa Urb.
O. cinerea (v. Tiegh) Urb.

Sauvagesia L.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles sessiles ou avec un court pétiole; stipules très ciliées. Fleurs rougeâtres, rarement blanches, disposées en panicules axillaires ou terminales. Sépales 5, presque égaux, persistants; étamines fertiles 5, environnées de 2 séries de staminodes, les staminodes internes alternant avec les étamines fertiles; anthères à déhiscence longitudinale; ovaire apparemment trilobulaire, en réalité uniloculaire. Capsule déhiscente par trois valves. Graines nombreuses, disposées en deux séries.

S. erecta L.

Famille 110. MARCGRAVIACEÆ

Arbrisseaux rampants ou épiphytes. Feuilles alternes, coriacées, simples, entières, souvent dimorphes. Inflorescence racémeuse, terminale, pendante; bractées nées au milieu du racème ou sur les pédicelles, très modifiées, nectarifères. Sépales 5, imbriqués; pétales 5, connés à la base ou entièrement; étamines 5 à 40. Fruit globulaire, charnu ou coriacé, indéhiscant, 5 — pluriloculaire.

Marcgravia L.

Caractères de la famille.

M. rectiflora Tr. et Planch.

M. domingensis Urb.

M. oligandra Ch. Wright.

Famille 111. TERNSTROEMACEÆ

Arbrisseaux ou arbustes ou arbres, rarement sarments. Feuilles alternes, plus ou moins coriacées, entières, dentées ou rarement composées-digitées; folioles 3-5; stipules absentes ou rarement petites et caduques. Inflorescence généralement axillaire, en panicules ou en racemes. Calice (généralement soutenu par plusieurs bractéoles) de 5, rarement 4-7 sépales imbriqués; corolle de 5, rarement 4-7 pétales distincts ou légèrement soudés, imbriqués. Étamines nombreuses, rarement en nombre égal aux pétales; anthères à déhiscence longitudinale ou par pores terminaux. Ovaire 3-5 loges; styles aussi nombreux que les loges; ovules 2 — plusieurs dans chaque loge. Fruit coriacé ou ligneux, déhiscent ou indéhiscant.

- x. Fruit déhiscent 121. *Laplacea*, p. 230
 x. Fruit indéhiscant:
 2x. Graines et ovules attachés au sommet de la loge; sépales non ciliés, parfois glandulaires-denticulés 122. *Ternstroemia*, p. 229
 2x. Graines et ovules attachés latéralement à la loge; sépales ciliés 123. *Eurya*, p. 230

Ternstroemia L.

Arbres ou arbustes. Feuilles entières ou dentées-crénellées; nervation peu voyante. Pédoncules uniflores, recourbés, axillaires, solitaires ou quelque peu agrégés, avec 2 bractéoles à chaque fleur; fleurs blanches. Sépales 5, persis-

tants; pétales 5-7, unis à la base ou à la moitié de leur longueur, caducs; étamines indéfinies, généralement bisériées, rarement unies ou plurisériées; filets externes adhérent à la base de la corolle; anthères glabres plus longues que les filets; connectif plus ou moins prolongé; ovaire à 2 (3-4) loges; style simple; stigmates 1 ou plusieurs très petits ou plus ou moins développés, entiers ou lobés; ovules plusieurs — 2 dans chaque loge, pendants. Fruit indéhiscent, couronné par le style persistant. Graines plutôt grosses, presque en forme de fer à cheval, mais plus comprimées; endosperme charnu et petit; embryon courbé; cotylédons plus courts que la radicule, semi-cylindriques.

T. barkerii Ekm.

T. selleana Ekm. et Schmidt.

T. microcalyx Krug. et Urb.

T. obovalis A. Rich. «Bois d'Inde marron»

T. gracilifolia O. C. Schmidt.

T. nashii Urb.

Eurya Thumb.

Arbrisseaux ou arbres. Feuilles épaisses et persistantes. Fleurs petites, bisexuées, polygames ou dioïques, les pédoncules uniflores, solitaires ou fasciculés, bibractéolés. Sépales 5; pétales 5, distincts ou presque distincts, blancs; étamines 15 ou davantage. Fruit indéhiscent de 2-5 loges. Graines peu nombreuses dans chaque loge.

E. albopunctata Griseb.

E. nummularia Urb. et Ekm.

E. vaccinioides O. C. Schmidt.

Laplacea H. B. K. [*Hæmocharis*].

Arbres ou arbrisseaux avec feuilles coriaces. Fleurs pédunculées, bractéolées, solitaires. Calice de 5-6 sépales, rarement plus, imbriqués; pétales 5-6, rarement plus, soudés à la base avec la série externe des filets; ovaire 5-10 loges; ovules 4 plusieurs dans chaque loge; styles 3-10, libres ou stigmaté sessile. Fruit: capsule déhiscente, avec une columelle persistante. Graine ailée, charnue.

L. alpestris (Krug. et Urb.) Dyer.

L. cymatoneura Urb.

L. curtyana A. Rich.

A. samuelssonii O. C. Schmidt.

Famille 112 HYPERICACEÆ ou GUTTIFERÆ

Arbres, arbustes ou arbrisseaux ou herbes; jus souvent résineux, jaune ou verdâtre. Feuilles opposées, rarement verticillées, penninerves, généralement simples et entières; stipules le plus souvent absentes. Fleurs régulières, polygame-dioïques ou bisexuées, solitaires ou en cymes qui peuvent s'unir en inflorescence composée. Sépales et pétales 2-6, rarement beaucoup, imbriqués. Étamines nombreuses, hypogynes; filets libres ou unis de différentes façons, parfois formant une masse globulaire. Ovaire de 2 — beaucoup de loges, rarement uniloculaire avec 1 ou plusieurs ovules dans chaque loge; style long ou court, libre ou soudé, les lobes du stigmaté souvent épais et rayonnants. Fruit charnu ou coriacé; baie ou drupe indéhiscente ou capsule à déhiscence septicide.

x. Fruit capsulaire déhiscent:

2x. Jus visqueux, jaune, résineux *Clusia*, p. 232

2x. Jus aqueux, non résineux:

3x. Graines frangées aux 2 extrémités *Marila*, p. 231

3x. Graines non frangées:

4x. Fleurs quadrimères *Ascryum*, p. 231

4x. Fleurs pentamères *Hypericum*, p. 231

x. Fruit baccare ou drupacé:

2x. Fruit drupacé:

3x. Ovaire de 2-4 loges *Mammea*, p. 231

3x. Ovaire uniloculaire *Calophyllum*, p. 232

2x. Fruit baccare:

3x. Stigmaté sessile ou subsessile *Rheedia*, p. 232

3x. Stigmaté sur un style très long *Moronobea*, p. 232

Marila Swartz.

Arbres avec feuilles persistantes, nervures pinnées. Fleurs axillaires disposées en panicules plus ou moins poilues. Sépales 4-5; pétales 4-5, caducs, imbriqués; étamines nombreuses, avec filets libres; connectif glandulaire au sommet; ovaire 4-5 loges. Fruit capsulaire oblong. Graines nombreuses.

M. biflora Urb.

M. dicitiflora Urb.

M. domingensis Urb.

Ascryum L.

Arbrisseaux glabres, très ramifiés, les branches comprimées. Feuilles obovoïdes, ou presque linéaires, obtuses, parsemées de glandes noires. Fleurs terminales et axillaires, pédicellées, en groupes de trois. Sépales 4, les 2 sépales externes ovales, ou ovoïdes, les 2 sépales internes étroits et plus courts; pétales 4, alternant avec les sépales; étamines nombreuses, libres ou quelque peu soudées à la base; ovaire uniloculaire, avec 2-3, rarement 4 placentas latéraux et de nombreux ovules. Capsule ovoïde uniloculaire; graines non ailées.

A. hypericoides L.

Hypericum L.

Herbes ou sous-arbrisseaux, généralement vivaces, rarement annuels. Feuilles opposées, rarement verticillées, souvent glandulaires, entières, sessiles ou courtement pétioles. Fleurs disposées en corymbes, de couleur jaune, rarement rouges, parfois ponctuées de glandes noires. Sépales 5, valvés ou imbriqués; pétales 4-5, appendiculés; étamines nombreuses, libres ou unies en 3-5 groupes, accompagnées de glandes interposées; ovaire de 3-5 loges; styles 3-5, libres ou plus ou moins unis; stigmaté capité ou papilionacé; ovules nombreux. Fruit capsulaire ou baccare, uniloculaire ou pluriloculaire.

H. fuertesii Urb.

H. Christii Urb.

H. polycladum Urb.

H. dichotomum Lam.

H. diosmoïdes Griseb.

H. constanzæ Urb.

H. pycnophyllum Urb.

H. perforatum L.

H. millefolium Urb. et Ekm.

Mammea L.

Arbres cultivés pour leurs fruits comestibles. Feuilles pétioles, coriaces, avec de nombreuses nervures latérales parallèles. Fleurs polygames, axillaires, solitaires ou peu ensemble. Calice fermé avant la floraison, puis se séparant

en sépales bivalvés; pétales 4-6, imbriqués; étamines nombreuses, filiformes, libres ou unies à la base; ovaire de 2-4 loges, avec 1-2 ovules dans chaque loge; style court, avec stigmate pelté, bilobé ou quadrilobé. Fruit, une drupe indéhiscente avec 1-4 graines très grosses.

M. americana L. «Abricotier» (Haïti); «*Mammea apple*,» en anglais.

Calophyllum L.

Arbres. Feuilles entières, coriacées, avec de nombreuses nervures latérales parallèles. Fleurs petites ou moyennes, disposées en épis ou en racemes polygames. Calice et corolle ne pouvant pas toujours se distinguer facilement, ensemble 4-12 en 2-3 rangées, imbriqués; étamines nombreuses, libres ou soudées à la base, avec anthères ovoïdes ou oblongues; ovaire uniloculaire, avec 1 ovule dressé; style entier avec stigmate sculiforme ou lobé. Fruit, une drupe avec sarcocarpe mince, noyau couvert d'une enveloppe dure. Graines sphériques ou ovoïdes.

C. calaba Jacq. «*Dame-Marie*» ou «*Dalemarie*» ou «*Damage*» (Haïti), «*Maria*» (St-Domingue).

Clusia L.

Arbrisseaux épiphytes, ou arbres. Feuilles pétioolées, coriacées ou presque coriacées, avec nervure médiane très prononcée et des nervures latérales parallèles. Fleurs dioïques, rarement polygames, solitaires ou agrégées en épis. Sépales 4 ou davantage, les sépales internes ou tous les sépales imbriqués; pétales 4-10; étamines nombreuses, libres ou plus ou moins soudées; ovaire de 5-10 loges avec de nombreux ovules dans chaque loge; style absent ou très court; stigmate ovoïde ou presque triangulaire. Capsule épaisse, coriacée ou charnue. Graines enveloppées d'arille charnu.

C. domingensis Urb.

C. minor L. «*Figuier maudit*» (Haïti), «*Cupey*» ou «*Cupeyejo*» ou «*Cupeyito*» (St-Domingue).

C. picardæ Urb.

C. plumierii Planch.

C. rosea Jacq. «*Figuier maudit marron*.»

Rheedia L.

Arbres avec tiges dressées, entre-nœuds longs. Feuilles ovoïdes ou lancéolées. Fleurs petites, polygamo-dioïques, de couleur vert jaunâtre, pédonculées, solitaires ou peu nombreuses dans les fleurs mâles, axillaires. Sépales 2, unis à la base; pétales 4, obovoïdes, imbriqués; étamines nombreuses dans les fleurs mâles, insérées sous un disque central épais, libres, oblongues, avec de petites anthères sphériques; ovaire enfoui dans le disque, trilobé (1-2 loges par avortement); ovule solitaire dans chaque loge. Fruit: une baie avec une à trois graines.

R. laterifolia L. «*Abricot de St-Domingue*» (Haïti), d'après Urban.

R. verticillata Griseb. «*Bois diou*» (Haïti).

R. barkeriana Urb. et Ekm.

Moronobea Aubl.

Arbres avec feuilles coriacées, entières, oblongues. Fleurs solitaires, terminales, grandes. Calice de 5 sépales imbriqués; pétales 5, beaucoup plus grands que les sépales; étamines nombreuses, disposées en 5 faisceaux, chaque faisceau avec 3-5 filets; filets et anthères dressés. Baie avec 1 graine.

M. coccinea Aubl. «*Bois à cochon*» (Haïti), d'après Urban.

Famille 113. ELATINACEÆ

Herbes très petites ou sous-arbrisseaux. Feuilles opposées, rarement verticillées, simples, plus ou moins dentées, avec stipules interpétiolaires. Plantes dressées ou grimpantes. Fleurs solitaires ou agrégées dans l'axe. Sépales 2-5, imbriqués; pétales aussi nombreux; étamines 2-5, souvent 10, insérées avec les pétales; filets grêles; ovaire 2-5 loges, avec placenta central; stigmates 2-5, introrsés; ovules plusieurs dans chaque loge. Fruit capsulaire, à déhiscence septicide. Graines avec rainures.

Bergia L.

Caractères de la famille.

B. sessilliflora Griseb.

Famille 114. TAMARICACEÆ

Arbrisseaux ou arbres, ou herbes en partie ligneuses. Feuilles alternes sans stipules, relativement petites ou squameuses, entières, souvent imbriquées. Fleurs généralement parfaites, régulières, disposées en épis, en racemes ou en panicules. Calice de 5 sépales ou rarement de 4-6 sépales imbriqués; pétales aussi nombreux que les sépales, imbriqués; disque avec 10 lobes ou obsolete. Étamines 5 — plusieurs; filets distincts, libres; anthères à déhiscence longitudinale. Ovaire supère, uniloculaire, avec 3-5 placenta basilaire; stigmates 3-5, distincts; ovules 2 — plusieurs sur chaque placenta. Fruit: une capsule; graines se terminant en forme de virgule.

Tamarix L.

Caractères de la famille.

T. anglica Webb. «*Cèdre*.»

T. gallica L. «*Cèdre*,» d'après Urban.

Famille 115. CISTACEÆ

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux avec tiges dressées ou divergentes. Feuilles alternes ou opposées, simples. Fleurs solitaires, racemeuses, agrégées ou paniculées. Sépales 3-5, persistants, lorsqu'il y en a 5, les 2 externes plus petits et squameux, les 3 internes convolutés; pétales 5 ou 3, ou parfois absents, souvent fugaces. Étamines 8, hypogynes. Ovaire sessile, uni — pluriloculaire; ovules orthotropes, stipités; styles unis; stigmates entiers ou trilobés. Capsule déhiscente, valvée; graines généralement nombreuses.

Halimium Spach.

Caractères de la famille.

H. domingense Urb.

H. stenophyllum Urb.

Famille 116. BIXACEÆ

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles alternes, limbes simples, dentés, lobés ou rarement entiers. Fleurs parfaites, solitaires, ou nombreuses, disposées de différentes manières. Calice de 4-5 sépales libres, généralement imbriqués; pétales aussi nombreux que les sépales, décidus ou parfois absents. Étamines généralement nombreuses, anthères à déhiscence poricide. Gynécée de 2 — plusieurs carpelles unis; ovaire supère, uniloculaire, avec 2 — plusieurs placenta pariétaux; styles aussi nombreux que les placenta, mais unis; ovules 2 — plusieurs sur chaque placenta. Fruit: une capsule valvée, les valves portant des placenta. Graines nombreuses, souvent poilues.

Bixa L.

Caractères de la famille.

B. orellana L. «Roucous» (Haïti), «Bija» (St-Domingue).

Famille 117. CANELLACEÆ

Arbres glabres, rarement arbustes ou arbrisseaux avec écorce pâle, aromatique. Feuilles alternes, entières, ponctuées, sans stipules. Fleurs solitaires, en cymes, en panicules ou en corymbes terminaux; fleurs parfaites, régulières. Sépales 3, imbriqués; pétales 4-12, étroits, imbriqués ou absents. Étamines nombreuses; filets unis en 1 tube qui enveloppe le pistil; anthères étroites, extrorsées, adnées au tube des filets. Ovaire libre, uniloculaire, avec 2-5 placentas pariétaux; styles épais, stigmates de 2-5 lobes; ovules 2 — plusieurs, horizontaux, presque anatropes. Fruit: une baie; graines 2 — plusieurs, avec un testa brillant, crustacé.

x. Corolle simple, pentamère; androcée double **Canella**, p. 234

x. Corolle quadruple, trimère; androcée quadruple **Pleodendron**, p. 234.

Canella P. Br-Murr.

Arbre avec écorce grise. Feuillage glabre; feuilles alternes, coriacées, plus larges au dessus du milieu. Fleurs petites, en cymes terminales. Sépales 3, arrondis, coriacés, persistants, de beaucoup plus longs que les bractéoles; pétales 5, épais, 2 fois plus gros que les sépales, les pétales internes plus petits, libres, caducs; étamines le plus souvent 15-20, tube du filet faisant saillie derrière les anthères; ovaire supère, allongé, uniloculaire, avec 2 placentas pariétaux, enfermé dans le tube du filet; ovules 2-4; style court, épais; stigmate tronqué, épais, indistinctement lobé. Fruit, une baie presque globulaire. Graines 3-4 (généralement 4-6) remplissant la cavité de la baie; embryon légèrement courbé et latéral par rapport à l'axe de l'endosperme.

C. alba Murr. «Canelle poivrée» (Haïti), «Canelilla» (St-Domingue), d'après Urban.

Pleodendron Van Tiegh.

Arbres. Feuilles entières, distiques, sans stipules. Fleurs solitaires dans l'axe des feuilles avec pédoncule assez long. Sépales 3, soudés à la base; pétales 12, libres en 4 verticilles alternes, les pétales externes plus gros, alternes avec les sépales; tube stamifère avec 48 sacs de pollen qui correspondent à 12 étamines; ovaire composé de 6 carpelles avec 6 placentas pariétaux et de nombreux ovules semi-anatropes.

P. ekmanii Urb.

Famille 118. VIOLACEÆ

Herbes annuelles ou vivaces, arbrisseaux, arbustes, rarement arbres. Feuilles alternes ou opposées, le plus souvent entières, souvent non pétioles, généralement avec 2 stipules. Fleurs solitaires ou agrégées, rarement disposées en épis ou en cymes, parfaites ou dioïques, irrégulières, parfois presque régulières. Sépales 5, libres ou courtement soudés, persistants, rarement caducs; pétales 5, libres hypogynes ou irrégulièrement périgynes, les pétales inférieurs généralement plus grands que les autres et éperonnés. Étamines 5, alternant avec les pétales, connées, en forme d'anneaux autour de l'ovaire, souvent dissemblables et les 2 inférieures éperonnées ou appendiculées; filets courts; anthères introrsées. Ovaire libre, sessile, uniloculaire, avec 3, rarement 2-5

placentas pariétaux portant 1 — beaucoup d'ovules; styles 5. Fruit, une capsule déhiscence, valvée, ou rarement une baie indéhiscente.

- x. Sépales non auriculés; étamines unies en forme de gaine **Hybanthus**, p. 235
 x. Sépales auriculés; étamines distinctes, les 2 inférieures éperonnées. **Viola**, p. 235

Hybanthus Jacq.

Herbes vivaces, sous-arbrisseaux ou rarement arbustes. Feuilles alternes ou opposées. Fleurs blanches ou violettes, solitaires ou agrégées dans l'axe des feuilles ou en racemes terminaux, petites ou moyennes. Sépales 5, presque égaux; pétales 5, inégaux, le pétale inférieur éperonné; étamines 5, libres ou plus ou moins soudés, en 1-2 groupes portant les glandes sur le côté inférieur, connectif appendiculé; ovaire uniloculaire avec 3 placentas portant de nombreux ovules; styles encapuchonnés au sommet. Fruit capsulaire, trivalvé, avec de nombreuses graines arillées.

H. havanensis Jacq.

H. linearifolius (Vahl.) Urb.

H. domingensis Urb. et Ekm.

H. portoricensis Urb.

H. leucanthus Urb. et Ekm.

Viola L.

Herbes caulescentes et acaulescentes, avec stipules voyantes. Fleurs solitaires, axillaires; sépales auriculés; pétales plus ou moins inégaux, pétale inférieur éperonné à la base; étamines 5, les 2 inférieures appendiculées. Capsule trivalvée.

V. domingensis Urb.

V. odorata L. «Violette.»

Famille 119. FLACOURTIACEÆ

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles persistantes, généralement alternes, rarement opposées ou verticillées; stipules généralement caduques. Fleurs régulières, bisexuées ou unisexuées, solitaires dans l'axe ou disposées en cymes terminales ou axillaires. Enveloppe florale imbriquée; sépales 4 ou plus, libres ou soudés; pétales aussi nombreux que les sépales ou absents, libres, souvent insérés sur le bord externe d'un disque renflé hypogyne ou périgyne. Étamines nombreuses, rarement aussi peu nombreuses que les pétales, mais alors alternant avec les sépales en une ou plusieurs séries ou en faisceaux opposés aux pétales; staminodes parfois présents. Ovaire supère ou presque supère, uniloculaire, avec peu ou beaucoup d'ovules portés sur des placentas pariétaux; styles aussi nombreux que les placentas, libres ou soudés, ou parfois bi-pluriloculaires. Fruit: une capsule, une baie ou une drupe.

x. Pétales présents:

- 2x. Étamines fasciculées, opposées aux pétales. **Homalium**, p. 236
 Fleurs racemeuses
 2x. Étamines non fasciculées, distinctes ou presque distinctes
 3x. Ovaire uniloculaire à l'anthère. Feuilles avec 3-5 nervures **Banara**, p. 236
 3x. Ovaire de 3-5 loges à l'anthère. Feuilles avec 5-7 nervures **Prockia**, p. 236

x. Pétales absents:

- 2x. Fleurs terminales. Sépales valvées:
 3x. Fleurs racemeuses. Étamines 7-9 **Lunania**, p. 237

- 3x. Fleurs fasciculées ou ombellées. Étamines très nombreuses..... **Prockia**, p. 236
- 2x. Fleurs axillaires ou latérales. Sépales imbriqués:
- 3x. Disque de la fleur dépourvu d'appendices en forme de staminodes:
- 4x. Plantes armées d'épines:
- 5x. Étamines 4..... **Primosia**, p. 237
- 5x. Étamines nombreuses..... **Xylosma**, p. 236
- 4x. Plantes inermes:
- 5x. Étamines plus ou moins unies en tube..... **Samyda**, p. 237
- 5x. Étamines libres..... **Lætia**, p. 238
- 3x. Disque de la fleur muni d'appendices en forme de staminodes:
- 4x. Style absent; étamines 30 ou plus..... **Zuelania**, p. 238
- 4x. Style présent; étamines 6-22..... **Casearia**, p. 237

Prockia L.

Arbrisseaux ou arbustes. Feuilles avec 5-7 nervures principales, alternes, dentées; stipules généralement persistantes, grandes et dentées. Inflorescence terminale racémeuse. Sépales 3, valvés, persistants; pétales 3 ou rarement absents, plus petits que les sépales, persistants; étamines nombreuses, libres; filets filiformes; anthères petites, presque globulaires, biloculaires, à déhiscence longitudinale; ovaire libre, 3-5 loges, avec plusieurs ovules dans chaque loge sur 2 placentas; styles simples. Fruit indéhiscent, 3-5 loges. Graines nombreuses, petites.

P. crucis L.

Banara Aubl.

Arbres glabres ou poilus. Feuilles alternes, pétiolées, dentées, avec 3-5 nervures; stipules petites. Fleurs petites, terminales, racémeuses; bractées et bractéoles petites. Sépales 3, rarement 4, valvés, persistants; pétales aussi nombreux, semblables aux sépales, persistants; étamines nombreuses, hypogynes, ou les étamines externes périgynes, disposées en 2 — plusieurs séries; filets minces, filiformes; anthères biloculaires à déhiscence longitudinale; ovaire uniloculaire, avec 2-8 placentas pariétaux. Fruit capsulaire; graines plus ou moins arillées.

B. domingensis Benth.

Homalium Jacq.

Arbres ou arbrisseaux avec feuilles alternes ou rarement opposées ou verticillées, simples, penninerves, généralement dentées; stipules généralement petites, rarement absentes. Fleurs solitaires ou agrégées, en racemes axillaires, avec ou sans pédoncules. Calice concave, composé de 5-7 segments, rarement 4-8, persistants; pétales aussi nombreux, soudés aux sépales, persistants, imbriqués; étamines en nombre égal ou 2-3 fois plus nombreuses que les pétales, agrégées en groupes alternant avec les glandes; filets filiformes; anthères petites, biloculaires, à déhiscence longitudinale; ovaire soudé à la base avec le calice, uniloculaire, avec 2-6 placentas pariétaux, 1 — plusieurs graines sur chaque placenta; styles 2-6, filiformes. Fruit capsulaire, plus ou moins coriacé, semi-supère, avec 2-6 valves. Graines plus ou moins irrégulières.

H. racemosum Jacq. «Corazon de paloma» (St-Domingue).

Xylosma G. Forst.

Arbrisseaux ou arbustes, avec épines axillaires. Feuilles alternes, penninerves, courtement pétiolées, dentées et plus ou moins coriacées; stipules absentes.

Fleurs petites, en panicules axillaires avec les bractées petites; fleurs dioïques, rarement polygames. Sépales 4-5, rarement 6-7, plus ou moins soudés à la base, imbriqués; pétales absents; étamines nombreuses, insérées sur un disque annulaire ou sur de nombreuses glandes; filets libres, longs; anthères biloculaires, à déhiscence longitudinale; ovaire absent dans les fleurs mâles; ovaire dans les fleurs femelles sur le disque, uniloculaire, avec 2-3, rarement 4-6 placentas pariétaux, 2-4-6 ovules sur chaque placenta; styles courts, souvent presque absents. Fruit généralement baccare.

X. coriaceum (Poit.) Eichl.

X. schaefferioides A. Gray.

X. buxifolium A. Gray.

X. lineolatum Urb. et Ekm. «Piquant rosie».

X. glaucescens Urb.

Priamosia Urb.

Arbrisseaux ou arbustes avec des épines axillaires, les jeunes rameaux couverts de poils. Stipules très petites, égales; feuilles disposées en spirale, avec court pétiole, penninerves, serrées au-dessus, coriacées. Fleurs dioïques, solitaires, très petites, à pédoncule très court. Sépales 4, libres, en forme d'écaillés, imbriqués, membraneux; pétales absents; disque annulaire; étamines 4, insérées sous le disque, alternant avec les sépales, libres; filets courts; anthères extrorsées, à déhiscence longitudinale.

P. domingensis Urb.

Lunania Hook.

Arbres. Feuilles alternes, pétiolées, avec 3 nervures, ponctuées, sans stipules. Fleurs petites, généralement axillaires, disposées en épis ou racemes, avec de très petites bractéoles. Sépales 2-5, valvés, plus ou moins unis; pétales absents; étamines 6-12, insérées sur le disque; filets très courts; anthères biloculaires, à déhiscence longitudinale; ovaire uniloculaire, avec 3 larges placentas latéraux; ovules nombreux; styles 3, courts ou parfois absents. Fruit capsulaire, trivalvé. Graines petites, avec un arille.

L. mauritii Urb.

L. tenuifolia Urb. et Ekm.

L. buchii Urb.

L. ekmanii Urb.

L. dentata Urb.

Samyda L.

Arbrisseaux ou arbustes. Feuilles caduques, courtement pétiolées, entières, serrulées, pellucides, ponctuées. Fleurs axillaires, solitaires ou fasciculées. Calice campanulé, avec 4-6 lobes inégaux, imbriqués; pétales absents; étamines 8-13, insérées sur le tube calicinal; filets connés en forme de tube. Fruit globulaire, charnu-coriacé, avec 3-5 valves au sommet. Graines nombreuses.

S. dodecandra Jacq.

S. rosea Sims. «Casser sèche» (Haïti), «Rosa cimarron» (St-Domingue).

S. tenuifolia Urb.

S. oligostemon Urb.

Casearia Jacq.

Arbrisseaux ou arbres. Feuilles alternes, généralement distiques, entières, serrées, généralement pellucides ponctuées, persistantes ou caduques. Fleurs parfaites, fasciculées, ombellées ou corymbeuses-paniculées, latérales, petites, les pédoncules articulés. Calice de 4-7 lobes, le tube court; pétales absents;

étamines 6-25; disque avec appendices en forme de staminodes aussi nombreux que les étamines. Fruit: une capsule sèche ou charnue, tri-quadrivalvée. Graines entourées par les arilles charnus.

C. spinescens (Sw.) Benth.

C. illicifolia (Sw.) Vent. «Piquant carré» ou «Castor» (Haïti), «Chicharron» (St-Domingue).

C. aculeata Jacq. «Piquant arada» (Haïti), «Lemoncillo» (St-Domingue).

C. guianensis (Aubl.) Urb. «Café cimarron» ou «Café de gallina» (St-Domingue).

C. ehrenbergiana Urb.

C. decandra Jacq.

C. hirsuta Sw.

C. arborea (L. C. Rich.) Urb. «Palo de Yagua» (St-Domingue).

C. sylvestris Sw.

C. bicolor Urb.

C. bahamensis Urb.

Lætia Lœfl.

Arbres petits. Feuilles généralement crénelées ou serratées avec des points et des lignes pellucides. Fleurs hermaphrodites, axillaires ou terminales, agrégées ou corymbeuses. Sépales 4 ou 5, larges, subpétaloïdes; pétales absents; étamines indéfinies (rarement 15 à 10), hypogynes, parfois légèrement unies à la base; staminodes absents; anthères ovoïdes; ovaire avec 3 (4 ou 6) placentas; ovules indéfinis; style simple; stigmate capité ou trilobé. Fruit, une baie, souvent résineuse à l'intérieur, s'ouvrant par valves, après un certain temps. Graines avec arille.

L. thamnia L.

Zuelania A. Rich.

Arbres ou arbrisseaux avec les feuilles minces, poilues au-dessous, ponctuées et courtement pétiolées; stipules caduques. Fleurs agrégées dans l'axe des feuilles, avec les pédoncules courts; fleurs parfaites. Calice tubulaire, avec des lobes imbriqués; pétales absents; étamines nombreuses, hypogynes, en 1 série, chaque étamine alternant avec 2 staminodes; filets courts, beaucoup plus minces que les lobes du disque; anthères biloculaires, à déhiscence longitudinale; ovaire uniloculaire, avec de nombreux ovules sur 3 placentas pariétaux; styles absents; stigmates capités.

Z. guidonia (Sw.) Britt. et Wils. «Cachiman marron».

Famille 120. TURNERACEÆ

Herbes, arbrisseaux ou arbres. Feuilles alternes, pétiolées, simples, dentées, souvent bi-glandulaires à la base, stipules petites ou absentes. Fleurs axillaires, solitaires ou fasciculées, souvent bi-bractéolées, parfaites. Calice à 5 lobes, caduc, imbriqué; pétales 5, insérés à la gorge du tube calicinal; étamines 5, insérées sur le tube calicinal; filets libres; styles 3. Fruit: une capsule uniloculaire, trivalvée, avec de nombreuses graines.

x. Pétales appendiculés; stigmates bifides Piriqueta, p. 238

x. Pétales non appendiculés; stigmates non bifides Turnera, p. 239

Piriqueta Aubl.

Herbes annuelles ou vivaces, sous-arbrisseaux, arbrisseaux ou arbustes. Stipules présentes ou absentes; feuilles dentées. Fleurs généralement solitaires et axillaires. Sépales généralement libres, 5, imbriqués; pétales jaunes, 5, insérés au-dessous des étamines; filets aplatis; anthères quelque peu allon-

gées; stigmates 3, à deux fentes, pennicillés. Capsules uniloculaires, à déhiscence loculicide, avec trois valves à la base. Graines nombreuses, courbes.

P. caroliniana (Walt.) Urb.

P. caroliniana (Walt.) Var. *glabra* (P. DC.) Urb.

P. caroliniana (Walt.) Urb. Var. *exasperata* Urb.

P. cistoides (L.) Meyer.

P. ovata (Bello) Urb.

Turnera L.

Herbes ou arbres, arbustes ou arbrisseaux, avec feuillage glabre ou pubescent. Feuilles peu nombreuses, alternes; limbes entiers, dentés ou pinnatifides. Fleurs solitaires, situées dans l'axe des feuilles, parfois agrégées ou racemeuses, avec ou sans bractéoles. Sépales 5, plus ou moins unis, imbriqués; pétales 5, généralement jaunes, convolutés, insérés à la gorge du tube calicinal; étamines 5, insérées près des pétales; filets quelque peu aplatis, distincts; anthères biloculaires; stigmates 3, pennicillés. Capsule allongée, trivalvée.

T. pumilea L. Ile de la Tortue.

T. diffusa Willd. «Oreganillo» (St-Domingue), d'après Urban.

T. ulmifolia L. «Zombi nan bois».

T. ulmifolia L. Var. *intermedia* Urb.

T. ulmifolia L. Var. *angustifolia* (Mill.) Willd.

Famille 121. PASSIFLORACEÆ

Plantes herbacées ou ligneuses, généralement grimpantes à l'aide de vrilles. Feuilles alternes, généralement pétiolées, simples ou lobées, généralement stipulées, vrilles axillaires, simples. Fleurs bisexuées ou unisexuées, régulières, solitaires ou agrégées. Sépales 3-5, imbriqués, souvent pétaloïdes; pétales aussi nombreux que les sépales, alternant avec eux, ou parfois absents, insérés sur la gorge du calice, généralement libres, imbriqués, parfois frangés. Couronne du réceptacle généralement présente, de 1 à plusieurs rangées, composée de nombreux filets libres ou unis à la base, ou tubulaire et souvent profondément frangée; étamines généralement 5, alternant avec les pétales, rarement 3-10; filets libres ou monadelphes. Ovaire supère, généralement sur un gynophore ou support uniloculaire avec 3-5 placentas pariétaux, portant de nombreux ovules; styles 1-5. Fruit: une capsule ou une baie; graines avec arille charnu.

Passiflora L.

Caractères de la famille.

P. berteriana Balb.

P. bilobata A. Juss.

P. anadenia Urb.

P. bicrura Urb.

P. suberosa L.

P. suberosa L. Var. *minima* (L.) M. Mast. «Morila» (St-Domingue), d'après Urban.

P. suberosa L. Var. *angustifolia* (Sw.) M. Mast.

P. suberosa L. Var. *pallida* (L.) M. Mast., var. *lineariloba* (Hook. f.) M. Mast., var. *hederacea* (Cav.) M. Mast.

P. foetida L. «Marigouya» ou «Toque molle» (Haïti), «Cagnasia» (St-Domingue).

P. multiflora L. Var. *glabra* Ekm. «Liane tafia».

P. sexflora A. Juss.

- P. rubra* L. «Liane couleuvre.»
P. capsularis L.
P. murucuja L. «Liane caleçon.»
P. orbiculata Cav.
P. cupraea L.
P. heterophylla Lam.
P. maliformis L. «Callebassie» (Haïti), «Parcha» (St-Domingue).
P. quadrangularis L. «Grenadine.»
P. laurifolia L. «Pomme liane.»
P. pedata L.
P. pallens Poepp.
P. pectinata Griseb.
P. ekmanii Kilipp et Urb.

Famille 122. CARICACEÆ

Arbrisseaux avec jus laiteux, tronc dressé, ressemblant au palmier, rarement ramifiés, avec une couronne terminale, de grandes feuilles palmées-lobées. Fleurs généralement unisexuées (dioïques), disposées en racemes pauciflores. Calice très petit; pétales 5, dans les fleurs staminées, connés en un long tube, rarement distincts dans les fleurs pistillées. Étamines 10, en 2 séries, insérées sur la gorge de la corolle; filets courts. Ovaire supère, uniloculaire, portant de nombreux ovules, sur 5 placentas ou faussement pentaloculaire; stigmates 5, simples ou irrégulièrement ramifiés. Fruit: une grande baie charnue.

Carica L.

Caractères de la famille.

C. papaya L. «Papaye.»

Famille 123. LOASACEÆ

Généralement herbes dressées ou grimpantes, rarement arbrisseaux ou arbustes; plantes avec des poils caractéristiques, parfois irritants, parfois bardés. Feuilles opposées ou alternes, très diverses, généralement sans stipules. Fleurs régulières, parfaites; inflorescence variée; réceptacle ou tube calicinal adné à l'ovaire. Sépales généralement 5, rarement 4-7, imbriqués ou contordus, persistants; pétales aussi nombreux et alternes avec les sépales, insérés sur le réceptacle dans le calice, pétales plats ou encapuchonnés, généralement libres. Étamines généralement nombreuses, rarement 5-10 ou 2 par avortement, insérées avec les pétales, parfois en faisceaux opposés aux pétales; staminodes souvent présents, filiformes ou pétaloïdes. Ovaire généralement infère et uniloculaire, avec 1—plusieurs ovules portés sur 3-5 placentas pariétaux; styles entiers ou bi-tripartis. Fruit capsulaire, déhiscent ou indéhiscent.

x. Calice et corolle quadrimères *Sclerothrix*, p. 241

x. Calice et corolle pentamères:

2x. Ovules nombreux:

3x. Pétales encapuchonnés alternant avec autant d'écailles..... *Loasa*, p. 241

3x. Pétales non encapuchonnés; écailles absentes *Mentzelia*, p. 241

2x. Ovule solitaire..... *Fuertesiasia*, p. 240

Fuertesiasia Urb.

Plante ligneuse, grimpante, plus ou moins poilue. Feuilles alternes, avec un long pétiole, entières, trinerves à la base; stipules absentes. Inflorescence terminale ou axillaire, disposée en cymes. Fleurs parfaites, pentamères. Calice

avec 3 bractéoles à la base, tubulaire, adné à l'ovaire, sépales valvés, couverts de poils courts; pétales alternes avec les sépales à la base du disque. Étamines alternant avec les pétales; anthères biloculaires, introrsées, à déhiscence longitudinale; connectif pileux; staminodes absents; disque annulaire. Ovaire infère, uniloculaire; ovule solitaire, pendant au sommet de la cavité de l'ovaire; styles 5. Capsule indéhiscente avec péricarpe crustacé.

F. domingensis Urb. *Mala mujer* (St-Domingue), d'après Urban.

Mentzelia L.

Herbes annuelles ou vivaces, arbrisseaux et arbres avec des poils caractéristiques. Feuilles alternes ou rarement opposées, sessiles ou pétiolées. Fleurs disposées en cymes ou solitaires dans l'axe, avec des bractées, généralement blanches ou jaunes, de grandeur variée; fleurs pentamères. Réceptacle cylindrique, sessile ou stipité; sépales persistants, imbriqués; pétales imbriqués, libres ou soudés à la base avec les filets; étamines 10-200, libres ou soudées, égales ou inégales, en 1-5 séries; styles filiformes, longs, persistants; ovaire infère, uniloculaire, avec 3-80 ovules anatropes, pendants ou horizontaux; placentas 3 ou rarement 5-6, pariétaux. Fruit capsulaire, cylindrique, déhiscent par 5-6 valves au sommet, couvert des poils particuliers.

M. aspera L.

Loasa L.

Herbes ou sous-arbrisseaux, généralement couverts des poils irritants. Feuilles opposées, alternes dans quelques espèces. Fleurs disposées en cymes, solitaires dans l'axe, généralement jaunes, rarement blanches ou rouges. Parties florales 5, rarement 6-7; réceptacle plus ou moins cylindrique; pétales valvés, rarement imbriqués, libres, souvent éperonnés; staminodes généralement 3, rarement 4-7; étamines nombreuses, agrégées; ovaire généralement infère, rarement semi-supère ou supère, avec 3 ou 5 placentas pariétaux; ovules généralement nombreux. Fruit capsulaire, déhiscent par 3-5 valves entre les lobes du calice. Graines généralement petites et nombreuses.

L. plumieri Urb.

Sclerothrix Presl.

Herbes annuelles, sans poils irritants. Feuilles opposées, pétiolées, ovoïdes, dentées. Fleurs petites, blanches, ou bleuâtres, disposées en cymes, réceptacle obconique; fleurs quadrimères. Pétales valvés, légèrement imbriqués, libres; étamines en une seule série, composée de 4-14 étamines fertiles ou rarement en 2-4 séries; staminodes 6-10, 1-3 sur chaque sépale; styles filiformes, persistants; ovaire infère; placentas 4, avec un petit nombre d'ovules pendants. Capsule cylindrique ou obconique, déhiscente par 4 valves entre les sépales.

S. fasciculata Presl.

Famille 124. BEGONIACEÆ

Herbes monoïques ou rarement arbustives, généralement vivaces et quelque peu succulentes, et avec des nœuds renflés. Racines rhizomateuses, tubéreuses ou fibreuses. Feuilles alternes, généralement obliques à la base. Fleurs avec des parties le plus souvent régulières dans chaque série, excepté qu'une aile de l'ovaire est parfois plus développée que l'autre; fleurs agrégées, portant les fleurs mâles et les fleurs femelles. Périanthé des fleurs staminées généralement de 2 pétales et de 2 sépales pétaloïdes, les 2 séries souvent différentes; étamines nombreuses, avec des filets distincts ou connés. Périanthé des fleurs pistillées de 2-5 parties ou plus; ovaire infère, de 2-3 loges, angulé ou ailé;

styles 3, avec stigmates généralement recourbés ou tordus; ovules nombreux. Fruit généralement une capsule, avec de nombreuses petites graines.

Begonia L.

Caractères de la famille.

B. exilis O. E. Schulz.

B. domingensis A. DC.

B. brachypoda O. E. Schulz.

B. plumieri A. DC.

B. rotundifolia Lam.

B. plumieri A. DC. Var. *barahonensis* O. E. Schulz.

B. repens Lam.

Ordre XXXII. OPUNTIALES

Plantes arbustives, succulentes, généralement couvertes d'épines. Feuilles généralement absentes, tiges déprimées, globulaires, en forme de colonnes et cylindriques ou angulées ou aplaties et articulées ou continues. Inflorescence souvent axillaire ou latérale; fleurs généralement grandes et voyantes, parfaites, solitaires. Calice de peu ou de nombreux sépales imbriqués, la série interne pétaloïde; corolle de nombreux pétales en 2 ou plusieurs séries. Etamines nombreuses en plusieurs séries; filets filiformes, parfois adhérent avec la base des pétales; anthères introrses. Gynécée de plusieurs carpelles unis; ovaire infère, uniloculaire, avec plusieurs placentas pariétaux; styles unis, terminaux, simples allongés ou pyramidaux; stigmates aussi nombreux que les placentas, de forme variée; ovules nombreux, anatropes, horizontaux. Fruit: une baie charnue ou rarement sèche, lisse ou plus ou moins épineuse. Graines nombreuses, brillantes ou tuberculeuses.

Famille 125. CACTACEÆ

Caractères de l'ordre.

x. Feuilles larges, plates; glochides absentes.

Fleurs stipitées souvent agrégées..... *Peireskia*, p. 247

x. Feuilles cylindriques ou subcylindriques ou absentes. Fleurs sessiles:

2x. Aréoles avec glochides; parties végétatives portant des feuilles qui sont généralement petites et fugaces. Fleurs rotacées (pétales dressés sans *Nopalea*):

3x. Etamines beaucoup plus longues que pétales. Plantes avec tronc défini..... *Nopalea*, p. 247

3x. Etamines plus courtes que pétales. Plantes généralement très ramifiées à partir de la base..... *Opuntia*, p. 247

2x. Aréoles sans glochides. Parties végétatives généralement aphyllées. Fleurs avec tube défini (excepté *Rhipsalis*):

3x. Périanthé rotacé; segments peu nombreux. Plantes le plus souvent inermes; épiphytes grêles avec de nombreux nœuds..... *Rhipsalis*, p. 246

3x. Périanthé non rotacé; segments plusieurs —beaucoup:

4x. Aréoles le plus souvent inermes. Plantes avec de nombreux nœuds. ceux-ci plats. Epiphytes..... *Phyllocactus*, p. 245

4x. Aréoles le plus souvent spinifères. Plantes souvent non articulées, les nœuds non plats:

5x. Fleurs et épines portées par les mêmes aréoles:

6x. Plantes en forme de sarments:

7x. Avec racines aériennes:

8x. Ecaïlles de l'ovaire et fruit grands et foliacés, leur aisselle plutôt spinifère, poilue..... *Hylocereus*, p. 244

8x. Ecaïlles de l'ovaire et fruit ni grands, ni foliacés, leur aisselle spinifère et poilue..... *Selenicereus*, p. 244

7x. Sans racines aériennes..... *Leptocereus*, p. 244

6x. Plantes dressées, arborescentes, touffues, arquées ou diffuses:

7x. Ovaire nu ou portant rarement quelques courtes écaïlles, celles-ci sous-tendant des touffes de poils courts..... *Cephalocereus*, p. 245

7x. Ovaire avec écaïlles, portant aussi laine, arêtes ou épines:

8x. Périanthé court, campanulé ou court infundibuliforme. Tube court et épais:

9x. Plantes en forme de colonne, avec tige vigoureuse; épines des aréoles fortes..... *Lemaireocereus*, p. 244

9x. Plantes basses ou si allongées et dressées au début devenant procombantes ou grimpantes; épines des aréoles grêles..... *Harrisia*, p. 243

8x. Périanthé infundibuliforme ou infundibuliforme campanulé:

9x. Fleurs nocturnes, petites, tubulaires, avec limbe étroit; périanthé persistant sur l'ovaire..... *Neoabbottia*, p. 245

9x. Fleurs nocturnes, largement infundibuliformes; périanthé caduc par abscission..... *Dendrocereus*, p. 245

5x. Fleurs et épines portées par des aréoles différentes:

6x. Plantes courtes avec 1 nœud:

7x. Jus laiteux..... *Mammillaria*, p. 246

7x. Jus aqueux..... *Chilita*, p. 246

6x. Plantes courtes sans nœud..... *Melocactus*, p. 246

Harrisia Britt.

Plantes charnues, avec tiges cylindriques et branches cannelées, les sillons creux avec de fréquentes aréoles dont chacune supporte plusieurs épines grêles. Feuilles obsoletes. Fleurs nocturnes, relativement grandes, nées non loin des extrémités des branches; infundibuliformes. Hypanthium cylindrique, inerme, écaïlleux; sépales colorés; pétales blancs. Fruit charnu, globulaire — ovoïde, inerme, mais écaïlleux. Graines petites, nombreuses, souvent noires. Etamines plus courtes que les pétales; styles quelque peu plus longs que les étamines.

H. divaricatus (Lam.) Britton, «*Catastres*» (Haïti), «*Pitajaya*» (St-Domingue).

H. nashii Britt.

Lemaireocereus Britt. et Rose.

Plantes généralement grandes, élevées et branchues, rarement basses et presque procumbantes. Aréoles plutôt grandes, feutrées; épines généralement fortes et nombreuses. Fleurs diurnes ou rarement nocturnes, une à chaque aréole, tubulaires—infundibuliformes ou campanulées. Styles et tube caducs après quelques jours; étamines nombreuses en plusieurs rangées tout le long de la surface interne de la gorge; ovaire plus ou moins tuberculé, portant des écailles feutrées dans les axes, les aréoles au début dépourvues d'épines ou presque et formant ensuite un groupe d'épines. Fruit globulaire—ovale, souvent comestible, éclatant irrégulièrement quand il est vieux, exposant les graines, au début très épineux, mais à complète maturité les épines souvent décidues. Graines noires, nombreuses.

L. hystrix Britt. et Rose, «Catastres.»

Hylocereus Britt et Rose.

Plantes charnues, avec des tiges et des branches grimpantes, trigones ou pourvues de trois ailes avec racines aériennes, les aréoles avec plusieurs épines courtes et une touffe de laine. Feuilles obsoletes. Fleurs nocturnes très grandes; hypanthium tubiforme avec écailles foliacées, dépourvues d'épines et de laine. Sépales variés, les sépales externes ressemblant aux écailles de l'hypanthium, les sépales internes ressemblent aux pétales; pétales étroits généralement blancs. Fruit charnu, globulaire ou ovoïde, avec de larges écailles. Graines petites, noires.

H. triangularis (L.) Britton et Rose.

Selenicereus Britt. et Rose.

Plantes grêles, traînantes, généralement grimpantes; articulations sillonnées ou angulées. Aréoles petites, portant de petites épines. Fleurs grandes, généralement très grandes, nocturnes; tube floral allongé, quelque peu recourbé; écailles de l'ovaire et du tube floral petites, pourvues généralement de poils et de soies dans leurs axes; écailles supérieures et segments externes du périanthe semblables, étroits, verdâtres, brunâtres ou oranges; segments internes du périanthe larges, blancs, généralement entiers; filets allongés, grêles, nombreux, disposés en 2 groupes distincts, l'un formant un cercle au sommet du tube floral, l'autre éparpillé par dessus la gorge; styles allongés, épais, souvent creux; lobes du stigmate grêles, nombreux, entiers. Fruit: une grande baie rougeâtre, couverte d'une touffe d'épines décidues, de soie et de poils.

S. urbanianus Britt. et Rose.

S. grandiflorus (L.) Britt. et Rose.

S. quadrangularis (Haw.) Britt. et Rose.

Leptocereus (Berger) Britt. et Rose.

Cactus arborescents, en forme de sarments ou avec des branches diffuses. Nœuds avec 3-8 côtes proéminentes, minces, hautes, crénelées, sans racines aériennes; épines grêles aciculaires. Fleurs diurnes, petites; ovaire épineux; tube de la fleur court, campanulé, épineux; étamines très nombreuses, nées à la base de la gorge, légèrement exertes; lobes du stigmate dépassant légèrement les étamines. Fruit globulaire—oblong, plus ou moins épineux, charnu. Graines nombreuses, noires.

L. weingartianus (E. Hartm.) Britt. et Rose, «Pomme torche.»

Neoabbottia Britt. et Rose.

Plantes arborescentes avec tronc lisse dressé, cylindrique et avec extrémité ramifiée, les branches fortement ailées ou cotées, provenant normalement de l'extrémité éloignée de la branche précédente, mais parfois au-dessous de l'extrémité et généralement dans le même plan; côtes minces et élevées, très épineuses. Fleurs nocturnes, petites, tubulaires, avec limbes étroits; plusieurs réunies à l'extrémité d'une branche terminale provenant d'un petit cephalium feutré; périanthe persistant sur l'ovaire; tube du périanthe et ovaire portant de petites écailles avec laine courte et quelquefois une soie à leurs aisselles; segments du périanthe très petits; gorge de la fleur à extrémité un peu élargie au sommet portant de nombreuses étamines; style grêle. Fruit oblong, turgescent, presque nu, profondément ombiliqué. Graines excessivement petites, noires muriquées.

N. panniculata (Lam.) Britt. et Rose.

Dendrocereus Britt et Rose.

Cactus arborescents; tronc épais, dressé, cylindrique, couronné de nombreuses branches dressées ou pendantes; branches de 3-5 bourrelets; côtes minces et élevées, très épineuses; aréoles dépourvues de longs poils. Fleurs nocturnes, largement infundibuliformes, le périanthe tombant finalement de l'ovaire par abscission; tube floral subcylindrique, étréci au-dessous, portant de courtes écailles, souvent réfléchies, les écailles inférieures sous-tendant de courtes épines; segments du périanthe nombreux, divergents; étamines nombreuses, quelque peu exertes; ovaire avec quelques aréoles; celles-ci portant souvent quelques épines. Fruit indéhiscent, globulaire, nu, vert, dur, avec une paroi externe très épaisse. Graines brunâtres, rugueuses, tronquées à la base.

D. undulosus (D. C.) Britton et Rose.

Cephalocereus Pfeiff.

Plantes allongées, le plus souvent en forme de colonne et dressées, parfois très ramifiées, avec un tronc court ou dans une espèce avec des branches divergentes et procumbantes. Dans quelques espèces, les aréoles fleurissantes développent une abondance de laine qui forme ensemble une masse dense appelée pseudo-cephalium ou au sommet, ou non loin du sommet. Dans d'autres espèces, se développe une longue laine ou des poils, mais il ne se forme pas de pseudo-cephalium. Dans d'autres encore, les fleurs se produisent en un cercle au sommet, et les soies et le fruit forment après un collier à la base de la nouvelle croissance. Dans d'autres espèces enfin, il ne se produit des aréoles fleurissantes, ni laine, ni poils. Fleurs nocturnes, légèrement campanulées—infundibuliformes ou piriformes, dressées ou courbées. Fruit généralement déprimé, globulaire, parfois oblong. Graines noires, lisses ou tuberculées.

C. hermentianus (Monv.) Britt. et Rose.

C. monoclonos (P. DC.) Britt. et Rose.

C. polygonus (Lam.) Britt. et Rose.

C. schlumbergeri (Weber) Urb. (comb. nov.)

Phyllocactus Lk.

Arbrisseaux épiphytes, avec des articles foliacés angulés à la partie inférieure et larges à la partie supérieure qui sont généralement traversés d'un faisceau qui ressemble à une nervure médiane. Aréoles dans les sillons garnis de feuilles squameuses, légèrement velues—poilues. Fleurs dans les aréoles

latérales solitaires, généralement très grosses et très belles. Fleurs régulières ou par la courbure de la corolle et des étamines plus ou moins zygomorphes, avec le plus souvent un tube très long, qui est squameux ou foliacé, comme parfois l'ovaire. Segments du périanthe de même couleur, pétaloïdes ou les externes semblables au calice; étamines insérées au tube ou à la gorge de la corolle; ovaire parfois angulé avec de nombreux ovules placés séparément ou en touffe. Fruit, une baie juteuse, souvent oblique, angulée ou ronde, couverte d'écaillés ou d'une protubérance d'une couche d'écaillés. Graines reniformes, sculptées de petits points creux.

P. hookeri (Haw.) Link.

Melocactus Link. et Otto.

Tige en forme de cône ou subglobulaire, charnue, plate à la base, munie de côtes; à maturité couronnée par un capitule plus étroit, très laineux, florifère; côtes verticales 9-20, portant des grappes d'épines; capitule, une masse compacte de soies ou d'épines grêles, raides, enfouies dans la laine blanche. Fleurs sortant au sommet du capitule, petites, de couleur rose. Tube du calice cylindrique, plus large à la base, dépassant l'ovaire; lobes jusqu'à 24, petits, attachés au tube en une série ou presque en spirale, ou enveloppants; pétales en 2 ou 3 séries, unis à la base en un tube extérieurement plus étroit; étamines insérées sur le tube du calice; ovaire renfermé, lisse, ovoïde, plat au sommet; style filiforme avec des rayons stigmatiques (5 ou plus). Baie, lisse, couronnée avec la corolle fanée; graines noires, sans endosperme.

M. communis Link. et Otto.

Mammillaria Haw.

Plantes avec un seul nœud court, tige simple ou agrégée, généralement hémisphérique ou courte cylindrique, la surface entièrement couverte de tubercules. Fleurs généralement courtes—infundibuliformes, avec tube nu ou presque nu et ovaire né dans les aisselles plus ou moins laineuses entre les tubercules ou à l'extrémité supérieure d'une rainure étroite sur leur surface supérieure. Fruit globulaire—linéaire clavé, presque toujours lisse et en forme de baie.

M. prolifera (Ait.) Haw.

M. glomerata (Lam.) P. DC.

Chilita Orcutt.

Plantes ressemblant au genre *Mammillaria*, s'en distinguant par leur jus aqueux. Fruit écarlate, clavé (sans écaillés ou épines capillaires). Graines noires, nées sur un trognon central. Racines généralement fibreuses, non fixées profondément.

C. multicipes Orc.

Rhipsalis Gaertn.

Plantes épiphytes, très ramifiées, succulentes, avec de petites aréoles glabres ou feutrées, desquelles se développent de petites soies ou parfois des épines. Feuilles absentes ou représentées par de toutes petites bractées. Fleurs généralement solitaires, petites, souvent dépourvues de tube. Filets peu ou nombreux, dressés, grêles, portés sur le bord externe du disque en 1 ou 2 rangées; lobes du stigmate 3 ou plus, généralement grêles, divergents; ovaire petit, parfois déprimé. Fruit: une petite baie nue.

R. cassytha Gaertn.

Opuntia Mill.

Plantes très variées. Racines fibreuses ou parfois épaisses et charnues; tiges et branches à nœuds plats cylindriques ou globulaires, généralement très charnues, parfois ligneuses; épines solitaires ou agrégées, parfois absentes, nues ou revêtues d'une gaine; glochides généralement nombreuses, nées au-dessus des épines. Feuilles généralement petites, cylindriques et caduques. Fleurs solitaires, nées vers la partie supérieure des nœuds. Sépales verts ou colorés; corolle voyante, verte, rouge ou jaune, pétales divergents; étamines beaucoup plus courtes que les pétales, sensitives; styles simples, épais; stigmates court-ement lobés. Fruit: une baie, souvent comestible, épineuse ou nue, globulaire, ovoïde, ou ellipsoïde. Graines blanches et aplaties.

O. caribaeæ Britt. et Rose, «Piquant couëna.»

O. taylori Britt. et Rose, «Piquant sauteur.»

O. antillana Britt. et Rose, «Chardon cardasse» ou «Piquant sauteur.»

O. dillenii (Ker.) Haw.

O. moniliformis Haw. «Patte tortue.»

O. picardæ Urb.

O. tuna Miller.

O. testudinis crus Weber.

O. haïtiensis Urb.

Nopalea Salm-Dyck.

Plantes généralement arborescentes, avec des troncs définis, cylindriques, et de nombreuses branches charnues, aplaties. Aréoles portant une laine blanche, des glochides et souvent des épines qui sont solitaires ou agrégées, — dépourvues de gaines. Feuilles petites, souvent décidues. Fleurs nées dans les aréoles, généralement au bord ou près du bord des nœuds. Sépales et pétales dressés, les derniers rouges ou pourpres; étamines nombreuses et styles plus longs que les pétales; ovaire plus ou moins tuberculeux, nu ou épineux, profondément ombiliqué. Fruit: une baie juteuse, rouge, comestible et généralement inerme. Graines nombreuses, plates, couvertes d'un arille dur, osseux.

N. cachenillifera (L.) Salm-Dyck. Cultivé.

Peireskia L.

Arbres, arbustes ou sarments, ressemblant aux autres plantes ligneuses, avec tiges branchues et feuillues. Epines disposées par paires, ou axillaires, ni garnies d'un étui, ni bardées; glochides absentes. Feuilles alternes, décidues, larges et plates ou quelque peu charnues. Fleurs rotacées, solitaires, stipitées, corymbeuses ou paniculées, terminales ou axillaires. Etamines nombreuses; styles simples; ovaire nu ou feuillé. Fruit juteux, parfois comestible; graines noires.

P. aculeata Mill.

P. portulacifolia (L.) Haw. «Epines du Christ» d'après Urban.

P. bleo (H. B. K.) P. DC.

Ordre XXXIII. MYRTALES

Herbes, arbustes ou arbres, parfois aquatiques ou amphibies. Feuilles alternes ou opposées. Fleurs régulières ou irrégulières, complètes ou très réduites. Hypanthium enfermant l'ovaire ou adné à l'ovaire. Périanthe double ou corolle parfois absente; androcée de quelques ou de beaucoup d'étamines; anthères s'ouvrant par des fentes ou par pores; gynécée de 1—plusieurs carpelles. Fruit: une capsule, une baie, une drupe ou ressemblant à un akène.

- x. Corolle absente; calice présent ou absent, parfois simulant une corolle; ovaire libre du calice ou du tube du calice, supère; anthères normales; tube du périgone long, lobes 4-5, imbriqués..... 126. *Thymeleaceae*, p. 248
- x. Corolle et calice généralement présents; ovaire syncarpe, infère ou enfermé dans un réceptacle en forme de coupe, généralement divisé en loges; style non divisé; ovules 2- indéfinis dans les loges:
- 2x. Ovules pendant du sommet des loges:
- 3x. Ovaire de 2-4 loges..... 130. *Rhizophoraceae*, p. 253
- 3x. Ovaire uniloculaire..... 131. *Combretaceae*, p. 253
- 2x. Ovules fixés dans les angles internes des loges ou aux placentas basilaires, ascendants, horizontaux ou pendants:
- 3x. Etamines innombrables, rarement définies:
- 4x. Feuillage à glandes oléifères; tubes criblés dans les rayons de la moelle..... 132. *Myrtaceae*, p. 255
- 4x. Feuillage é glandulaire; pas de tubes criblés dans les rayons de la moelle..... 129. *Lecythidaceae*, p. 252
- 3x. Etamines définies, rarement innombrables:
- 4x. Sépales généralement imbriqués ou ouverts; anthères courbées s'ouvrant généralement par des pores au sommet; connectif généralement appendiculé ou épaissi..... 133. *Melastomataceae*, p. 262
- 4x. Sépales généralement valvés; anthères normales non appendiculées s'ouvrant longitudinalement:
- 5x. Ovaire supère; pétales plissés..... 127. *Lythraceae*, p. 249
- 5x. Ovaire infère ou semi-infère:
- 6x. Carpelles superposés par étage; pétales plissés..... 128. *Punicaceae*, p. 252
- 6x. Carpelle en 1 verticille; pétales convolutés..... 134. *Oenotheraceae*, p. 269

Famille 126. THYMELAEACEÆ

Arbrisseaux ou arbustes ou rarement herbes. Feuilles alternes, rarement opposées, généralement petites; stipules absentes; feuilles supérieures placées sous les fleurs généralement grandes, formant parfois un involucre compact. Fleurs généralement régulières, souvent bisexuées, en capitules terminaux ou axillaires, racemes ou épis, ou rarement solitaires; bractées variées. Réceptacle ou tube calicinal pétaloïde; sépales 4-5, ou rarement 6; pétales absents ou représentés par des écailles. Etamines aussi nombreuses ou 2 fois plus nombreuses que les sépales ou réduites à 2, généralement insérées à la bouche du tube. Ovaire uniloculaire, rarement biloculaire, avec un ovule dans chaque loge; styles longs ou courts. Fruit, une noix indéhiscente, une baie ou une drupe, rarement une capsule déhiscente.

- x. Feuilles larges, environ 2:3 de leur longueur (notre espèce)..... *Lagetta*, p. 249
- x. Feuilles avec limbe environ 2 fois plus long que large (dans nos espèces):
- 2x. Surface inférieure des jeunes feuilles très poilue..... *Hyptiodaphne*, p. 249
- 2x. Surface inférieure des jeunes feuilles glabre..... *Daphnopsis*, p. 249

Hyptiodaphne Urb.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles alternes, coriaces, plus ou moins pubescentes. Inflorescence capitée ou ombellée; fleurs dioïques par avortement. Fleurs staminées: périgone infundibuliforme, quadrilobé, 2 lobes internes alternant avec 2 lobes externes, avec 5-6 écailles à la base; étamines 8, 4 supérieures et 4 inférieures alternant avec les lobes; anthères sessiles; ovaire rudimentaire, très petit, sessile. Fleurs pistillées: périgone plutôt urcéolé avec 4 petites écailles à la base; staminodes absents; ovaire oblong, subsessile, uniloculaire; style simple; stigmatte convexepelté; ovule solitaire. Fruit ovoïde, exocarpe mince, non charnu, endocarpe presque ligneux.

H. crassifolia (Poir.) Urb. «*Ayau*» ou «*Hayay*» (St-Domingue), d'après Urban.

Lagetta Juss.

Arbres avec feuilles alternes, larges — oblongues. Fleurs sessiles ou courtement pédonculées, disposées en épis ou en racemes terminaux, dénués de bractées; fleurs bisexuées ou diclines, quadrimères. Réceptacle en forme d'urne, glabre; sépales avec 3 angles courts; pétales absents; étamines en 2 séries, insérées dans la gorge du réceptacle; filets très courts; anthères presque sessiles, ovoïdes; ovaire poilu sur les côtés; style court; stigmatte grand, épais. Fruit presque sec, enveloppé par un réceptacle persistant.

L. lintearia Lam. «*Bois dentelle*» (Haïti), «*Palo de encaje*» (St-Domingue), d'après Urban.

Daphnopsis Mart. et Zucc.

Arbres ou arbustes, feuilles alternes, entières, coriaces, dénuées de stipules. Fleurs dioïques par avortement, ombellées ou subracemeuses, axillaires ou terminales. Périgone de la fleur staminée avec un tube grêle et 4 lobes divergents; étamines 8, 4 insérées sur les lobes du périgone de 4 dans la gorge; anthères sessiles. Périgone de la fleur pistillée plus petit, turbiné ou urcéolé; styles courts; stigmatte capité. Fruit subglobulaire, monosperme, drupacé, avec mince péricarpe.

D. americana (Mill.) Johnst.

D. oblongifolia Britt. et Wils.

D. uniflora Urb. et Ekm.

Famille 127. LYTHRACEÆ

Arbres, arbustes, arbrisseaux ou herbes. Feuilles opposées ou verticillées, ou rarement alternes, entières; stipules absentes ou très petites. Fleurs bisexuées, régulières ou rarement irrégulières, généralement axillaires, solitaires ou en cymes ou panicules; pédicelle généralement bibractéolé. Calice tubulaire ou campanulé, persistant, libre de l'ovaire, avec 4-6, rarement 3-16 lobes valvés, et souvent avec des dents accessoires entre les lobes; pétales aussi nombreux que les lobes du calice et insérés à la bouche du calice, imbriqués ou rarement absents. Etamines peu ou nombreuses, insérées sur le tube calicinal. Ovaire supère, sessile ou stipité, avec 2-6 loges, rarement uniloculaire; ovules nombreux généralement dans chaque loge; styles simples ou absents; stigmatte capité. Fruit capsulaire, sec, déhiscent ou indéhiscent.

x. Feuilles parsemées de petits points creux, noirs. *Adenaria*, p. 251

x. Feuilles non parsemées de petits points creux noirs:

xx. Bord du calice double..... *Haitia*, p. 251

2x. Bord du calice simple:

3x. Hypanthium campanulé ou largement turbiné, devenant hémisphérique ou globulaire:

4x. Herbes:

5x. Capsule éclatant irrégulièrement *Ammannia*, p. 250

5x. Capsule à déhiscence septicide *Rotala*, p. 250

4x. Arbrisseaux, arbustes ou arbres:

5x. Étamines 8 (dans notre espèce) *Lawsonia*, p. 252

5x. Étamines plus de 8:

6x. Pétales ongulés *Lagerstroemia*, p. 251

6x. Pétales non ongulés *Ginoria*, p. 251

3x. Hypanthium allongé, tubulaire ou cylindrique:

4x. Fleurs régulières, calice tubulaire, légèrement courbé ou même éperonné ou gibbeux à la base *Cuphea*, p. 250

4x. Fleurs irrégulières, calice tubulaire, jamais courbé, ni gibbeux à la base *Lythrum*, p. 250

Rotala L.

Herbes coriacées, succulentes, généralement annuelles. Feuilles opposées, ou verticillées, étroites, entières, verticilles 3-10. Fleurs généralement solitaires dans l'axe des feuilles. Sépales 4, très petits, alternant avec de toutes petites dents; pétales généralement 4; étamines 4; style très court. Capsule à déhiscence septicide, de 2, parfois 4 valves.

R. ramosior (L.) Kœhne.

Ammannia L.

Herbes coriacées, succulentes. Feuilles opposées, étroites, souvent auriculées à la base. Fleurs disposées en cymes axillaires, parfois uniflores. Sépales 4, souvent accompagnés de petites dents; pétales 4, caducs ou absents; étamines 4-8; ovaire de 2-4 loges, parfois uniloculaire; style filiforme, parfois court; stigmate capité. Capsules déhiscences, parfois irrégulièrement.

A. coccinea Rottb.

A. latifolia L.

Lythrum L.

Herbes annuelles ou vivaces, rarement sous-arbrisseaux; branches quadrangulées. Feuilles opposées ou verticillées ou spiralées. Fleurs solitaires dans l'axe des feuilles ou disposées en épis ou en racemes souvent dimorphes ou trimorphes. Tube calicinal cylindrique, avec 8-12 côtes, avec 4-6 lobes et autant d'appendices dans les sinus; pétales 4-6, rarement absents; étamines 4-12, incluses ou exsertes; ovaire biloculaire, style filiforme. Capsule complètement enveloppée par le calice, à déhiscence septicide par 2 valves ou irrégulièrement.

L. lanceolatum Ell.

Cuphea Adans.

Herbes ou arbrisseaux. Feuilles opposées ou verticillées; verticilles 3-5. Fleurs irrégulières, solitaires ou racemeuses, les pédicelles entre les pétioles ou rarement axillaires. Tube calicinal allongé et semblable à la corolle, muni de côtes, éperonné ou gibbeux à la base, oblique à la bouche, avec 6 dents ou lobes et généralement autant de dents accessoires; pétales 6, inégaux, ou rarement 2, ou absents; étamines 11, rarement 9, 6 ou 4; filets courts; ovaire généralement supère, sessile, glandulaire à la base, inégalement biloculaire avec peu ou beaucoup d'ovules dans chaque loge; style grêle; stigmate capité, bilobé. Capsule oblongue, enveloppée par le calice, à déhiscence latérale.

C. ciliata (Sw.) Kœhne.

C. rotundifolia Kœhne.

C. urens Kœhne.

C. melanium (L.) R. Br.

C. cordifolia (Sw.) Kœhne.

C. micrantha H. B. K.

C. riparia Ekm. et Schmidt.

C. parsonsia (L.) R. Br.

C. ekmanii O. C. Schmidt.

Adenaria H. B. K.

Arbrisseaux ou arbustes couverts de glandres noires en forme de petits points. Feuilles opposées, presque sessiles, elliptiques ou lancéolées, aiguës ou acuminées, pubérulentes en dessous. Fleurs jaunes, disposées en cymes compactes, courtes axillaires. Parties florales 4-5; calice largement turbiné, non appendiculé; pétales légèrement exserts; étamines 7-12; ovaire généralement couvert de courts poils. Capsule indéhiscente.

A. floribunda H. B. K.

Ginoria Jacq.

Arbrisseaux, arbustes ou arbres généralement glabres. Feuilles coriacées, opposées. Fleurs en racemes ou ombelles, axillaires. Parties florales 4-6; calice dénué d'appendices; pétales grands; étamines nombreuses, parfois 10 à 23. Capsule avec 2-5 valves, parfois bilobées.

G. rohrii (Vahl.) Kœhne.

G. callosa O. C. Schmidt.

G. lanceolata O. C. Schmidt.

Haitia Urb.

Arbrisseaux d'Haïti, glabres, inermes. Feuilles décussées, subcoriacées; pétiole court. Inflorescence latérale ou en racemes courts, terminaux dans les petites branches ou presque ombellée, sessile ou pédonculée; bractées très petites; pédicelles allongés, uniflores, articulés et bi-bractéolés presque au sommet. Parties florales 6; tube calicinal herbacé plus élevé que les pétales, limbe double, les lobes externes entiers, ouverts, les lobes internes valvés, appendices absents; pétales grands, obovoïdes, membraneux; étamines 34-38 en 1 seule série, légèrement libres à la base en un tube court; filets filiformes; anthères oscillantes; ovaire sessile avec les lobes; style dépassant les étamines; stigmate frangé. Capsule déhiscence.

H. buchii Urb.

H. pulchra Ekm. et O. C. Schmidt.

Lagerstroemia L.

Arbrisseaux, arbustes ou arbres. Feuilles opposées ou les feuilles supérieures alternes. Fleurs disposées en panicules axillaires ou terminales, les pédoncules et les pédicelles avec des bractées caduques. Calice turbiné ou hémisphérique, souvent cannelé ou ailé, avec généralement 5-8 lobes; pétales 5-8, ongulés, le limbe souvent formé en zigzags ou frangé; étamines 15-200; ovaire sessile de 3-6 loges; style long. Capsule ligneuse, incomplètement enveloppée par le calice à déhiscence loculicide par 3-6 valves. Graines ailées.

L. indica L. «*Stragornia*.» Ornemental.

L. indica L. Var. *floribus albis*. «*Stragornia blanc*.» Ornemental.

Lawsonia L.

Arbustes ou arbres glabres; branches souvent spinescentes. Feuilles opposées; pétiole court. Fleurs en corymbes de peu ou de beaucoup de fleurs formant une panicule terminale. Tube calicinal très court ou absent, quadrangulé avec 4 lobes divergents, dénué d'appendices; pétales 4, avec onglet très court, ridés; étamines 8, parfois 4 ou 12, insérées à la base du tube calicinal, exertes; ovaire de 2-4 loges avec style long. Capsule incomplètement enveloppée par le calice, irrégulièrement déhiscente ou indéhiscente.

L. inermis L. «*Réséda*» Ornemental.

Famille 128. PUNICACEÆ

Arbrisseaux ou arbustes; branches souvent épineuses à l'extrémité. Feuilles généralement opposées, entières, exstipulées. Fleurs bisexuées, 1-5 ensemble sur l'extrémité des jeunes pousses axillaires. Réceptacle ou tube calicinal campanulé ou tubulaire, coriacé; les 5-7 sépales épais persistants sur le fruit; pétales 5-7, alternant avec les sépales et insérés sur le bord du réceptacle, ridés. Etamines nombreuses, tapissant l'intérieur du réceptacle; filets grêles. Ovaire infère, de plusieurs carpelles unis; style et stigmate 1. Fruit: une baie sphérique à peau épaisse, pluriloculaire. Graines entourées d'une pulpe juteuse.

Punica L.

Caractères de la famille.

P. granatum L. «*Grenade*» (Haïti); «*Granado*» en espagnol; «*Pomegranate*» en anglais. Alimentaire et ornemental.

Famille 129. LECYTHIDACEÆ

Arbres. Feuilles généralement grandes et frappantes, alternes, souvent pressées les unes contre les autres à l'extrémité des branches; stipules absentes. Fleurs bisexuées, régulières, solitaires ou en racemes, axillaires ou terminales. Sépales et pétales généralement 4-6 ou parfois pétales absents. Etamines nombreuses en plusieurs séries plus ou moins unies à la base, une partie parfois dépourvue d'anthères; disque intrastaminal souvent présent. Ovaire infère, de 2-6 loges ou plus; ovule 1 à plusieurs dans chaque loge. Fruit coriacé, une drupe ou une baie ou une capsule s'ouvrant par un opercule.

x. Fruit: une baie avec opercule ou une capsule operculée.

..... **Couroupita**, p. 252

x. Fruit: une baie sans opercule..... **Barringtonia**, p. 252

Barringtonia Forst.

Arbres. Fleurs en longues grappes pendantes; involucre et les 2 bractées situés à la base du pédoncule, squameux, caducs; réceptacle de la fleur ovale, ailé ou angulaire. Sépales 2-4, valvés et unis dans l'anthèse ou légèrement imbriqués; pétales 4, rarement 5-6; étamines toutes fertiles ou celles qui sont le plus à l'intérieur sans anthères; anthères cubiques ou oblongues; ovaire bi-quadriloculaire, dans chaque loge 2-9 ovules en 2 rangées (les ovules les plus inférieurs au milieu) suspendus de la partie supérieure de l'angle interne, avec raphé presque dorsal. Fruit ovale, quadrangulé ou muni de 4 ailes courtes, monosperme par avortement, ressemblant à une noix avec la couche interne pourvue de fibres dures.

B. speciosa Forst. Cultivé à Diquini; ornemental.

Couroupita Aubl.

Arbres. Fleurs en grappes. Calice caduc, corolle et ovaire 6 mères; tubes de l'androcée courts, en forme de plat, se développant d'un côté en une sorte

de plat large cochléariforme ou en forme de casque, les filets supérieurs libres s'avancent vers l'intérieur, tous fertiles; anthères divergeant en dessous; disque intrastaminal en forme de plat à gâteau (placentiforme); stigmate à 6 rayons; du milieu de l'axe creux au sommet et en forme de colonne dans les loges, les 2 bords des placentas recourbés, libres l'un de l'autre. Le bord du calice descend jusqu'au tiers ou à la moitié du fruit presque globulaire, seulement un très petit couvercle attaché à la colonne du placenta se détache tout autour; épicarpe libeux, mésocarpe juteux se liquéfiant à maturité, endocarpe corné. Endosperme spiralé ou en forme de fer à cheval; tigelle cylindrique quelque peu aussi longue que les cotylédons foliacés et frisés.

C. guianensis Aubl.

Famille 130. RHIZOPHORACEÆ

Arbrisseaux ou arbustes, rarement arbres très élevés. Feuilles généralement entières, rarement dentées ou crénelées, persistantes, souvent coriacées, généralement opposées et avec des stipelles caduques, rarement solitaires et sans stipelles. Fleurs petites ou moyennes, parfaites, rarement polygames par avortement, solitaires dans l'axe des feuilles ou disposées en épis, racemes, cymes ou panicules. Sépales 3-16, généralement 4-8, valvés, généralement charnus ou coriacés; pétales aussi nombreux que les sépales, libres, caducs, rarement absents. Etamines 8 ou davantage, parfois inégales, toutes généralement fertiles; anthères biloculaires, introrsées, à déhiscence longitudinale. Gynécée de 2-5 carpelles unis; ovaire infère ou semi-infère, de 2-5 loges, ou rarement de 6 ou de 1 loge; ovules 2 ou rarement 1 ou 4 ou davantage dans chaque loge. Fruit généralement une baie petite, juteuse, rarement une capsule à déhiscence tardive ou une drupe. Graines glabres, parfois arillées, très rarement ailées.

x. Etamines 8 (12). Fruit en forme de baie.

Graines non arillées..... **Rhizophora**, p. 253

x. Etamines 15-30. Fruit capsulaire. Graines arillées..... **Cassipourea**, p. 253

Rhizophora L.

Arbres, arbustes ou arbrisseaux avec une écorce astringente et des rameaux vigoureux. Feuilles opposées, entières; stipules allongées, interprétolaires, caduques. Fleurs de couleur crème ou jaune, 2 ou plusieurs sur des pédoncules bifurqués; hypanthium adné à la base de l'ovaire. Sépales 4, coriacés; pétales 4, émarginés, coriacés; étamines 4-12, alternant avec les pétales; filets courts; ovaire biloculaire, semi-infère; stigmate bilobé; ovules 2 dans chaque loge. Fruit baccaire, pendant, uniloculaire, coriacé.

R. mangle L. «*Manglier rouge*» (Haïti), «*Mangle*» ou «*Mangle colorado*» (St-Domingue).

Cassipourea Aubl.

Arbres ou arbustes glabres. Feuilles elliptiques, entières ou dentées. Fleurs blanches ou jaunâtres, solitaires ou généralement agrégées, axillaires. Sépales 4-5; pétales 4-5, spatulés; étamines 15-30; disque avec 15-30 lobes, les lobes tridentés; stigmate légèrement lobé. Fruit quelque peu charnu, à déhiscence septicide, tardive. Graine arillée, solitaire dans chaque loge.

C. obtusa Urb. «*Palo robinson*» (St-Domingue), d'après Urban.

Famille 131. COMBRETACEÆ

Arbustes ou arbres parfois grimpants, riches en tanin, parfois armés d'épines. Feuilles opposées ou alternes, entières, pétioles, simples, dépourvues de

stipules. Fleurs bisexuées, ou rarement unisexuées, généralement sessiles, disposées en épis, panicules, racemes ou capitules; réceptacle ou tube calicinal adné à l'ovaire. Sépales 4-5, les lobes généralement valvés; pétales 4-5, ou absents, généralement petits. Etamines aussi nombreuses ou 2 fois plus nombreuses que les sépales, insérées sur le calice. Ovaire infère, uniloculaire, généralement avec autant d'angles qu'il y a de sépales et alternant avec eux; ovules 2-5 ou rarement plus; style 1, grêle. Fruit: généralement sec, monosperme, indéhiscent ou incomplètement déhiscent.

x. Corolle absente:

2x. Calice décidu:

3x. Feuilles souvent agrégées à l'extrémité des branches:

4x. Calice appliqué directement sur l'ovaire. Fruit, une grande drupe angulaire ou comprimée.

Terminalia, p. 254

4x. Ovaire allongé en un support recourbé qui porte le calice. Fruit, une aggrégation de petites drupes squameuses, imbriquées.

Buchenavia, p. 254

3x. Feuilles non agrégées.

Conocarpus, p. 254

2x. Calice persistant.

Bucida, p. 255

x. Corolle présente:

2x. Calice persistant; Plantes dressées.

Laguncularia, p. 255

2x. Calice décidu. Plantes sarmenteuses (dans nos espèces):

3x. Plantes ornementales. Fleurs voyantes, rouges et blanches.

Quisqualis, p. 255

3x. Plantes sauvages. Fleurs peu voyantes.

Combretum, p. 255

Terminalia L.

Arbres ornementaux à fruits comestibles. Feuilles alternes, rarement opposées, mais agrégées à l'extrémité des rameaux; feuilles simples, entières, pétioles, sans stipules. Fleurs petites, parfaites, polygamo-dioïques, sous-tendues par de petites bractées décidues, généralement nées en épis peu compacts. Tube calicinal campanulé, à 5 lobes, généralement caduc; pétales absents; étamines 10, en 2 séries; ovules 2, ou rarement 3. Fruit: une drupe angulaire ou comprimée.

T. catappa L. «Amandier des Indes» ou «Zanmande» (Haïti), «Álmendro» (St-Domingue). Ornemental et alimentaire.

T. domingensis Urb.

T. intermedia (A. Rich) Urb. (comb. nov.).

Buchenavia Eichl.

Arbres ou arbrisseaux avec feuilles alternes, généralement agrégées à l'extrémité du rameau, souvent verticillées. Inflorescence généralement en épis, rarement en capitules; fleurs pentamères. Calice campanulé; pétales absents; filets généralement épais, courts, avec le connectif claviforme; ovules 2-3. Fruit, une drupe charnue.

B. capitata (Vahl.) Eichl. «Bois Margot» ou «Bois gris-gris».

Conocarpus L.

Arbrisseaux généralement dressés, parfois procombants, parfois arbres, croissant dans les marécages. Feuilles alternes, limbes entiers, coriacés; pétiole biglandulaire. Fleurs parfaites, très petites, verdâtres, disposées en capitules compacts, épillés ou paniculés; hypanthium aplati. Sépales 5, décidus;

étamines généralement 5, exertes; filets allongés; anthères cordées; styles pubescents; ovules 2 dans chaque loge. Fruit, une aggrégation de drupes squameuses, imbriquées.

C. erecta L. «Mangle» ou «Palétuvier» (Haïti), «Mangle» (St-Domingue).

C. erecta L. Var. *sericea* (Griseb. «Mangle» (St-Domingue).

Bucida L.

Arbustes ou arbres. Feuilles alternes, relativement petites, agrégées à l'extrémité des branches. Fleurs parfaites, vertes, disposées en épis simples ou ramifiés. Calice de 5 sépales couvert de poils très doux; hypanthium cylindrique; pétales absents; étamines 10, exertes. Fruit, une drupe ovoïde.

B. buceras L. «Bois gri-gris» ou «gris-gris des montagnes» (Haïti); «Caracol de Puerto-Rico» (St-Domingue).

Combretum L.

Arbres ou arbustes grimpants, parfois armés d'épines. Feuilles opposées, parfois verticillées, pétioles, entières. Fleurs polygamo-dioïques, disposées en épis ou racemes cylindriques ou unilatéraux. Tube du calice cylindrique ou angulé, rétréci au dessus de l'ovaire, le limbe campanulé, avec 4-5 lobes, décidu; pétales 5 ou 4, petits, insérés entre les lobes du calice; étamines 8-10, longues, exertes. Fruit coriacé, longitudinalement muni de 4-6 ailes, monosperme.

C. laxum Jacq. «Liane blanc» ou «Liane mimebi blanche».

C. cordatum G. Don.

C. eriopetalum (P. DC.) G. Don.

Laguncularia Gært. fil.

Arbustes ou arbres. Feuilles charnues, opposées, entières, les nervures peu apparentes; pétioles biglandulaires. Fleurs polygames, peu voyantes, disposées en épis simples ou composés. Hypanthium cylindrique ou presque cylindrique. Sépales 5, persistants; pétales 5, très petits, caducs; étamines 10, incluses; filets subulés, en 2 séries; anthères cordées; ovaire surmonté par un disque épigyné avec bord dentelé; style glabre; stigmate légèrement bilobé; ovules 2 dans chaque loge. Drupe coriacée, légèrement angulée.

L. racemosa (L.) Griseb. «Mangle» ou «Manglier blanc» (Haïti), «Mangle prieto» (St-Domingue), d'après Urban.

Quisqualis L.

Arbrisseaux grimpants ou semi-grimpants. Feuilles opposées. Fleurs voyantes, bisexuées, disposées en épis courts, axillaires ou terminaux. Réceptacle ou tube du calice développé en un long tube grêle au dessus de l'ovaire décidu, avec 5 petits sépales divergents ou recourbés; pétales 5; étamines 10; ovules 3 ou 4. Fruit sec et coriacé, avec 5 ailes ou 5 angles, s'ouvrant au sommet, le long des angles.

Q. indica L. «Pois et riz» Ornemental.

Famille 152. MYRTACEÆ

Arbrisseaux, arbustes ou arbres ou rarement herbes, généralement aromatiques. Feuilles généralement opposées, persistantes, rarement alternes ou verticillées, épaisses et généralement entières, à pétiole court, exstipulées, plus ou moins pellucides, ponctuées ou parsemées de petits points glandulaires. Fleurs parfaites, régulières, disposées de différentes façons, généralement pourvues de bractées. Réceptacle ou tube du calice plus ou moins adné à l'ovaire et

souvent allongé, sépales 4-5, généralement libres, persistants; pétales 4-5 ou parfois absents. Étamines nombreuses généralement, filets distincts ou partiellement unis. Ovaire infère ou partiellement infère de 1 — beaucoup de loges, avec 1 — beaucoup d'ovules dans chaque loge, style simple, stigmate généralement capité, entier. Fruit, une baie, une drupe, une capsule ou une noix.

x. Fruit, une baie ou une drupe indéhiscente:

2x. Embryon en forme de sabot ou spiralé:

3x. Testa de la graine corné:

4x. Sépales libres dans le bourgeon Myrtus, p. 256

4x. Sépales unis dans le bourgeon:

5x. Ovaire généralement biloculaire:

6x. Tube du calice prolongé au-dessus de l'ovaire Amomis, p. 257

6x. Tube du calice non prolongé au-dessus de l'ovaire Cryptorhiza, p. 257

5x. Ovaire généralement de 4-5 loges (rarement 2-7):

6x. Calice éclatant durant la floraison sous forme de capuchon Calyptropsidium, p. 257

6x. Calice non éclatant durant la floraison sous forme de capuchon Psidium, p. 257

3x. Testa de la graine membraneux Pimenta, p. 260

2x. Embryon droit:

3x. Radicule et cotylédons de longueur égale:

4x. Les loges de l'anthère sont placées dans le même plan:

5x. Sépales libres dans le bourgeon ou unis sur une très courte étendue:

6x. Ovaire biloculaire (3-4 loges); ovules 2, côte à côte dans chaque loge Myrcia, p. 258

6x. Ovaire imparfaitement biloculaire; ovule solitaire dans chaque loge Mozartia, p. 258

5x. Sépales unis dans le bourgeon à la base, ou complètement unis:

6x. Sépales s'ouvrant au moment de la floraison par des fentes longitudinales Plinia, p. 261

6x. Sépales éclatant au moment de la floraison par des fentes transversales, sous forme d'un capuchon Calyptranthes, p. 258

4x. Les 2 loges internes de l'anthère plus élevées que les 2 externes Gomidesia, p. 259

3x. Radicule plus courte que les cotylédons épaisement charnus:

4x. Inflorescence centripète. Hypanthium non développé au-dessus de l'ovaire:

5x. Limbes du calice déjà libres dans le bourgeon Eugenia, p. 259

5x. Limbes du calice unis dans le bourgeon Hottea, p. 261

4x. Inflorescence centrifuge. Hypanthium le plus souvent considérablement prolongé au-dessus de l'ovaire Syzygium, p. 260

x. Fruit, une capsule déhiscente Eucalyptus, p. 261

Genre non classifié Myrtekmania.

Myrtus L.

Arbustes ou arbres. Feuilles opposées, penninerves, entières. Fleurs solitaires dans les axes ou disposées en cymes pauciflores. Réceptacle ou tube

du calice turbiné avec 4-5 sépales; pétales 4-5, divergents; étamines nombreuses, en plusieurs séries, libres, plus longues que les pétales; anthères oscillantes; ovaire de 2-3 loges avec de nombreux ovules dans chaque loge. Fruit, une baie globulaire ou ovoïde, couronnée par les lobes persistants du calice. Graines solitaires ou nombreuses avec embryon charnu, courbé ou spiralé.

M. bahamensis (Kiaersk) Urb. (comb. nov.).

Amomis O. Berg.

Arbres ou arbustes très aromatiques. Feuilles coriacées, obovoïdes ou elliptiques, obtuses, à nervures finement réticulées; pétiole court. Fleurs blanches, pentamères, petites, disposées en cymes pluriflores dans les axes supérieurs; ovaire biloculaire avec 6-7 ovules dans chaque loge; stigmate suboblique, punctiforme. Fruit, une baie ovoïde. Embryon involuté, — spiralé.

A. caryophyllata (Jacq.) Kr. et Urb. «Bois d'Inde français» (Haïti), «Bay ou Bay-Rum tree» en anglais.

A. caryophyllata (Jacq.) Kr. et Urb. Var. grisea (Kiaersk) Krug. et Urb.

A. pauciflora Urb.

A. anisomera Urb. et Ekm.

A. ozua Urb. et Ekm. «Ozua» (St-Domingue).

A. hispaniolensis Urb.

Calyptropsidium Berg.

Présente les caractères du genre Psidium, s'en distingue par le calice qui, généralement au moment de la floraison éclate sous forme d'un capuchon, par suite d'une fissure irrégulière, presque circulaire, faite à la partie inférieure.

C. bracteosum Urb. Massif de la Hotte.

Cryptorhiza Urb.

Arbuste glabre et aromatique. Feuilles opposées, penninerves. Inflorescence paniculée, terminale; prophylls nulles sous le calice. Tube du calice globulaire, non développé au-dessus de l'ovaire, lobes 5, libres, inégaux, semi-orbitulaires ou triangulaires sur une grande étendue; filets nombreux, 4 séries, insérés au-dessus du limbe du calice au sommet de l'ovaire plan à l'extrémité, glabre, biloculaire; ovules 6-7 dans chaque loge, fixés sur des placentas entiers ou partiellement divisés, les ovules supérieurs faisant saillie, les latéraux subhorizontaux et les inférieurs pendants. Baie globulaire ou sphéroïdale, entourée du calice, (ou triangulaire et obsolet). Graines 1-3 dans chaque loge.

C. haïtiens Urb. «Malaguettes» Cultivé.

Psidium L.

Arbres, arbustes ou arbrisseaux. Feuilles opposées, glabres ou tomenteuses, penninerves. Fleurs généralement grandes, sur des pédoncules axillaires ou latéraux généralement unis — 3 flores. Réceptacle campanulé ou pyriforme, lobes 4-5, souvent fermés avant la floraison et s'ouvrant irrégulièrement; pétales 4-5, divergents; étamines nombreuses, en plusieurs séries libres, insérées sur le disque; ovaire généralement de 4-5 loges (2-7) avec de nombreux ovules dans chaque loge. Fruit, une baie globulaire ou pyriforme, couronnée avec les lobes persistants du calice.

P. acranthum Urb.

P. guajava L. «Gouyave» (Haïti), «Guava», en anglais.

P. trilobum Urb. et Ekm.

- P. guianense* Sw.
P. hotteanum Urb. et Ekm.
P. dictyophyllum Urb. et Ekm.

Myrcia P. DC.

Arbres, arbustes ou arbrisseaux. Fleurs petites, en panicules peu compactes, axillaires et terminales. Réceptacle turbiné ou hémisphérique, lobes 5 libres, ou si soudés, très courts; pétales 5, divergents; étamines nombreuses; filets et style très longs et minces; ovaire généralement biloculaire (rarement 3-4 loges), avec 2 ovules dans chaque loge; stigmate petit, capité. Fruit, une baie, généralement biloculaire.

- M. deflexa* (Poir.) P. DC.
M. splendens (Sw.) P. DC.
M. hotteana Urb. et Ekm.
M. citrifolia (Aubl.) Urb.
M. leptoclada P. DC. «Huesito» (St-Domingue).

Mozartia Urb.

Arbres petits. Feuilles opposées, penninerves. Inflorescence prenant naissance à la base ou à la partie inférieure des branches de l'année précédente dans l'axe des bractées, rarement terminale, paniculée; bractées triangulaires ou les supérieures lancéolées, décidues; pédicelles très courts ou absents; prophylles très petites, très décidues ou presque absentes; fleurs devenant blanches. Tube du calice obové, développé au-dessus d'un ovaire en forme de coupe, les segments du limbe 4-5, libres, très courts, très inégaux; pétales très inégaux; étamines insérées sur le bord du calice; ovaire glabre, imparfaitement biloculaire, cloisons non connées avec les parois de l'ovaire; ovule solitaire dans chaque loge, réniforme, inséré par la base à la partie externe et élargie des cloisons. Baie sphéroïdale, couronnée par le cal. Graines 1-2, fixées à la base du fruit, presque réniformes; testa osseux, lisse, avec des taches jaune foncé; embryon glandulaire-ponctué dans les fruits monospermes; cotylédons libres; radicule libre, allongée plus ou moins comprimée.

- M. abbottiana* Urb. (comb. nov.)

Calyptanthus Sw.

Arbres, arbustes ou arbrisseaux. Fleurs petites, disposées en cymes ou panicules axillaires et terminales. Réceptacle ou tube calicinal turbiné, limbe fermé dans le bourgeon, circumsissile et décidu dans l'anthèse; pétales 1 ou 2, ou absents. Fruit bacciforme, bi-triloculaire généralement monosperme ou disperme.

- C. picardæ* Krug. et Urb.
C. syzygium (L.) Sw.
C. pallens (Poir.) Griseb. «Arrayan» (St-Domingue).
C. sintenisii Kiaersk. «Limoncillo» (St-Domingue).
C. eriocephala Urb.
C. nummularia Berg.
C. ternifolia Urb. et Ekm.
C. sordida Urb. et Ekm.
C. arborea Urb. et Ekm.
C. hotteana Urb. et Ekm.
C. pitoniana Urb. et Ekm.
C. collina Urb.

- C. litoralis* Urb. et Ekm.
C. samuelssonii Urb. et Ekm.
C. densifolia Urb. et Ekm.
C. bracteosa Urb. et Ekm.
C. calophylla Urb. et Ekm.
C. mornicola Urb.
C. salicifolia Urb. et Ekm.
C. marmeladensis Urb. et Ekm.
C. chrysophylloides Urb. et Ekm.
C. chrysophylloides Urb. et Ekm. Var. *minor* Urb. et Ekm.
C. barkerii Urb. et Ekm.
C. ekmanii Urb.
C. selleana Urb. et Ekm.

Gomidesia O. Berg.

Présente les caractères du genre *Myrcia* avec la différence que l'anthère est oblongue-ovale avec des fissures ayant plus ou moins la forme d'une s renversée, parce que ces fissures sont dirigées dans la partie médiane supérieure de l'anthère vers l'extérieur et dans la partie médiane inférieure vers l'intérieur.

- G. lindeniana* Berg.

Eugenia L.

Arbres, arbustes, ou arbrisseaux. Inflorescence racémeuse, cymeuse, corymbeuse ou fasciculée ou les fleurs rarement solitaires. Tube calicinal globulaire ou turbiné, limbe généralement quadrilobé, les lobes imbriqués, généralement suborbiculaires; pétales 4, divergents, blancs; ovaire biloculaire. Fruit drupacé, ou bacciforme, contenant 1 ou quelques graines.

- E. melanadenia* Krug. et Urb.
E. picardæ Krug. et Urb.
E. reticularis Berg.
E. pilosula Krug. et Urb.
E. linearis L. C. Rich.
E. mornicola Urb.
E. odorata Berg.
E. pomifera (Aubl.) Urb. «Cerise marron»
E. pomifera (Aubl.) Urb. Var. *angustissima* (Berg.) Urb.
E. pomifera (Aubl.) Urb. Var. *latifolia* (Berg.) Urb.
E. mucronata Berg.
E. ehrenbergiana Berg.
E. intermedia Berg.
E. lineata (Sw.) P. DC.
E. lineata (Sw.) P. DC. Var. *racemosa* Berg.
E. isabeliana Kiaersk.
E. haïtiensis Krug. et Urb.
E. ligustrina (Sw.) Willd.
E. uniflora L.
E. aeruginea P. DC. «Brignolle» (Haïti), «Guasara» (St-Domingue).
E. christii Urb.
E. biflora (L.) P. DC.
E. biflora (L.) P. DC. Var. *ludibunda* (Bertero) Krug et Urb.
E. crenulata (Sw.) Willd. «Z'os douvant»
E. monticola (Sw.) P. DC. «Petit Bois d'Inde»
E. monticola (Sw.) P. DC. Var. *latifolia* (P. DC.) Krug et Urb.

E. buxifolia (Sw.) Willd. «Bois petites feuilles» (Haïti), «Escobon» (St-Domingue).

E. axillaris (Sw.) Willd.

E. glabrata (Sw.) P. DC. «Arrayan» (St-Domingue).

E. laevis Berg. «Gros petites feuilles»

E. rhombea Krug et Urb. «Bois myrte»

E. procera (Sw.) Poir.

E. pseudopsidium Jacq.

E. pseudopsidium Jacq. Var. *sintenisii* (Kiaersk) Krug et Urb.

E. floribunda West. «Bois Mulâtre» (Haïti).

E. heteroclita Tuss.

E. fragrans (Sw.) Willd. «Bois d'ine»

E. umbellulifera (H. B. K.) Krug et Urb.

E. jambos L. «Pomme rose» (Haïti), «Pomarosa» (St-Domingue).

E. chrootricha Urb. et Ekm.

E. abeggii Urb. et Ekm.

E. belladerensis Urb. et Ekm.

E. vanderveldei Urb. et Ekm.

E. brachyclada Urb. et Ekm.

E. malangensis Urb. et Ekm.

E. orthioneura Urb.

E. minguetii Urb.

E. lindahlia Urb. et Ekm.

E. esnardiana Urb. et Ekm. «Malaguettes» Plante médicinale.

E. cahosiana Urb. et Ekm.

E. confusa DC.

E. namophylla Urb. et Ekm.

E. polyclada Urb. et Ekm.

E. calumetæ Urb. et Ekm.

E. pitrensis Urb.

E. formonica Urb. et Ekm.

E. delpechiana Urb. et Ekm.

E. gonavensis Urb.

E. dictyophylla Urb.

E. plinioïdes Urb. et Ekm.

E. lineolata Urb. et Ekm.

E. tussacii Urb. et Ekm.

E. bicincta Urb. et Ekm.

E. perriniana Urb. et Ekm.

E. pitoniana Urb. et Ekm.

E. vigiensis Urb. et Ekm.

E. pitresia Urb.

Sizygium Gaertn.

Pas de disque staminal; sépales le plus souvent courts et larges ou presque complètement absents; pétales plus ou moins cimentés ou unis en forme de capuchon au moment de la floraison. Fleurs solitaires ou en panicules ombellées. Hypanthium le plus souvent non développé au-dessus de l'ovaire.

S. jambolanum (Lam.) P. DC.

Pimenta Lindl.

Arbres de 9 à 12 mètres de haut, les rameaux quadrangulaires. Feuilles pétiolées, oblongues ou ovales-oblongues, coriaces. Fleurs quadrimères, dis-

posées en cymes courtes, axillaires ou subterminales, couvertes de poils très doux. Ovaire biloculaire, ovule solitaire ou très rarement 2 ovules dans chaque loge. Fruit bacciforme, uni ou biloculaire avec 1 ou 2 graines, globulaire. Embryon en spirale.

P. officinalis Lindl. «Malaguettes» «Poivre Jamaïque» Cultivé; Diquini.

Plinia L.

Arbrisseaux dressés grêles. Fleurs quadrimères, rarement pentamères, en glomérules pluriflores, sessiles; bractées arrondies. Calice à tube court, turbiné, développé au-dessus de l'ovaire, enfermé dans le bourgeon; sépales valvés, libres seulement au sommet; durant l'anthèse les lobes inégaux sont profondément divisés; pétales petits; étamines nombreuses, plurisériées, libres; filets filiformes, courbes; anthères versatiles, à déhiscence loculicide, longitudinale; ovaire biloculaire, style filiforme, stigmaté petit; ovules 2 dans chaque loge. Fruit, une baie sphéroïdale avec 12 côtes plus ou moins remarquables. Graine solitaire, presque comprimée, testa adhérent à l'endocarpe; cotylédons libres;

P. icardiana Urb.

P. cidensis Urb.

P. haïtiensis Urb. et Ekm.

P. abeggii (Urb. et Ekm.) Urb. (comb. nov.).

P. ekmaniana Urb.

P. acutissima Urb.

P. caricensis Urb.

P. microcycla Urb.

Hottea Urb.

Arbres petits ou arbustes d'Hispaniola avec des poils très simples quand ils sont présents. Feuilles opposées, rarement tri-verticillées, penninerves, les nervures latérales font saillie des 2 côtés. Fleurs situées dans l'axe des feuilles, 1—plusieurs, ombelliformes, pédicellées, prophylls développées, mais peu nombreuses. Tube du calice légèrement obové, non développé au-dessus de l'ovaire, enveloppé dans le bourgeon, s'éloignant durant l'anthèse et formant 2 lobes, jusqu'au disque staminifère. Pétales 1—4, inégaux; étamines peu nombreuses en 2—3 séries; stigmaté punctiforme; ovaire biloculaire; ovules 6 dans chaque loge, horizontaux, fixés en 2 séries; placentas non saillants. Baie monosperme, endocarpe mince. Testa papyracé, adhérent tout autour de l'embryon; cotylédons apposés verticalement, connés tout autour du bord, libres à l'intérieur; radicule très courte, mamelliforme.

H. miragoane Urb. et Ekm.

H. torbeciana Urb. et Ekm.

H. crispula Urb. (comb. nov.).

Eucalyptus L'Her.

Arbres. Feuilles généralement alternes et verticales, rigides, panninerves, entières, celles des jeunes pousses parfois opposées, horizontales, sessiles et cordées. Fleurs 3 ou plus ensemble ou rarement solitaires, en ombelles ou capitules. Réceptacle ou tube calicinal turbiné ou campanulé, adné à la base de l'ovaire, la partie libre entière ou légèrement quadridentée; pétales unis aux lobes du calice formant une capsule à déhiscence transversale; étamines nombreuses, en plusieurs séries, généralement libres; ovaire de 3—6 loges avec de nombreux ovules dans chaque loge. Fruit, une capsule, entièrement ou partiellement close dans le tube du calice, déhiscence loculicide au sommet par 3—6 valves.

E. sp. Cultivé; Bayeux. Non encore identifié.

Famille 133. MELASTOMATACEÆ

Herbes, arbrisseaux, arbustes ou arbres. Feuilles opposées ou rarement verticillées, généralement pétioolées, entières, serrulées ou crénelées, généralement avec 3-9 nervures, exstipulées. Fleurs bisexuées, régulières, souvent voyantes; inflorescence variée. Tube du calice libre ou adné à l'ovaire, généralement avec 4-5 lobes; pétales aussi nombreux que les lobes du calice insérés sur la bouche du réceptacle, libres ou légèrement unis très rarement. Étamines aussi nombreuses ou deux fois plus nombreuses que les pétales et insérées avec eux, souvent inclinées ou déclinées, égales ou bien les étamines alternes parfois plus courtes; anthères avec connectifs particuliers et variés. Ovaire généralement infère avec 2 — plusieurs loges; ovules nombreux dans chaque loge; style 1; stigmat 1. Fruit: une baie ou une capsule à déhiscence irrégulière ou loculicide généralement enfermée dans le réceptacle.

- x. Feuilles avec 3 nervures ou plus. Fruit plurisperme. Embryon très petit:
 - 2x. Fruit capsulaire. Étamines le plus souvent inégales:
 - 3x. Graines spiralées ou recourbées:
 - 4x. Étamines égales ou presque égales: Tibouchina, p. 263
 - 4x. Étamines très inégales: Tibouchina, p. 263
 - 5x. Corolle obovée ou presque circulaire, tronquée au sommet ou arrondie: Acisanthera, p. 263
 - 5x. Corolle lancéolée, pointue à l'extrémité: Nepsera, p. 263
 - 3x. Graines dressées:
 - 4x. Connectif avec appendice dorsal: Meriania, p. 263
 - 4x. Connectif sans appendice dorsal, éperonné: Graffenrieda, p. 264
 - 2x. Fruit en forme de baie ou coriacé et se déchirant irrégulièrement:
 - 3x. Faisceaux vasculaires remarquables:
 - 4x. Inflorescence terminale:
 - 5x. Corolle campanulée par l'inclinaison des pétales; ovaire entièrement soudé au tube du calice: Charianthus, p. 264
 - 5x. Corolle non inclinée:
 - 6x. Ovaire entièrement soudé au tube du calice:
 - 7x. Ovaire de 5-15 loges: Conostegia, p. 264
 - 7x. Ovaire de 4 loges: Calycogonium, p. 266
 - 6x. Ovaire non entièrement soudé au tube du calice:
 - 7x. Segments du calice non appendiculés ou munis d'un appendice peu voyant:
 - 8x. Limbe du calice divergeant dans le fruit: Tetrazygia, p. 264
 - 8x. Limbe du calice non divergent:
 - 9x. Connectif appendiculé latéralement: Miconia, p. 265
 - 9x. Connectif non appendiculé: Mommsenia, p. 266
 - 7x. Segments du calice remarquablement appendiculés:
 - 8x. Fleurs 5-6 mères. Ovaire de 5 loges: Pachyanthus, p. 267
 - 8x. Fleurs 6-9 mères. Ovaire de 6-12 loges: Heterotrichum, p. 267

- 4x. Inflorescence latérale ou axillaire (rarement latérale dans Ossaea):
 - 5x. Pétales tronqués:
 - 6x. Filets articulés; anthères s'ouvrant par 1-2 grands pores; ovaire de 3-5 loges:
 - 7x. Tube du calice campanulé ou hémisphérique avec lobes obtus. Bord des feuilles non cilié: Mecranium, p. 267
 - 7x. Tube du calice obové-globulaire avec 4 petites dents. Bord des feuilles cilié: Ekmaniocharis, p. 267
 - 6x. Filets non articulés; anthères avec 1 pore très petit; ovaire de 3-9 loges: Clidemia, p. 268
 - 5x. Pétales aigus; fleurs petites; stigmates ponctués: Ossaea, p. 268
 - 3x. Faisceaux vasculaires ni remarquables, ni crustacés: Henriettella, p. 268
 - x. Feuilles avec une nervure. Ovaire adhérent plus ou moins au calice. Fruit: une baie. Graines 1-4, grandes: Mouriria, p. 269

Acisanthera Adans.

Plantes herbacées, généralement très ramifiées; tiges glandulaires, poilues. Feuilles pétioolées, ovoïdes — lancéolées, obtuses ou aiguës, serrulées. Fleurs solitaires; pétales roses ou pourpres. Fruit capsulaire.

A. quadrata Juss.

Nepsera Naud.

Herbes. Feuilles pétioolées, serrulées (5-7 nervures dans notre espèce) cordiformes. Fleurs blanches; étamines alternes, inégales; ovaire libre, sphérique, trilobulaire. Capsule trivalvée avec de courtes graines spiralées.

N. aquatica (Aubl.) Naud.

Tibouchina Aubl.

Arbrisseaux ou arbustes ou rarement herbes. Feuilles de 3-5 nervures, entières ou serrulées. Fleurs pentamères, solitaires ou en panicules terminales. Tube du calice oblong ou urcéolé, les limbes étroits, persistants ou décidus; pétales obovoïdes; étamines inégales ou subégales; anthères similaires; connectif développé au delà des loges, mais parfois très court aussi. Capsule pentavalvée.

T. longifolia (Vahl.) Baill. «Bois dents marron.»

Meriania Sw.

Arbustes ou arbres, glabres ou sétueux. Fleurs de grandeur moyenne, parfois voyantes, rarement petites, disposées en courtes panicules ou en cymes terminales ou axillaires ou encore solitaires ou au nombre de 3. Corolle blanche, jaune clair, rose ou pourpre; parties florales 5; réceptacle courtement campanulé ou semi-cylindrique, très rarement oblong-campanulé avec des bords très variés; anthères rostrées; connectif point ou très peu développé à la base, sans appendice au devant, derrière avec un éperon obtus ou aigu, généralement au dos avec un appendice parallèle à l'anthère; ovaire libre ou rarement soudé à la base du tube calicinal; carpelle généralement bivalvé au sommet. Capsule

enveloppée des lobes persistants du calice, généralement ombiliquée. Graines petites, oblongues — pyramidales.

M. ekmanii Urb.

M. involucrata (Desr.) Naud.

M. squamulosa Urb. et Ekm. Massif de la Hotte.

Graffenrieda DC.

Arbrisseaux glabres ou poudreux. Feuilles 3-9 nervures. Fleurs disposées en panicules terminales, blanches, jaunes ou pourpres, quadrimères ou pentamères. Tube calicinal oblong ou campanulé, avec les bords irréguliers ou pourvus de 4-5 dents; étamines avec des filets subulés; anthères recourbées; connectif peu ou non développé au dehors, au devant non appendiculé et derrière avec un éperon aigu; ovaire libre ou parfois légèrement soudé au tube du calice. Fruit capsulaire enveloppé par le bord du calice, souvent garni de côtes. Graines oblongues ou linéaires — pyramidales.

G. chrysandra (Griseb) Triana.

Conostegia D. Don.

Arbrisseaux ou arbustes. Feuilles grandes, pétioles. Fleurs généralement blanches, disposées en forme de panicules terminales. Parties florales 5-10; tube du calice campanulé ou subglobulaire; étamines 15, 25 ou davantage; anthères comprimées latéralement avec un connectif simple non développé en avant et dénué d'appendices; ovaire entièrement soudé au tube du calice avec 5-15 loges; style court et épais; stigmate généralement capité ou scutiforme. Fruit: une baie avec de nombreuses graines angulées, obovoïdes ou pyramidales.

C. subhirsuta P. DC.

C. elidemioïdes Ch. Wright.

C. hotteana Urb. et Ekm.

C. affinis Urb. Massif de la Hotte.

Charianthus D. Don.

Arbrisseaux ou arbustes, généralement glabres avec des branches presque rondes. Feuilles pétioles, coriaces. Fleurs grandes ou petites, écarlates ou pourpres, en panicules terminales ou en cymes disposées en forme de petits paniers. Fleurs quadrimères; tube calicinal en forme d'urne ou campanulé avec des limbes très courts quadrilobés ou encapuchonnés; étamines égales, connectif non développé en avant et dénué d'appendices; ovaire soudé au tube du calice. Fruit: une baie coriacée avec des graines pyramidales.

C. coccineus (L. C. Rich.) D. Don.

Tetrazygia L. C. Rich.

Arbrisseaux, arbustes ou arbres, avec des branches généralement farineuses et des feuilles nombreuses. Inflorescence terminale paniculée ou en forme d'urne ou en forme de petits paniers; fleurs peu voyantes, généralement blanches, quadrimères ou pentamères. Réceptacle ou tube du calice en forme d'urne ou campanulé, brodé, avec les extrémités allongées; connectif indistinctement éperonné au dos; ovaire soudé à moitié au tube du calice. Fruit: une baie quadriloculaire avec graines en forme de faucille ou de pyramide renversée.

T. crotonifolia (Desr.) P. DC.

T. elaeagnoides (Sw.) P. DC.

T. fuertesii Cogn.

T. longicollis Urb. et Cogn.

T. pallens (Spreng) Cogn.

T. bicolor (Mill.) Cogn.

T. macrocarpa Urb. et Ekm. Barahona.

T. humilis Urb. et Ekm. Massif de la Selle.

Miconia R. et P.

Arbrisseaux, arbustes ou arbres. Feuilles généralement pétioles, entières ou serrées. Fleurs plutôt petites, blanches, roses, pourpres ou jaunes; inflorescence variée. Lobes du calice 4-8, courts; pétales 4-8, divergents ou réfléchis; étamines 8-16, ou rarement plus, égales ou parfois légèrement inégales; anthères polymorphes, connectif légèrement développé à la base, appendiculé latéralement, rarement éperonné au dos; ovaire de 2-5 loges, rarement libres. Fruit: une baie sèche ou coriacée.

M. macrophylla (D. Don) Triana Melast.

M. dodecandra (Desr.) Cogn.

M. guianensis (Aubl.) Cogn.

M. impetiolaris (Sw.) D. Don, «Trois côtes» ou «Macrioi.»

M. ambigua (Bonpl.) P. DC.

M. punctata (Desr.) D. Don.

M. laevigata (L.) P. DC.

M. splendens (Sw.) Triana.

M. pteropoda Benth.

M. prasina (Sw.) P. DC.

M. lanceolata (Desr.) P. DC.

M. rubiginosa (Bonpl.) P. DC.

M. racemosa (Aubl.) P. DC.

M. favosa (Desr.) Naud.

M. desportesii Urb.

M. tetrastoma Naud.

M. rigida (Sw.) Triana.

M. calycina Cogn.

M. ferruginea (Desr.) P. DC.

M. multiglandulosa Cogn.

M. luteola Cogn.

M. fuertesii Cogn.

M. domingensis Cogn.

M. krugii Cogn.

M. viscidula Urb. et Cogn.

M. cubensis (Griseb.) Ch. Wright.

M. stenobotrys (L. C. Rich.) Naud.

M. buchii Cogn.

M. christii Cogn.

M. barkerii Urb. et Ekm.

M. subcompressa Urb.

M. rigidissima Urb. et Ekm.

M. selleana Urb. et Ekm.

M. albiviridis Urb. et Ekm.

M. adenocalyx Urb. et Ekm.

M. pyramidalis (Desr.) DC.

M. chrysophylla (L. C. Rich.) Urb.

M. staminea (Desr.) DC.

M. xenotricha Urb. et Ekm.

- M. microcarpa* DC.
- M. nematophora* Urb. et Ekm.
- M. abeggii* Urb. et Ekm.
- M. leptantha* Urb. et Ekm.
- M. ossaeifolia* Urb. et Ekm.
- M. tetrazygioïdes* Urb. et Ekm.
- M. plumerii* Urb. et Ekm.
- M. ottoschulzii* Urb. et Ekm. Santo Domingo.
- M. tetrandra* (Sw.) D. Don.
- M. markgrafii* Urb. et Ekm.
- M. coniophora* Urb. et Ekm.
- M. artibonitensis* Urb. et Ekm. Santo Domingo.
- M. basiliensis* Urb. et Ekm.
- M. niedenzuana* Urb. et Ekm.
- M. samanensis* Urb.
- M. haïtiensis* Urb. et Ekm.
- M. apiculata* Urb. et Ekm.
- M. leptoneura* Urb. et Ekm.
- M. azuensis* Urb. et Ekm.
- M. hypioïdes* Urb. et Ekm.

Mommsenia Urb. et Ekm.

Arbrisseaux. Feuilles courtement pétioles, entières, presque coriaces, Fleurs quadrimères, peu nombreuses, sessiles, disposées au sommet des branches, cachées par de petites bractéoles. Pétales rouges; tube calicinal cylindrique; étamines 8, égales; anthères exertes; connectif non développé en avant, ni appendiculé; déhiscence apicale par pores; ovaire adné au tube calicinal, avec 2-3 loges; ovules nombreux et plurisériés dans les loges; style presque dressé, glabre; stigmaté ponctué. Fruit ovoïde, charnu, non déhiscent. Graines cuneiformes; embryon dressé.

- M. apleura* Urb. et Ekm.

Calycogonium P. DC.

Arbrisseaux ou arbustes. Feuilles grandes, coriaces. Fleurs petites, solitaires ou peu nombreuses. Parties florales 4, rarement 5 ou 6; calice en forme d'urne, globulaire ou conique; pédoncule rond ou quadrangulaire; connectif non développé en avant et dénué d'appendices; ovaire entièrement soudé au tube du calice, avec le sommet renflé et généralement nu. Fruit: une baie, avec quelques graines en forme de pyramide.

- C. hispidulum* Cogn.
- C. calycopteris* (L. C. Rich) Urb.
- C. domatiatum* Urb. et Ekm.
- C. rhamnoides* Naud.
- C. turbinatum* Urb. et Ekm.
- C. brevifolium* Urb. et Ekm.
- C. ramossissimum* Urb. et Ekm.
- C. maculatum* Urb. et Ekm.
- C. rhomboïdeum* Urb. et Ekm.
- C. torbeccianum* Urb. et Ekm. Massif de la Hotte.
- C. ekmanii* Urb. Massif de la Hotte.
- C. apiculatum* Urb. et Ekm. Massif de la Hotte.

Pachyanthus A. Rich.

Arbrisseaux ou arbres. Feuilles coriaces, pétioles. Fleurs de grandeur moyenne, en panicules pauciflores, terminales, avec axes épais. Parties florales généralement 6; calice cylindrique, conique ou campanulé; pétales ongulés; connectif épais, non développé au dehors, muni au dos d'un éperon indistinct ou dénué d'appendices; ovaire soudé à moitié au tube du calice. Baie avec de grosses graines en forme de pyramide ou de faucille.

- P. tuerckheimii* Cogn.
- P. urbanianus* Cogn.
- P. blanchianus* (Urb.) Urb. et Ekm.

Heterotrichum P. DC.

Arbrisseaux ou arbustes, avec tiges hispides — sétueuses. Feuilles grandes, ovoïdes — cordiformes, plurinerves. Fleurs souvent voyantes, blanches ou roses, en panicules. Parties florales 6-8; calice campanulé ou globulaire, généralement avec une gorge brodée; pétales souvent ajustés à la base avec une couronne membraneuse; connectif épais, dressé, non développé en avant; ovaire plus ou moins soudé ou tout-à-fait libre. Fruit: une baie charnue ou coriaccée, avec de nombreuses graines, couronnée par le calice persistant.

- H. umbellatum* (Mill.) Urb.
- H. angustifolium* P. DC.

Mecranium Hook. f.

Arbrisseaux ou arbustes glabres. Feuilles coriaces. Inflorescence courtement paniculée, axillaire ou latérale. Fleurs quadrimères — pentamères; tube calicinal semi-globulaire ou ovoïde; anthères s'ouvrant par 1-2 grands pores; connectif allongé; filets articulés; ovaire soudé au tube du calice, avec 3-5 loges; styles courts, avec stigmates capités. Fruit: une baie avec de petites graines, généralement spiralées.

- M. amygdalinum* (Desr.) Ch. Wright, «Bois pigeon.»
- M. multiflorum* (Desr.) Triana.
- M. puberulum* Cogn.
- M. tuberculatum* Urb.
- M. ovatum* Cogn.
- M. birimosum* (Naud.) Triana.
- M. integrifolium* (Naud.) Triana.
- M. torbecianum* Urb. et Ekm.
- M. plicatum* Urb.
- M. haïtiensis* Urb.
- M. valde* Urb.
- M. alpestre* Urb. et Ekm.
- M. tricotatum* Urb. et Ekm.
- M. salicifolium* Urb.
- M. microdictyum* Urb. et Ekm.

Ekmaniocharis Urb.

Arbustes d'Haïti, glabres; rameaux cylindriques, obtus, angles au sommet obsoletés. Feuilles avec pétioles courts, ovées-cordées, coriaces, trinervées en dehors des nervures marginales, nervation très proéminente en dessous avec des soies et des poils sur le bord. Inflorescence axillaire, celle située aux nœuds très anciens paniculée, grêle; fleurs pédicellées, rouges, avec 2 bractéoles sous le calice. Tube du calice glabre, obové-globulaire, avec 4 petites dents; pétales 4, légèrement libres au sommet, entortillés dans le bourgeon,

obovés, nus au sommet; étamines 8, presque égales; filets linéaires; anthères oblongues-linéaires, dressées, presque tronquées au sommet, à déhiscence poricide; connectif linéaire légèrement prolongé à la base, fixé aux filets sans appendice; ovaire quadriloculaire, adhérent au milieu du tube du calice, s'étendant au sommet tout autour du style par plusieurs dents subulées, membraneuses; style de grosseur presque égale, stigmate insensiblement tronqué quelque peu plus étroit que le style.

E. crassinervis Urb. Morne La Hotte.

Clidemia D. Don.

Arbrisseaux couverts de poils compacts. Feuilles généralement grandes, pétiolées, avec 3-7 nervures. Fleurs petites, blanches, roses ou pourpres, disposées en capitules ou en panicules. Parties florales 4-5, très rarement 6; calice campanulé, allongé ou en forme d'urne, plus ou moins denté; pétales généralement insérés à la base avec une couronne membraneuse; connectif généralement un peu développé en avant, éperonné; ovaire plus ou moins soudé au tube du calice. Fruit baccaire, charnu, coriacé ou membraneux, couronné du tube calicinal persistant, souvent pourvu de soies. Graines variées.

C. hirta (L.) D. Don. «Guérit vite.»

C. strigillosa (Sw.) P. DC.

C. pusilliflora Cogn.

C. rubrinervis (Naud) Cogn.

C. plumosa (Desr.) P. DC.

C. rubripila Cogn.

C. domingensis (P. DC.) Cogn.

C. fuertesii Cogn.

C. tetraptera Cogn.

C. vegaensis Cogn.

C. tetragonoloba Cogn.

C. oligantha Urb.

C. capillaris (Sw.) Griseb.

C. erythropogon DC.

C. pycnantha Urb. et Ekm.

Henriettella Naud.

Arbres ou arbrisseaux cauliflores. Feuilles coriacées. Fleurs petites, blanches ou rosées, disposées en cymes agrégées. Parties florales 5, très rarement 4; calice campanulé, avec des limbes divergents; tronqués ou courtement lobés, munis de dents accessoires ou tubercules; étamines 10; anthères courtes, obtuses, non rostrées, recourbées, avec un connectif non développé en avant et dépourvu d'appendices à la base; ovaire complètement soudé au tube du calice. Fruit baccaire, charnu.

H. fascicularis (Sw.) Ch. Wright.

H. fascicularis (Sw.) Ch. Wright. Var. *sintenisii* Cogn.

H. reticulata Cogn.

H. ciliata Urb. et Ekm.

H. elliptica Urb.

H. barkerii Urb. et Ekm.

H. megaloclada Urb. et Ekm.

Ossaea P. DC.

Arbrisseaux ou sous arbrisseaux à feuilles coriacées ou membraneuses. Fleurs opposées ou agrégées ou, par réduction, solitaires. Parties florales 4-5,

rarement 6; tube calicinal oblong ou campanulé, généralement avec des bords développés en avant et munis de dents externes, dents internes parfois obsoletes; ovaire soudé au tube du calice; anthères linéaires ou même subulées; connectif non appendiculé, ou muni au dos d'un éperon gibbeux ou court peu apparent. Fruit baccaire, charnu, plurisperme.

O. scalpta (Vent.) P. DC.

O. domingensis Cogn.

O. lomensis Urb.

O. limoïdes Urb.

O. cinerea Cogn.

O. lima (Desr.) Triana.

O. acuminata P. DC.

O. scabrosa (L.) P. DC.

O. lanceolata Urb. et Ekm.

O. furfuracea Urb.

O. hybophylla Urb.

O. setulosa Urb.

O. abbottii Urb.

O. hotteana Urb. et Ekm.

O. rubrinervis Urb. et Ekm.

O. polychaete Urb. et Ekm.

O. curvipila Urb. et Ekm.

O. barahonensis Urb. et Ekm.

O. lanceifolia Urb.

O. ellipsoïdea Urb. et Ekm.

O. inæquidens Urb. et Ekm.

O. alloeotricha Urb.

O. marigotiana Urb. et Ekm.

O. humilis Urb. et Ekm.

O. micrantha (Sw.) Macf.

Mouriria Aubl.

Arbrisseaux ou arbres glabres. Feuilles coriacées, nervure médiane très voyante; feuilles penninerves ou trinerves, sessiles, entières. Fleurs petites, fasciculées dans les axes, pentamères; limbes du calice cupuliformes; pétales aigus ou acuminés; étamines 10, égales. Fruit baccaire, globulaire, avec 1-4 graines.

M. domingensis (Tuss.) Spach, «Cormier.»

M. myrtilloïdes (Sw.) Poir. Massif de la Hotte, près de Corail.

M. brachypoda Urb. et Ekm. Massif du Nord, près de Hinche.

M. hotensis Urb. et Ekm. Près de Jérémie.

M. lancifolia Urb. et Ekm. Près de Jérémie.

M. gonavensis Urb. et Ekm.

Famille 134. OENOTHERACEÆ

Herbes annuelles ou vivaces, rarement arbrisseaux ou arbustes. Feuilles alternes ou opposées. Fleurs bisexuées, régulières ou parfois irrégulières, périgynes ou épigynes, axillaires, épiées ou racemeuses. Tube du calice adné à l'ovaire et souvent développé au delà de l'ovaire, le limbe de 2-6 lobes (généralement 4); pétales 4, rarement davantage ou moins, généralement ongués, convolutés dans le bourgeon. Étamines aussi nombreuses ou 2 fois plus nombreuses que les pétales, insérées avec eux sur le sommet du tube calicinal

ou sur un disque. Ovaire de 2-4 loges, avec de nombreux ovules; style 1, stigmates 1-4. Fruit généralement une capsule, rarement une baie ou une noix. Reconnaissable par le plan numérique (2-4) des fleurs et l'ovaire infère avec de nombreux ovules.

x. Fruit capsulaire:

2x. Graines garnies d'une touffe de poils soyeux. *Epilobium*, p. 270

2x. Graines dénuées d'une touffe de poils soyeux:

3x. Étamines 3-6. *Ludwigia*, p. 270

3x. Étamines 8-12. *Jussiaea*, p. 270

x. Fruit, une baie pulpeuse. *Fuchsia*, p. 270

Jussiaea L.

Herbes vivaces ou plantes arbustives avec tiges dressées ou rampantes. Feuilles alternes, généralement entières. Fleurs parfaites, axillaires; sépales 4-6, aigus, persistants; pétales 4-6 (rarement davantage), blancs ou jaunes; étamines 8-12, en 2 rangées; ovaire de 4-6 loges; stigmate de 4-6 lobes. Capsule cylindrique ou angulée ou garnie de côtes, déhiscence, généralement avec de nombreuses graines.

J. peruviana L.

J. erecta L.

J. leptocarpa Nutt.

J. repens L.

J. suffruticosa L.

Ludwigia L.

Plantes généralement vivaces, aquatiques ou semi-aquatiques; herbes petites, souvent rampantes, parfois flottantes. Feuilles opposées ou alternes. Fleurs solitaires et axillaires ou agrégées en épis ou capitules terminaux, généralement peu voyantes. Parties florales 3-6; étamines aussi nombreuses que les segments du calice; corolle petite ou absente. Capsule courte, à déhiscence longitudinale ou par pores au sommet.

L. palustris (L.) Ell.

L. repens Sw.

Epilobium L.

Herbes ou sous-arbrisseaux, parfois annuels, dressés, procombants ou rampants. Feuilles alternes ou opposées, dentées ou entières. Fleurs solitaires et axillaires ou disposées en épis ou racemes terminaux. Hypanthium développé au-delà de l'ovaire; sépales 4, décidus; pétales 4, souvent crénelés; étamines 8; ovaire à 4 loges; stigmate claviforme ou quadrilobé. Capsule étroite, allongée, quadrilatérale, loculicide.

E. coloratum Muhl.

E. domingense Urb.

Fuchsia L.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles simples, opposées, alternes ou verticillées, entières ou dentées. Fleurs petites ou grandes, roses, rouges ou pourpres, parfaites ou unisexuées, axillaires, racemeuses, ou paniculées. Hypanthium court ou allongé, le limbe avec 4 lobes divergents; pétales 4, parfois 5 ou absents; étamines 8, généralement inégales, souvent exsertes. Fruit: une baie quadriloculaire avec peu à beaucoup de graines.

F. pringsheimii Urb.

F. triphylla L.

Ordre XXXIV. UMBELLALES

Herbes, arbustes, arbres ou sarments. Feuilles alternes ou opposées; limbes le plus souvent lobés, divisés ou composés. Fleurs parfaites, polygames ou dioïques, agrégées de façon distincte, mais généralement en ombelles. Hypanthium présent. Calice de 5 sépales relativement petits environnant l'hypanthium; corolle de 5 pétales. Androcée d'autant d'étamines qu'il y a de sépales ou de pétales. Gynécée de 2 carpelles unis ou rarement plus ou parfois unicarpellaire. Ovaire infère, 1 — plusieurs loges, parfois surmonté d'un stylopodium; stigmates terminaux ou introrsés. Fruit en forme de drupe ou de baie ou sec et un crémocarpe avec carpelles lisses ou épineux, garnis de côtes ou ailés.

x. Fruit en forme de drupe ou de baie. Gynécée de 1-plusieurs carpelles; si bi-carpellaire, stigmates introrsés:

2x. Ovule avec un raphé dorsal. Feuilles le plus souvent opposées; limbes entiers ou dentés simplement 137. *Cornaceae*, p. 276

2x. Ovule avec un raphé ventral. Feuilles le plus souvent alternes; limbes lobés ou composés 135. *Araliaceae*, p. 271

x. Fruit sec, un crémocarpe. Gynécée bi-carpellaire; stigmates terminaux 136. *Umbelliferae*, p. 272

Famille 135. *ARALIACEAE*

Arbustes ou arbres, rarement herbes, parfois épiphytes; tiges parfois épineuses. Feuilles alternes ou verticillées, simples ou composées, stipulées, petites, verdâtres ou blanchâtres. Calice très petit, adné à l'ovaire, le bord denté ou obsolete, court; pétales généralement 5, valvés ou imbriqués. Étamines généralement aussi nombreuses que les pétales et alternant avec eux, attachées sur un disque épigyne. Ovaire infère, avec 1 — beaucoup de loges; ovule 1 dans chaque loge, pendant; styles aussi nombreux que les loges ou carpelles de l'ovaire. Fruit: une baie ou une drupe.

x. Pétales valvés dans le bourgeon avec base large, pointus:

2x. Ovaire de 2-4 loges *Didymopanax*, p. 272

2x. Ovaire de 5 loges ou plus:

3x. Fleurs stipitées avec pédoncules non articulés ou fleurs sessiles:

4x. Fleurs pédonculées, ombellées *Gilibertia*, p. 272

4x. Fleurs sessiles, capitées *Oreopanax*, p. 271

3x. Fleurs stipitées avec pédoncules articulés *Polyscias*, p. 272

x. Pétales imbriqués dans le bourgeon avec base large *Sciadodendron*, p. 272

Oreopanax Dcne. et Pl.

Arbustes ou arbres, parfois épiphytes. Feuilles à long pétiole, entières, lobées ou composées-digitées. Fleurs capitées, polygame-dioïques, les capitules racemeux ou paniculés. Calice entier ou presque entier; pétales 4-7, généralement 5, très rarement plus, valvés; étamines aussi nombreuses que les pétales; ovaire généralement pentaloculaire (rarement 6-7 loges ou parfois 12, rarement aussi 1-2 ou 3-4 loges); styles libres ou plus ou moins soudés. Fruit bacciforme avec 2-7 loges.

O. capitatum (Jacq.) Dcne et Pl. «Bois d'Anjou» (Haïti), «Palo de viento» ou «Vibona» (St-Domingue).

Gilibertia R. et P.

Arbustes ou arbres glabres. Feuilles simples, entières ou trilobées, avec un long pétiole. Fleurs parfaites ou polygames, disposées en ombelles paniculées ou ombellées; bractées très petites ou absentes. Calice entier ou muni de 5-8 petites dents; pétales 5-8; ovaire de 5-8 loges. Fruit charnu, avec 5-8 loges.

G. arborea (L.) E. March. «Bois négresse» (Haïti), «Lengue de vaca» ou «Ramon de vaca» (St-Domingue), d'après Urban.

G. selleana Urb. et Ekm.

G. brachypoda Urb.

Polyscias Forst.

Arbustes et arbres avec herbage aromatique âcre, le plus souvent glabres. Feuilles variées tendant à être polymorphes, 1-5 pinnées. Les espèces cultivées fleurissent rarement. Fleurs très petites, en ombelles ou capitules, parfois en épis, assemblées en panicules ou autrement sur des pédicelles articulés, quadrimères ou généralement pentamères. Calice denté ou réduit à un bord tronqué; pétales valvés; ovaire 5-8 loges avec styles généralement aussi nombreux que les loges.

P. pinnata Forst. «Paresseux.» Cultivé dans les jardins.

P. fruticosa (L.) Harms. «Paresseux.» Cultivé.

P. guilfoylei Bailey, «Paresseux.» Cultivé.

P. balfouriana Bailey, «Paresseux.» Cultivé.

P. filicifolia (Moore) Bailey, «Paresseux.» Cultivé.

Didymopanax Dcne. et Pl.

Arbustes ou arbres. Feuilles généralement composées-digitées, rarement simples; folioles pétiolées, le plus souvent entières, rarement denticulées. Fleurs parfaites ou polygames, disposées en ombelles paniculées (parfois en courtes grappes); bractées petites ou absentes. Calice entier, petit ou muni de 5 dents; pétales 5, valvés; étamines 5, avec des filets courts et de grandes anthères ovoïdes; ovaire généralement biloculaire, rarement avec 3-4 loges; styles 2, distincts ou plus ou moins soudés à la base ou au milieu ou parfois plus haut, rarement 3-4 styles libres. Fruit charnu à parois minces, biloculaire (elliptique ou cordiforme) ou avec 3-4 loges (avec 3-4 sillons).

D. morotoni (Aubl.) Dcne. et Pl.

D. tremulum Krug. et Urb. «Bois trembler» (Haïti), «Palo de viento» (St-Domingue).

Sciadodendron Griseb.

Grand arbrisseau ou arbre élevé atteignant parfois 9 mètres, généralement avec quelques branches épaisses; écorce lisse et pâle. Feuilles avec long pétiole, se composant de nombreuses petites folioles ovées, glabres, serrées. Fleurs ombellées, disposées en double ombelle; pédoncule non articulé. Bord du calice presque entier; pétales 10-12, ovales-linéaires, imbriqués; étamines 10-12; ovaire presque globulaire de 10 à 12 loges.

S. excelsum Griseb. «Ouane primaire» mis pour «Juan primero.»

Famille 136 UMBELLIFERÆ

Herbes ou rarement arbrisseaux possédant une huile volatile; tiges généralement creuses. Feuilles alternes, généralement composées, parfois toutes basilaires ou rarement opposées; limbes plus ou moins disséqués ou dentés ou entiers. Inflorescence ombellée, généralement composée, les ombelles parfois raccourcies en capitules, l'ombelle principale généralement sous-tendue

par des bractées qui forment un involucre, les ombellules sous-tendues par des bractéoles formant les involuclles. Fleurs petites, généralement bisexuées ou polygames. Calice de 5 sépales, très petits, ressemblant à des dents ou absents; corolle de 5 pétales valvés, insérée sur un disque, qui couronne l'ovaire. Androcée de 5 étamines insérées avec les pétales. Ovaire infère, biloculaire (1 loge) chaque loge avec 1 graine; styles 2, leurs bases généralement unies et épaissies. Fruit sec, un crémocarpe, de 2 carpelles unis, se séparant à maturité, comme 2 méricarpes ailés ou munis de côtes, semblables à des akènes. Graines avec péricarpe et testa unis.

x. Endocarpe ligneux, tube oléifère obsolète ou absent:

2x. Fruit fortement aplati latéralement:

3x. Involucre absent. Fruit dénué de côtes secondaires et de réticulations **Hydrocotyle**, p. 275

3x. Involucre voyant. Fruit pourvu de côtes secondaires et de réticulations **Centella**, p. 275

2x. Fruit souvent turgide et à peine aplati **Spananthe**, p. 276

x. Endocarpe parenchymateux, tubes oléifères distincts:

2x. Inflorescence en masses sphériques; fleurs agrégées en capitules compacts **Eryngium**, p. 273

2x. Inflorescence manifestement ombellée:

3x. Graines sans épines:

4x. Graines concaves:

5x. Fruit avec diamètre de coupe transverse beaucoup plus grand que le diamètre de coupe longitudinale **Conium**, p. 274

5x. Diamètre longitudinal plus grand que le diamètre transverse **Arracacia**, p. 274

4x. Graines plates:

5x. Les côtes latérales et les 3 côtes dorsales égales, coupe transverse semi-circulaire:

6x. Côtes légèrement développées: 7x. Pétales jaune verdâtre **Petroselinum**, p. 276

7x. Pétales blancs ou crème:

8x. Pétales plans **Pedinopetalum**, p. 275

8x. Pétales non plans **Apium**, p. 274

6x. Côtes très développées **Feniculum**, p. 274

5x. Côtes latérales beaucoup plus larges que les 3 côtes dorsales **Pastinaca**, p. 274

3x. Fruit avec épines:

4x. Dents du calice saillantes. Fruit aplati sur les côtés. Face de la graine profondément sillonnée **Torilis**, p. 275

4x. Dents du calice obsolètes. Fruit aplati au dos. Face de la graine plate **Daucus**, p. 274

Eryngium L.

Herbes bisannuelles ou vivaces souvent rigides avec tiges dressées ou rampantes. Feuilles alternes ou verticillées, parfois basilaires; limbes épineux, dentés, lobés ou incisés, ou rarement entiers. Fleurs en épis denses, capités ou allongés, bractées de l'involucre variées, souvent colorées, ressemblant aux feuilles. Sépales rigides, aigus ou en forme d'épines; pétales 5, prolongés en pointe infléchie. Fruit ovoïde — obovoïde, légèrement aplati sur les côtés; carpelles avec des côtes obsolètes et 5 tubes oléifères. Graines légèrement aplatis.

E. foetidum L. «Coulante» (Haïti), «Culantro» (St-Domingue).

Conium L.

Herbes élevées, glabres, vivaces. Feuilles décomposées, pinnées, les segments pinnatifides et dentés. Fleurs blanches, en ombelles composées, à nombreux rayons; bractées et bractéoles peu nombreuses. Fruit largement ovoïde, comprimé sur les côtés et plus ou moins rétréci à la commissure; carpelles avec 5 côtes, dénués de tubes oléifères.

C. maculatum L.

Arracacia Bancroft.

Herbes vivaces étroitement apparentées au genre **Conium**. Feuilles composées — pennées ou décomposées. Dents du calice très petites ou absentes; pétales larges, acuminés et infléchis, blancs — brun pourpre. Fleurs en grandes ombelles composées.

A. xanthorrhiza Bancr. «Panème» Alimentaire.

Apium L.

Herbes caulescentes, annuelles ou vivaces. Feuilles alternes; limbes pinnés ou décomposés ternés; folioles dentées ou incisées. Fleurs en ombelles composées; involucre présents ou absents. Hypanthium tronqué ou presque tronqué; pétales blancs, larges, infléchis au sommet. Fruit quelque peu aplati sur les côtes, lisse ou tuberculé; carpelles pentagones ou munis de 5 côtes avec 1 tube oléifère dans chaque intervalle ou 2 dans la face interne. Graines cylindriques ou légèrement angulées.

A. ammi (L) Urb.

A. graveolens L. «Céleri.» Alimentaire.

Foeniculum L.

Herbes caulescentes, glabres, dressées, bisannuelles ou vivaces, généralement aromatiques. Feuilles alternes, décomposées-pinnées, les segments linéaires ou filiformes. Fleurs jaunes ou jaunâtres en ombelles nues, composées; involucre et involucelles absents. Hypanthium tronqué; disque avec un stylopodium vigoureux, conique; styles courts. Fruit allongé, glabre, presque cylindrique; carpelles aplatis au dos et munis de 5 côtes saillantes, tubes oléifères solitaires dans les intervalles et 2 sur le côté interne.

F. officinale All.

F. vulgare Mill. «Anis.»

Pastinaca L.

Herbes élevées, bisannuelles ou vivaces; racines épaisses. Feuilles composées pinnées. Fleurs parfaites, jaunes ou rouges, en ombelles composées; involucre et involucelles généralement absents. Hypanthium tronqué; disque avec un stylopodium déprimé. Fruit glabre, ovale ou oblong, très aplati au dos; carpelles avec les côtes dorsales et contiguës grêles et les ailes latérales minces; tubes oléifères solitaires dans les intervalles et 2-4 dans la face interne. Graines plates.

P. sativa L. «Persil marron.»

Daucus L.

Herbes caulescentes, annuelles ou bisannuelles avec feuillage grossier pubescent. Feuilles alternes, décomposées-pinnées. Fleurs en ombelles divergentes composées; involucre et involucelles variés ou absents. Hypanthium tronqué ou subtronqué; sépales obsoletés; pétales blancs ou rarement colorés, souvent inégaux, plus larges au dessus du milieu, infléchis au sommet; disque généralement pourvu d'un stylopodium déprimé ou conique. Fruit plus long que large,

aplatis dorsalement; carpelles avec 5 côtes principales et 4 côtes secondaires ailées qui sont armées d'une rangée de poils durs; tubes oléifères solitaires sous les côtes secondaires et 2 dans la face interne.

D. carota L. «Carotte.» Alimentaire.

Torilis Adans.

Herbes annuelles, caulescentes, avec feuillage pubescent. Feuilles alternes, composées-pinnées. Fleurs disposées en ombelles composées-capitées ou divergentes; involucre de peu de bractées ou absents, involucelles de bractées étroites. Sépales saillants, aigus; pétales souvent inégaux, obovoïdes ou cunéaires, infléchis au sommet; disque avec un stylopodium conique. Fruit aplati sur les côtés, épineux; carpelles avec 5 côtes principales et 4 côtes secondaires ailées; tubes oléifères solitaires sous les côtes secondaires et 2 dans la face interne. Graines avec faces sillonnées.

T. anthriscus (L) Benth.

Pedinopetalum Urb. et Wolff.

Herbes vivaces pluri ou multicaules, glabres. Feuilles tri-bipennetisséquées ou 3-4 — ternatisséquées, les segments excessivement étroits. Ombelles composées, les ombelles inférieures en dichasis, les supérieures en monochasis, ombellules involucrées; fleurs blanchâtres, hermaphrodites. Dents du calice nulles; pétales ovales ou ovales-oblongs, légèrement ou non onguiculés, plats, ni courbés, ni repliés au sommet, traversés par une nervure jaune. Fruit ovoïde, comprimé latéralement, manifestement atténué au sommet, acuminé, non serré à la commissure glabre et uni; section transversale du méricarpe (cylindrique) pentagone, très légèrement comprimée sur les côtés, plane à la commissure, les côtes filiformes, visibles, obtuses, les côtes latérales bordent la commissure, les dorsales un peu contiguës entre elles. Carpophore comprimé, rigide, légèrement bifide au sommet. Graines en forme de méricarpe; cristaux d'oxalate de calcium répandus tout autour du carpophore présents dans l'endosperme.

P. domingense Urb. et Wolff.

Hydrocotyle L.

Herbes vivaces, croissant dans les endroits humides; tiges rampantes. Feuilles alternes, une à chaque nœud, avec long pétiole; limbes entiers ou lobés, palminerves, parfois attachés au pétiole en forme d'une pelte. Bractées de l'involucre obsoletés ou absentes; fleurs parfaites ou unisexuées, peu voyantes, disposées en ombelles pédonculées, souples ou prolifères. Sépales manifestes; pétales blancs, aigus, valvés; disque plat ou presque plat. Fruit lenticulaire, aplati latéralement, orbiculaire ou déprimé, lisse; carpelles avec 5 côtes distinctes, avec une couche de tissus oléifères au-dessous de l'épiderme. Graines lenticulaires.

H. verticillata Thunbg.

H. umbellata L.

H. pusilla A. Rich.

H. hirsuta Sw.

H. lanipes Urb. et Ekm.

Centella L.

Herbes vivaces avec rhizomes rampants ou horizontaux. Feuilles agrégées aux nœuds avec de longs pétioles dressés; limbes entiers ou dentés palménerves. Bractées de l'involucre 2-4, petites; fleurs disposées en ombelles capi-

tées avec longs pédoncules. Hypanthium tronqué; sépales obsolètes; pétales blancs, obtus, imbriqués; disque plat ou concave. Fruit lenticulaire, aplati sur les côtés, suborbiculaire, cordé ou reniforme, lisse; carpelles dépourvus de grands tubes oléifères, les côtes saillantes s'anastomosent. Graines lenticulaires.

C. asiatica (L.) Urb.

Spananthe Jacq.

Arbustes ou arbrisseaux dressés, à tige élevée, bifurquée au sommet. Feuilles à long pétiole, avec une courte gaine ciliée, cordiformes — effilées, serrées, avec une petite couronne de cils à la base divergente. Fleurs en ombelles simples, avec long pédoncule, dans l'axe des feuilles et dans la bifurcation de la tige, avec une couronne de bractées linéaires remarquables. Fleurs jaune blanc, avec long pédoncule, le plus souvent toutes fertiles. Calice à segments courts, pentadentés; pétales ovales, quelque recourbés au sommet uninerves; disque de 2 petits cercles aplatis, enveloppé étroitement dans le fruit d'un calice comprimé en forme de collier. Fruit sec, fortement comprimé au dos, ovale-pointu; toutes les côtes dépourvues de tubes oléifères. Graines aplaties dorsalement, elliptiques-pointues.

S. paniculata Jacq.

Petroselinum Hoffm.

Herbes annuelles, bisannuelles ou vivaces, avec 1-3 feuilles composées pinnées, les segments dentés et coupés. Fleurs verdâtres — jaunes ou rougeâtres, disposées en ombelles composées; involucre avec quelques bractées; involucelles avec de nombreuses petites bractées lancéolées. Fruit ovoïde, comprimé latéralement, les carpelles voûtés extérieurement et séparément ne sont contigus qu'à la base et au sommet.

P. sativum Hoffm. «Persil.»

Famille 137. CORNACEÆ ou GARRYACEÆ

Arbrisseaux ou arbustes. Feuilles généralement opposées, entières, décidues ou persistantes, exstipulées. Fleurs petites, polygames, dioïques ou bisexuées. Calice avec 4-5 dents ou absent; pétales 4-5 ou absents, valvés. Etamines généralement aussi nombreuses que les pétales, insérées avec eux à la base d'un disque. Ovaire infère, généralement avec 1-3 loges, plus rarement 4-5 loges, très rarement 6-10 loges; ovules généralement solitaires dans chaque loge (2 ovules dans notre genre). Fruit: une baie ou une drupe, avec 1-3 graines, très rarement plus.

Garrya Dougl.

Arbrisseaux ou arbustes. Feuilles persistantes, opposées pétiolées, entières, coriaces. Fleurs petites, dioïques, en racemes ressemblant à des chatons. Les fleurs staminées pédicellées, les fleurs pistillées sessiles ou subsessiles; les fleurs staminées avec 4 sépales valvés; pétales absents; étamines 4; les fleurs pistillées dépourvues de périanthe. Fruit: une baie monosperme ou disperme.

G. fadyenii Hook. «Bois amer.»

Ordre XXXV. ERICALES

Herbes, sous-arbrisseaux, arbustes ou arbres. Feuilles alternes, souvent persistantes, souvent réduites à des écailles; limbes généralement coriacés. Fleurs principalement parfaites et complètes, régulières ou presque régulières. Calice de 2-8, souvent de 5 sépales partiellement unis; corolle de 2-8 souvent

5 pétales plus ou moins unis ou très rarement distincts. Androcée formé d'autant d'étamines qu'il y a de pétales ou deux fois autant, parfois partiellement réduit à des staminodes, le plus souvent libre de la corolle. Gynécée de plusieurs carpelles unis; ovaire supère ou infère, avec 1 — plusieurs loges; styles unis. Fruits variés: capsule, baie ou drupe.

x. Corolle formée de pétales essentiellement distincts. Plantes herbacées

138. *Pyrolaceæ*, p. 277

x. Corolle de pétales remarquablement unis. Arbustes ou arbres

139. *Ericaceæ*, p. 277

Famille 138. PYROLACEÆ

Herbes vivaces généralement persistantes avec des rhizomes allongés, branchus. Feuilles basilaires ou très rapprochées les unes des autres; limbes épais, entiers ou dentés. Fleurs parfaites, souvent légèrement irrégulières, solitaires ou en racemes ou corymbes terminaux. Calice de 4-5 sépales persistants; corolle souvent blanche ou rose de 4-5 pétales distincts ou légèrement soudés. Etamines 2 fois plus nombreuses que les pétales; filets généralement subulés; anthères introrsées, s'ouvrant par pores ou par fentes. Carpelles 4-5, unis; ovaire supère de 4-5 loges; styles unis, parfois déclinés; stigmathe pentalobé; ovules très nombreux, anatropes. Fruit: une capsule valvée de 4-5 loges, à déhiscence loculicide. Graines très petites, nombreuses.

Chimophila Pursh.

Plantes suffrutescentes, avec rhizomes rampants. Feuilles opposées ou subverticillées, coriaces, persistantes, serrées. Fleurs parfaites en ombelles ou racemes terminaux, pauciflores. Sépales 5; pétales 5; étamines 10, les anthères s'ouvrant par des tubes terminaux; style presque obsolete; stigmathe pelté, avec 5 rayons. Fruit: une capsule pentaloculaire.

C. domingensis Blake.

Famille 139. ERICACEÆ

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux ou arbres. Feuilles alternes, rarement opposées, persistantes, coriaces, dépourvues de stipules, entières ou serrées. Fleurs parfaites, disposées généralement en racemes ou en panicules. Calice de 4-7 sépales, distincts ou partiellement unis; corolle de 4-7 pétales distincts, unis. Etamines aussi nombreuses ou 2 fois plus nombreuses que les lobes de la corolle; anthères biloculaires, souvent appendiculées. Ovaire de 2-6 loges; styles unis; stigmathe capité ou pelté; ovules généralement nombreux, anatropes. Fruit: une capsule, une baie ou une drupe.

x. Ovaire supère, non adhérent au calice:

2x. Fruit: une capsule *Lyonia*, p. 277

2x. Fruit: une baie *Gaultheria*, p. 278

x. Ovaire infère, soudé au calice:

2x. Corolle en forme d'urne, campanulée ou rotacée *Vaccinium*, p. 278

2x. Corolle tubulaire, bombée à la base ou cylindrique avec bord court de 4-5 lobes:

3x. Etamines 4-8. Corolle délicate *Sophoclesia*, p. 278

3x. Etamines 10. Corolle grande *Thibaudia*, p. 278

Lyonia Nutt.

Feuilles généralement persistantes, souvent couvertes de poils. Calice à 5 lobes, en forme de plat; corolle globulaire — oblongue, avec de petits bords; anthères obtuses ou parfois éperonnées; placenta central. Fruit, une capsule avec 5 valves.

- L. heptamera* Urb.
L. dictyoneura Urb.
L. truncata Urb.
L. haïtiensis Urb.
L. tippenhaueri Urb.
L. tinensis Urb.
L. eggersii Urb.
L. tuerckheimii Urb.
L. costata Urb.
L. buchii Urb.
L. darrasiana Urb. et Ekm.
L. plumerii Urb. et Ekm.
L. alpina Urb. et Ekm.
L. brachycarpa Urb. et Ekm.
L. angulata Urb. et Ekm.
L. acutifolia Urb. et Ekm.
L. microcarpa Urb. et Ekm.
L. furcyensis Urb.

Gaultheria L.

Arbrisseaux à feuilles persistantes, alternes, coriées. Fleurs solitaires dans l'axe ou disposées en cymes. Calice souvent sous-tendu par des bractées; sépales plus longs que le tube calicinal; corolle campanulée ou urcéolée à 5 lobes divergents; étamines 10, incluses; filets adnés à la base du tube de la corolle; anthères généralement avec 2 barbes; disque à 10 lobes; ovaire 5 loges et 5 lobes, glabre; stigmates entiers; ovules nombreux dans chaque cavité. Fruit, une baie charnue, enfermée dans le calice acrescent.

- G. coccinea* (L.) Urb.
G. domingensis Urb.

Vaccinium L.

Arbrisseaux dressés ou grimpants. Feuilles alternes, décidues ou persistantes. Fleurs disposées en racemes axillaires ou terminaux ou solitaires. Calice avec 4-5 lobes courts; corolle urcéolée, cylindrique, campanulée ou en forme de roue, à 4-5 lobes; étamines 8-10; anthères parfois pourvues de 2 barbes sur la partie dorsale; ovaire infère, de 4-5 loges ou rarement 8-10 loges par l'intrusion de la côte médiane de chaque carpelle; ovules nombreux ou peu nombreux dans chaque loge. Fruit, une baie encapuchonnée par le calice persistant.

- V. cubense* (A. Rich.) Griseb.

Thibaudia H. B. K.

Arbrisseaux souvent épiphytes. Feuilles entières, légèrement coriées, avec un court pétiole. Fleurs disposées en racemes axillaires ou terminaux. Hypanthium circulaire ou en forme de coupe, les bords courts; corolle conique avec les bords très courts; étamines généralement 10; filets plus ou moins unis; anthères non éperonnées. Graines angulées.

- T. domingensis* Urb.

Sophoclesia Kltzsch.

Tube calicinal circulaire — globulaire; corolle tubulaire-convexe, avec les bords dentés; étamines 4-8, aussi longues que les pétales; ovaire 2-4 loges; ovules nombreux sur les placentas basilaires.

- S. domingensis* Urb. et Ekm.

Ordre. XXXVI. PRIMULALES

Herbes, arbustes, arbres ou sarments. Feuilles alternes ou opposées, parfois toutes basilaires; limbes le plus souvent entiers. Fleurs parfaites ou polygamodioïques. Calice de 4 — plusieurs sépales unis partiellement; corolle de 4 — plusieurs pétales unis partiellement ou distincts, ou absents. Androcée formée d'autant d'étamines qu'il y a de pétales ou de sépales et parfois accompagnés d'autant de staminodes, partiellement adnés à la corolle. Gynécée de 4-6 carpelles unis ou rarement plus; ovaire supère généralement, le plus souvent uniloculaire; styles unis. Fruit capsulaire ou drupacé.

- x. Herbes. Ovules ou graines non immergés.
 Fruit capsulaire..... 142. *Primulaceæ*, p. 281
 x. Arbustes ou arbres. Ovules et graines immergés. Fruit drupacé:
 2x. Staminodes situés aux sinus des lobes de la corolle. Fruit contenant peu ou beaucoup de graines..... 140. *Theophrastaceæ*, p. 279
 2x. Staminodes absents. Fruit renfermant une seule graine..... 141. *Myrsinaceæ*, 280

Famille 140. THEOPHRASTACEÆ

Arbustes ou arbres. Feuilles alternes ou pseudo-verticillées, entières ou serrées; stipules absentes. Fleurs parfaites, racemeuses, en ombelles, régulières, généralement pentamères. Lobes du calice libres ou légèrement connés, imbriqués, arrondis au sommet; corolle gamopétale, infundibuliforme ou rotacée, charnue. Etamines 5; staminodes 5, présents. Styles simples; stigmate entier ou presque entier. Fruit baccaire ou drupacé.

- x. Staminodes insérés à la base du tube cylindrique de la corolle..... *Theophrasta*, p. 279
 x. Staminodes insérés sur le tube de la corolle:
 2x. Staminodes non pétaloïdes. Fleurs polygamodioïques; tube de la corolle charnu..... *Clavija*, p. 280
 2x. Staminodes pétaloïdes. Fleurs hermaphrodites; tube de la corolle non charnu..... *Jacquinia*, p. 279

Theophrasta L.

Arbustes avec tronc dressé, simple, garni au sommet d'écaillies épineuses. Feuilles agrégées au sommet, à pétiole court, allongées, oblongues, dentées, épineuses. Fleurs parfaites, pentamères, voyantes, blanches, nombreuses, disposées en racemes courts, couronne cylindrique — campanulée, avec des segments courts, arrondis, distants; filets adnés à la base de la couronne; connectif en forme de langue; staminodes squamiformes; ovaire supère; ovules nombreux. Fruit drupacé avec peu de graines.

- T. jussiaei* Lindl. «Coque molle.» ou «Ptit coco.»

- T. americana* L. «Coque molle,» (Haïti), «Guayaba de indio» (St-Domingue).

Jacquinia L.

Arbustes ou arbres. Feuilles entières, persistantes, rigides, chacune terminée par une épine rigide; pétiole court. Fleurs terminales jaunes ou orange, pentamères. Lobes de la corolle divergents, staminodes insérés sur le tube de la corolle, ressemblant aux lobes de la corolle, mais plus petits. Fruit ovoïde ou globulaire, grand, cuspidé, avec peu de graines.

- J. berterii* Spreng. «Bois bandé.»

- J. berterii* Spreng. Var. *acutifolia* Griseb.

- J. berterii* Spreng. Var. *portoricensis* Urb. Var. *angustior* Urb.

- J. incrustata* Urb.

- J. barbasco* (Loefl.) Mez.
J. linearis Jacq.
J. eggersii Urb.
J. eggersii Urb. Var. *intermedia* Urb.
J. keyensis Mez.
J. sphaeroïdea Urb.
J. polyphleba Urb. et Ekm.
J. stenophylla Urb.
J. dichotoma Urb. et Ekm.
J. comosa Urb. et Ekm.
J. barahonensis Urb. et Ekm.

Clavija Ruiz. et Pav.

Arbres ou arbustes glabres ou garnis d'écaillés épineuses. Feuilles alternes ou verticillées, entières ou dentées. Fleurs blanches, jaunes ou orange, disposées en grappes axillaires, le plus souvent pendantes. Corolle rotacée ou campanulée-rotacée avec des segments charnus; filets insérés dans le tube de la corolle, unis parfois chez les fleurs mâles à l'ovaire en un tube, toujours libres chez les fleurs femelles; ovaire des fleurs femelles fusiforme, rétréci en un style court. Fruit un peu arrondi; endosperme axile.

C. domingensis Urb. et Ekm.

Famille 141. MYRSINACEÆ

Arbustes ou arbres. Feuilles alternes, entières, crénelées ou serratées, ponctuées, lignées; stipules absentes. Inflorescence racémeuse, corymbeuse, cymeuse ou agrégée sur des éperons écaillés; fleurs régulières, parfaites ou polygamo-dioïques. Parties florales 4-5; calice infère, les segments libres ou légèrement connés, généralement ponctués; pétales généralement unis; corolle rotacée, les lobes valvés ou convolutés en forme de spirale. Étamines aussi nombreuses que les segments de la corolle et opposées à ces segments, généralement attachées à la corolle. Styles simples; stigmates punctiformes ou capités. Fruit, une baie ou une drupe.

- | | |
|---|----------------------------|
| x. Placenta avec de nombreux ovules plurisériés; style long, grêle..... | <i>Ardisia</i> , p. 280 |
| x. Placenta avec quelques ovules unisériés; style absent ou court: | |
| 2x. Inflorescence en racemes plus ou moins allongés ou en panicules racémeuses composées: | |
| 3x. Style peu allongé, grêle; stigmate punctiforme | <i>Parathesis</i> , p. 281 |
| 3x. Style absent ou très court; stigmate non punctiforme: | |
| 4x. Fleurs parfaites..... | <i>Vegaea</i> , p. 281 |
| 4x. Fleurs dioïques..... | <i>Wallenia</i> , p. 281 |
| 2x. Inflorescence en ombelles courtes | <i>Rapanea</i> , p. 281 |

Ardisia Sw.

Arbres ou arbustes glabres ou légèrement poilus. Feuilles alternes, coriaces, entières ou rarement crénelées ou dentées. Fleurs petites, blanches ou rosées, disposées en panicules ou en cymes ombellées, parfaites ou polygamo-dioïques, généralement pentamères. Calice persistant; filets courts, adnés à la gorge de la corolle rotacée; anthères sagittées — lancéolées; style court ou allongé, avec stigmate punctiforme ou discoïde. Fruit en forme de pois.

- A. obovata* Desv.
A. escalloniaoides Cham et Schlecht.

- A. fuertesii* Urb.
A. angustata Urb. «Quatre chemins.»
A. picardæ Urb. «Bois le tremble,» d'après Urban.
A. guadalupensis Duchass.
A. brachypoda Urb.

Parathesis Hook. f.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles pétiolées, entières ou crénelées. Fleurs petites, pentamères, en panicules terminales ou axillaires, généralement roses. Sépales très petits, connés au-dessous; corolle rotacée, les lobes allongés ou oblongs, valvés. Fruit petit, globulaire, monosperme.

P. serrulata (Sw.) Mez. «Raisin marron» (Haïti), «Jalapon» (St-Domingue), d'après Urban.

Wallenia Sw.

Arbres ou arbustes glabres. Feuilles entières, coriaces. Fleurs blanches ou jaunâtres, dioïques. Fleurs mâles: calice irrégulier, semi-oblong ou cylindrique, avec 3-4 lobes; corolle tubulaire de 3-4 lobes; étamines surpassant la couronne; pistillodium avec style allongé. Fleurs femelles à moitié aussi grandes que les fleurs mâles, avec calice court cupuliforme et une plus courte couronne qui surpasse légèrement le calice; staminodes petits, enveloppés par la corolle, ovaire avec style court, mais avec un stigmate qui surpasse les fleurs.

W. laurifolia (Jacq.) Sw. «Raisin marron» ou «Bois crapaud» (Haïti), «Caimoni» (St-Domingue).

- W. laurifolia* (Jacq.) Sw. Var. *raunkiaeri* Urb.
W. urbaniana Mez.
W. ekmanii Urb.
W. apiculata Urb.
W. illicifolia Urb. et Ekm.
W. aquifolia Urb. et Ekm.

Vegaea Urb.

Arbres glabres. Feuilles entières, rigides, coriaces, sessiles, allongées. Inflorescence au sommet des rameaux ou dans l'axe des bractées solitaires ou ombellée et pauciflore; bractées persistantes; fleurs pédonculées, blanches, hermaphrodites. Parties florales 5, rarement 6; sépales libres, plus ou moins ponctués; pétales connés, arrondis, égaux; étamines adnées à la base du tube de la corolle; filets glabres; ovaire glandulaire, ponctué; stigmate tronqué.

V. pungens Urb.

Rapanea Aubl.

Arbustes ou arbres. Feuilles entières. Fleurs petites, agrégées dans l'axe des feuilles, quadrimères ou pentamères, bractéolées. Sépales légèrement connés, munis de petits cils; pétales légèrement connés, divergents ou recourbés; étamines insérées dans la gorge de la corolle. Fruit sec ou charnu, monosperme.

- R. ferruginea* (R. et P.) Mez. «Bois savanne» ou «Bois plomb.»
R. guianensis Aubl.
R. magnoliafolia Urb. et Ekm.

Famille 142. PRIMULACEÆ

Herbes annuelles et vivaces, rarement ligneuses. Feuilles alternes, opposées ou verticillées, parfois toutes basilaires, simples ou lobées; stipules ab-

sentes. Fleurs bisexuées, régulières, solitaires ou ombellées, à l'extrémité d'une hampe ou en racemes terminaux ou axillaires, panicules ou épis, ou solitaires dans les axes. Calice généralement pentamère et persistant; corolle gamopétale ou rarement absente, généralement pentalobée. Etamines 5, opposées aux lobes de la corolle, épipétale, parfois staminodes présents; filets distincts ou unis à la base. Ovaire supère, rarement semi-infère, uniloculaire, avec de nombreux ovules sur un placenta libre central; style et stigmate 1. Fruit, une capsule déhiscence.

- x. Lobes de la corolle imbriqués..... **Samolus**, p. 282
 x. Lobes de la corolle valvés ou convolutés..... **Anagallis**, p. 282

Anagallis L.

Herbes caulescentes, annuelles, rarement vivaces, souvent glabres. Feuilles généralement opposées ou verticillées, entières. Fleurs sur des pédoncules axillaires grêles. Sépales 5, unis en dessous, étroits, persistants; corolle rotacée, lobes 5, généralement entiers, convolutés; étamines 5, adnées à la base de la corolle; filets grêles, parfois pubescents; ovaire uniloculaire, styles filiformes, stigmate capité, ovules semi-anatropes dans un placenta subglobulaire. Capsule subglobulaire circomsissile. Graines nombreuses.

- A. arvensis** L. Var. *phoenicea*. Gren. et Godr.
A. pumila Sw.

Samolus L.

Herbes caulescentes, annuelles ou vivaces. Feuilles alternes, variées; limbes entiers. Fleurs blanches ou rose, en racemes simples, ou paniculées, avec ou sans bractées. Sépales persistants unis à la base; corolle périgyne; tube très court, les lobes du limbe imbriqués; étamines 5, adnées au tube de la corolle, alternant parfois avec 5 staminodes étroits dans les sinus des lobes de la corolle; anthères cordées, dressées; ovaire uniloculaire; stigmate obtus et capité; ovules nombreux dans un placenta subglobulaire. Capsules nues, allongées, pentavalvées au sommet. Graines nombreuses.

- S. floribunda** H. B. K.

Ordre XXXVII. PLUMBAGINALES

Herbes vivaces ou rarement annuelles, généralement acaules ou plantes ligneuses avec tiges dressées ou grimpantes. Feuilles variées; pétiole dilaté à la base ou entourant la tige à la base comme les feuilles. Fleurs parfaites, régulières, disposées en épis, capitules et panicules. Calice avec bractées à la base, tubulaire ou infundibuliforme, pentadenté ou pentalobé, avec 5-15 côtes, plissé, souvent scarieux et coloré; corolle de 5 pétales hypogynes, unis en tube ou connés seulement à la base. Etamines 5, opposées aux pétales, hypogynes ou insérées sur la corolle. Ovaire supère, uniloculaire, avec un ovule; styles 5, séparés ou unis. Fruit généralement enveloppé par le calice, déhiscent ou indéhiscent.

Famille 143. PLUMBAGINACEÆ

Caractères de l'ordre.

Plumbago L.

Caractères de l'ordre.

- P. scandens** L. «Herbe au diable.»
P. capensis Thumb. «Forget me not.» Ornemental.

Ordre. XXXVIII. EBENALES

Arbustes ou arbres. Feuilles alternes, opposées ou verticillées, parfois persistantes; limbes simples, généralement entiers. Fleurs parfaites, monoïques ou dioïques. Calice de 3-12 sépales partiellement unis; corolle de 3-12 pétales partiellement unis. Androcée formé d'autant d'étamines qu'il y a de lobes dans la corolle ou parfois le double ou plus, parfois accompagnées de staminodes. Gynécée de 3 — plusieurs carpelles; ovaire supère ou infère; styles et stigmates distincts ou unis; ovules solitaires ou plusieurs dans chaque loge de l'ovaire. Fruit: une capsule ou une baie.

- x. Styles ou stigmates distincts. Fleurs le plus souvent monoïques ou dioïques; étamines généralement libres de la corolle..... 145. **Ebenaceæ**, p. 287
 x. Styles ou stigmates unis. Fleurs le plus souvent parfaites; étamines portées généralement sur la corolle:
 2x. Etamines aussi nombreuses que les lobes de la corolle..... 144. **Sapotaceæ**, p. 283
 2x. Etamines 2 fois plus nombreuses que les lobes de la corolle ou plus:
 3x. Etamines plurisériées..... 146. **Symplocaceæ**, p. 287
 3x. Etamines unisériées..... 147. **Styracaceæ**, p. 288

Famille 144. SAPOTACEÆ

Arbustes ou arbres, parfois armés d'épines; sève souvent laiteuse. Feuilles alternes, entières, pétioles, généralement coriaces; stipules absentes. Fleurs parfaites, régulières, solitaires ou fasciculées dans l'axe des feuilles, petites, blanches ou verdâtres. Sépales 4-12, imbriqués; corolle gamopétale; appendices souvent présents entre les lobes. Etamines aussi nombreuses que les lobes de la corolle, nées sur la corolle, généralement alternant avec les staminodes. Ovaire de 4-12 loges; styles unis; ovule solitaire. Fruit: une baie ou une drupe, petit ou grand.

- x. Lobes de la corolle dépourvus d'appendices dorsaux:
 2x. Staminodes absents..... **Chrysophyllum**, p. 286
 2x. Staminodes présents:
 3x. Ovaire avec 10-12 loges..... **Achras**, p. 284
 3x. Ovaire avec 6- moins de loges:
 4x. Ovaire avec 2, rarement 3 loges..... **Paralabatia**, p. 284
 4x. Ovaire avec 4-6 loges:
 5x. Calice avec 4 lobes (2+2)..... **Labatia**, p. 284
 5x. Calice avec plus que 4 lobes:
 6x. Calice avec 8-10 lobes..... **Calocarpum**, p. 284
 6x. Calice avec 5, rarement 6 lobes:
 7x. Graines avec endosperme:
 8x. Lobes de la corolle entiers:
 9x. Nervures tertiaires distinctes des nervures secondaires..... **Sideroxylon**, p. 285
 9x. Nervures tertiaires peu distinctes des nervures secondaires..... **Micropholis**, p. 286
 8x. Lobes de la corolle avec deux appendices entre eux:
 9x. Ovaire glabre. Endosperme abondant..... **Dipholis**, p. 285
 9x. Ovaire poilu. Endosperme peu abondant; ou absent..... **Bumelia**, p. 285

- 7x. Graines sans endosperme..... *Lucuma*, p. 284
 x. Lobes de la corolle avec 2 larges appendices dorsaux..... *Mimusops*, p. 286

Achras. L.

Arbres, feuilles agrégées vers l'extrémité des rameaux. Fleurs presque sessiles, 6-12 ensemble dans l'axe des feuilles caduques. Sépales 10, imbriqués en plusieurs séries; corolle avec 5 lobes imbriqués plus longs que le tube; étamines 5, alternant avec 5 staminodes allongés; ovaire villeux, pentaloculaire. Fruit: une baie oblongue ou ovoïde.

A. zapota L. «Sapotille.» Comestible.

Calocarpum Pierre.

Arbres avec jus laiteux, la couronne arrondie ou déprimée; écorce rouge brun, raboteuse. Feuilles décidues, pétiolées, obovées, arrondies, ou aiguës au sommet, atténuées à la base, pubescentes au dessous quand elles sont jeunes, mais bientôt glabres, les nervures latérales distantes, parallèles. Fleurs réunies en masse sphérique, subsessiles sur des branches privées de feuilles. Sépales 8-10, soyeux; corolle blanche, pentalobée. Fruit globulaire ou ovoïde, pointu au sommet, la pelure brune, écaillée, la pulpe rose ou rougeâtre.

C. mammosum (L.) Pierre, «Sapotier» (Haïti), «Sapote» (St-Domingue), d'après Urban. Alimentaire.

Lucuma Juss.

Arbres ou arbustes avec jus laiteux. Feuilles pétiolées, agrégées vers l'extrémité des rameaux. Fleurs pédicellées, solitaires ou fasciculées dans les axes. Sépales 4-6; corolle urcéolée ou campanulée avec 4-5 lobes; étamines 4-5, alternant avec de petits staminodes, allongés ou squameux; ovaire poilu à la base, pentaloculaire (rarement 4-6 loges); stigmate court et lobé. Fruit, une baie avec graines elliptiques ou globulaires.

L. domingensis Gaertn. «Jaune d'œuf.» Alimentaire.

L. cuprea Urb. et Ekm.

L. serpentaria H. B. K. «Jaune d'œuf.» Ornemental.

Paralabatia Pierre.

Arbrisseaux, arbustes ou arbres. Lobes du calice 4-5, imbriqués; lobes de la corolle 4-5 plus longs que le tube; étamines 4-5, épipétales; filets très courts, insérés au sommet du tube; anthères ovoïdes, plus courtes que les lobes de la corolle, fendues au dedans; staminodes 4-5, subulés, insérés dans les sinus de la corolle; ovaire hirsute de 2 loges, rarement triloculaire; style court; ovule solitaire, fixé à un axe très court à la base de la loge. Baie monosperme, subglobulaire, avec des poils brun foncé; péricarpe de 2 mm. d'épaisseur, mésocarpe laiteux, granulé, mi-charnu, mi-dur, endocarpe luisant.

P. fuertesii Urb. «Cuero de puerco» (St-Domingue).

Labatia Sw.

Arbres avec feuilles oblongues — lancéolées, aiguës, quelque peu ondulées au bord. Fleurs situées dans les nœuds au dessus des cicatrices; fleurs polygames, petites, agrégées, avec pédoncule souvent court. Sépales 2+2; corolle avec 4 lobes arrondis; étamines libres à la base de la corolle, staminodes pétaloïdes et au bord de la corolle, entre les lobes, mais quelque peu plus courts; ovaire globulaire, avec 4 rainures profondes, quadriloculaire, poilu;

style avec 4 rainures légères et stigmate quadrilobé. Fruit: une baie de 4-1 graines, avec exocarpe petit, rugueux, et poilu et endocarpe mince jauné brun. Graine ovoïde.

L. sessiliflora Sw.

L. hotteana Urb. et Ekm.

Sideroxylon L.

Arbres ou arbustes. Feuilles, alternes, coriaces, parfois plutôt minces. Fleurs petites, parfois polygames, généralement agrégées, axillaires ou latérales. Sépales 5-6, ovés ou obovés, généralement obtus, fortement imbriqués; lobes de la corolle 5-6, généralement obtus; étamines 5-6, incluses, adnées à la base des lobes de la corolle ou sur le tube, opposées aux lobes; anthères à déhiscence longitudinale, staminodes 5-6, squameux ou pétaloïdes, entiers ou dentés; ovaire de 5 loges (ou rarement 4-2 loges); style variable. Baie ovoïde ou subglobulaire. Graine généralement solitaire (rarement 5-2), avec un testa crustacé, souvent brillant.

S. fetidissimum Jacq. «Acomat» (Haïti), «Caya amarilla» ou «Caya prieta» (St-Domingue).

S. domingense Urb. «Caya prieta» (St-Domingue).

Dipholis A. DC.

Arbustes inermes ou arbrisseaux. Feuilles alternes. Fleurs agrégées, axillaires ou latérales. Sépales 5, ovés, ou suborbiculaires, fortement imbriqués, presque égaux; lobes de la corolle 5, garnis de 2 appendices dans chaque sinus; étamines 5, adnées au tube de la corolle, opposées aux lobes, exertes; filets filiformes; anthères s'ouvrant longitudinalement; staminodes 5, pétaloïdes, généralement acuminés, carénés; ovaire pentaloculaire, quelque peu pentalobé, glabre; style allongé. Baie ovoïde ou oblongue, charnue. Graine généralement solitaire, avec testa coriacé.

D. salicifolia (L.) A. DC. «Acomât rouge» ou «Sapotillier marron» (Haïti), «Caya colorada» (St-Domingue).

D. domingensis Pierre et Urb. «Bois d'Inde» (Haïti), d'après Urban.

D. angustifolia Urb. «Caya de loma» (St-Domingue) d'après Urban.

D. anomala Urb.

D. leptopoda Urb. et Ekm. Massif de la Hotte.

D. repens Urb. et Ekm. Santo Domingo.

Bumelia Sw.

Arbustes ou arbrisseaux à sève laiteuse ou gommeuse et à bois très dur. Feuilles alternes, leurs axes parfois spinifères; nervation parfois voyante ou saillante. Fleurs généralement parfaites, peu ou nombreuses, agrégées, axillaires. Calice persistant; sépales 5, inégaux, fortement imbriqués; corolle blancôté; étamines 5, adnées au tube de la corolle; anthères oscillantes; staminodes 5, décidue, les lobes plus longs que le tube, avec un appendice de chaque côté; ovaire pentaloculaire, pubescent; ovules 5. Baie en forme de drupe. Graines généralement solitaires, dressées.

B. obovata (Lam.) A. DC.

B. parvifolia A. DC.

B. heterophylla Urb.

B. picardæ Urb.

B. buchii Urb. Massif de la Selle, près de Pétionville.

B. subintegra Urb. et Ekm.

- B. pachyclada* Urb. et Ekm.
B. navasana Urb. et Ekm. Ile de la Navase.
B. horrida Griseb. Massif de la Selle, près de Marigot.
B. lineolata Urb. et Ekm. Massif de la Selle, près des Anses à Pitre.

Chrysophyllum L.

Arbustes ou arbres avec sève laiteuse. Feuilles coriacées souvent soyeuses ou tomenteuses au dessous, avec de nombreuses nervures parallèles; stipules absentes. Fleurs blanchâtres ou verdâtres, fasciculées aux nœuds ou dans les axes, pédicellées ou presque sessiles, petites. Sépales généralement 5; corolle tubulaire, campanulée ou parfois rotacée, avec généralement 5 lobes; étamines 5, adnées à la base des lobes de la corolle, incluses; anthères souvent pubescentes, s'ouvrant longitudinalement, staminodes absents; ovaire généralement pentaloculaire (4-10 loges) pubescent. Fruit baccaire ou drupacé.

- C. caïnite* L. «Caïmite» (Haïti), «Caïmito» (St-Domingue). Alimentaire.
C. bicolor Poir. «Caïmito cimarron» (St-Domingue).
C. argenteum Jacq. Var. *sphaerocarpum* Urb. «Ti caïmite» (Haïti), «Caïmito blanco cimarron» ou «Carabana» (St-Domingue).
C. oliviforme Lam. «Caïmite marron»
C. platyphyllum Urb. «Caïmite marron»
C. montanum Urb.
C. angustifolium Lam.
C. picardæ Urb.
C. brachystylum Urb.
C. gonavense Urb.
C. heterochroum Urb. Massif de la Selle, près des Anses à Pitre..
C. miragoaneum Urb. Massif de la Selle.

Mimusops L.

Arbustes ou arbres avec sève laiteuse. Feuilles alternes, coriacées; nervures fines et souvent indistinctes. Fleurs agrégées à l'extrémité de courtes branches. Sépales 6-12 en 2 rangées, les externes valvés; lobes de la corolle généralement inclus dans le calice, 6-12, avec 2 appendices à chaque sinus, le tube court; étamines 6-12, adnées au tube de la corolle, opposées aux appendices; filets légèrement dilatés en dessous, anthères souvent légèrement pubescentes et dentées à l'extrémité, à déhiscence longitudinale; staminodes 6-12, parfois cohérents avec les étamines, généralement dentés ou coupés; ovaire de 6-8 loges, pubescent. Fruit, une baie subglobulaire, charnue.

- M. balata* (Aubl.) Pierre.
M. balata (Aubl.) Pierre, var. *domingensis* Pierre. «Sapotille»
M. albescens (Griseb.) Hartog, «Bois huile» ou «Sapotille marron»
M. jaimiqui Ch. Wright.
M. gonavensis Urb. et Ekm. «Sapotille marron»

Micropholis (Griseb.) Pierre.

Arbustes, arbrisseaux ou arbres. Stipules souvent peu remarquables; feuilles alternes, rarement glabres, souvent d'un bleu sombre ou velouté doré; nervures tertiaires peu distinctes des nervures secondaires. Fleurs petites; sépales 4-6, souvent 5, imbriqués; lobes de la corolle 4-6, souvent 5; staminodes larges, rarement étroits, légèrement plus longs que les étamines fertiles; étamines insérées à la gorge du tube; anthères ovoïdes ou elliptiques, extrorses, de même longueur ou plus courtes que les filets; disque faisant corps avec

l'ovaire, rarement peu remarquable, hispide ou villos; ovaire de 4-6 loges, souvent 5; ovule anatrophe, inséré au sommet interrompu de l'axe. Baie souvent fibreuse, rarement subéreuse ou durcie ou semi-subéreuse, oblongue ou ovoïde, souvent monosperme.

M. sp. Non encore identifié.

Famille 145. DIOSPYRACEÆ ou EBENACEÆ

Arbres ou arbustes à bois très dur. Feuilles alternes, entières, dénuées de stipules, généralement coriacées. Fleurs petites, blanches ou vertes, solitaires ou cymeuses, axillaires, unisexuées. Calice infère, de 3-7 lobes, persistant et acrescent dans le fruit; corolle urcéolée, campanulée de 3-7 lobes. Etamines 3 — beaucoup, insérées à la base de la corolle; filets courts, libres ou unis à la base. Ovaire supère, de 2-16 loges; ovules généralement solitaires; styles 2-8, libres ou unis à la base, avec stigmates entiers ou bilobés. Fruit: une baie coriacée ou charnue, indéhiscence, contenant plusieurs grosses graines.

x. Parties florales 3; ovaire 3 ou 6 loges Maba, p. 287

x. Parties florales 4-6; ovaire 4, 8 ou 16 loges Diospyros, p. 287

Maba Forst.

Arbustes ou arbres. Fleurs dioïques, trimères, solitaires ou en petites cymes axillaires. Calice acrescent; corolle tubulaire ou campanulée; étamines 3 — beaucoup dans les fleurs staminées, généralement 9 environ; ovaire 3-6 loges, généralement poilu. Fruit globulaire ou ovoïde, 1-3 loges, contenant 1-6 graines

M. caribaea (A. DC.) Hiern. «Bois raide»

M. domingensis Urb.

Diospyros L.

Arbustes ou arbres. Feuilles persistantes ou décidues, dioïques, rarement polygames, axillaires, cymeuses ou fasciculées. Calice 4-5 lobes; corolle urcéolée, campanulée, lobes obtus, divergents ou recourbés. Fruit baccaire, contenant 1-10 graines.

D. tetrasperma Sw.

Famille 146. SYMPLOCACEÆ

Arbustes ou arbres, avec feuillage glabre ou la pubescence si elle est présente, formée de poils simples. Feuilles alternes, généralement coriacées, souvent jaunâtres et produisant une teinture jaune; stipules absentes. Inflorescence axillaire, disposée de différentes façons, parfois fasciculée; fleurs souvent polygamo-dioïques ou parfois parfaites, régulières. Calice infère, lobes 5 imbriqués, le tout acrescent; corolle de 5 pétales, presque distincts ou unis, souvent imbriqués. Etamines nombreuses, adnées en plusieurs séries au tube de la corolle; filets plus ou moins aplatis, distincts ou cohérents; anthères courtes, innées. Ovaire de 2-5 loges; styles terminaux, unis; stigmates entiers ou légèrement lobés; ovules 2 ou rarement 4 dans chaque loge, pendant de la partie supérieure de l'angle. Fruit: une baie ou une drupe, avec un endocarpe dur, mince ou épais. Graines souvent solitaires.

Symplocos Jacq.

Caractères de la famille.

S. pilifera Urb.

S. domingensis Urb.

S. hyboneura Urb.

S. berterii (DC.) Miers.

S. hotteana Urb. et Ekm.

Famille 147. STYRACACEÆ

Arbres, arbustes ou arbrisseaux, avec pubescence stellaire. Feuilles alternes, dénuées de stipules, entières, légèrement dentées. Inflorescence racemuse, cymeuse ou fasciculée; fleurs parfaites, régulières. Calice avec 5, ou rarement 4-8 lobes courts ou obsolètes; corolle de 5 ou rarement 4-8 lobes distincts ou presque distincts. Etamines peu nombreuses (8-16) adnées en 1 seule série au tube de la corolle; filets aplatis et cohérents à la base; anthères introrses, adnées. Ovaire de 2-5 loges, les cavités opposées aux lobes du calice; styles unis; ovules solitaires ou peu nombreux dans chaque cavité, anatropes, ascendants ou pendants ou les deux à la fois. Fruit généralement une drupe ou une capsule. Graines le plus souvent solitaires avec un testa mince ou coriacé.

Styrax L.

Caractères de la famille.

S. ochraceus Urb.

S. obtusifolius Griseb.

Ordre. XXXIX. GENTIANALES

Herbes, arbustes ou arbres ou parfois sarments, quelquefois avec jus laiteux. Feuilles généralement opposées, parfois alternes ou verticillées; limbes entiers. Inflorescence variée; fleurs variées. Calice généralement de 5 sépales, partiellement unis, ou moindre; corolle de généralement 5 pétales partiellement unis (parfois 2-6) ou absents. Androcée formé d'autant d'étamines qu'il y a de lobes dans la corolle; filets libres ou partiellement adnés au tube de la corolle. Gynécée de carpelles plus ou moins unis ou rarement de plus de 2; styles distincts ou unis. Fruits très variés.

- x. Etamines 2, alternes avec les carpelles, rarement 4; stigmate terminal; ovaire biloculaire; ovules fixés au septum, rarement plats herbacés..... 148. Oleaceæ, p. 288
- x. Etamines et lobes de la corolle généralement 5, parfois 4, rarement indéfinis:
 - 2x. Ovaire généralement composé avec 2 ou 3 (rarement 4-5) loges ou placentas:
 - 3x. Fruit capsulaire le plus souvent biloculaire. Feuilles unies par des lignes transversales ou par des stipules..... 149. Loganiaceæ, p. 290
 - 3x. Fruit capsulaire, le plus souvent uniloculaire, avec placenta pariétal. Feuilles non unies comme au dessus..... 150. Gentianaceæ, p. 291
 - 2x. Ovaires 2, devenant généralement des follicules:
 - 3x. Styles unis; étamines distinctes ou largement conniventes; pollen granulaire..... 151. Apocynaceæ, p. 293
 - 3x. Styles distincts; étamines généralement monadelphes; pollen uni en masses cireuses ou les grains par groupe de 4..... 152. Asclepiadaceæ, p. 299

Famille 148. OLEACEÆ

Arbustes ou arbres, rarement herbes; tiges dressées ou grimpantes. Feuilles opposées ou rarement alternes ou verticillées, simples ou pinnées, entières ou dentées, généralement dépourvues de stipules. Fleurs régulières, bisexuées ou unisexuées, en panicules terminales ou axillaires, en cymes ou fascicules. Calice libre, petit de 4-15 dents ou lobes, rarement absent; corolle gamopétale ou formée de pétales distincts, segments 4-6, parfois absents. Etamines 2, par-

fois 3-5 hypogynes ou épipétales; filets généralement courts. Ovaire supère, biloculaire, avec 2 (parfois 4-10) ovules dans chaque loge; styles généralement courts, simples; stigmates généralement capités. Fruit, une capsule, une drupe, une baie ou une samarre, contenant 1-4 graines.

- x. Graines le plus souvent pendantes dans les loges de l'ovaire. Fruit dénué de franges à l'extrémité:
 - 2x. Corolle présente avec 4 pétales:
 - 3x. Pétales linéaires ou oblongs unis par paires à la base ou libres..... *Linociera*, p. 289
 - 3x. Pétales linéaires, charnus, cylindriques ou comprimés latéralement, unis à la base..... *Hænanthus*, p. 290
 - 2x. Corolle absente ou rarement 1-3 pétales caducs..... *Forestiera*, p. 289
- x. Graines dressées, très rarement pendantes. Fruit muni d'une frange qui divise l'extrémité en 2 moitiés..... *Jasminum*, p. 289

Forestiera Poir.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles opposées, entières ou serrulées, persistantes ou décidues, souvent ponctuées. Fleurs petites, verdâtres, polygames ou dioïques, fasciculées ou racemeuses, latérales. Calice absent ou infiniment petit et quadrilobé; corolle absente ou de 1-2 petits pétales décidus; étamines 2-4. Fruit, une petite drupe monosperme.

F. rhamnifolia Griseb.

F. segregata (Jacq.) Krug. et Urb.

F. selleana Urb. et Ekm.

Linociera Sw.

Arbustes ou arbrisseaux, rarement arbres. Feuilles entières. Fleurs blanches, jaunes ou pourpres, disposées en panicules compactes, axillaires ou terminales dans les jeunes branches de l'année précédente ou de l'année en cours. Calice petit, quadrilobé ou quadridenté; pétales 4, unis par paires à la base (étamines insérées au point d'union) ou libres, linéaires ou oblongs; étamines 2, rarement 4; filets courts; anthères tournées sur les côtés; insertion des ovules variée; style court, stigmate sessile crénelé ou bilabié. Fruit drupacé, ovoïde, oblong, rarement globulaire, avec généralement 1 graine, rarement avec 2-3 graines.

L. dictyophylla Urb.

L. ligustrina Sw. «Lirio» St-Domingue), d'après Urban.

L. pubescens Urb. et Ekm.

L. domingensis (Lam.) Knobl. «Cayepon», (Haïti).

L. axilliflora Griseb.

L. caribaea (Jacq.) Knobl. «Tarana» (St-Domingue).

L. miragoanæ Urb.

Jasminum L.

Arbrisseaux grimpants ou dressés. Feuilles opposées ou parfois alternes, imparipennées, avec 3-7 folioles ou réduites à une seule foliole, mais avec pétiole articulé. Fleurs en cymes terminales, simples ou dicotomes ou rarement solitaires. Calice infundibuliforme ou campanulé, avec 4-9 dents de longueur variée; corolle en forme de soucoupe, avec un tube cylindrique et un limbe de 4-9 lobes imbriqué; étamines 2; filets courts inclus. Fruit, une baie bilobée.

J. sambac (L.) Solander, «Jasmin.» Ornamental.

J. pubescens (Retz.) Willd. «Jasmin.» Ornamental.

J. azoricum L. «Jasmin.» Ornamental.

J. grandiflorum L. «Jasmin.» Ornamental.

Hænianthus (Griseb.) Urb.

Arbres ou arbustes. Feuilles entières. Fleurs en panicules denses, latérales ou terminales. Calice petit, quadridenté; sépales 4, généralement soudés à la base en un tube, linéaires, charnus, cylindriques ou comprimés latéralement; filet et la moitié inférieure de la bande de milieu des 2 étamines unis au tube de la corolle à l'extrémité inférieure de la gorge; anthères presque extrorses; ovules épitropes, soudés presque sur toute la longueur avec la cloison de séparation. Endocarpe mince, cassant. Endosperme épais, cartilagineux.

H. oblongatus Urb.

Famille 149. LOGANIACEÆ

Herbes, arbrisseaux ou sarments ou parfois arbres. Feuilles opposées ou verticillées, stipulées, simples, entières ou dentées. Fleurs parfaites, régulières, ou rarement quelque peu dioïques, en cymes ou panicules ou quelque peu capitées, de couleur variée. Calice infère, de 4-5 lobes imbriqués ou valvés; corolle gamopétale de 4-5 lobes, valvés, imbriqués ou convolutés. Étamines 4-5, alternant avec les lobes de la corolle; filets filiformes ou subulés; anthères biloculaires à déhiscence longitudinale. Ovaire supère, biloculaire ou rarement de 3-5 lobes; styles unis, simples; stigmates distincts ou unis; ovules solitaires ou 2 ou parfois plusieurs dans chaque loge de l'ovaire, amphitropes ou anatropes. Fruit parfois capsulaire, s'ouvrant par 2 valves, ou baccaire, ou drupacé et indéhiscent.

x. Fruit capsulaire:

2x. Lobes de la corolle valvés. Herbes:

3x. Corolle infundibuliforme; styles unis

près de la base

3x. Corolle en forme d'urne; styles distincts *Spigelia*, p. 290

2x. Lobes de la corolle imbriqués. Arbustes *Cynoctonum*, p. 290

x. Fruit, une baie *Buddleia*, p. 291

x. Fruit, une baie *Strychnos*, p. 291

Spigelia L.

Herbes annuelles ou vivaces, rarement quelque peu ligneuses; tiges souvent ramifiées, principalement à la base. Feuilles opposées, entières, sous-tendues par de toutes petites stipules caduques. Fleurs souvent voyantes, en épis terminaux ou en racemes épineux. Calice grêle, tube portant souvent 5 — plusieurs glandes internes à la base, lobes étroits; corolle tubulaire ou infundibuliforme, lobes 5; étamines 5, souvent avec des anthères exsertes, adnées au tube de la corolle; ovaire biloculaire; styles unis près de la base; ovules nombreux dans chaque cavité. Fruit biloculaire, porté sur une base en forme de coupe.

S. anthelmia L.

Cynoctonum J. F. Gmel.

Herbes caulescentes, souvent avec rhizomes courts. Feuilles opposées, entières, coriaces, parfois avec des nervures très fines; stipules petites, entières. Fleurs blanches ou légèrement colorées, en cymes composées terminales. Calice plus court que la corolle, généralement pentalobé; corolle en forme d'urne, tube souvent renflé au dessous et rétréci à la gorge qui est enfermé par des poils unis, lobes 5 divergents ou convergents. Étamines 5, incluses, adnées au tube de la corolle; ovaire biloculaire, se terminant en 2 styles dont les extrémités sont plus ou moins unies; ovules nombreux, attachés à un placenta pelté. Capsule en forme de mitre, terminée par 2 cornes recourbées.

C. mitreola (L.) Britton.

Strychnos L.

Arbres et arbustes parfois grimpants, généralement avec des vrilles enroulées en forme de couleuvre ou avec des épines droites ou recourbées. Feuilles membraneuses ou coriaces avec 3-5 nervures, soudées par une rangée de stipules. Inflorescence cymeuse, tantôt multiflore, tantôt pauciflore, ombellée ou racemeuse, terminale et latérale; fleurs 4-5 mères. Calice court, triangulaire, subulé; corolle rotacée avec des tubes de longueur distincte, généralement poilus intérieurement et extérieurement, gorge barbuée ou glabre; étamines le plus souvent courtes, anthères parfois poilues; ovaire biloculaire, très rarement uniloculaire avec le plus souvent de nombreux ovules, style assez long, stigmate le plus souvent capité et indistinctement bilobé, rarement un peu long. Baies de différentes grosseurs, avec beaucoup de graines, généralement avec 1-2 graines par avortement; péricarpe souvent coriacé-ligneux. Graines le plus souvent discoïdes; hile central.

S. grayi Griseb.

Buddleia L.

Arbustes ou arbres ou herbes ligneuses, avec feuillage pubescent, teigneux ou granulaire. Feuilles opposées, stipulées. Fleurs en capitules compacts ou plus rarement en panicules ouvertes. Calice campanulé, quadrilobé ou rarement pentalobé; corolle rotacée-campanulée ou parfois en forme de soucoupe, lobes larges; étamines 4, rarement 5; filets adnés au tube de la corolle; ovaire biloculaire; styles unis. Capsules globulaires ou oblongues, à déhiscence septicide, bivalvées.

B. domingensis Urb.

B. calcicola Urb.

Famille 150. GENTIANACEÆ

Herbes annuelles ou vivaces, rarement arbrisseaux, avec sève aqueuse et amère. Feuilles opposées, simples, parfois connées à la base et engainantes. Fleurs parfaites, régulières, souvent voyantes, disposées en cymes. Calice de 2-4-5 sépales plus ou moins unis, persistants; pétales 4-5 ou davantage, généralement convolutés, parfois imbriqués, divergents, voyants; étamines aussi nombreuses que les pétales et partiellement adnées au tube de la corolle; ovaire supère, uniloculaire, avec 2 placentas pariétaux; styles généralement unis; stigmates 2; ovules nombreux anatropes ou amphitropes. Fruit, une capsule.

x. Feuilles alternes, généralement pétiolées. Plantes

marécageuses ou aquatiques

Limnanthemum, p. 293

x. Feuilles jamais alternes, sessiles:

2x. Plantes avec chlorophylle, allophytes:

3x. Pollen en tétrade

Schultesia, p. 292

3x. Pollen solitaire:

4x. Ovaire presque toujours uniloculaire.

placenta pariétal; grain de pollen de

grosseur moyenne:

5x. Étamines filiformes ou quelque peu

élargies à la base:

6x. Stigmate capité ou claviforme,

légèrement lobé

Bisgoeppertia, p. 292

6x. Stigmate distinctement et pro-

fondément bilobé

Sabbatia, p. 292

5x. Étamines divergentes en une sorte

d'écaille caduque

Enicostema, p. 292

4x. Grains de pollen gros:

5x. Stigmate capité ou légèrement ar-

rondi; fleurs jaunes

Lisianthus, p. 292

5x. Stigmate toujours distinctement et profondément bilobé; fleurs blanches.....

Eustoma, p. 292

2x. Plantes sans chlorophylle; saprophytes.....

Leiphaimos, p. 293

Enicostema Bl.

Herbes bisannuelles, stipulées. Fleurs petites, pentamères, jaunes, pédoncules courts, nés dans les axes des feuilles, disposées en faisceaux. Calice campanulé; corolle en forme de coupe, la face interne de chaque filet garnie d'une écaille; anthères oblongues, avec un connectif plus ou moins allongé; ovaire uniloculaire, styles courts, stigmates capités. Capsule oblongue.

E. verticillatum (L.) Engl.

Bischoepertia O. Ktze.

Herbes volubiles. Feuilles lancéolées. Fleurs petites, blanches ou crème, disposées en panicules souvent avec bractées; fleurs pentamères. Sépales carénés; corolle avec tube cylindrique; ovaire apparemment biloculaire, styles filiformes, avec 2 stigmates recourbés.

B. scandens (Spreng.) Urb.

Sabbatia Adans.

Herbes annuelles ou bisannuelles caulescentes. Feuillage glabre; feuilles opposées ou rarement verticillées, sessiles ou rarement pétiolées ou entourant la tige à la base. Fleurs solitaires ou en cymes ouvertes, terminales. Calice rotacée, lobes 4-12; étamines 4-12, filets adnés au tube court de la corolle, pédicellé, lobes 4-2-3; corolle blanche, rose, crème, avec un œil distinct, anthères enroulées; ovaire uniloculaire, styles unis. Capsule courte.

S. cubensis Urb.

Lisianthus L.

Herbes ou arbrisseaux glabres, avec feuilles opposées. Fleurs généralement grandes, vert jaunâtre ou brunes, rarement blanches, disposées en cymes corymbeuses, pentamères. Calice ailé, à la partie dorsale ou caréné; corolle infundibuliforme; anthères avec connectif allongé; ovaire apparemment biloculaire, style allongé, filiforme, avec stigmate plus ou moins capité.

L. domingensis Urb.

L. longifolius L. Var. *scabridus* (Griseb.) Perkins.

Eustoma Salisb.

Herbes caulescentes annuelles avec feuillage glabre et généralement glauques. Feuilles opposées, sessiles, ou entourant la tige à la base. Fleurs en panicules terminales ou parfois solitaires. Calice avec 5-6 lobes étroits, carénés; corolle blanche, pourpre ou bleue, tube campanulé, lobes 5-6 oblongs ou élargis au sommet, convolutés dans le bourgeon, généralement érodés — denticulés; étamines 5-6, adnées à la gorge du tube de la corolle; filets filiformes; anthères oscillantes, presque droites ou recourbées à maturité; ovaire uniloculaire, stigmates 2, ovules nombreux. Graines marquées de petits creux.

E. exaltatum (L.) Salisb.

Schultesia Mart.

Herbes annuelles, dressées, avec feuilles opposées. Fleurs généralement grandes, rarement petites, pédonculées ou presque sessiles, rougeâtres, violettes ou jaunes, solitaires, terminales ou en cymes bipartites peu compactes; fleurs quadrimères. Calice tubulaire ou plus ou moins conique; corolle infundibuli-

forme avec lobes ovoïdes souvent très larges; étamines insérées au tube; filets filiformes, généralement ailés à la base; anthères oblongues, obtuses, cordiformes à la base. Graines très petites, marquées de petits creux ou réticulées.

S. heterophylla Miq.

S. stenophylla Mart.

Leiphaimos Ch. et Schl.

Herbes saprophytes, dénuées de chlorophylle, basses, qui ne portent que de toutes petites feuilles squameuses; rhizomes filiformes. Fleurs solitaires ou un petit nombre de cymes. Calice campanulé avec 4-5 dents ou lobes non carénés; corolle en forme de coupe ou tubulaire avec un tube souvent allongé ou quelque peu frangé, lobes 4-5 obtus ou aigus, divergents, enroulés, persistants après la floraison, mais irrégulièrement fendus; étamines 4-5, fixées à la partie supérieure du tube, mais ne le dépassant pas; filets filiformes, généralement très courts; anthères ovoïdes, cordiformes ou oblongues, libres ou légèrement soudées, introrsées, obtuses à la base ou aiguës, munies de 2 éperons ou d'une structure pennée et de même longueur; ovaire uniloculaire avec 2 cloisons; style filiforme avec stigmate capité, connexe à la partie supérieure et généralement strié à la partie inférieure. Capsule oblongue, linéaire septicide, s'ouvrant par 2 valves. Graines rarement globulaires, le plus souvent fusiformes.

L. aphylla (Jacq.) Gilg.

L. parasitica Schlecht. et Cham.

L. domingensis Urb.

L. brachyloba (Griseb.) Urb.

Limnanthemum Gmel.

Herbes flottantes ou rampantes des endroits marécageux. Feuilles ovées ou circulaires ou parfois très cordées, parfois peltées, entières ou légèrement lobées, le plus souvent alternes, rarement plus ou moins opposées à la partie inférieure des fleurs. Fleurs jaunes ou blanches, parfois dimorphes, solitaires, 2 ou généralement agrégées avec 1 ou 2 feuilles, rarement nœuds aphylls. Calice partagé profondément en 5 lobes lancéolés ou oblongs; corolle avec tube très court, presque rotacée, pentavalvée; étamines 5, adnées à la base de la corolle ou de la gorge; filets courts; anthères légèrement sagittées, oscillantes, à la gorge de la corolle se rencontrent parfois de toutes petites écailles épipétales; ovaire uniloculaire, avec 2 placentas pariétaux un peu saillants parfois légèrement divisés, avec un disque glandulaire à la base; style très long avec stigmate large, bilobé, souvent pétaloïde. Capsule ovoïde ou oblongue, indéhiscence, ou se déchirant irrégulièrement. Graines très nombreuses ou parfois quelques-unes, parfois ailées.

L. humboldtianum (H. B. K.) Griseb.

Famille 151. APOCYNACEÆ

Herbes vivaces, sarments, arbustes ou arbres, généralement avec sève laiteuse, acride. Feuilles entières, exstipulées, opposées, verticillées, ou alternes, simples. Fleurs parfaites, régulières, petites ou grandes, généralement disposées en cymes, terminales ou latérales. Sépales généralement 5, unis à la base, souvent glandulaires intérieurement à la base. Calice infère; corolle gamopétale, généralement infundibuliforme ou en forme de soucoupe, le limbe généralement pentalobé. Étamines 5, insérées sur le tube ou la gorge de la corolle; filets généralement libres, les anthères généralement sagittées et aiguës, pollen granulaire. Disque hypogyne généralement présent, entier ou lobé,

parfois de 2-5 écailles. Ovaires généralement 2, supères ou partiellement infères ou ovaire uniloculaire ou biloculaire avec peu — beaucoup d'ovules; style 1, simple ou divisé. Fruit généralement de 2 follicules, parfois baccaire ou drupacé, les graines souvent avec une touffe de poils.

- x. Etamines libres ou seulement rattachées d'une façon peu dense à la tête du stigmate, les sacs généralement non caudés et remplis de pollen jusqu'à la base ou rarement caudés, mais dans ce cas avec fruit charnu (*Tabernæmontana*). Graines généralement dépourvues de touffes de poils, les lobes de la corolle généralement développés à gauche:
 - 2x. Ovaire syncarpé; style non fendu à la base; ovaire uniloculaire..... *Allamanda*, p. 299
 - 2x. Ovaire apocarpé; style fendu à la base:
 - 3x. Ovules nombreux dans chaque loge:
 - 4x. Calice églulaire. Fruit sec:
 - 5x. Ovules en plusieurs rangées..... *Plumeria*, p. 295
 - 5x. Ovules en 2 rangées:
 - 6x. Fruit comprimé:
 - 7x. Disque absent..... *Cameraria*, p. 295
 - 7x. Disque présent..... *Aspidosperma*, p. 295
 - 6x. Fruit à peu près rond..... *Lochnera*, p. 296
 - 4x. Calice glandulaire. Fruit pulpeux:
 - 5x. Corolle en forme de plateau..... *Tabernæmontana*, p. 296
 - 5x. Corolle infundibuliforme..... *Stemmadenia*, p. 296
 - 3x. Ovules 2, rarement 4, plus rarement 6 dans chaque loge:
 - 4x. Placentas très minces; ovules fixés dorsalement:
 - 5x. Disque absent..... *Vallesia*, p. 296
 - 5x. Disque présent:
 - 6x. Feuilles opposées en croix..... *Anechites*, p. 297
 - 6x. Feuilles verticillées..... *Rauwolfia*, p. 297
 - 4x. Placentas épais, saillant à l'intérieur de l'ovaire; ovules fixés en forme de bouclier..... *Thevetia*, p. 297
- x. Etamines rattachées étroitement à la tête du stigmate; sacs de l'anthère toujours caudés, les loges externes ne sont pas remplies de pollen jusqu'à la base; lobes de la corolle développés toujours à droite. Graines, sauf de rares exceptions, munies d'une touffe de poils:
 - 2x. Cône de l'anthère inclus dans le tube:
 - 3x. Corolle sans écaille à la gorge ou dans le tube:
 - 4x. Corolle en forme de soucoupe avec tube cylindrique..... *Echites*, p. 297
 - 4x. Corolle infundibuliforme avec base plus ou moins cylindrique: et sommet du tube développé:
 - 5x. Plantes dressées..... *Funtumia*, p. 299
 - 5x. Plantes volubiles:
 - 6x. Calice gros, foliacé; étamines avec filets très longs..... *Baumontia*, p. 298
 - 6x. Calice petit, non foliacé; étamines avec filets très courts:
 - 7x. Calice églulaire..... *Rhabdadenia*, p. 297
 - 7x. Calice muni de nombreuses glandes..... *Urechites*, p. 298

- 3x. Corolle avec tube muni d'écailles:
 - 4x. Lobes de la corolle non appendiculés. Fruit dressé. Graines avec 1 touffe de poils..... *Nerium*, p. 298
 - 4x. Lobes de la corolle plus ou moins appendiculés, parfois avec longs appendices. Fruit horizontal, divergent. Graines avec 2 touffes de poils à la base..... *Strophantus*, p. 298
- 2x. Cône de l'anthère faisant saillie sur le tube..... *Forsteronia*, p. 299

Plumeria L.

Arbustes ou arbres avec branches épaisses et une abondante sève laiteuse. Feuilles alternes, pétioles. Fleurs grandes en cymes terminales. Calice pentalobé, églulaire; corolle en forme de soucoupe, avec tube grêle; anthères obtuses non appendiculées. Fruit formé de grandes follicules divergentes. Graines nombreuses, plates, ailées.

- P. rubra* L. «Frangipanier rose» (Haïti). Ornemental.
- P. barahonensis* Urb. «Aleli» (St-Domingue), d'après Urban.
- P. domingensis* Urb. «Aleli» (St-Domingue), d'après Urban.
- P. paulinae* Urb. «Frangipane» (Haïti), d'après Urban. Ornemental.
- P. stenopetala* Urb. «Frangipanier» Ornemental.
- P. stenopetala* Urb. Var *angustissima* Urb.
- P. berterii* A. DC.
- P. subsessilis* A. DC. «Frangipanier marron», d'après Urban.
- P. gibbosa* Urb. «Frangipanier épineux», d'après Urban. Ornemental.
- P. tuberculata* Lodd.
- P. biglandulosa* Urb. «Frangipanier», d'après Urban. Ornemental.
- P. trouinensis* Urb. et Ekm.
- P. cuneifolia* Helwig.
- P. discolor* Urb. et Ekm.
- P. marchii* Urb.
- P. obtusa* L.
- P. longiflora* Urb. et Ekm.

Cameraria L.

Arbrisseaux glabres, dressés. Feuilles coriaces. Inflorescence terminale, le tube de la corolle jaune et les lobes blancs. Calice petit profondément pentalobé, églulaire; corolle avec tube cylindrique, pas très élargi au point d'insertion des étamines, mais étréci à la gorge et poilu, recouvrant les lobes à gauche; étamines adnées au milieu du tube avec sacs courts; connectif filiforme; disque absent; ovaire semi-supère, avec peu d'ovules (6) en 2 séries; style filiforme; stigmate capité, élargi en forme de plat à la base, souvent profondément bilobé. Follicule dur, ailé, indéhiscence, élargi au-dessus ou aussi au-dessous d'une aile coriacée. Graines ovoïdes, pourvues à l'extrémité d'une aile courte.

- C. latifolia* L. «Laitier»
- C. angustifolia* L.
- C. linearifolia* Urb.

Aspidosperma Mart. et Zucc.

Arbres avec bois très dur. Feuilles alternes, rarement verticillées ou opposées en croix, nervures délicates. Fleurs petites, très poilues à l'extérieur, agrégées en panicules terminales. Calice petit ou relativement grand, profondément divisé, avec lobes acuminés, imbriqués, églulaires; corolle en forme de

soucoupe avec tube cylindrique ou en forme de tonneau peu ou point élargi au point d'insertion des étamines, étréci à la gorge qui est glabre, couvrant les lobes à gauche; étamines fixées au milieu du tube, avec des sacs aigus, ovoïdes ou oblongs; connectif non allongé, toujours poilu à la partie inférieure des étamines; disque en forme de plat ou obscur; ovaire largement infère; ovules 4-12 dans chaque réceptacle en 2 séries; style court, avec stigmate capité cylindrique, qui est creusé en forme de plat à la partie supérieure et qui porte 2 petits lobes dans le plat. Follicule solitaire parfois, circulaire ou oblong, oblique ou souvent comprimé, traversé d'une ligne saillante recourbée à la face ventrale ou toute ronde, alors s'ouvrant par 2 valves, coriaces ou ligneuses. Graines comprimées, annulaires ou obovoïdes, avec membranes ailées.

A. domingense Urb. «Mme Jean.»

Lochnera Rchb.

Herbes annuelles ou arbustes. Feuilles opposées en croix. Fleurs blanches ou rosées, solitaires, axillaires. Calice de moyenne grandeur, profondément pentaloqué; lobes étroits, acuminés, glandulaires; corolle en forme de soucoupe avec tube cylindrique, élargi, calleux et poilu à la gorge au point où sont fixées les étamines et recouvrant à gauche les extrémités; étamines oblongues, lancéolées, presque sessiles; disque absent; ovaire légèrement déprimé, avec 2 glandes situées entre le réceptacle; ovules très nombreux, en 2 rangées dans chaque réceptacle; style allongé; stigmate capité cylindrique, situé sous une grosse membrane annulaire. Follicules se développant en biais, minces, cylindriques. Graines oblongues, cylindriques, tuberculées.

L. rosea (L.) Rchb. «Sans cesse» (Haïti), «*Todo el ano*» (St-Domingue). Ornemental.

Tabernaemontana L.

Arbustes ou arbres généralement glabres. Feuilles opposées. Fleurs en cymes terminales, parfois sublatérales, blanches ou jaunâtres. Calice pentaloqué, glandulaire à l'intérieur; corolle en forme de soucoupe, le tube cylindrique, les lobes contordus; anthères sagittées, non appendiculées. Fruit de 2 follicules charnus, courts.

T. citrifolia L. «Bois lait mâle» (Haïti), «*Palo de leche*» (St-Domingue).

T. coronaria (Jacq.) Willd. «Caprice» (Haïti). Ornemental.

Stemmadenia Benth.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles opposées. Fleurs grandes, généralement jaunes, en cymes terminales. Calice de 5 parties, les lobes imbriqués glandulaires intérieurement; corolle infundibuliforme, le tube développé en une large gorge, les lobes contordus; étamines incluses, anthères sagittées, non appendiculées. Fruit formé de 2 follicules courts, charnus, divariqués.

S. bella Miers. Ornemental; cultivé à Pétienville.

Vallesia R. et P.

Arbrisseaux ou arbustes, avec tiges branchées. Feuilles alternes, relativement peu nombreuses, entières. Fleurs disposées en cymes pédonculées, opposées aux feuilles. Calice glandulaire avec 5 lobes courts; corolle en forme de soucoupe, le tube élargi au-dessous des lobes; anthères cordées, non appendiculées; disque absent; carpelles 2, stigmate clavé. Fruit, une drupe monosperme ou bisperme. Graines clavées, nues.

V. montana Urb.

Anechites Griseb.

Arbrisseaux volubiles. Calice petit, profondément pentaloqué, pluriglandulaire; corolle en forme de soucoupe, tube poilu; anthères insérées au milieu du tube; disque en forme de coupe, avec bords légèrement lobés; ovaire supère avec 2 ovules dans chaque loge; styles filiformes, papilleux à la base, avec un stigmate capité bilobé. Fruit folliculaire, mince cylindrique, glabre au tiers, garni au sommet de nombreux poils. Graine mince, solitaire.

A. nerium (Aubl.) Urb.

Rauwolfia L.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles généralement verticillées; pétiole court. Fleurs petites, disposées en cymes pédonculées, généralement axillaires. Calice glandulaire, pentaloqué; corolle en forme de soucoupe; étamines incluses; anthères obtuses, non appendiculées. Fruit formé de 2 drupes, celles-ci connées, le fruit ainsi quelque peu didyme.

R. bauriculata Mull.

R. nitida Jacq. «Bois lait femelle» (Haïti), «*Paio de leche chiquito*» (St-Domingue).

R. lamarckii A. DC.

R. canescens L.

Thevetia L.

Arbustes ou arbres avec branches vigoureuses. Feuilles alternes, nombreuses, étroites, entières. Fleurs solitaires, ou peu nombreuses, lobes du calice 5, relativement longs, calice infundibuliforme, tube dilaté en une gorge non rétrécie à la bouche, lobes 5, plus longs que le tube, inéquilatéraux; étamines adnées à la gorge de la corolle; anthères non appendiculées; disque lobé; carpelles 2, stigmate avec 2 pointes. Drupe provenant de 2 carpelles, large, avec 2 à 4 graines. Graines plutôt triangulaires, nues.

T. neriifolia Jus. «Serpent», «Bois saisissement» (Haïti), d'après Urban.

Echites L.

Arbrisseaux volubiles. Feuilles opposées. Fleurs petites ou grandes, en racemes axillaires. Calice pentaloqué, glandulaire à l'intérieur; corolle en forme de soucoupe, tube cylindrique; anthères sagittées, appendiculées à la base. Follicules grêles, cylindriques, souvent toruleuses. Graines avec une touffe de

E. umbellata Jacq.

E. agglutinata Jacq.

E. repens Jacq. «*Pti liane ibo*» (Haïti).

E. breviflora Urb.

E. angustifolia Poir.

E. dolichopetala Urb.

E. picardæ Urb.

E. glomerata Poir.

E. longiflora Ekm. et Helwig.

Rhabdadenia Mull-Arg.

Arbrisseaux volubiles. Feuilles opposées, pétioles. Fleurs grandes, en racemes pauciflores. Calice pentaloqué, glandulaire; corolle infundibuliforme, tube cylindrique, la gorge longue, campanulée; anthères oblongues, obtuses, avec un court appendice à la base. Follicules cylindriques, allongées, fusiformes. Graines avec une touffe terminale de poils.

R. paludosa (Vahl.) Miers. «Caoutchouc» (Haïti), «*Bejuco mangle*» (St-Domingue), d'après Urban.

R. berterii (A. DC.) Mull.

R. polyneura Urb.

Urechites Mull.

Sarments volubiles avec tige quelque peu ligneuse. Feuilles opposées, plates, entières. Fleurs grandes, racemeuses. Calice pentalobé, glandulaire à l'intérieur, relativement long et étroit; corolle relativement grande, indundibuliforme, le tube grêle, cylindrique, la gorge campanulée, les lobes courts; anthères sagittées, portant au sommet un long appendice filiforme et tordu. Follicules cylindriques dressées ou divergentes. Graines avec une touffe de poils au sommet.

U. lutea (L) Britton, «Corne cabrite» (Haïti), «Bejuco ahoya vaca» (St-Domingue). Plante vénéneuse d'une grande importance économique à cause des dégâts qu'elle cause chaque année aux animaux dans les pâturages.

U. lutea (L) Britton. Var. **angustifolia** Ekm. et Helwig.

U. dolichantha Urb.

Beaumontia Wall.

Sarments ligneux. Feuilles opposées, à nervation pennée. Fleurs très grandes, sous-tendues par des bractées foliacées caduques, disposées en cymes terminales. Calice grand, avec des lobes aigus, avec ou sans glandes; corolle infundibuliforme, sans écailles à la gorge; étamines insérées à la partie supérieure du tube, filets très longs et dilatés au-dessus, unis autour du stigmate et y adhérents; disque de 5 écailles ou pentalobé; ovaires 2, supères, avec beaucoup d'ovules dans chaque loge, style filiforme. Fruit long, cylindrique, ligneux, se séparant en 2 follicules.

B. grandiflora Wall. Ornemental.

Nerium L.

Arbustes ou arbrisseaux dressés. Feuilles verticillées, ou opposées, coriaccées. Fleurs voyantes, en cymes terminales. Calice avec de nombreuses glandes internes près de la base; corolle infundibuliforme, tube cylindrique à la base, gorge campanulée, avec 5 dents larges ou lascinées; étamines attachées à la gorge de la corolle, incluses; filets très courts; anthères avec de longs appendices au sommet, conniventes et adhérent au stigmate, appendiculées aussi à la base; disque absent; ovaires 2 avec de nombreux ovules dans chaque loge; styles filiformes. Fruit formé de 2 follicules allongées.

N. oleander L. Laurier rose. Ornemental.

Strophantus P. DC.

Plantes ligneuses, grimpantes ou rarement arbustes dressés ou sous-arbustes ou arbrisseaux avec feuilles opposées, herbacées ou coriaccées. Inflorescence terminale ou axillaire ou panicule multiflore. Calice pentalobé avec de nombreuses glandes à l'intérieur; corolle infundibuliforme, tube cylindrique à la base, gorge campanulée avec 10 écailles autour qui sont parfois libres, parfois unies par paires et alternant avec les lobes, ceux-ci appendiculés ou aigus ou arrondis; étamines attachées à la base de la partie supérieure du tube, filets courts, recourbés vers le style et y adhérent; anthères appendiculées; disque 0; ovaires plus ou moins nombreux, parfois semi-infère avec de nombreux ovules dans chaque loge; style filiforme avec court stigmate capité bilobé. Follicules oblongs ou allongés, horizontaux, souvent unis à la base. Graines velues.

S. gratus (Wall, Hook et Benth) H. Baill. Plante ornementale. Pétienville.

Forsteronia G. F. W. Mey.

Sarments glabres ou poilus. Feuilles opposées. Fleurs terminales, disposées en panicules pyramidales. Calice petit, profondément pentalobé, glandulaire ou non glandulaire; corolle avec tube plus ou moins cylindrique; étamines adnées au tube; disque pentalobé; ovaire plus ou moins infère; styles courts, filiformes; stigmates bilobés, capités. Follicules cylindriques grêles. Graines poilues au sommet.

F. corymbosa (Jacq.) G. F. W. Mey, «Bejuco de arana» (St-Domingue), d'après Urban.

Allamanda L.

Arbrisseaux généralement grimpants. Feuilles verticillées ou opposées, penninerves. Fleurs grandes et voyantes, en racemes pauciflores, à l'extrémité des branches. Calice profondément pentalobé, les lobes externes s'ouvrant plus large, avec ou sans glandes internes à la base; corolle campanulée, infundibuliforme, tube cylindrique, avec des poils ou des écailles poilues à la gorge; étamines insérées à la bouche du tube cylindrique, filets très courts, anthères non unies avec le stigmate; disque annulaire, entier ou pentalobé; ovaire uniloculaire, avec de nombreux ovules. Fruit, une capsule épineuse s'ouvrant par 2 valves.

A. cathartica L.

Funtumya Stapf.

Arbres avec feuilles opposées en croix, avec de larges nervures. Fleurs jaunâtres, ou verdâtres, formant une cyme compacte. Calice petit, profondément pentalobé avec segments subulés, pourvus de nombreuses glandes et de beaucoup de petites écailles; corolle infundibuliforme avec tube basilaire élargi au-dessus et au-dessous, dénuée d'écailles à la gorge, les lobes recouvrant à droite; étamines adnées à la gorge avec filets courts et larges, les sacs pointus auxquels adhèrent de minces appendices; disque charnu, pentalobé; ovaire entièrement supère; style filiforme avec stigmate capité, épaissi à l'extrémité. Fruit folliculaire, fortement cylindrique, recourbé, coriacé. Graines glabres à la partie supérieure, garnie d'une longue aiguille poilue à la partie inférieure.

F. elastica Stapf. «Caoutchouc», Bayeux. Cultivé.

Famille 152. ASCLEPIADACEÆ

Herbes vivaces, sarments ou arbrisseaux généralement avec sève laiteuse. Feuilles alternes, opposées ou verticillées; stipules absentes. Fleurs parfaites, régulières, généralement en cymes, celles-ci présentant ordinairement la forme d'une ombelle ou d'un raceme. Calice infère, tube très court ou absent; sépales imbriqués ou séparés dans le bourgeon; corolle gamopétale, rotacée, campanulée, urcéolée ou rarement infundibuliforme ou en forme de soucoupe, pentalobée; corona généralement présente adnée à la corolle et au tube staminal. Etamines 5, filets généralement courts et connés; anthères attachées à la base, introrsées, biloculaires, connivant autour du stigmate, parfois unies, les loges généralement développées en dessous, le connectif souvent avec une membrane au sommet; pollen généralement cohérant en masse, connues sous le nom de pollinies; 5 petits corpuscules présents sur le bord du disque entre les anthères, attachés aux pollinies et les supportant après la déhiscence des anthères. Ovaire de deux carpelles distincts; stigmates formant généralement un disque pentagone. Fruit de 2 follicules, l'une généralement abortive, sessile, déhiscence. Graines s'ouvrant avec une touffe terminale de poils.

- x. Pollen granulaire, les grains groupés par 4 : caudicules en forme de cuiller, sans corpuscule; corolle infundibuliforme..... **Cryptostegia**, p. 300
- x. Pollen uni en 2 masses cireuses (pollinies); caudicules unis par un corpuscule; corolle jamais infundibuliforme:
- 2x. Pollinies portées dans la partie inférieure de la loge de l'anthère, pendantes des bras des corpuscules:
- 3x. Corona absente..... **Astephanus**, p. 300
- 3x. Corona présente:
- 4x. Plantes ligneuses, robustes, dressées, très rarement rampantes, non volubiles:
- 5x. Corona non éperonnée à la base..... **Asclepias**, p. 300
- 5x. Corona munie d'un éperon à la base..... **Calotropis**, p. 301
- 4x. Plantes ligneuses volubiles, très rarement dressées, petites et molles:
- 5x. Corona adnée à la corolle, double..... **Funastrum**, p. 302
- 5x. Corona adnée au gynostegium simple..... **Metastelma**, p. 301
- 2x. Pollinies portées dans la partie inférieure de la loge de l'anthère, dressées ou divariquées des bras des corpuscules:
- 3x. Pollinies par paires dans chaque demi-sac..... **Tæniönema**, p. 301
- 3x. Pollinie solitaire dans chaque demi-sac:
- 4x. Loges de l'anthère à déhiscence longitudinale; pollinies dressées ou presque dressées..... **Marsdenia**, p. 302
- 4x. Loges de l'anthère à déhiscence transversale; pollinies généralement horizontales:
- 5x. Corona simple (aussi le genre **Gonolobus** avec corolle réticulée et gynostegium le plus souvent très bas):
- 6x. Stigmate plat..... **Poecilopsis**, p. 302
- 6x. Stigmate allongé..... **Ibatia**, p. 302
- 5x. Corona double..... **Gonolobus**, p. 302

Cryptostegia R. Br.

Arbrisseaux grimpants, jus laiteux, fournissant souvent du caoutchouc. Feuilles opposées. Fleurs grandes, disposées en cymes terminales, trichotomes. Calice grand, avec de nombreuses glandes à la base; corolle infundibuliforme, tube court et limbe campanulé, couronne de 5 écailles entières ou bipartites, attachée à la corolle; étamines avec des filets courts, libres et des anthères appendiculées, connées autour du stigmate. Follicules angulées ou ailées.

C. grandiflora (Roxb.) R. Br. «Caoutchouc» (Haïti).

Astephanus H. B. K.

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux avec rameaux plus ou moins volubiles. Fleurs petites, solitaires dans l'axe ou 2 ou rarement plusieurs, disposées en cymes, sessiles ou rarement pédonculées. Calice petit avec ou sans glande à la base; corolle cylindrique ou campanulée, avec 5 lobes; corona absente; gynostegium sessile. Follicules épaisses, arrondies.

A. leptophyllus Schlechter.

Asclepias L.

Arbrisseaux ou généralement herbes. Feuilles opposées, verticillées ou alternes. Fleurs disposées en ombelles terminales ou axillaires. Calice géné-

ralement petit souvent glandulaire à l'intérieur; corolle profondément pentalobée, les segments fortement réfléchis; couronne de 5 coiffes dressées ou divergentes qui sont généralement ornées à l'intérieur; étamines insérées à la base de la corolle; filets unis en tube, enveloppant le stigmate; anthères avec appendice membraneux au sommet, pollinie solitaire et pendant dans chaque sac de l'anthère; stigmate tronqué, avec 5 angles ou lobes. Follicules lisses ou échinées.

A. nivea L. «Lava ropa» (St-Domingue).

A. curassavica L. «Herbe Madan Bouvin» (Haïti), «Mata Cavaille» (St-Domingue).

A. curassavica L. Var. **concolor** Krug. et Urb.

Calotropis R. Br.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles larges, grandes, à pétiole court ou sessiles, opposées. Inflorescence ombellée; fleurs externes verdâtres, fleurs internes pourpres. Calice lancéolé-ovoïde, avec beaucoup de glandes à la base; corolle campanulée, presque coriacée; corona simple; gynostegium stipité; stigmate capité. Follicules courtes, renflées, souvent très larges.

C. procera (Ait.) R. Br. «Arbre soie» «Coton soie»

Metastelma R. Br.

Sarments ou arbrisseaux grimpants, grêles. Feuilles opposées, petites; cymes ombelliformes, sessiles ou courtement pédonculées; fleurs très petites, blanchâtres. Calice pentalobé, généralement avec de toutes petites glandes à l'intérieur; corolle plus ou moins campanulée, profondément pentalobée, valvée, lobes généralement papilleux ou vilieux, les écailles de la corona membraneuses; stigmates planes ou apiculés. Follicules cylindriques, lisses.

M. astephanoides Schltr.

M. picardæ Schlechter.

M. decaisneanum Schlechter.

M. domingense Schlechter.

M. aemulans Schlechter.

M. stenoglossum Schlechter.

M. leptocladum (Dcne.) Schlechter.

M. ephedroides (Griseb.) Schlechter.

M. filiforme (Griseb.) Ch. Wright.

M. gracile Dcne.

M. tylophoroides Schlechter.

M. crassiusculum Schlechter.

Tæniönema Schlechter.

Plantes volubiles grimpant très haut. Feuilles oblongues-elliptiques. Fleurs solitaires dans l'axe des feuilles ou 2-3, avec court pédoncule. Calice profondément pentalobé, avec 5 petites glandes internes, placées à la base, légèrement poilu, segments dressés ou étendus, lancéolés, pointus; corolle semi-globulaire, réticulée, garnie de poils mous, presque pentalobée jusqu'au milieu, segments dressés — étendus, ovales, oblongs, tronqués; extrémités de la corona 5, fixées à la base du tube staminal, de chaque côté de la base se trouve une membrane épaisse; gynostegium sessile; anthères oblongues, presque carrées, les bords arrondis à la base; appendice membraneux sur le stigmate comprimé; pollinies obovales, légèrement comprimées.

T. occidentale (Spreng.) Schlechter, (St-Domingue).

Funastrum Fourn.

Herbes ou sous-arbrisseaux volubiles. Feuilles pétioleées. Fleurs blanches ou pourpres, disposées en cymes axillaires ombelliformes. Calice petit, pentalobé; corolle subrotacée, pentalobée, contordée; corona externe, annulaire, adnée à la corolle; corona interne, formée de 5 larges écailles charnues; pollinie pendante. Follicules cylindriques lisses.

F. clausum (Jacq.) Schlechter, «Liane gain lait» (Haïti), «Bejuco de grajo» (St-Domingue).

Marsdenia R. Br.

Herbes ou sous-arbrisseaux grimpants. Fleurs petites ou de grandeur moyenne, disposées en cymes ombelliformes. Calice pentalobé, glandulaire à l'intérieur; corolle campanulée, la gorge généralement villeuse, les lobes contordus; appendice parfois présent dans les sinus des lobes, les écailles de la corona 5, adnées au tube staminal; stigmate déprimé ou rostré. Follicules épaisses, généralement lisses.

M. linearis Dcne. «Corne cabrite» (Haïti), d'après Urban.

M. clausa R. Br. «Corne cabrite» (Haïti), d'après Urban.

M. nitida (Poir.) Dcne.

M. saturejifolia A. Rich.

M. haïtiens Urb. et Ekm.

M. dictyophylla Urb.

Poicillopsis Schlechter.

Plantes volubiles. Feuilles lancéolées — cordiformes. Fleurs petites, en cymes ombellées. Sépales petits, oblongs, lancéolés, aigus; corolle rotacée avec tube court et segments operculés du côté droit; segments 5, fixés au tube du gynostegium, encapuchonnés ou infléchis latéralement; étamines operculées; anthères dépourvues d'appendices à la partie médiane.

P. ovatifolia (Griseb.) Schlechter, «Bejuquito» (St-Domingue), d'après Urban.

P. tuerckheimii Schlechter.

P. crispiflora Schlechter.

Ibatia Dcne.

Arbustes volubiles et sous-arbrisseaux avec poils de couleur de rouille et feuilles cordiformes. Fleurs disposées en ombelles axillaires, sessiles, formant à l'extrémité des rameaux aphylls des épis discontinus. Sépales petits, oblongs ou ovoïdes, acuminés, alternant avec 1 glande; corolle rotacée, velue à l'extérieur, avec des segments recouverts à droite; corona fixée à la corolle, segments 5 ou 10 lobes, à l'intérieur entre les étamines munies de sacs superficiels; gynostegium court, sessile; anthères avec connectif appendiculé, large, membraneux; pollinies pendantes; stigmate capité, plat, avec au milieu un appendice claviforme avec 2 tubercules au sommet. Fruit folliculaire.

I. maritima (Jacq.) Dcne, «Corne cabrite» (Haïti), «Curamaguey» (St-Domingue), d'après Urban.

Gonolobus R. Br.

Sarments vivaces, volubiles, herbacés. Feuilles opposées, cordées, minces. Fleurs en cymes axillaires pédonculées. Lobes du calice 5, glandulaires à l'intérieur, lancéolés; corolle blanche, campanulée, lobes 5, légèrement contordés, presque droits; couronne presque sessile, de 5 lobes membraneux, dressés, tronqués, chaque lobe appendiculé par 2 soies terminales; étamines insérées à la base de la corolle; filets unis en un tube court; anthères terminées

par une membrane plus ou moins dressée, les ailes de l'anthère cornées, sail-lantes à la base; pollinies oblongues-elliptiques, sur des caudicules plutôt larges, pendantes; stigmate conné, légèrement bilobé. Follicules épaisses, angulées. Graines chevelues.

G. membranaceus Schlechter.

G. pauciflorus Spreng.

G. dictyopetalus Urb. et Ekm.

Ordre XL. POLEMONIALES

Herbes ou parfois arbustes ou arbres. Feuilles avec limbes dilatés ou en forme d'écailles. Fleurs principalement parfaites, disposées de façons diverses. Calice de sépales partiellement unis; corolle gamopétale, régulière ou irrégulière. Androcée composé d'autant d'étamines qu'il y a de lobes dans la corolle, ou de moins d'étamines parfois représenté en partie par des staminodes, parfois en partie obsolète. Gynécée de 2 carpelles distincts ou de plusieurs carpelles unis. Fruit, une capsule, une baie, une drupe ou un groupe de noyaux ou encore en forme d'utricule.

x. Corolle régulière; étamines aussi nombreuses que les lobes de la corolle. Feuilles généralement alternes. Ovaire de 1—beaucoup d'ovules:

2x. Pistil 3—mère; lobes de la corolle convolutés 154. **Polemoniaceæ**, p. 309

2x. Pistil non 3—mère:

3x. Lobes de la corolle imbriqués ou rarement convolutés:

4x. Style généralement profondément bifide ou même séparé en 2 styles distincts. Capsule uniloculaire, bivalvée, avec 2 placentas pariétaux ou introfléchis, ou parfois biloculaire

155. **Hydrophyllaceæ**, p. 309

4x. Style généralement entier, ou courtement bifide, rarement autrement; ovaire quadriovulé, généralement quadrilobé et mûrissant sous forme de 4 noyaux séparés ou séparables, —ou non lobé avec 3—4 loges et se séparant à maturité en 2 ou 4 noyaux

156. **Borraginaceæ**, p. 310

3x. Limbes de la corolle plus ou moins plissés ou rarement imbriqués:

4x. Ovaire biloculaire (parfois avec 3 ou 4 loges éperonnées) devenant une capsule globulaire de 4—6 graines. Graines basilaires.

153. **Convolvulaceæ**, p. 304

4x. Ovaire biloculaire (rarement 3—5 loges) avec de nombreux ovules sur des placentas axillaires, devenant une gousse ou une baie

159. **Solanaceæ**, p. 326

x. Corolle généralement irrégulière ou oblique; étamine postérieure différant des autres, abortive ou même absente:

2x. Carpelles avec un nombre indéfini d'ovules ou avec 2 ovules l'un au-dessus de l'autre:

3x. Graines généralement avec endosperme. Ovaire parfaitement biloculaire; placenta central

160. **Scrophulariaceæ**, p. 332

3x. Graines sans endosperme:

4x. Plantes insectivores, souvent aquatiques. Ovaire uniloculaire, globulaire avec placenta libre ou basilaire:

165. **Lentibulariaceæ**, p. 344

- 4x. Plantes non insectivores, non aquatiques:
 5x. Graines ailées. Ovaire biloculaire, rarement uniloculaire. Arbres ou arbustes grimpants..... 161. *Bignoniaceæ*, p. 336
 5x. Graines non ailées:
 6x. Ovaire uniloculaire ou avec 2-4 fausses loges:
 7x. Fruit dressé ou spiralé..... 164. *Gesneriaceæ*, p. 341
 7x. Fruit falciforme rostré..... 163. *Martyniaceæ*, p. 341
 6x. Ovaire de 2-4 loges:
 7x. Plantes très mucilagineuses, pas de crampons dans les graines. Fruit souvent avec crampon ou épineux..... 162. *Pedaliaceæ*, p. 340
 7x. Plantes non visiblement mucilagineuses. Crampons dans les capsules aidant à la dissémination des graines..... 166. *Acanthaceæ*, p. 344
 2x. Carpelles avec 2 ovules placés l'un à côté de l'autre, ou même uniovulés:
 3x. Fruit non divisé en 4 noyaux. Ovaire non quadrilobé:
 4x. Loges de l'ovaire avec 2-10 ovules. Arbres ou arbustes..... 167. *Myoporaceæ*, p. 350
 4x. Loges de l'ovaire avec 1 ovule. Herbes ou arbrisseaux..... 157. *Verbenaceæ*, p. 314
 3x. Fruit divisé en 4 noyaux. Ovaire quadrilobé..... 158. *Menthaceæ*, p. 320

Famille 153. CONVULVACEÆ

Plantes dressées ou grimpantes, ligneuses ou herbacées. Feuilles alternes, simples ou composées-digitées, souvent lobées, dénuées de stipules. Fleurs régulières, parfaites, généralement grandes et voyantes, le plus souvent sinueuses. Calice infère, pentalobé, les sépales libres ou presque libres, fortement imbriqués; corolle gamopétale, infundibuliforme, campanulée ou en forme de soucoupe, pentalobée, généralement indupliquée-valvée. Étamines 5, insérées sur le tube de la corolle; styles simples ou bifides, le ou les stigmates capités ou bifides. Fruit capsulaire, de 2-5 loges, les loges monospermes ou bispermes.

- x. Plantes sans chlorophylle, parasites. Embryon sans cotylédons, spiralé. Feuilles absentes ou squameuses..... *Cuscuta*, p. 305
 x. Plantes vertes. Embryon avec cotylédons, dressé ou légèrement recourbé:
 2x. Ovaire le plus souvent divisé. Carpelles 2-4, distincts ou presque distincts; styles 2, basilaires..... *Dichondra*, p. 305
 2x. Ovaire entier, style 1, très rarement divisé jusqu'à la base ou 2 styles:
 3x. Styles 2, chacun bifide (stigmates linéaires-filiformes)..... *Evolvulus*, p. 306
 3x. Style non divisé jusqu'au stigmate:
 4x. Fruit non déhiscent, baccaire ou dur:
 5x. Stigmate bilobé avec les lobes linéaires ou cylindriques..... *Rivea*, p. 308
 5x. Stigmate capité ou plus ou moins bi-capité:
 6x. Feuilles non garnies à la face inférieure de grosses glandes en forme de tumeur..... *Argyreia*, p. 309

- 6x. Feuilles garnies à la face inférieure de grosses glandes en forme de tumeur..... *Stictocardia*, p. 309
 4x. Fruit capsulaire, déhiscent avec péricarpe mince ou dur:
 5x. Sépales petits au début, puis très développés pendant la fructification, ailés et à membrane sèche..... *Porana*, p. 306
 5x. Sépales variés, parfois de grosseur inégale, caducs:
 6x. Stigmate ovoïde ou subglobulaire:
 7x. Sépales externes différents des sépales internes, le plus souvent cordiformes ou étendus..... *Aniseia*, p. 306
 7x. Sépales tous égaux ou très peu différents, jamais étendus:
 8x. Capsule à déhiscence longitudinale par 2-8 valves:
 9x. Étamines et style exerts; corolle en forme de soucoupe:
 10x. Tube de la corolle grêle, cylindrique; limbe très large..... *Calonyction*, p. 308
 10x. Tube de la corolle étroitement infundibuliforme; limbe très étroit..... *Quamoclit*, p. 308
 9x. Étamines et style inclus; corolle campanulée ou infundibuliforme:
 10x. Pollen lisse..... *Merremia*, p. 307
 10x. Pollen épineux..... *Ipomoea*, p. 307
 8x. Capsule à déhiscence irrégulière et transversale, parfois presque operculée..... *Operculina*, p. 307
 6x. Stigmate quelque peu aplati..... *Jacquemontia*, p. 306

Cuscuta L.

Plantes parasites herbacées, jaunes ou orange, succulentes. Feuilles réduites à de toutes petites écailles alternes. Fleurs parfaites. Sépales 5 ou rarement 4; pétales 5, rarement 4, imbriqués; étamines 5, rarement 4, adnées à la gorge des sinus de la corolle au-dessus des écailles; anthères biloculaires; ovaire biloculaire; styles 2, stigmate capité, ovules 2 dans chaque loge. Capsule subglobulaire, déprimée ou légèrement allongée, biloculaire, circomscissile ou indéhiscence, avec 1 à 4 graines.

- C. americana* L. «Amitié» ou «Vermicelle» (Haïti), «Fideo» (St-Domingue).
C. indecora Choisy.
C. domingensis Urb.
C. umbellata H. B. K.

Dichondra Forst.

Herbes petites, glabres ou velues sur les côtés, rampantes ou grimpantes, émettant des racines aux nœuds. Feuilles pétiolées, circulaires ou réniformes. Fleurs petites, solitaires dans l'axe des feuilles. Sépales libres, le plus souvent spatulés; corolle large, campanulée, plus courte que le calice avec 5 lobes, presque valvée; étamines plus courtes que la corolle; ovaires 2, parfois soudés, chaque ovaire biloculaire avec 2 ovules; styles 2, entre les 2 ovaires, filiformes,

avec stigmates capités. Capsules généralement 2, avec 1-2 graines, indéhiscentes ou se déchirant irrégulièrement par 2 valves. Graines sphériques, glabres.

D. repens Forst.

D. repens Forst. Var. *sericea* (Sw.) Choisy.

D. micrantha Urb.

Evolvulus L.

Herbes annuelles ou vivaces, caulescentes, avec pubescence appressée ou hérissée. Feuilles alternes, entières. Fleurs solitaires dans les axes ou en racemes ou panicules terminaux. Calice généralement pédicellé, sépales 5, presque égaux; corolle blanche, rose ou bleue, infundibuliforme, campanulée ou rotacée, limbes plissés, avec 5 angles ou 5 lobes; étamines 5, filets filiformes; ovaire biloculaire, globulaire; styles distincts, chacun bifide; stigmates grêles. Capsule légèrement plus longue que large, de 2-4 valves. Graines 1-4 larges.

E. nummularius L.

E. glaber Spreng.

E. alsinoides L.

E. sericeus Sw.

E. arbuscula Poir.

Porana Burm.

Plantes volubiles. Feuilles généralement cordées-ovées, entières, alternes, pétioles. Fleurs petites, blanches, bleues ou pourpres, cymeuses, racemeuses ou paniculées, pentamères. Calice de 2 lobes semblables, s'élargissant dans le fruit, beaucoup plus court que la corolle campanulée ou infundibuliforme; ovaire biloculaire, ovules 2-4, style 1, capité ou bilobé. Fruit, une petite capsule indéhiscente, oblongue ou bivalvée.

P. paniculata Roxb. «Perles de Noël» ou «Fleurs de Noël» (Haïti), «Velo de novia» (St-Domingue), d'après Urban. Ornemental.

Jacquemontia Choisy.

Herbes dressées, généralement vivaces ou sarments rampants ou volubiles ou arbrisseaux. Feuilles alternes, entières ou rarement dentées ou lobées. Fleurs généralement cymeuses, les cymes parfois très voyantes à cause des bractées très pubescentes. Sépales presque égaux ou les externes beaucoup plus larges que les internes; corolle blanche, bleue ou violette, campanulée, limbes plissés avec 5 angles ou 5 lobes; étamines 5, ne surpassant pas la corolle; filets filiformes ou dilatés à la base, adnés à la base du tube de la corolle; ovaire biloculaire, styles unis au stigmate, ovules 4, 2 dans chaque loge. Capsule subglobulaire, quadrivalvée. Graines glabres.

J. nodiflora (Desr.) G. Don, «Campanilla» (St-Domingue), d'après Urban.

J. jamaicensis (Jacq.) Hallier f.

J. verticillata (L.) Urb.

J. pentantha (Jacq.) G. Don.

J. tamnifolia (L.) Griseb.

J. apocynoides (Schlecht. et Cham.) Urb.

J. tuerckheimii Urb.

Aniseia Choisy.

Herbes ou sous-arbrisseaux des Tropiques, grêles, rampants ou grimpants, avec feuilles de formes variées, glabres, tomenteuses, avec fleur solitaire ou en inflorescence ombellée axillaire. Sépales hétérogène, herbacés, 2 (3) exter-

nes plus grands souvent cordiformes à la base ou s'étendant sur le pédoncule, plus ou moins élargis à l'époque de la floraison, les sépales internes plus courts et plus étroits; corolle petite ou remarquable, campanulée ou infundibuliforme avec bord légèrement lobé; étamines incluses; ovaire biloculaire avec 4 ovules, stigmates avec 2 tubercules plus ou moins globulaires. Fruit capsulaire, biloculaire, déhiscent.

A. martinicensis (Jacq.) Choisy.

A. salicifolia (Desr.) Choisy.

Merremia Dennst.

Merremia ressemble au genre *Ipomoea*. Il s'en distingue essentiellement par son pollen lisse avec 3-11 rides longitudinales ou éparpillées de toutes parts, des émergences circulaires ou des rides disposées en dodécaèdres.

M. dissecta (Jacq.) Hallier f.

M. aegyptia (L.) Urb.

M. quinquefolia (L.) Hallier f.

M. glabra (Aubl.) Hallier f.

M. umbellata (L.) Hallier f.

Operculina S. Manso.

Tiges volubiles, herbacées ou fruticuleuses. Feuilles variées, tantôt entières, tantôt composées-digitées. Calice grand, pyriforme, rétréci au-dessus, sépales scarieux ou papyracés; corolle campanulée ou infundibuliforme; anthères spiralées. Capsules grandes biloculaires avec 4 graines ou imparfaitement quadriloculaires. Graines généralement glabres.

O. populifolia Hallier f.

O. tuberosa (L.) Meissn.

Ipomoea L.

Sarments annuels ou vivaces, grimpants ou rampants, ou rarement plantes dressées. Feuilles alternes, entières, angulées ou lobées. Fleurs solitaires sur des pédoncules axillaires ou disposées en cymes. Sépales 5, membraneux ou charnus, devenant parfois coriacés, imbriqués, non allongés; corolle blanche, rose, bleue, pourpre, rouge, infundibuliforme, généralement divergente; étamines 5, incluses; ovaire biloculaire ou quadriloculaire, les cavités plus ou moins complètement divisées entre les ovules; styles unis. Capsule de 2 ou 4 valves, à déhiscence septifrage. Graines souvent pubescentes.

I. hederacea (L.) Jacq.

I. nil (L.) Roth.

I. acuminata (Vahl.) R. et Sch. «Patate marron.»

I. purpurea (L.) Lam.

I. meyeri (Spreng.) G. Don.

I. tiliacea (W.) Choisy.

I. tenuissima Choisy.

I. rubra (Vahl.) Millsp.

I. pescaprae (L.) Sweet, «Patate lan mer.»

I. litoralis (L.) Boiss.

I. crassicaulis (Benth.) Robinson, «Clochette.» Ornemental.

I. tuba (Schlecht.) G. Don.

I. phillomega (Vell.) House.

I. lachnaea Spreng.

I. macrorrhiza (L.) R. et Sch. «Liane à minguet», d'après Urban.

- I. arenaria* (Choisy) Steud.
- I. clausa* Rudolphi.
- I. viridiflora* Urb.
- I. buchii* Urb.
- I. digitata* L.
- I. rubrocincta* Urb. Var. *brachyloba* Urb.
- I. eriosperma* (Desr.) Urb.
- I. leuconeura* Urb.
- I. nematoloba* Urb.
- I. nematophylla* Urb.
- I. calantha* Griseb.
- I. reptans* (L.) Poir.
- I. pitoniana* Urb.
- I. luteoviridis* Ekm. et Leonard.
- I. heptaphylla* (Rottl. et Willd.) Voigt.
- I. batatas* Lam. «Patate.» Alimentaire.
- I. selleana* Urb.

Calonyction Choisy.

Sarments vivaces, volubiles, généralement avec sève laiteuse. Feuilles alternes, larges. Fleurs odoriférantes. Calice pédicellé, sépales 5, herbacés devenant coriacés, les sépales externes parfois cornés au sommet; corolle blanche en forme de soucoupe, tube allongé, non dilaté à la gorge, limbes amples, contordus; étamines 5; ovaire de 2-4 loges; styles unis au stigmate capité didyme; ovules 4, 2 en 2 cavités ou solitaires dans les 4 cavités. Capsules plus longues que larges.

- C. aculeatum* (L.) House.

Quamoclit Moench.

Sarments vivaces ou annuels, volubiles, avec feuillage généralement glabre. Feuilles alternes, entières, lobées ou divisées-pinnées. Fleurs en cymes axillaires ou solitaires. Sépales 5, membraneux ou herbacés, égaux ou presque égaux; corolle souvent écarlate, en forme de soucoupe, tube étroitement infundibuliforme, limbes divergents, plus courts que le tube, pentalobés; stigmates 5, exerts; filets filiformes; ovaire biloculaire ou imparfaitement quadriloculaire; styles unis, stigmates capités, ovules 4. Capsule subglobulaire ou quelque peu allongée généralement quadriloculaire. Graines 4.

- Q. pinnata* (Desr.) Boj.
- Q. coccinea* (L.) Moench.

Rivea Choisy.

Herbes volubiles, grimpantes, rarement à branches dressées. Tiges solides, ligneuses. Feuilles voyantes ou grandes, penninerves, souvent velues sur les côtés. Fleurs grandes, rarement solitaires, plus rarement en inflorescence plus ou moins ombellée ou capitée de peu ou de plusieurs fleurs, souvent enveloppées de grandes bractées; inflorescence axillaire avec pédoncules longs. Sépales égaux, ovoïdes, ou oblongs, obtus; corolle en forme de soucoupe ou d'un grand entonnoir avec bord très courtement lobé; étamines incluses; filets courts, parfois poilus à la base; anthères oblongues — lancéolées, obtuses; disque annulaire; ovaire quadriloculaire, chaque loge avec 1 ovule; style filiforme, stigmate bilobé, lobes oblongs-linéaires et filamenteux. Fruit plus ou moins charnu ou presque sec, brillant, indéhiscence ou s'ouvrant irrégulièrement. Graines 4, glabres ou moindres par avortement.

- R. bracteata* (Rudolphi) Hallier f. «Cheveux de Vénus» (Haïti). Ornemental.
- R. corymbosa* (L.) Hallier f. «Marie-Claude» (Haïti), «Pascua» (St-Domingue). Ornemental.

Stictocardia Hallier f.

Diffère du genre *Argyreia* par l'habitat et par les fruits articulés quadriloculaires. Ceux-ci, enveloppés profondément des sépales d'une couleur sombre, contiennent 4 graines dont les plus externes veloutées. Les feuilles sont garnies à la partie inférieure de grosses glandes comprimées, affectant la forme d'une figue.

- S. tiliifolia* (Desr.) Hallier f.

Argyreia Lour.

Herbes volubiles ou grimpantes comme le genre *Rivea*. Feuilles penninerves, généralement voyantes et larges, rarement étroites (lancéolées). Inflorescence axillaire, souvent paniculée avec des bractées petites — grandes; fleurs remarquables, violettes, rouges ou blanches. Se distingue principalement du genre *Rivea* par les lobes du stigmate plus ou moins sphériques ou seulement indiqués. Sépales souvent oblongs ou lancéolés, égaux ou inégaux, les sépales internes étroits, rarement plus développés à la fructification; corolle infundibuliforme, avec 5 angles ou 5 lobes; étamines généralement plus larges à la base. Fruit charnu ou sec et dur, indéhiscence, souvent monosperme.

- A. speciosa* (L. f.) Sweet, «Liane tonnelle» ou «Liane d'argent» ou «Coup d'air.»

Famille 154. POLEMONIACEÆ

Herbes annuelles ou généralement vivaces ou plantes ligneuses. Feuilles alternes ou opposées, souvent agrégées, entières ou composées-pinnées. Inflorescence paniculée, corymbeuse, parfois agrégée; fleurs parfaites, régulières ou presque régulières. Calice de 5 sépales partiellement unis; corolle régulière, pentalobée. Étamines 5, généralement inégales, adnées au tube de la corolle; anthères introrses, à déhiscence longitudinale. Ovaire triloculaire, avec un axe épais; styles unis; stigmates 3; ovules solitaires, dressés, anatropes ou plusieurs en 2 séries, ascendants, amphytropes. Fruit, une capsule triloculaire, à déhiscence loculicide, les valves généralement se séparent de l'axe central auquel sont attachées les graines. Graines solitaires ou nombreuses dans chaque cavité, avec un testa spongieux ou mucilagineux.

Gilia R. et P.

Caractères de la famille.

- G. incisa* Benth. St-Domingue.

Famille 155. HYDROPHYLLACEÆ

Herbes ou rarement arbrisseaux avec sève aqueuse. Feuilles alternes, ou rarement opposées, sans stipules; limbes entiers ou lobés ou pinnatifides. Fleurs bisexuées, généralement en cymes scorpioides, terminales ou axillaires, rarement solitaires. Calice profondément pentalobé (rarement 10-12 lobes); corolle gamopétale, pentalobée (rarement 6-10 lobes). Étamines 5 (rarement 6 à 10), insérées sur la corolle et alternant avec ses lobes; filets libres et filiformes; anthères introrses, oscillantes. Ovaire supère, généralement uniloculaire, avec 2 placentas et 2 à plusieurs ovules ou parfois biloculaire; styles 2, distincts ou partiellement unis. Fruit, une capsule bivalvée, loculicide, rarement septicide ou à déhiscence irrégulière.

- x. Corolle infundibuliforme. Nama, p. 310
- x. Corolle grande, campanulée. Wigandia, p. 310

Nama L.

Plantes herbacées ou ligneuses, vivaces, parfois armées d'épines. Feuilles alternes, entières. Cymes ou vertes ou agrégées. Calice souvent pubescent, avec lobes presque distincts; corolle bleue ou rarement blanche, infundibuliforme — rotacée, tube sans appendice, lobes 5, imbriqués; étamines 5; filets insérés à la base du tube de la corolle, dilatés à la base; ovaire biloculaire ou rarement triloculaire; styles distincts; stigmates capités; ovules nombreux sur chaque placenta adhérent. Capsules ovoïdes ou subglobulaires, à déhiscence septicide ou quelque peu irrégulière. Graines nombreuses.

N. jamaïcense L.

Wigandia H. B. K.

Herbes élevées ou sous-arbrisseaux. Feuilles très grandes, simples et dentées. Fleurs sessiles, disposées en cymes terminales scorpioides. Calice profondément pentaloqué à la base; corolle large campanulée, sans écailles à l'intérieur, limbes grands, divergents, pentaloqués; étamines généralement exsertes; ovaire uniloculaire ou imparfaitement biloculaire, avec de nombreux ovules, les 2 styles filiformes, avec stigmates capités, claviformes. Capsule bivalvée, à déhiscence généralement loculicide.

W. urens (L.) Urb. «Feuilles malfini» (Haïti), «Pringa moza» (St-Domingue).

Famille 156. BORRAGINACEÆ

Arbres, arbustes, arbrisseaux ou herbes. Feuilles entières ou dentées, alternes ou rarement opposées, dénuées de stipules. Fleurs parfaites, régulières, généralement en cymes, les branches généralement scorpioides. Calice infère, généralement persistant, tubulaire ou campanulé, sépales généralement 5, rarement 4, plus ou moins unis; corolle gamopétale, subrotacée — infundibuliforme ou en forme de soucoupe, le limbe généralement pentaloqué. Étamines aussi nombreuses que les lobes de la corolle et alternant avec eux, insérées sur la corolle. Ovaire de 2 carpelles supères, bi-ovulés, souvent quadrilobés comme s'il s'agissait de 4 carpelles uniovulés; styles entiers ou 1-2 fois bifides. Fruit drupacé ou formé de 4 petits noyaux.

x. Style terminal; ovaire non divisé (ou seulement quadrilobé latéralement et surmonté du style:

2x. Style 2 fois bifide; ovaire non lobé stigmates non annulaires. Cotylédons pliés:

2x. Style entier, bifide ou bipartite (les divisions parfois coalescentes au sommet); stigmates plus ou moins capités. Cotylédons plats, non pliés:

3x. Style non garni d'un anneau de poils:

4x. Style bilobé jusqu'à moitié:

5x. Calice fermé dans le bourgeon, alors bipentaloqué.....

5x. Calice quinquepartite.....

4x. Style bipartite.....

3x. Style généralement garni d'un grand cercle de poils, surmonté d'un appendice entier ou bilobé:

4x. Fruit drupacé.....

4x. Fruit sec, se séparant en 2 ou 4 noyaux.....

x. Style entier ou bilobé; ovaire tétrapartite (rarement bipartite), le style placé au milieu des divisions:

Cordia, p. 311

Beureria, p. 312

Ehretia, p. 312

Rocheortia, p. 312

Tournefortia, p. 312

Heliotropium, p. 313

2x. Écailles et appendices dans la gorge de la

corolle larges et obtus..... *Myosotis*, p. 314

2x. Écailles dans la gorge, linéaires-subulées..... *Symphytum*, p. 314

Cordia L.

Arbres ou arbustes. Feuilles généralement alternes, pétiolées, entières ou dentées. Fleurs disposées en cymes, capitules ou épis. Calice tubulaire ou campanulé, souvent strié de 3-5 dents ou lobes; corolle infundibuliforme, campanulée ou en forme de soucoupe, généralement de 4-6 lobes, parfois plus (18 lobes); étamines aussi nombreuses que les lobes de la corolle, styles quadrilobés ou quadripartites. Fruit drupacé, quadriloculaire, généralement avec 4 graines, sous-tendues ou plus ou moins enveloppées par le calice persistant.

C. alliodora (R. et P.) Cham. «Bois soumis» ou «Chêne caparo.»

C. alba (Jacq.) R. et Sch. «Bois chique.»

C. sebastena L. «Coquelicot» [*C. brachycalyx* Urb. (comb. nov.)].

C. juglandifolia Jacq.

C. buchii Urb. «Bois d'ine» (Haïti), «Coquillo» (St-Domingue), d'après Urban.

C. ensifolia Urb. «Bèbelle» ou «Belle-belle.» Ornemental.

C. fitchii Urb.

C. domingensis Lam.

C. collococca L. «Trois pieds.»

C. nitida Vahl.

C. nitida Vahl. Var. *angustata* Urb.

C. lævigata Lam.

C. sulcata P. DC. «Parésol» Ile de la Tortue.

C. corymbosa (L.) G. Don.

C. cylindrostachya (R. et P.) R. et Sch.

C. integrifolia (Desv.) R. et Sch.

C. haïtiensis Urb.

C. exarata Urb.

C. microphylla (Desv.) R. et Sch.

C. globosa (Jacq.) H. B. K.

C. picardæ Urb.

C. barahonensis Urb.

C. nashii Urb. et Britton.

C. selleana Urb.

C. lima (Desv.) R. et Sch.

C. lima (Desv.) R. et Sch. Var. *subinflata* Urb.

C. areolata Urb.

C. calcicola Urb.

C. lamprophylla Urb.

C. anisodonta Urb.

C. serrata Gurke, «Bonbon captain», «Fleur dent.»

C. oligodonta Urb.

C. tortuensis Urb. et Ekm.

C. claviceps Urb. et Ekm.

C. fasciculata Urb. et Ekm.

C. brittonii (Millsp.) Macbride.

C. gerascanthus L.

C. ignea Urb. et Ekm. Santo Domingo.

C. jeremiensis Urb. et Ekm.

- C. gibberosa* Urb. et Ekm. Massif de la Hotte.
- C. perroyana* Urb. et Ekm. Massif du Nord.
- C. badeava* Urb. et Ekm. Massif de la Selle.
- C. bombardensis* Urb. et Ekm.
- C. chabrensis* Urb. et Ekm. Massif du Nord.
- C. dependens* Urb. et Ekm. Massif des Matheux.

Beureria Jacq.

Arbustes ou arbres ou arbrisseaux. Feuilles alternes, pétioles, entières. Fleurs plutôt grandes en cymes terminales corymbiformes. Calice campanulé, de 2-5 lobes, les lobes valvés; corolle en forme de soucoupe, le limbe généralement pentalobé; styles bifides; stigmates aplatis. Fruit, une drupe, contenant 4 petits noyaux osseux.

- B. glandiflora* (Poir.) Griseb.
- B. albo-punctata* O. E. Schulz.
- B. tomentosa* (Lam.) G. Don. Var. *modesta* O. E. Schulz, (var. nov.) Plaine Centrale.
- B. ovata* Miers. Var. *hirtella* O. E. Schulz (var. nov.) «Café marron.»
- B. succulenta* Jacq. «Café marron» ou «Mapou gris.»
- B. succulenta* Jacq. Var. *revoluta* (H. B. K.) O. E. Schulz, var. *canescens* O. E. Schulz.
- B. velutina* (P. DC.) Gurke.
- B. domingensis* (P. DC.) Griseb.
- B. virgata* (Sw.) G. Don.
- B. virgata* (Sw.) G. Don. Var. *vestita* O. E. Schulz.
- B. nashii* Britton.
- B. brachypoda* O. E. Schulz. Massif de la Hotte.
- B. urbanii* O. E. Schulz. Près de Port-de-Paix.
- B. maritima* O. E. Schulz. Santo-Domingo.

Ehretia L.

Arbustes ou arbres. Feuilles alternes, entières ou serratées. Fleurs petites, blanches, disposées en cymes corymbeuses ou paniculées. Calice campanulé, persistant, pentalobé; corolle pentalobée, divergente; étamines 5, adnées au tube de la corolle; ovaire uniloculaire ou incomplètement quadriloculaire par le développement de 2 placentas pariétaux; styles bifides, filiformes, partiellement unis; stigmates déprimés-capités ou clavés. Fruit, une petite drupe.

- E. tinifolia* L. «Chêne noir» ou «Filière» (Haïti), «Arrayan» (St-Domingue).

Rocheortia Sw.

Arbrisseaux avec feuilles entières, coriaces, oblongues. Fleurs petites, solitaires ou axillaires; inflorescence cymeuse. Calice pentalobé, rarement quadrilobé, lobes imbriqués; corolle avec tube très court, généralement pentalobée, rarement quadrilobée, lobes larges, valvés; étamines 4-5, avec anthères oblongues — ovoïdes; ovaire quadriloculaire; styles bifides, filiformes. Fruit drupacé, avec 4 petits noyaux.

- R. cuneata* Sw.
- R. acanthophora* (P. DC.) Griseb, «Bois d'ébène.»

Tournefortia L.

Arbres, arbustes ou sarments, avec feuillage généralement très pubescent. Feuilles alternes, très variées. Fleurs petites, disposées en cymes scorpioides, en racemes ou épis. Calice persistant, lobes 5, étroits, imbriqués ou distants;

corolle blanche ou pâle, en forme de soucoupe, gorge nue, pentalobée, lobes divergents, imbriqués ou indupliques; étamines 5, incluses; ovaire quadriloculaire, styles unis. Fruit drupacé, petit, contenant 4 petits noyaux.

- T. gnaphalodes* (L.) R. Br.
- T. glabra* L.
- T. hirsutissima* L. «Nigua» ou «Nigua peluda» (St-Domingue), d'après Urban.
- T. bicolor* Sw. «Liane chique» (Haïti), «Nigua» (St-Domingue), d'après Urban.

- T. scabra* Lam.
- T. scabra* Lam. Var. *ovalifolia* Griseb.
- T. gibberosa* Urb.
- T. conocarpa* Urb.
- T. peruviana* Poir.
- T. volubilis* L.
- T. picardæ* Urb.
- T. ferruginea* Lam. «Kallaba» (Haïti).
- T. suffruticosa* L.
- T. stenophylla* Urb.
- T. selleana* Urb. et Ekm.
- T. oblongata* Urb. et Ekm.
- T. setifera* Urb. et Ekm. Massif de la Hotte.
- T. laurifolia* Vent. Santo-Domingo.
- T. petionvillæ* Urb. et Ekm. Massif de la Selle.
- T. minuta* Bertero. Près des Anses à Pitres.

Heliotropium L.

Herbes ou arbrisseaux avec feuillage généralement pubescent. Feuilles alternes ou rarement opposées, limbes variés. Fleurs généralement disposées en épis ou racemes terminaux scorpioides ou rarement axillaires. Calice pentalobé, étroit; corolle pentalobée indupliquée ou imbriquée, cylindrique, souvent nue à la gorge et infléchie au sommet; étamines 5; filets courts, adnés au tube de la corolle; anthères parfois appendiculées; ovaire quadriloculaire ou biloculaire avec 2 placentas; styles unis; ovules pendants. Fruit sec, bilobé ou quadrilobé, se séparant en 2-4 petits noyaux.

- H. curassavicum* L.
- H. parviflorum* L. «Crête coq» (Haïti), «Mocos de pavo» (St-Domingue).
- H. indicum* L. «Crête coq» (Haïti), «Mocos de pavo» (St-Domingue).
- H. inundatum* Sw.
- H. campechianum* H. B. K.
- H. dichroum* Urb.
- H. humile* (L.) R. Br.
- H. crispiflorum* Urb.
- H. haïtienne* Urb.
- H. microphyllum* Sw.
- H. humifusum* H. B. K. Plaine du Nord.
- H. glomerulifolium* Urb. et Ekm. Près du Môle St-Nicolas.
- H. plumerii* Urb. et Ekm. Près de Jean-Rabel.
- H. elegans* Urb. et Ekm. Dans le Nord-Ouest.
- H. pedicellare* Urb. et Ekm. Près des Gonaïves.
- H. uninerve* Urb.
- H. hypogæum* Urb. et Ekm.

Myosotis L.

Herbes annuelles ou vivaces, cultivées comme ornement. Plantes branchues, diffuses ou dressées, plus ou moins poilues. Feuilles alternes, entières. Fleurs bleues, roses ou blanches, disposées en racemes terminaux simples ou ramifiés; bractées absentes. Calice petit, pentafide; corolle en forme de soucoupe, avec 5 lobes convolutés, la gorge généralement huppée; étamines 5, incluses; ovaire de 4 lobes presque distincts, formant dans le fruit 4 petits noyaux lisses, brillants, attachés par leur base.

M. intermedia Link.

Symphytum L.

Herbes dressées souvent hispides; racines tubéreuses parfois. Feuilles basilaires ou alternes ou les feuilles supérieures parfois presque opposées; feuilles décurrentes sur la tige. Fleurs en racemes scorpioides, souvent ramifiés ou en cymes terminales. Calice pentafide ou quinquépartite en segments linéaires; corolle largement tubulaire, presque campanulée au-dessus de l'insertion des étamines, la gorge avec 5 écailles lancéolées ou linéaires, les 5 lobes très courts; ovaire quadrilobé. Noyaux 4, obliquement ovoïdes, dressés, rugueux.

S. officinale L. «Borrache.» Massif du Nord.

Famille 157. VERBENACEÆ

Herbes, arbustes, arbrisseaux ou arbres. Feuilles généralement opposées ou verticillées, simples ou composées-digitées, sans stipules. Fleurs parfaites, généralement irrégulières. Calice infère, persistant, campanulé ou tubulaire, quadri ou pentalobé, ou denté; corolle gamopétale, avec 4-5 lobes, tube cylindrique ou amplifié au-dessus, souvent courbé, le limbe souvent bilabié. Etamines parfaites 4 ou 2 attachées à la corolle et alternant avec les lobes; disque présent. Ovaire supère de 2 ou rarement 4-5 carpelles, entier ou avec 2-4 lobes, de 2-5 loges, mais par de fausses cloisons de 4-10 loges, chaque loge avec 1 ovule; styles 5, entiers ou courtement bilobés; stigmates généralement 5. Fruit drupacé ou baccaire ou subcapsulaire de 2-4 loges.

x. Feuilles composées-digitées..... **Vitex**, p. 319

x. Feuilles simples:

2x. Fleurs en capitules, épis ou racemes:

3x. Fleurs disposées en épis ou capitules:

4x. Fruit avec 4 loges monospermes:

5x. Calice plus ou moins tubulaire.

Fruit sec enveloppé dans le calice, se divisant à maturité en 4 noyaux. **Verbena**, p. 315

5x. Calice mûr largement campanulé.

Fruit à noyaux, avec exocarpe charnu et endocarpe dur..... **Tamonea**, p. 316

4x. Fruit avec 2 noyaux ou avec 1 seul par avortement:

5x. Noyau monosperme, non divisé en loges:

6x. Etamines fertiles 4:

7x. Calice distinct et petit avec tube mince et membraneux:

8x. Fruit charnu..... **Lantana**, p. 316

8x. Fruit sec..... **Lippia**, p. 316

7x. Calice plus grand, plus épais, tubulaire..... **Bouchea**, p. 317

6x. Etamines fertiles 2..... **Stachytarpheta**, p. 317

5x. Noyau avec 2 graines, biloculaire.

Feuilles opposées..... **Priva**, p. 317

3x. Fleurs en racemes:

4x. Fruit avec 2 noyaux monospermes, non divisés. Lobes du calice plus longs que le tube..... **Petreaea**, p. 317

4x. Fruit avec 2 ou 4 noyaux biloculaires ou dispermes. Lobes du calice plus courts que le tube:

5x. Stigmate bilobé. Fruit renfermant 2 noyaux dispermes, avec calice enveloppant seulement la partie basilaire. Fleurs blanches ou jaunes..... **Citharexylum**, p. 318

5x. Stigmate quadrilobé. Fruit contenant 4 noyaux dispermes, complètement enveloppé dans le calice. Fleurs le plus souvent libres..... **Duranta**, p. 318

2x. Fleurs en cymes ou panicules:

3x. Ovules latéraux semi-anatropes; ovaire de 4-10 loges parfaites ou imparfaites:

4x. Corolle actinomorphe; étamines 4 (5) égales:

5x. Fruit avec 4- un nombre indéfini de noyaux:

6x. Stigmate avec lobes courts et obtus..... **Callicarpa**, p. 318

6x. Stigmate avec lobes subulés..... **Aegiphila**, p. 318

5x. Fruit avec un noyau quadriloculaire..... **Petitia**, p. 318

4x. Corolle plus ou moins zygomorphe: étamines 4, dont 2 distinctement plus grandes:

5x. Fruit avec 1 noyau quadriloculaire..... **Cornutia**, p. 319

5x. Fruit divisé en 4 parties avec 4 noyaux ou par avortement moins nombreux:

6x. Calice divergeant largement et uniformément de la base au sommet, le bord entier ou très légèrement sinué-lobé, grand..... **Holmskioldia**, p. 319

6x. Calice non comme ci-dessus..... **Clerodendron**, p. 319

3x. Ovules terminaux, pendants orthotropes:

4x. Fruit sec, quadrisperme. Ovaire biloculaire jusqu'à moitié..... **Congea**, p. 319

4x. Fruit capsulaire, bivalvé, monosperme. Ovaire imparfaitement quadriloculaire avec une petite colonne placentaire libre quadriailée..... **Avicennia**, p. 320

Verbena L.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles opposées, rarement verticillées ou alternes, dentées ou incises ou disséquées, rarement entières. Epis terminaux, rarement axillaires, parfois corymbeux ou paniculés sur une tige dressée; fleurs petites ou de grandeur moyenne, sessiles. Calice tubulaire, avec 5 côtes et 5 dents; tube de la corolle droit ou incurvé, limbes divergents, quelque peu bilabiés, les 5 lobes oblongs ou larges, obtus ou rétus; étamines 4, par paires; ovaire entier ou très courtement quadrilobé au sommet; ovules solitaires dans chaque loge. Fruit sec, enveloppé dans le calice, se séparant en 4 petits noyaux étroits.

V. scabra Vahl.

V. domingensis Urb.

Tamonea Aubl.

Sous-arbrisseaux ou herbes dressées avec des branches fines, inflexibles, divergentes. Feuilles opposées, petites, presque sessiles, dentées ou divisées, stipules le plus souvent non dentées. Epis pauciflores, fins, terminaux et axillaires; fleurs petites, solitaires et logées dans l'axe des très petites bractées sessiles. Calice tubulaire au début, campanulé, avec 5 côtes et 5 petites dents; corolle avec tube cylindrique, un peu élargi au sommet, pentalobée, les 2 lobes postérieurs quelque peu plus courts, les antérieurs quelque peu allongés; étamines 4, par paires, insérées au milieu du tube de la corolle; anthères ovoïdes, avec sacs parallèles; connectif des 2 anthères antérieures pourvu d'un petit appendice glandulaire; ovaire de 2 carpelles, presque complètement quadriloculaire, les loges uniovulées; style enfoncé avec stigmatte épaissi, oblique. Fruit à noyau plus ou moins globulaire presque entièrement enveloppé dans le calice, obtus ou court, quadrilobé; exocarpe charnu; endocarpe dur, quadriloculaire. Graine solitaire dans chaque loge.

T. subbiflora Urb. et Ekm.

Lantana L.

Arbustes ou arbrisseaux, parfois semi-grimpants. Feuilles opposées ou ternées, dentées. Fleurs petites en capitules compacts, axillaires ou en épis; bractées présentes. Calice petit, tronqué ou sinuédenté; tube de la corolle cylindrique, le limbe quadri ou pentalobé; étamines 4. Fruit, une petite drupe contenant un noyau biloculaire.

L. aculeata L. «Bonbonnier» ou «Herbe à plomb.»

L. microcarpa Urb.

L. subcordata Urb.

L. involucrata L.

L. reticulata Pers.

L. buchii Urb.

L. trifolia L. «Mélisse marron.»

L. canescens H. B. K.

L. floribunda Urb. et Ekm.

L. bahamensis Britton. Entre Port-de-Paix et Jean-Rabel.

L. alatipes Urb. et Ekm. Massif des Matheux.

L. exarata Urb. et Ekm. Près de Port-de-Paix.

L. pauciflora Urb. Ile de la Tortue.

L. nannocarpa Urb. Morne la Hotte.

Lippia L.

Herbes, arbustes ou arbrisseaux. Feuilles opposées ou ternées, rarement alternes, entières, dentées ou lobées. Fleurs petites, capitées ou épiées; bractées présentes. Calice petit, ovoïde, campanulé ou comprimé, de 2 ou 4 dents; tube de la corolle cylindrique et dressé ou courbé; corolle quadrilobée ou pentalobée, oblique ou quelque peu bilabée; étamines 4, didynames, attachées au milieu du tube de la corolle; ovaire biloculaire, avec 1 ovule dans chaque loge. Fruit sec, biloculaire, inclus dans le calice.

L. nodiflora (L.) L. C. Rich. «Fleur la cigale.»

L. reptans H. B. K.

L. micromera Schauer, «Oregano» (St-Domingue), d'après Urban.

L. geminata H. B. K. «Marguerite.» Médicinal et ornemental.

L. geminata H. B. K. Var. *microphylla* Griseb.

L. flavida Urb.

L. dulcis Trevir.

L. stoechadifolia (L.) H. B. K. «Te chino» (St-Domingue), d'après Urban.

L. spinifera Urb. Massif de la Selle.

Bouchea Cham.

Herbes ou sous-arbrisseaux, avec feuilles opposées, dentées ou découpées, rarement entières. Epis terminaux le plus souvent allongés; fleurs solitaires dans l'axe des bractées, sessiles ou presque sessiles; bractées petites; stipules très petites ou absentes. Calice légèrement tubulaire, avec 5 côtes, pentadenté ou pentalobé; corolle cylindrique, pentalobée, les lobes égaux ou les lobes internes plus petits; étamines 4, filets courts, anthères ovoïdes; ovaire biloculaire avec 2 ovules, styles filiformes. Fruit sec, enveloppé dans un calice persistant, se séparant en 2 noyaux.

B. ehrenbergii Cham. «Verbena» (St-Domingue), d'après Urban.

Stachytarpheta Vahl.

Herbes ou sous-arbrisseaux avec feuilles alternes, généralement dentées. Fleurs blanches, bleues, pourpres ou rouges, disposées en épis terminaux avec des bractées. Calice tubulaire, pentalobé ou denté; corolle cylindrique avec limbe pentalobé; étamines 2, filets courts, staminodes généralement 2 petits; ovaire biloculaire avec 2 ovules. Fruit, une petite noix enveloppée du calice persistant.

S. cayennensis (L. C. Rich.) Vahl.

S. jamaicensis (L.) Vahl. «Verveine violette» (Haïti), «Verbena» (St-Domingue).

S. strigosa Vahl.

S. mutabilis (Jacq.) Vahl.

S. adulterina Urb. et Ekm. Massif du Nord.

Priva Adans.

Herbes vivaces, caulescentes. Feuilles opposées, membraneuses, dentées. Fleurs disposées en épis terminaux ou axillaires, pédonculés; petites ou de grandeur moyenne, solitaires dans l'axe des bractées; bractées très petites. Calice sessile ou presque sessile, tube avec 5 côtes, lobes 5; corolle en forme de coupe, tube droit ou incurvé, légèrement dilaté au-dessus, bords divergents, obliques, légèrement bilabés, lobes 5, courts; étamines 4, didynames, incluses; anthères avec des sacs parallèles, ou légèrement divergents; staminodes très petits ou absents; ovaire quadriloculaire, chaque cavité avec un septa plus ou moins bien développé; ovules 2, ou 1 par avortement. Fruit enveloppé dans le calice, se séparant en 2 petits noyaux.

P. lappulacea (L.) Pers. «Cousin vent» ou «Vendôme.»

P. domingensis Urb.

Petreaea Houst.

Plantes volubiles. Feuilles opposées avec court pétiole. Fleurs bleues, violettes ou pourpres, dans l'axe des bractées, pédoncules courts, disposées en racemes terminaux ou axillaires. Calice plus ou moins tubulaire, avec 5-15 côtes, pentalobé; corolle avec tube court, cylindrique, pentalobée; étamines 4, didynames; styles courts. Fruit plus ou moins biloculaire, avec 1 ovule dans chaque loge. Fruit charnu, coriacé, indéhiscant, enfoncé dans le tube du calice persistant.

P. volubilis L. «Liane St-Jean.» Ornemental.

Citharexylum L.

Arbres ou arbrisseaux parfois armés d'épines axillaires. Feuilles opposées, sans stipules. Fleurs petites en racemes axillaires ou terminaux; pédicelles sous-tendus par de toutes petites bractées persistantes. Calice membraneux, tube étroitement campanulé, avec 5 lobes très petits, persistants; corolle généralement blanche, en forme de soucoupe, pentalobée; étamines 4, didynames; ovaire sessile, incomplètement quadriloculaire, avec 2 placentas pariétaux; stigmate bilobé; ovule solitaire anatrope. Fruit, une drupe sous-tendue par le calice persistant, avec un noyau qui se sépare en 2 petits noyaux bispermes.

C. caudatum L. «Café marron» (Haïti), d'après Urban.

C. microphyllum (P. DC.) O. E. Schulz. «Mala mujer», d'après Urban. Môle St-Nicolas.

C. fruticosum L. «Pendula» (St-Domingue), d'après Urban.

C. fruticosum L. Var. *villosum* (Jacq.) O. E. Schulz.

C. stenophyllum Urb. et Ekm. Massif de la Hotte.

C. glandulosum Urb. et Ekm. Massif de la Selle.

C. schulzii Urb. et Ekm. Près de la Croix des Bouquets.

Duranta L.

Arbrisseaux ou arbustes, souvent avec rameaux épineux. Feuilles opposées ou verticillées, entières ou souvent dentées. Fleurs petites, dans les cymes terminales ou axillaires. Calice pédicellé, tube campanulé, pentalobé; corolle infundibuliforme, de 5 lobes égaux; étamines 4, didynames; anthères avec le connectif non appendiculé; ovaire partiellement ou imparfaitement octolocu- laire; stigmate oblique, parfois inégalement quadrilobé; ovule solitaire ou 2 dans chaque loge. Drupe enveloppée dans le calice persistant, avec 4 petits noyaux.

D. erecta L. «Bois jambette» ou «Maïs bouilli.»

D. erecta L. Var. *domingensis* Urb. [*D. repens* L.]

Callicarpa L.

Arbrisseaux ou arbres avec feuillage pubescent. Feuilles opposées. Fleurs en cymes axillaires. Tube du calice campanulé tronqué ou avec 4 lobes courts; corolle blanche, bleue ou pourpre, tube très court avec 4 lobes imbriqués, égaux; étamines 4, égales; ovaire imparfaitement biloculaire; stigmate bilobé; ovules 2 dans chaque cavité. Drupe globulaire sous-tendue par le calice persistant.

C. aculeolata Schauer.

C. sordida Urb.

C. selleana Urb. et Ekm.

Aegiphila Jacq.

Arbrisseaux ou arbres glabres ou pubescents, souvent volubiles, avec feuilles entières, opposées. Fleurs disposées en cymes axillaires ou terminales, souvent dioïques apparemment. Calice campanulé, quadrilobé ou denté; tube de la corolle court, quadrilobé; étamines 4, égales, avec filets très courts; ovaire biloculaire, avec 2 ovules dans chaque loge; styles exerts; stigmates bilobés. Fruit petit, drupacé, sous-tendu par le calice persistant avec 4 petits noyaux.

A. elata Sw.

A. nervosa Urb.

A. subopposita Urb. et Ekm. Massif de la Hotte.

Petitia Jacq.

Arbrisseaux ou arbustes avec feuilles opposées, entières. Fleurs petites.

Calice petit, largement campanulé, quadrilobé ou denté. Tube de la corolle court, quadrilobé. Étamines 4, égales avec filets très courts. Ovaire biloculaire avec 2 ovules dans chaque loge. Styles exerts. Stigmates bilobés. Fruit petit, drupacé, sous-tendu par le calice persistant, avec 4 petits noyaux.

P. domingensis Jacq. «Bois d'ortie» ou «chêne callebassie» (Haïti), «Capa blanco» (St-Domingue).

P. urbanii Ekm.

Cornutia L.

Arbrisseaux élevés. Feuilles opposées, entières ou dentées. Fleurs petites, violettes, disposées en cymes, celles-ci en grandes panicules terminales. Calice petit, campanulé, sinué-denté, non développé dans le fruit, tube de la corolle dressé ou courbé, quadrilobé; étamines parfaites 2; 2 staminodes aussi présents. Fruit, une petite drupe globulaire.

C. pyramidata L. «Azulejo» (St-Domingue), d'après Urban.

Vitex L.

Arbrisseaux ou arbres. Feuilles opposées, composées-digitées; folioles 3-7, rarement 1. Fleurs en cymes parfois verticillées. Calice campanulé avec 5, rarement 3 lobes. Corolle blanche, bleue, violette ou jaune; étamines 4, didynames, souvent exertes; ovaire au début imparfaitement biloculaire, plus tard quadriloculaire; ovules 4, solitaires dans chaque loge. Fruit, une drupe généralement sèche.

V. domingensis Urb. et Ekm.

V. umbrosa Sw. «Gri-gri» (Haïti), d'après Urban.

V. heptaphylla A. Juss. «Bois de savane» (Haïti), d'après Urban.

V. divaricata Sw. Var. *haïtiensis* Urb. Près de Dame-Marie.

Clerodendron L.

Arbres ou arbustes souvent grimpants. Feuilles opposées ou verticillées, généralement entières, parfois dentées ou lobées, mais non composées. Fleurs en cymes ou panicules terminales ou axillaires, blanches, violettes ou rouges. Calice campanulé, pentalobé ou denté; tube de la corolle généralement cylindrique et grêle, limbe de 5 lobes plus ou moins inégaux; étamines 4, insérées sur le tube de la corolle; ovaire imparfaitement quadriloculaire, avec 1 ovule dans chaque loge. Fruit, une drupe souvent enveloppée par le calice.

C. aculeatum (L.) Schlechtend.

C. picardæ Urb.

C. fragrans Vent.

C. fragrans Vent. Var. «pleniflora» Schauer, «Hortensia.» Ornamental.

C. fallax Lindl. «Corail.» Ornamental.

C. spinosum (L.) Spreng, «Z'yeux mouton.»

Holmskioldia Retz.

Arbrisseaux glabres ou couverts de poils blancs. Feuilles opposées, entières, ou dentées. Fleurs racemeuses ou cymeuses. Calice divergent, membraneux, coloré, bords entiers, pentalobé; tube de la corolle courbé avec bord oblique, lobes 5, courts; étamines 4, didynames, exertes, ensemble avec le style. Fruit, une drupe ovoïde, quadrilobée, incluse dans le calice.

H. sanguinea Retz. «Chapeau chinois, «Bonnet chinois.» Ornamental.

Congea Roxb.

Plantes ligneuses, grimpantes, tomenteuses. Feuilles entières opposées. Capitules pédicellés, disposés en panicules terminales; bractées de l'involucre

souvent blanches ou nuancées, ovales ou elliptiques unies à la base; cymes de 5-7 fleurs, en forme de capitule entouré d'un involucre élargi, pourvu de 3-4 segments ou articles. Calice oval—globulaire, pentadenté et finalement élargi; corolle avec tube élargi à la partie supérieure, bord étendu très incliné, plus ou moins bilabié, lèvre postérieure externe, bifide et 2 fois plus courte, lèvre antérieure trifide avec des lobes ovoïdes; étamines 4, exertes, insérées à l'extrémité inférieure de la corolle; anthères petites; ovaire biloculaire, plus haut que le milieu, avec des loges imparfaitement séparées comprenant chacune 2 ovules, uniloculaire au sommet; style allongé avec sommet très court, bilobé; ovules terminaux, pendants. Fruit petit, obové, avec exocarpe presque dur, quadripartite et quadrisperme.

C. tomentosa Roxb. Ornamental.

Avicennia L.

Arbustes ou arbres. Feuilles opposées, entières, plus ou moins coriacées. Fleurs disposées en cymes capitées, axillaires et terminales, petites, sessiles; bractées plus courtes que le calice. Calice campanulé, pentalobé; corolle cylindrique, blanche, tube court, pentalobé; étamines 4, filets très courts; ovaire imparfaitement quadriloculaire, avec bords quadriaillés; ovules 4. Fruit capsulaire, oblique, bivalvé.

A. nitida Jacq. «Manglier noir», «Palétuvier» (Haïti), «Manglier prieto» (St-Domingue). Industrial.

Famille 158. MENTHACEÆ

Herbes, arbustes, ou arbrisseaux, généralement aromatiques; tiges généralement quadrangulaires. Feuilles opposées ou verticillées, simples, entières, dentées, lobées ou fendues. Fleurs parfaites, irrégulières ou presque régulières, généralement bilabiées. Calice infère, persistant, gamosépale, avec 5 lobes; corolle gamopétale, généralement pentalobée ou quadrilobée, le bord généralement bilabié; étamines 4-2, adnées au tube de la corolle, filets nus ou barbus, anthères biloculaires. Ovaire libre, profondément quadrilobé, quadriloculaire; styles filiformes, généralement bifides au sommet; ovule solitaire. Fruit composé généralement de 4 petits noyaux ou akènes enfermés dans le calice persistant. Graine solitaire dressée.

x. Style non gynobasique. Noyaux attachés latéralement:

2x. Etamines fertiles 4; anthères biloculaires. Noyaux ridés.....

Teucrium, p. 321

2x. Etamines fertiles 2; anthères biloculaires. Noyaux lisses.....

Rosmarinus, p. 322

x. Style tout-à-fait gynobasique. Noyaux attachés à la base:

2x. Calice muni d'un casque sur le bord supérieur ou lèvre supérieure; lèvres 2, entières.

Scutellaria, p. 322

2x. Calice sans casque sur le bord supérieure, lèvres non entières:

3x. Etamines ascendantes ou divergentes et dressées:

4x. Corolle profondément bilabiée, avec des lobes très inégaux, lèvre supérieure concave, plus ou moins en forme de faucille ou de casque; anthères ovoïdes:

5x. Calice bilabié, lèvre inférieure inclinée contre la lèvre supérieure après l'anthèse et formant la gorge. Corolle avec lèvre supérieure en forme de casque.....

Brunella, p. 322

5x. Calice tubulaire-campanulé avec lobes élargis et alors plus ou moins infundibuliforme, avec 5-10 dents, rarement bilabié, lèvre supérieure concave souvent en forme de casque, rarement plate:

6x. Branches du style très inégales, les postérieures plus courtes que les antérieures:

7x. Lèvre supérieure beaucoup plus longue que lèvre inférieure.....

Leonotis, p. 322

7x. Lèvres égales ou lèvre supérieure plus courte que lèvre inférieure.....

Leucas, p. 323

6x. Branches du style presque égales ou égales:

7x. Noyaux trilatéraux, tronqués au sommet.....

Leonurus, p. 323

7x. Noyaux presque cylindriques, arrondis au sommet.....

Stachys, p. 323

4x. Corolle profondément ou légèrement bilabiée avec lobes généralement très inégaux; lèvre supérieure le plus souvent concave; anthères avec sacs linéaires, étroits:

5x. Etamines fertiles 2.....

Salvia, p. 323

5x. Etamines fertiles 4.....

Sphacele, p. 324

4x. Corolle bilabiée ou presque actinomorphe, avec lobes légèrement différenciés, lèvre supérieure si présente plate ou très légèrement concave; anthères ovoïdes:

5x. Corolle bilabiée:

6x. Filets courbés, convergents sous la lèvre supérieure de la corolle:

7x. Tube du calice avec 13 nervures.....

Micromeria, p. 324

7x. Tube du calice avec 10 nervures.....

Satureia, p. 323

6x. Filets dressés, souvent divergents:

7x. Calice avec dents égales.....

Origanum, p. 326

7x. Calice bilabié, lèvre supérieure distinctement tridentée, lèvre inférieure bilobée.....

Thymus, p. 326

5x. Corolle presque actinomorphe.....

Mentha, p. 325

3x. Etamines déclinées reposant sur la lèvre inférieure de la corolle ou enveloppées par elle:

4x. Lobe antérieur de la corolle court, recourbé en pointe, en forme de poche, rétréci à la base.....

Hyptis, p. 325

4x. Lobe antérieur de la corolle plus long, mais plus étroit que les autres, plat ou légèrement concave.....

Ocimum, p. 325

4x. Lobe antérieur plus long que les autres, concave ou en forme de navire, souvent rétréci à la base, mais non recourbé pendant l'anthèse.....

Coleus, p. 325

Teucrium L.

Herbes, sous-arbrisseaux ou arbustes. Feuilles entières, dentées ou incises. Feuilles florales semblables ou réduites à des bractées; verticilles floraux

2 — rarement beaucoup de fleurs en épis ou capitules racemeux. Tube du calice campanulé, pentadenté; tube de la corolle rarement exsert, limbes apparemment unilabiés avec une grande lèvre inférieure et une petite lèvre supérieure; étamines 4, fortement exsertes, entre les lobes de la lèvre supérieure de la corolle. Noyaux obovoïdes, réticulés, rugueux.

T. inflatum Sw.

T. picardæ Krug. et Urb.

T. cubense Jacq.

Rosmarinus L.

Arbrisseaux toujours verts. Feuilles étroites, entières, avec bords révolutés. Fleurs subsessiles en courts racemes axillaires avec de toutes petites bractées. Calice ovoïde — campanulé, le bord bilabié, la lèvre supérieure avec 3 dents très courtes, la lèvre inférieure bidentée; corolle bilabiée, la lèvre supérieure émarginée ou bilobée, la lèvre inférieure fortement trilobée, le lobe médian grand, fortement concave et abaissé; étamines parfaites 2. Akène lisse, ovoïde, subglobulaire.

R. officinalis L. «Romarin.» Médicinal.

Scutellaria L.

Herbes parfois ligneuses, avec feuillage amer et glandulaire-ponctué. Feuilles opposées, entières et dentées. Fleurs en racemes ou panicules terminaux. Calice campanulé, bilabié, lèvres entières, la lèvre supérieure avec une crête protubérante; corolle blanche, bleue ou violette, tube recourbé formant une gorge, bilabiée, lèvre supérieure arquée, lèvre inférieure avec 2 petits lobes latéraux et 1 grand lobe médian plus ou moins divergent; étamines 4; anthères ciliées, celles de la paire supérieure de filets biloculaires, celles de la paire inférieure uniloculaires.

S. havanensis Jacq.

Brunella L.

Herbes vivaces, feuillage pubescent. Feuilles opposées, dentées, pétiolées. Fleurs agrégées axillaires souvent groupées en panicules terminales continues. Calice bilabié, fermé à maturité, tube avec environ 10 côtes, lèvres supérieures avec 3 lobes courts ou presque tronqués, lèvres inférieures avec 2 lobes étroits; corolle blanche ou pourpre, bilabiée, tube légèrement rétréci à la bouche, lèvre supérieure arquée, lèvre inférieure avec 2 lobes latéraux et 1 lobe médian plus grand; étamines 4, filets variés, 2 stériles et 2 bifurqués au sommet, une fourche portant une anthère; anthères biloculaires avec sacs divergents. Akène lisse.

B. vulgaris L.

Leonotis Pers.

Herbes ou plantes ligneuses. Feuilles opposées, larges, dentées, pétiolées. Fleurs en verticilles compacts. Calice courtement pédicellé, tube avec 10 nervures, oblique à la bouche, lobes 8–10 inégaux, terminés en pointes; corolle jaune, orange ou écarlate, bilabiée, tube dilaté au-dessus, courbé, lèvre supérieure droite, longue, lèvre inférieure avec 3 lobes, le lobe médian légèrement plus long que les latéraux; étamines courtes; anthères biloculaires, sac divergent. Akène triangulaire, trigone, lisse.

L. nepetifolia (L.) R. Br. «Gros tête» ou «Pompon» (Haïti), «Molinillo» (St-Domingue).

Leucas R. Br.

Herbes ou sous-arbrisseaux poilus, laineux, rarement glabres, avec feuilles entières ou dentées, avec ou sans bractées. Fleurs blanches, rarement plus ou moins pourpres, en verticilles voyants, axillaires ou terminaux. Calice tubulaire ou campanulé, avec 10 nervures, avec 5–10 dents; corolle tubulaire, lèvre supérieure dressée, concave, très poilue, lèvre inférieure trilobée, large, lobe médian très grand; disque régulièrement ou irrégulièrement denté; stigmaté avec 2 lobes inégaux. Akène ovoïde, avec 3 noyaux.

L. martinicensis (Jacq.) R. Br. «Badi.»

Leonurus L.

Herbes caulescentes. Feuilles opposées, plates, dentées ou palmées. Fleurs denses, agrégées, axillaires. Calice tubulaire, campanulé, tube avec 5 côtes, non oblique, lobes 5, subulés; corolle blanche ou rose, bilabiée, lèvre supérieure dressée, presque plate ou concave, lèvre inférieure divergente ou réfléchie, trilobée, le lobe médian large, tronqué; étamines parfaites, anthères biloculaires, sacs généralement parallèles. Akène trigone lisse.

L. sibiricus L.

Satureia L.

Herbes et plantes ligneuses aromatiques. Feuilles étroites et entières ou plus larges et dentées; feuilles florales pareilles ou parfois plus petites. Verticilles floraux peu — beaucoup de fleurs; inflorescence simple et presque en épi, plus ou moins racemuse paniculée. Calice tubulaire-campanulé ou tubulaire, rarement campanulé, cylindrique ou presque cylindrique, 10, 13 (15) nervures avec 5 dents égales ou bilabié, lèvre supérieure tridentée et lèvre inférieure bilobée; tube de la corolle court ou long exsert.

S. domingensis Urb. et Ekm.

Stachys L.

Herbes caulescentes, avec feuillage glabre ou pubescent. Feuilles opposées, entières ou dentées, généralement pétiolées. Fleurs agrégées axillaires. Calice généralement campanulé, tube avec 5–10 côtes, lobes 5; corolle pourpre ou blanche ou rarement rouge ou jaune, bilabiée, lèvre supérieure dressée, entière ou crénelée, lèvre inférieure divergente, avec 3 lobes, le lobe médian beaucoup plus grand, entier ou bilobé; étamines parfaites 4, anthères triloculaires, sac généralement divergent. Akène émoussé au sommet.

S. arvensis L.

Salvia L.

Herbes ou plantes ligneuses avec tige feuillue ou en forme de hampe. Feuilles opposées, parfois basilaires, plates, entières, dentées ou lobées. Fleurs agrégées, axillaires, disposées en épis, racemes ou panicules. Calice de forme variée, bilabié, tube avec des côtes, généralement glabre dans la gorge, ou cilié près de la base des lobes, lèvre supérieure trilobée, lèvre inférieure avec 2 lobes plus longs et plus étroits; corolle généralement très colorée, fortement bilabiée, lèvre supérieure courte ou allongée, lèvre inférieure plus longue, divergente, trilobée; étamines 4, mais 2 seulement portant des anthères ou étamines 2; filets variés, la paire postérieure parfois complètement réduite, les filets fertiles avec un connectif transverse au sommet. Akène lisse.

S. occidentalis Sw. «Pti baume marron» (Haïti), «Yerba buena cimarrona» (St-Domingue).

S. bidens Urb.

S. micrantha Vahl. «Cizana» (St-Domingue).

- S. serotina* L.
S. densiflora Benth.
S. constanzæ Urb.
S. wunschmanii Krug. et Urb.
S. azuensis Urb.
S. calaminthæfolia Vahl.
S. brachyphylla Urb.
S. brachyphylla Urb. Var. *subglabra* Urb.
S. cabonii Urb.
S. buchii Urb.
S. brachyloba Urb.
S. selleana Urb.
S. tuerckheimii Urb.
S. uncinata Urb.
S. coccinea B. Juss. «Gueule de lion.» Ornamental.
S. thormanni Urb.
S. microdictya Urb. et Ekm.
S. lachnaïocloa Briquet.
S. arduinervis Urb. et Ekm.
S. foveolata Urb. et Ekm.
S. incumbens Urb. et Ekm.
S. bahorucona Urb. et Ekm.
S. setosa Fernald.
S. parciflora Urb.
S. barkeriana Urb. et Ekm.
S. mornicola Urb. et Ekm.
S. tortuensis Urb.
S. arborescens Urb. et Ekm. Var. *dolichocharpa* Urb.
S. hotteana Urb. et Ekm.
S. ottoschulzii Urb. et Ekm. Var. *neurocalyx* Urb. et Ekm.
S. cognata Urb. et Ekm.
S. haïtiensis Urb. et Ekm.
S. typenhauerii Urb.
S. saccifera Urb. et Ekm.

Sphacele Benth

Plantes ligneuses ou suffrutescentes. Feuilles crénelées. Fleurs solitaires ou en bouquets pauciflores, axillaires ou en racemes terminaux. Calice campanulé, avec environ 10 nervures, nervation réticulée, dents 5, presque égales; tube de la corolle amplifié au-dessus, le limbe légèrement bilobé, quadrilobé; étamines 4. Akène ovoïde, lisse.

S. urbanii Briquet.

Micromeria Benth.

Herbes vivaces ou plantes ligneuses, généralement avec tiges rampantes. Feuilles opposées, limbes variés, souvent larges, entiers ou légèrement dentés. Fleurs agrégées axillaires ou parfois solitaires dans les axes. Calice presque tubulaire, le tube généralement avec 13 côtes, lobes 5 presque égaux, parfois disposés de façon à donner au calice un caractère bilabié; corolle petite, généralement très petite, quelque peu plus longue que le calice, bilabiée, lèvre supérieure dressée, généralement très réduite, lèvre inférieure trilobée, lobe médian souvent crénelé; étamines 4; anthères biloculaires. Akène lisse.

- M. viminea* (L.) Urb. «Thym» (Haïti), d'après Urban.
M. alpestris Urb.
M. brownei (Sw.) Benth.

Mentha L.

Herbes vivaces, avec tiges dressées ou diffuses, aromatiques. Feuilles opposées, plates, ponctuées, dentées ou incises, souvent pétiolées. Fleurs disposées en bouquets denses. Calice souvent ponctué, tube campanulé-tubulaire, avec 10 côtes, lobes 5, égaux ou presque égaux; corolle blanche, rose ou pourpre, presque régulière, tube surpassé par le calice, lobes inégaux, lobe supérieur plus grand que le reste, entier ou émarginé; étamines 4, dressées, filets égaux, anthères biloculaires, sacs parallèles. Akène lisse.

M. nemorosa Willd. «Ti-Baume», «Menthe» (Haïti), «Yerba buena» (St-Domingue). Médicinal.

M. citrata Ehrh.

M. arvensis L. «Ti-baume.» Médicinal.

Hyptis Jacq.

Arbustes ou herbes, très rarement arbres. Feuilles généralement dentées. Calice ovoïde, tubulaire ou campanulé, les 5 lobes égaux; corolle cylindrique, bilabiée, la lèvre supérieure dressée ou divergente, la lèvre inférieure en forme de poche; étamines 4.

H. americana (Aubl.) Urb.

H. capitata Jacq.

H. atrorubens Poit.

H. mutabilis (L. C. Rich.) Briquet.

H. suaveolens (L.) Poit. «Mélisse.» Médicinal.

H. pectinata (L.) Poit.

H. schusteri Urb.

H. scoparia Poit.

H. scoparioïdes Urb.

H. escobilla Urb. «Escobilla» (St-Domingue).

H. verticillata Jacq. «Zhèb bourrique» ou «Maman houane.» Médicinal.

H. domingensis Urb.

H. suaredens Urb.

H. chylantha Urb. et Ekm.

Coleus Lour.

Herbes ou sous-arbrisseaux dressés. Feuilles crénelées, dentées ou serrées. Fleurs petites ou de grandeur moyenne, généralement bleues ou lilas, en racemes épiés terminaux. Calice pentadenté; corolle avec tube exsert et bilabié, lèvre supérieure plus courte que la lèvre inférieure; étamines 4, didynames et déclinées, filets unis en un tube court, libre de la corolle, anthères confluentes. Akène lisse.

C. amboïnicus Loisel. «Oreille» Médicinal et Ornamental.

C. scutellarioides (L.) Benth.

C. laciniatus (Bl.) Benth. Ornamental.

C. blumei Benth. «Manteau St-Joseph.» Ornamental.

Ocimum L.

Herbes ou arbrisseaux avec tiges branchues. Feuilles opposées, généralement dentées. Fleurs en bouquets axillaires, ceux-ci disposés en racemes ou panicules. Calice défléchi à maturité, tube ovoïde, — campanulé, lobes variés;

lobe supérieur large, lobes latéraux plus étroits, lobe inférieur encore plus étroit, plus ou moins unis; corolle souvent blanche, tube plus court que le calice, lobes presque égaux; étamines 4, filets souvent distincts, nus ou appendiculés ou poilus. Akène lisse ou légèrement rugueux.

O. basilicum L. «Basilique» Ornemental.

O. gratissimum L. «Atiayo» (Haïti), «Albahaca de veca» (St-Domingue) Médicinal.

O. micranthum Willd. «Franc basin», «Basilique grandes feuilles», (Haïti), «Albahaca» (St-Domingue). Ornemental.

Origanum L.

Herbes vivaces. Feuilles entières ou dentées. Fleurs en petits épis dressés avec bractées ovées ou lancéolées, vertes ou colorées, les épis agglomérés plus ou moins en corymbes ou panicules. Calice ové — campanulé, avec 5 dents égales, gorge barbue; corolle avec limbe plus ou moins exsert, lèvre supérieure dressée, lèvre inférieure déployée et trilobée; étamines 4, exsertes; style inégalement quadrilobé. Noyaux ovés, lisses.

O. vulgare L. Cultivé comme plante aromatique.

Thymus L.

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux dressés ou rampants, avec une forte odeur de menthe. Fleurs petites, entières, feuilles florales semblables ou en forme de bractées. Verticilles floraux généralement pauciflores, axillaires et distants ou agrégés, terminaux, capités; bractées très petites. Calice ovoïde ou cylindrique, bilabié, la lèvre supérieure large, avec 3 lobes ou 3 dents, la lèvre inférieure divisée en 2 petits segments ciliés; tube de la corolle quelque peu bilabié; étamines 4. Akène ovoïde ou oblong, lisse.

T. vulgaris L. «Thym.»

Famille 159. SOLANACEÆ

Herbes dressées ou grimpantes. Arbrisseaux ou arbustes. Feuilles généralement alternes, sans stipules, limbes très variés. Inflorescence variée; fleurs généralement régulières, parfaites, sur des pédicelles nus. Calice libre, de 5, ou rarement 4-6 sépales, plus ou moins unis, généralement persistants, parfois acrescents; corolle gamopétale, hypogyne, rotacée, campanulée, infundibuliforme ou hypocratériforme, généralement pentalobée. Etamines généralement 5, rarement 4-6, toutes fertiles, adnées au tube de la corolle, alternant avec les lobes; filets généralement dentés; anthères introrsées, à déhiscence longitudinale ou par pores. Ovaire supère, biloculaire ou parfois de 3-5 loges; styles terminaux, unis; stigmate entier; ovules nombreux, amphytropes. Fruit, une baie ou une capsule, avec généralement 2 cavités. Famille de grande importance économique.

x. Embryon très distinctement recourbé, la courbe représente plus de la moitié du cercle. Etamines fertiles 5 de longueur égale ou très légèrement distinctes:

2x. Ovaire de 3-5 loges, les cloisons des loges divisent le placenta en parties irrégulières. *Nicandra*, p. 327

2x. Ovaire biloculaire:

3x. Corolle tubulaire avec lobes étroits ou étroitement campanulée avec des lobes courts:

4x. Fleurs solitaires, exceptionnellement agrégées. *Lycium*, p. 327

4x. Fleurs 2 ou agrégées, exceptionnellement solitaires.

3x. Corolle rotacée ou campanulée avec des lobes larges: *Acnistus*, p. 328

4x. Anthères conniventes ou convergeant autour du style:

5x. Anthères s'ouvrant par des pores terminaux ou des fentes courtes *Solanum*, p. 328

5x. Anthères s'ouvrant longitudinalement et introrsées *Lycopersicum*, p. 330

4x. Anthères non conniventes autour du style:

5x. Calice renflé ou en forme de vésicule à la maturité du fruit:

6x. Calice environnant étroitement la base. *Physalis*, p. 328

6x. Calice s'épanouissant à une certaine distance de la base du fruit et ne l'enveloppant jamais *Saracha*, p. 328

5x. Calice non renflé ni en forme de vésicule à la maturité du fruit *Capsicum*, p. 328

2x. Ovaire quadriloculaire, les cloisons des loges divisent le placenta en 4 parties égales:

3x. Filets plus longs que la corolle *Solandra*, p. 330

3x. Filets ne dépassant pas la corolle *Datura*, p. 330

x. Embryon dressé ou légèrement recourbé, la courbe n'excède jamais le demi-cercle:

2x. Etamines 5, toutes fertiles et de même longueur ou 1-3 plus courtes:

3x. Fruit, une baie indéhiscente. Plantes ligneuses:

4x. Graines avec endosperme. *Coestrum*, p. 330

4x. Graines sans endosperme. *Coeloneurum*, p. 331

3x. Fruit, une capsule septicide. Plantes herbacées, rarement ligneuses *Nicotiana*, p. 331

2x. Etamines fertiles 2-4, toujours de longueur distincte:

3x. Herbes *Browallia*, p. 331

3x. Arbrisseaux ou arbustes *Brunfelsia*, p. 331

Nicandra Adans.

Herbes annuelles, caulescentes, avec feuillage d'un vert sombre. Feuilles alternes, larges, sinuées-dentées ou lobées. Fleurs inclinantes, solitaires dans les axes. Calice accrescent, anguleux, renflé à maturité, sépales presque distincts, cordés ou sagittés à la base; corolle bleue ou violette, plissée dans le bourgeon, campanulée, légèrement pentalobée; étamines 5, incluses; filets adnés à la base de la corolle, filiformes, à base dilatée et pubescente; anthères à déhiscence longitudinale; ovaire de 3-5 loges; stigmates de 3-5 lobes. Baie presque globulaire, plutôt sèche, enveloppée par le calice.

N. physalodes (L.) Gaertn.

Lycium L.

Plantes ligneuses, souvent grimpantes, épineuses ou inermes. Feuilles alternes, souvent fasciculées, courtement pétiolées, petites et généralement étroites, entières, sans stipules. Fleurs verdâtres, blanchâtres, pourpres ou violettes, axillaires, solitaires ou agrégées. Calice campanulé, avec 3-5 dents; corolle infundibuliforme, généralement pentalobée; étamines généralement 5. Fruit, une baie écarlate, avec graines plus ou moins nombreuses.

L. americanum Jacq. Var. *chrysocarpum* Urb. et Ekm.

Acnistus Schott.

Arbustes et arbres parfois épineux. Fleurs agrégées, rarement solitaires avec corolle blanche, rouge ou violette. Calice campanulé, pentadenté, peu ou point développé à la maturité du fruit, souvent lacéré; corolle tubulaire, campanulée au sommet ou élargie en entonnoir, pentalobée, entre les lobes se trouvent parfois de toutes petites dents; étamines souvent plus longues que la corolle; filets ni ailés, ni dentés. Baie sphérique et juteuse.

A. arborescens (L.) Schlechtend.

Physalis L.

Herbes ou parfois plantes légèrement ligneuses à la base, diffuses ou rampantes. Feuilles alternes, souvent 2 ensemble, simples, généralement angulées et distinctement pétiolées. Fleurs généralement bleues ou jaunâtres ou blanchâtres et non voyantes, sur des pédicelles axillaires ou extra-axillaires. Calice avec 5 dents ou lobes, persistant dans le fruit; corolle rotacée ou courtement campanulée, généralement avec des taches pourpres au milieu, plissée, tube court, généralement pentadenté; étamines 5; styles grêles; stigmate quelque peu bilobé. Fruit, une baie biloculaire, globulaire, jaune ou verdâtre, souvent plus ou moins visqueuse.

P. angulata L. «Coque molle» ou «Battre autour.»

P. angulata L. Var. *ramosissima* (Mill.) O. E. Schulz.

P. pubescens L. «Battre autour.» (Haïti) «Tope-topos» (St-Domingue).

P. turbinata Medik. «Battre autour.» «Maman laman.»

P. microcarpa Urb. et Ekm.

P. peruviana L.

Saracha R. et P.

Herbes dressées ou rampantes, avec feuilles entières. Fleurs très rarement solitaires, disposées en ombelles. Calice campanulé avec 5 lobes courts, persistant et très développé dans le fruit; corolle plate, campanulée, pentalobée. Fruit, une baie globulaire.

S. antillana Krug. et Urb.

Capsicum L.

Herbes plus ou moins ligneuses, dressées, très ramifiées, essentiellement glabres. Feuilles ovées, simples et entières. Fleurs pédicellées, solitaires ou en groupes de 2 ou de 3. Calice court, presque tronqué, mais généralement avec des pointes très courtes, quelque peu élargi à la base du fruit; corolle rotacée, généralement pentalobée; étamines généralement 5, légèrement conniventes, généralement bleuâtres; anthères à déhiscence longitudinale; ovaire de 2-3 loges; styles 5, stigmate capité. Fruit, une baie indéhiscence, en forme de légume, avec tégument épais, piquant au goût.

C. frutescens L. «Piment.»

C. baccatum L. «Piment zouézu.»

C. annum L. «Piment bouc.»

Solanum L.

Herbes, arbrisseaux ou arbustes, parfois grimpants, parfois épineux, généralement avec pubescence stellaire. Feuilles alternes, simples ou composées. Fleurs généralement cymeuses, racemeuses ou ombellées. Calice campanulé, avec 5 dents ou 5 lobes; corolle rotacée, pentagone, pentalobée; filets courts; anthères parfois inégales, connées ou conniventes; ovaire biloculaire, avec de nombreux ovules; stigmate petit. Fruit, une baie globulaire.

S. nigrum L.

S. nigrum L. Var. *americanum* (Mill.) O. E. Schulz, «Lanment.» Alimentaire et médicinal.

S. antillarum O. E. Schulz.

S. seaforthianum Andr. «Lilas.» Ornemental.

S. seaforthianum Andr. Var. *disjunctum* Lam.

S. pyriforme Lam.

S. umbellatum Mill.

S. rugosum Dun.

S. testaceum O. E. Schulz.

S. erianthum D. Don. «Zamorette mâle» ou «marron.» (Haïti) «Tabacon» (St-Domingue).

S. verbascifolium L.

S. fugax Jacq.

S. fugax Jacq. Var. *flexuosum* (Willd.)

S. fugax Jacq. Var. *albidiochraceum* (Bitter).

S. virgatum Lam.

S. polygamum Vahl.

S. crotonoides Lam.

S. hoplophorum O. E. Schulz.

S. aculeatum (Jacq.) O. E. Schulz.

S. aculeatum (Jacq.) O. E. Schulz, var. *fuertesii* O. E. Schulz.

S. microphyllum (Lam.) Dun. Var. *ischyracanthum* Bitter.

S. squarrosus O. E. Schulz.

S. polyacanthum Lam. «Mala mujer» (St-Domingue) d'après Urban.

S. polyacanthum Lam. Var. *oreophilum* O. E. Schulz.

S. mammosum L. «Pomme d'amour.» «Tété jeune fille» (Haïti), «Berengena de gallina» (St-Domingue).

S. ciliatum Lam. «Berengena de gallina» (St-Domingue), d'après Urban.

S. guanicense Urb.

S. plumieri Dun.

S. bahamense L. Var. *subarmatum* (W.) Schulz.

S. persicifolium Dun.

S. persicifolium Dun. Var. *parvifolium* (Vahl.) O. E. Schulz.

S. jamaïcense Mill.

S. torvum Sw. «Zamorette.» (Haïti) «Berengena de gallina» (St-Domingue).

S. torvum Sw. Var. *daturifolium* (Dun.) O. E. Schulz.

S. carolinense L.

S. schulzianum Urb.

S. wendlandii Hook f. Ornemental.

S. orthacanthum O. E. Schulz.

S. lanceifolium Jacq.

S. melongena L. «Béréginn» ou «Aubergine.» Alimentaire.

S. tuberosum L. «Pomme té» ou «Pomme de terre.» Alimentaire.

S. cahosianum Urb. et Ekm.

S. hotteanum Urb. et Ekm.

S. miragoanæ Urb.

S. tortipes Urb. et Ekm.

S. marmeladense Urb. et Ekm.

S. selleanum Urb. et Ekm.

Lycopersicum Mill.

Herbes annuelles ou rarement vivaces. Feuillage souvent gluant-pubescent, feuilles alternes, pinnées ou pinnatifides. Fleurs en cymes latérales racemeuses. Calice divergent, tube court, lobes 5-6, étroits; corolle jaune, rotacée, tube très court, bords plissés, divergents, lobes 5-6, étamines 5-6, exertes, filets très courts, anthères allongées, convergentes ou connées, à déhiscence longitudinale, introrses; ovaire de 2—plusieurs loges, stigmaté capité. Baie très pulpeuse, subglobulaire ou pyriforme. Graines nombreuses, aplaties.

L. esculentum Mill. «Tomate.» Alimentaire.

Solandra Sw.

Arbrisseaux ou arbustes, avec feuilles souvent coriacées. Tube du calice long, souvent avec des côtes, bords de 2-3 dents; corolle blanchâtre, très grande, tube long, avec bords quelque peu zygomorphes; filets plus longs que la corolle. Baie globulaire ou allongée, juteuse avec de grosses graines plates.

S. longiflora Tuss.

Datura L.

Herbes, arbustes, arbrisseaux ou arbres. Feuilles alternes, variées. Fleurs solitaires dans les axes. Calice courtement pédicellé, avec 5 dents ou en forme de spathe, souvent circomcissile près de la base; corolle blanche, pourpre, violette ou jaune, infundibuliforme, tube surpassant de beaucoup le calice, lobes 5, acuminés; étamines 5, incluses ou presque incluses; filets filiformes, insérés près de la base du tube de la corolle; ovaire biloculaire ou imparfaitement quadriloculaire. Fruit capsulaire, plus ou moins épineux, quadrivalvé, mais parfois charnu et indéhiscent ou s'ouvrant irrégulièrement.

D. stramonium L. «Concombre zombi.» Médicinal.

D. tatula L.

D. fastuosa L.

D. metel L.

D. suaveolens H. B. K.

Cestrum L.

Arbustes, arbrisseaux ou arbres. Feuilles alternes, pétiolées, entières, généralement plus étroites que larges. Fleurs blanchâtres, jaunâtres, rouges ou pourpres, disposées en cymes. Calice pentalobé ou pentadenté, campanulé ou tubulaire, lobes valvés; corolle en forme de soucoupe ou infundibuliforme, avec tube long, lobes 5, divergents; étamines 5, incluses; filets filiformes, souvent appendiculés; ovaire biloculaire, courtement stipité; stigmaté pelté ou légèrement bilobé. Fruit, une baie globulaire oblongue.

C. inclusum Urb.

C. violaceum Urb.

C. nocturnum L. «Lilas de nuit» ou «Jasmin de nuit.» Ornemental.

C. laurifolium L'Her.

C. macrophyllum Vent.

C. diurnum L.

C. linearifolium Urb.

C. heterophyllum Urb.

C. daphnoïdes Griseb, «Mata gallina» (St-Domingue).

C. daphnoïdes Griseb, var. *laxiflorum* O. E. Schulz.

C. caelophlebium O. E. Schulz.

C. domingense O. E. Schulz.

C. fuertesii O. E. Schulz.

C. brevifolium Urb.

C. brevifolium Urb. Var *gracillimum* O. E. Schulz.

C. tuerckheimii O. E. Schulz.

C. sphaerocarpum O. E. Schulz.

C. pitonianum Urb. et Ekm.

C. azuense Urb. et Ekm.

C. filipes Urb. et Ekm.

C. marmoratum Urb. et Ekm.

C. dolichopus Urb. et Ekm.

C. virgaurea Urb. et Ekm.

C. abeggii Urb. et Ekm.

C. farinosum Urb. et Ekm.

C. pumile Urb. et Ekm.

C. hotteanum Urb. et Ekm.

C. parviflorum Urb.

C. bicolor Urb.

C. angulosum Urb.

C. cahosianum Urb. et Ekm.

C. mononeurum Urb. et Ekm.

Coeloneurum Radlk.

Arbres, arbustes ou arbrisseaux, avec feuilles coriacées. Fleurs solitaires extra-axillaires. Calice campanulé, pentalobé; étamines 5; ovaire biloculaire; ovule solitaire dans chaque loge. Fruit, une baie ovoïde.

C. ferrugineum (Spr.) Urb. «Brignolle.»

Nicotiana L.

Herbes annuelles ou vivaces, souvent visqueuses-pubescentes, imprégnées d'une forte odeur et possédant des propriétés narcotiques-vénéneuses. Feuilles alternes, simples, entières ou rarement sinuées, le plus souvent sessiles ou presque sessiles par une base conique. Fleurs blanches, jaunes, vardâtres ou pourpres, s'ouvrant généralement la nuit et alors plus odoriférantes, disposées en une panicule terminale ou en racemes unilatéraux allongés ou la fleur inférieure solitaire dans l'axe. Calice tubulaire-campanulé, pentalobé; corolle avec un long tube, pentalobée avec bord souvent oblique; étamines 5, incluses ou exertes. Capsule bivalvée ou rarement pentavalvée, les valves bidentées ou fendues. Graines nombreuses, toutes petites.

N. tabacum L. «Tabac.»

Browallia L.

Herbes annuelles, glabres ou glandulaires, avec feuilles entières. Fleurs solitaires ou racemeuses. Calice tubulaire, campanulé, pentadenté; corolle violette ou blanche, pentalobée; étamines 4, didynames; filets courts; anthères biloculaires, les loges des étamines inférieures égales, les loges des étamines supérieures inégales. Fruit capsulaire valvé, bilobé.

B. americana L.

Brunfelsia L.

Arbustes ou arbrisseaux glabres, avec feuilles entières, généralement coriacées. Fleurs en cymes terminales ou solitaires, grandes. Calice campanulé, pentadenté; corolle infundibuliforme, pentalobée; étamines 4, didynames. Capsule ou baie déhiscente avec valves entières.

B. picardæ Krug. et Urb.

B. nitida Benth.

B. americana L.

Famille 160. SCROPHULARIACEÆ

Herbes, arbrisseaux, arbustes ou arbres, avec tiges généralement cylindriques. Feuilles alternes, opposées ou verticillées, dénuées de stipules, limbes simples, entiers, dentés ou divisés. Fleurs parfaites, généralement irrégulières. Calice infère, de 4-5 sépales unis, plus ou moins imbriqués, persistants; corolle généralement irrégulière, rotacée ou largement campanulée ou avec tube cylindrique, le bord de 4-5 lobes également divergents ou bilabés. Etamines généralement 4 et didynames, insérées sur le tube de la corolle et alternant avec les lobes; anthères généralement biloculaires. Ovaire supère, sessile, parfaitement ou imparfaitement biloculaire, généralement avec de nombreux ovules dans chaque loge; styles entiers ou bilobés. Fruit, une capsule, rarement une baie.

- x. Lèvre supérieure ou lobes de la corolle recouvrant la lèvre inférieure dans le bourgeon.
Capsule généralement septicide:
- 2x. Toutes les feuilles alternes *Verbascum*, p. 333
- 2x. Les feuilles inférieures au moins opposées:
- 3x. Corolle éperonnée ou élargie à la base en forme de sac:
- 4x. Corolle non tubulaire *Angelonia*, p. 333
- 4x. Corolle tubulaire:
- 5x. Corolle éperonnée à la base, le palais fermant rarement la gorge:
- 6x. Fleurs axillaires. Capsule à déhiscence operculée *Elatinoïdes*, p. 333
- 6x. Fleurs en épis et en panicules terminales. Capsule s'ouvrant par 4-10 valves *Linaria*, p. 333
- 5x. Corolle munie d'une poche ou gibbeuse à la base, la gorge presque ou entièrement fermée par un palais visible *Antirrhinum*, p. 333
- 3x. Corolle ni éperonnée, ni élargie à la base en forme de sac:
- 4x. Inflorescence cymeuse, composée, centrifuge:
- 5x. Arbrisseaux. Corolle écarlate *Russelia*, p. 334
- 5x. Herbes ou sous-arbrisseaux. Corolle jaune, pourpre ou verdâtre *Scrophularia*, p. 334
- 4x. Inflorescence non cymeuse, simple le plus souvent, centripète:
- 5x. Anthères uniloculaires *Tuerckheimocharis*, p. 334
- 5x. Anthères biloculaires:
- 6x. Etamines fertiles 4:
- 7x. Sépales égaux ou presque égaux *Stemodia*, p. 334
- 7x. Sépales très inégaux, les sépales supérieurs plus grands *Herpestris*, p. 334
- 6x. Etamines fertiles 2:
- 7x. Sépales 5, presque distincts *Ilysanthes*, p. 335
- 7x. Sépales 4-5 partiellement soudés:
- 8x. Corolle très irrégulière, sacs de l'anthère divergents *Hemisiphonia*, p. 335
- 8x. Corolle presque régulière, sacs de l'anthère parallèles *Micranthemum*, p. 335
- x. Lèvres inférieures ou lobes de la corolle recouvrant la lèvre supérieure dans le bourgeon.
Capsule généralement loculicide (Exception *Scoparia*):

- 2x. Loges de l'anthère unies au sommet; les 2 pétales supérieurs souvent dressés:
- 3x. Etamines 4:
- 4x. Feuilles alternes *Capraria*, p. 335
- 4x. Feuilles opposées *Scoparia*, p. 335
- 3x. Etamines 2 *Veronica*, p. 336
- 2x. Loges de l'anthère toujours séparées; pétales toujours aplatis:
- 3x. Corolle campanulée-infundibuliforme; anthères biloculaires: *Gerardia*, p. 336
- 3x. Corolle en forme de soucoupe; anthères uniloculaires *Buchnera*, p. 336

Verbascum L.

Herbes caulescentes, rarement vivaces, souvent glandulaires ou très pubescentes. Feuilles alternes, entières, dentées ou pinnatifides, parfois décurrentes sur la tige. Fleurs en épis terminaux, racemes ou panicules. Sépales 5, partiellement unis; corolle blanche, jaune ou pourpre, rotacée, lobes 5, légèrement inégaux, le lobe supérieur externe dans le bourgeon; étamines 5, exsertes, les 3 étamines supérieures ou tous les filets pubescents; ovaire biloculaire, sessile; ovules nombreux. Capsule oblongue — subglobulaire, déhiscence septicide par 2 valves, valves généralement fendues au sommet.

V. thapsus L. «Bouillon blanc.»

Angelonia H. et B.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles opposées ou les feuilles supérieures alternes. Fleurs bleues, solitaires dans les axes ou en racemes terminaux. Calice de 5 lobes ou 5 dents; tube de la corolle presque absent, lèvre supérieure bilobée, lèvre inférieure trilobée, gorge renflée, avec une protubérance bidentée à l'extrémité inférieure; étamines 4, filets courts. Capsule globulaire ou elliptique, bivalvée, déhiscence loculicide, rarement indéhiscente.

A. angustifolia Benth.

A. salicarifolia H. et B.

Elatinoïdes (Chav.) Wettst.

Herbes annuelles, rampantes. Feuilles pétiolées, penninerves, généralement en forme de flèches. Fleurs axillaires, blanches, jaunes ou bicolores. Calice pentalobé, avec gorge fermée et éperon court. Fruit capsulaire, avec valves terminales ou latérales.

E. elatine (L.) Wettst.

Linaria L.

Herbes ou plantes ligneuses, avec tiges dressées. Feuilles alternes ou opposées ou verticillées, plates, souvent étroites, entières, dentées ou lobées. Fleurs en épis terminaux, racemes ou panicules. Sépales 5, partiellement unis; corolle blanche ou de couleur variée ou bariolée, irrégulière, bidentée, tube éperonné à la base, la gorge partiellement fermée par une palette; étamines 4, incluses; styles unis; ovules nombreux. Capsule courte, s'ouvrant par un à quelques pores généralement tridentés. Graines angulées ou ridées, parfois ailées.

L. canadensis (L.) Dun.

Antirrhinum L.

Herbes parfois glandulaires ou pubescentes. Feuilles alternes ou opposées sur les jeunes parties, plates, entières. Fleurs solitaires dans les axes supérieurs ou en racemes terminaux ou panicules. Sépales partiellement unis; corolle blanche ou colorée ou bigarrée, irrégulière, bilabée, tube plus ou moins

en forme de sac à la base, la gorge fermée par une palette; étamines 5, incluses; styles unis; ovules nombreux. Capsule courte, s'ouvrant par 2-3 pores au-dessous du sommet. Graines non ailées.

A. orontium L.

A. antirrhiniflorum (H. et B.) Hitchc.

Russelia Jacq.

Arbrisseaux avec feuilles opposées ou verticillées, ou généralement réduites à des écailles sur les branches. Fleurs en cymes dicotomes, bractées présentes; fleurs nombreuses ou parfois 1 seule, rouges. Calice avec 5 fentes ou 5 segments; tube de la corolle cylindrique, quelque peu bilabié, avec 5 segments, les lobes arrondis; étamines 4, incluses. Capsule subglobulaire, à déhiscence septicide.

R. juncea Zucc. «Clochette.» Ornemental.

R. equisetiformis Ch. et Schl. «Clochette.» Ornemental.

Scrophularia L.

Herbes vivaces, à odeur très forte. Feuilles opposées, plates, dentées ou incisées. Fleurs protérogynes, en cymes terminales, paniculées. Lobes du calice 5, relativement larges; corolle pourpre, jaunâtre ou verte, bilabiée, tube ni gibbeux, ni éperonné à la base, lèvre supérieure dressée, lobe médian de la lèvre inférieure divergent ou réfléchi; étamines 4, filets stériles, squameux sur le bord supérieur de la corolle. Capsule ovoïde. Graines non ailées.

S. micrantha Desv.

S. eggersii Urb.

S. domingensis Urb.

Tuerckheimocharis Urb.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles opposées, serrées, non ponctuées. Fleurs solitaires dans l'axe. Calice profondément pentalobé, tube court; corolle décidue verte, tube cylindrique, pentalobé; étamines 4, incluses, staminodes filiformes; styles allongés; stigmatte entier, subclavé; ovules nombreux. Fruit capsulaire ové, à déhiscence septicide, 2 valves entières.

T. domingensis Urb.

Stemodia L.

Herbes généralement aromatiques, avec feuillage pubescent. Feuilles opposées ou verticillées, plates, dentées. Fleurs solitaires dans les axes, parfois disposées en racemes compacts épiés. Lobes du calice égaux ou presque égaux; corolle bleue ou pourpre, bilabiée; étamines 4, incluses; filets filiformes; sacs de l'anthère largement séparés. Capsule bivalvée à déhiscence septicide, les valves bilobées. Graines striées ou réticulées.

S. parviflora Ait.

S. maritima L. Ile de la Tortue.

S. durantifolia (L.) Sw.

Herpestris Gærtn.

Herbes succulentes, inodores, avec tiges rampantes. Feuilles opposées, entières ou très légèrement dentées, palminerves, sessiles. Fleurs généralement solitaires sur des pédoncules axillaires. Calice sessile dans 2 petites bractées, sépales presque distincts, sépale supérieur beaucoup plus large; corolle bleue ou blanche, presque régulière, les 5 lobes presque égaux, divergents; étamines 4, incluses; filets adnés, près de la gorge de la corolle. Capsule ovoïde, ou ovale, à déhiscence septicide, valves fendues ou partites. Graines nombreuses.

H. procumbens (Mill.) Urb.

H. stricta Schrad.

H. obovata Poepp.

H. monnieri (L.) H. B. K.

Micranthemum Michx.

Herbes très petites, avec tiges diffuses ou rampantes. Feuilles opposées, entières, généralement sub-orbiculaires, à nervures manifestes, sessiles. Fleurs peu voyantes, solitaires dans les axes. Sépales 4, unis à la base; corolle blanche ou pourpre, très légèrement bilabiée, lèvre supérieure entière, celle-ci et les trois lobes de la lèvre inférieure presque égaux ou le lobe médian de la lèvre inférieure légèrement plus grand, la corolle apparaissant ainsi avec 4 lobes plus ou moins égaux; étamines 2, filets dilatés à la base, stigmatte capitulé ou claviforme. Capsule subglobulaire.

M. orbiculatum Michx.

Hemisiphonia Urb.

Herbes procumbantes avec des racines aux nœuds. Feuilles opposées, très petites, ovées ou obovées, elliptiques, entières, trinerves à la base. Fleurs très petites, axillaires, subsessiles. Calice tubulaire, quadrilobé; la partie postérieure de la corolle fait entièrement défaut jusqu'à la base, le tube se développe par devant, est ouvert par derrière, lèvre antérieure (unique) trilobée, à lobe intermédiaire oblong ou oblong-lancéolé, plus long que les lobes latéraux, persistante dans le fruit et recourbée entre les lobes antérieurs du calice; étamines 2, fixées à la gorge du tube, staminodes absents; ovules nombreux, styles bifides. Fruit capsulaire, subglobulaire, uniloculaire, bivalvé. Graines nombreuses, striées.

H. antillana Urb.

Ilysanthes Rafin.

Herbes avec feuillage glabre. Feuilles opposées, entières ou légèrement dentées, le plus souvent sessiles. Bractées le plus souvent semblables aux feuilles; fleurs solitaires dans les axes avec pédicelles grêles. Sépales 5, unis à la base; corolle blanchâtre ou pourpre, bilabiée, la lèvre inférieure divergente; étamines 2; staminodes 2, bilobés, 1 lobe capitulé glandulaire, l'autre plus petit, glabre; stigmatte bilobé. Capsule étroitement ovoïde — oblongue, à déhiscence septicide. Graines striées.

I. gratioloïdes (L.) Benth.

Capraria L.

Herbes vivaces ou plantes ligneuses. Feuilles alternes, plus longues que larges, dentées. Fleurs sur des pédicelles axillaires. Calice de 5 sépales étroits presque égaux; corolle blanche, campanulée, avec 5 lobes plats; étamines généralement 4; sacs de l'anthère 2, divergents, confluent; stigmatte dilaté ou bilobé. Capsule courte, avec 2 rainures, à déhiscence loculicide. Graines réticulées.

C. biflora L. «Thé pays» ou «Thé suisse» (Haïti), «Feregosa», «Té», «Té de Santa-Maria» (St-Domingue), d'après Urban

Scoparia L.

Herbes ou plantes ligneuses. Feuilles opposées ou verticillées, généralement étroites, ponctuées. Fleurs solitaires dans les axes. Calice de 4-5 sépales presque distincts; corolle blanche, jaune ou bleue, rotacée, tube pubescent dans la gorge, lobes 4, presque égaux; étamines 4, légèrement didynames; anthères légèrement sagittées, sacs distincts; stigmatte tronqué ou crénelé. Capsule ovoïde ou subglobulaire, à déhiscence septicide. Graines angulées.

S. dulcis L. «Balai doux» (Haïti), «Mastuerzo» (St-Domingue).

Veronica L.

Herbes. Feuilles opposées ou parfois alternes, variées, entières, dentées ou lobées. Fleurs solitaires dans les axes, parfois groupées en racemes ou panicules. Calice de 4, rarement 5 sépales légèrement unis; corolle blanche ou de couleur variée, rotacée, légèrement irrégulière, tube très court, lobe inférieur généralement plus étroit que le reste; étamines 2 sur l'un ou l'autre côté du lobe supérieur de la corolle; filets divergents; sacs de l'anthère confluent au sommet; stigmate capité. Capsule aplatie, crénelée ou bilobée au sommet, à déhiscence loculicide. Graines aplaties ou concaves.

V. arvensis L. Massif de la Selle.

V. agrestis L. Massif de la Selle.

Gerardia L.

Herbes généralement grêles. Feuilles surtout opposées, étroites ou squameuses, entières. Fleurs solitaires dans l'axe des bractées étroites. Calice de 5 sépales généralement unis, les lobes en forme de dents; corolle souvent rose pourpre, parfois blanche, ou rose jaunâtre, bilabée, les lobes inférieurs placés en dehors dans le bourgeon; étamines 4, didynames, incluses; filets pubescents; anthères toutes semblables, sacs obtus ou mucronés à la base, styles filiformes. Capsule arrondie au sommet, à déhiscence loculicide. Graines généralement angulées.

G. domingensis Spreng.

Buchnera L.

Herbes rigides, avec feuillage pubescent, noir en se desséchant. Feuilles opposées généralement, dentées. Fleurs en épis allongés terminaux. Calice de 5 sépales unis, tube de 5-10 nervures, beaucoup plus long que les lobes; corolle blanche, bleue ou pourpre, en forme de soucoupe, tube courbé, lobes 5, légèrement inégaux, divergents, les lobes latéraux placés au dehors dans le bourgeon; étamines 4 didynames, sacs de l'anthère confluent; stigmate entier ou légèrement crénelé. Capsule courte, enveloppée dans le calice, à déhiscence loculicide. Graines réticulées.

B. elongata Sw. Plaine Centrale.

Famille 161. BIGNONIACEÆ

Arbres ou arbustes, souvent sarments ligneux ou rarement herbes. Feuilles opposées ou ternées, simples ou généralement composées, la foliole terminale généralement remplacée par une vrille. Fleurs parfaites, irrégulières, généralement grandes et voyantes; inflorescence généralement épillée ou racemuse. Calice infère, gamosépale, généralement fermé dans le bourgeon, spathacé, tronqué ou pentadenté; corolle gamopétale, pentalobée, les lobes généralement quelque peu inégaux. Étamines généralement 4, didynames, insérées sur la partie supérieure du tube de la corolle et alternant avec ses lobes. Ovaire supère, uni ou biloculaire, avec de nombreux ovules sur les placentas pariétaux; styles grêles, avec stigmates bilobés. Fruit, capsulaire ou baccare, souvent très grand.

x. Ovaire biloculaire. Fruit capsulaire, déhiscent.

Graines ailées:

2x. Plantes volubiles; vrilles présentes:

3x. Disque absent..... *Cydista*, p. 338

3x. Disque présent à la base de l'ovaire:

4x. Corolle membraneuse ou mince, peu ou point recourbée:

5x. Vrilles simples:

6x. Fruit linéaire. Calice muni de grosses glandes; ovules bisériés dans chaque loge.....

Adenocalymma, p. 337

6x. Fruit elliptique. Calice glandulaire; ovules plurisériés dans chaque loge.....

Wunschmannia, p. 337

5x. Vrilles tripartites.....

Doxantha, p. 338

4x. Corolle coriacée, très épaisse, généralement presque rectangulaire recourbée.....

Distictis, p. 337

2x. Plantes dressées:

3x. Staminodes extraordinairement allongés..... *Jacaranda*, p. 338

3x. Staminodes non allongés:

4x. Feuilles simples ou composées digitées, non pinnées:

5x. Étamines fertiles 2. Graines poilues..... *Catalpa*, p. 338

5x. Étamines fertiles 4. Graines ailées:

6x. Ovules plurisériés dans chaque loge.....

Tabebuia, p. 339

6x. Ovules bisériés dans chaque loge..... *Ekmanianthe*, p. 339

4x. Feuilles pinnées:

5x. Calice en forme de spathe..... *Spathodea*, p. 338

5x. Calice non en forme de spathe:

6x. Fleurs d'un jaune brillant (racemes terminaux ou panicules)..... *Tecoma*, p. 340

6x. Fleurs d'un brun pourpre (dans l'axe des feuilles).....

Neurotecoma, p. 340

x. Ovaire uniloculaire. Fruit baccare, indéhiscent, même sec. Graines non ailées:

2x. Plantes dressées:

3x. Fruit séparé plus tard par une fausse cloison. Fleurs violettes ou verdâtres.....

Enallagma, p. 340

3x. Fruit non séparé plus tard par une cloison. Fleurs d'un jaune pâle.....

Crescentia, p. 340

2x. Plantes non dressées, épiphytes..... *Schlegelia*, p. 340

Adenocalymma Mart.

Arbustes ou arbrisseaux grimpants. Feuilles normalement bifoliolées, avec une vrille terminale, mais généralement trifoliolées; folioles entières. Fleurs grandes, roses ou pourpres, disposées principalement en racemes ou en panicules terminaux. Calice campanulé, tronqué ou pentadenté, glandulaire à l'intérieur, pubescent; corolle allongée, infundibuliforme. Capsule oblongue, comprimée, parallèle avec le septum ou subcylindrique, généralement tuberculée-rugueuse. Graines généralement avec de larges ailes.

A. obovatum Urb.

Distictis Mart.

Arbrisseaux ou arbustes volubiles. Feuilles opposées, avec 2 ou 3 folioles, la foliole terminale souvent représentée par une vrille. Fleurs grandes et voyantes, pourpres ou roses, en racemes ou panicules terminaux. Calice campanulé, tronqué ou pentadenticulé; corolle infundibuliforme-campanulée. Capsule oblongue ou elliptique, lisse obcomprimée. Graines largement ailées.

D. lactiflora (Vahl.) P. DC. «Bejuco culebra» (St-Domingue), d'après Urban.

Wunschmannia Urb.

Arbustes ou arbrisseaux volubiles. Feuilles bifoliolées; folioles entières. Fleurs paniculées ou cymeuses, brun jaune ou pourpre jaunâtre ou dorées; bractées très caduques. Calice campanulé, tube très court, tronqué, avec 5 petites dents obsoletes; corolle zygomorphe, bilabée, pentalobée, 3 lobes antérieurs réfléchis, les 2 postérieurs dressés; étamines adnées au tube de la corolle

exertes, staminodes présents; ovaire sessile; ovules nombreux plurisériés; stigmaté oblong, accompagnant. Capsule ovale, nue.

W. staminea (Lam.) Urb. «*Liane zorain*» ou «*Zorain*».

Cydista Miers.

Arbustes ou arbrisseaux grimpants. Feuilles bifoliolées, généralement pourvues de vrilles. Inflorescence pauciflore, terminale, racémeuse ou paniculée. Calice campanulé, tronqué ou pentadenté; corolle infundibuliforme campanulée. Fruit capsulaire, allongé, obcomprimé, lisse. Graines comprimées, largement ailées.

C. æquinoctialis (L.) Miers.

Doxantha Miers.

Sarments ligneux, les branches généralement avec des racines aériennes. Feuilles avec pétiole grêle; folioles 2, la troisième remplacée par une vrille, celle-ci trifide, chaque branche recourbée à l'extrémité. Fleurs jaunes, pédoncules axillaires uniflores ou pauciflores. Calice campanulé, subtronqué ou irrégulièrement lobé; corolle infundibuliforme campanulée. Capsule allongée, obcomprimée, lisse. Graines ailées.

D. unguis cati (L.) Miers. «*Griffe chatte*» (Haïti), «*Abraza palo*» (St-Domingue).

Spathodea Beauv.

Arbres. Feuilles grandes, opposées, étrangement pennées ou parfois ternées avec folioles entières. Fleurs orange, rouges ou écarlates, en panicules terminales ou en racèmes. Calice fendu sur un côté et recourbé, exposant la corolle à la base; corolle campanulée et ventrueuse; étamines 4, exertes avec loges de l'anthère divergentes et pendantes; disque grand, en forme de coupe; ovaire oblong, biloculaire, les ovules en plusieurs rangées. Fruit, une capsule oblongue — lancéolée, acuminée aux deux extrémités, loculicide avec valves ligneuses. Graines elliptiques, avec de larges ailes.

S. campanulata Beauv. «*Immortel étranger*» Cultivé comme plante ornementale.

Jacaranda Juss.

Arbustes ou arbres. Feuilles opposées, bipennées ou rarement unipennées; folioles généralement nombreuses, entières ou dentées. Fleurs bleues ou violettes, disposées généralement en panicules terminales ou axillaires. Calice petit, tronqué ou pentadenté; tube de la corolle dressé ou courbé, le bord quelque peu bilabié, avec 5 lobes arrondis, divergents, presque égaux; disque épais et en forme de coussin; étamines parfaites 4, didynames; staminodes presque aussi longs que les étamines, claviformes et généralement poilus au sommet; ovaire biloculaire. Fruit capsulaire, oblong, ové ou large.

J. poitaei Urb. «*L'abbé blanc*» ou «*L'abbé franc*» (Ile de la Tortue, Haïti).

J. selleana Urb.

J. cowellii Brik. et Wils. St-Domingue.

Catalpa Juss.

Arbres ou arbustes. Feuilles opposées ou parfois verticillées; pétioles longs. Fleurs blanches, rosées ou jaunâtres, disposées en panicules terminales très voyantes. Calice s'ouvrant irrégulièrement ou bilabié; corolle campanulée, bilabée, avec 2 lobes supérieurs plus petits que les 3 lobes inférieurs; étamines fertiles 2, courbées, avec des sacs divergents; styles bilobés au sommet, légèrement plus longs que les étamines. Fruit, une très longue capsule cylindrique

se séparant en 2 valves, avec de nombreuses petites graines oblongues, comprimées, celles-ci portent une touffe de poils blancs à chaque extrémité.

C. longissima (Jacq.) Sims. «*Bois Chêne*», «*Chêne*» (Haïti), «*Roble*» (St-Domingue).

C. ekmaniana Urb.

C. oblongata Urb. et Ekm.

C. obovata Urb.

C. domingensis Urb. et Ekm.

C. denticulata Urb.

Tabebuia A. Gomes.

Arbres, arbustes ou arbrisseaux. Feuilles opposées, pétiole long, composées-digitées; folioles 5-7, entières ou dentées. Fleurs grandes, en cymes terminales, ou panicules. Calice tubulaire, ou campanulé, fermé dans le bourgeon, fendu ou denté de diverses manières dans l'anthèse; tube de la corolle amplifié, le bord quelque peu bilabié; étamines 4. Capsule grêle cylindrique. Graines largement ailées.

T. acrophylla (Urb.) Britton, «*Bois nago*».

T. grisebachii Urb.

T. domingensis (Urb.) Britton.

T. buchii (Urb.) Britton.

T. berterii (P. DC.) Britton.

T. revoluta (Urb.) Britton.

T. pentaphylla (L.) Hemsl.

T. obovata Urb.

T. microphylla (Lam.) Urb.

T. tortuensis Urb. et Ekm.

T. gonavensis Urb.

T. ostefeldii Urb. Ile de la Gonâve.

T. polyantha Urb. et Ekm.

T. dolichopoda Urb. et Ekm.

T. hotteana Urb. et Ekm.

T. conferta Urb.

T. erosa Urb. et Ekm.

T. multinervis Urb. et Ekm.

T. densifolia Urb.

T. brigandina Urb. et Ekm.

T. ekmanii Urb. «*Bois savane*».

T. samanensis Urb.

T. apiculata Urb. et Ekm.

T. lindahlia Urb.

Ekmanianthe Urb.

Arbres. Feuilles opposées digitées, de 3-7 folioles; folioles entières, pétioles. Inflorescence terminale paniculée ou corymbeuse; branches uniflores ou cymeuses; fleurs entièrement blanches ou vert jaune. Calice de 2-3 lobes courts, inégaux; corolle à 5 lobes égaux, tubulaire, presque infundibuliforme à la base; étamines 4-5, égales, un peu hors du tube de la corolle; filet filiforme adné au tube; anthères dressées, biloculaires; disque annulaire, épais et charnu; ovaire sessile; ovules nombreux régulièrement bisériés sur chaque placenta; style allongé; stigmaté plat. Capsule linéaire, allongée, dressée à cloison parallèle, comprimée ou convexe, à déhiscence loculicide, valves coriaces. Graines plates, bisexuées.

E. longiflora (Griseb) Urb. «*Chêne à glandes*».

Tecoma Juss.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles opposées, pinnées; folioles serrées. Fleurs grandes, odoriférantes, généralement jaunes, disposées en racemes terminaux ou panicules. Calice tubulaire campanulé, tronqué ou denté ou irrégulièrement pentadenté; corolle infundibuliforme ou infundibuliforme campanulée, le bord quelque peu bilabié, pentalobée; étamines 4, incluses. Capsule allongée, à déhiscence loculicide; valves coriaces. Graines ailées.

T. stans (L.) Juss. «Chevalier» (Cayes, Haïti). Ornemental.

Neurotecoma K. Schum.

Arbres. Feuilles composées; folioles 5-7. Inflorescence axillaire, racémeuse — corymbeuse; bractées linéaires. Calice campanulé — cylindrique, avec 3-4 lobes, persistant; corolle bilabiée à bord entier; étamines fertiles 4; filets adnés au tube de la corolle; anthères exsertes, à déhiscence loculicide; style glabre. Capsule linéaire, comprimée.

N. domatiata Urb. et Ekm. Massif de la Selle.

Enallagma Baill.

Arbres glabres. Feuilles alternes, simples et entières. Fleurs zygomorphes, terminales; pédoncules longs. Calice se déchirant irrégulièrement, généralement bilobé; corolle campanulée ou infundibuliforme, légèrement lobée ou presque entière; disque annulaire; ovaire uniloculaire, avec 2 placentas pariétaux; ovules nombreux. Fruit, une baie couverte de croûtes.

E. cucurbitina (L.) Baill. «Calebasse zombi.»

Crescentia L.

Arbres inermes. Feuilles alternes ou fasciculées, simples ou trifoliolées (rarement pentafoliolées). Fleurs grandes, jaunâtres, solitaires ou fasciculées le long du tronc et des plus grandes branches. Calice fermé dans le bourgeon, campanulé et irrégulièrement fendu dans l'anthèse; corolle campanulée, oblique, pentalobée. Fruit, grand, ovale ou globulaire, indéhiscence; péricarpe dur. Graines nombreuses, enfouies dans la pulpe.

C. cujete L. «Calebasse.»

C. linearifolia Miers, «Calebasse marron.»

Schlegelia Miq.

Arbuste ou arbrisseau glabre, épiphyte, grimpant à l'aide de nombreuses racines. Feuilles opposées en croix, simples, coriaces. Fleurs régulières, nombreuses, disposées en panicules terminales ou agrégées sur les branches latérales. Calice fermé d'abord, puis s'ouvrant irrégulièrement, pentadenté ou fendu d'un côté, campanulé ou globulaire, rarement de la forme d'une courte massue; corolle infundibuliforme avec des lobes imbriqués; étamines incluses ou un peu saillantes; disque en forme de plat; ovaire ovoïde, uniloculaire avec des bandes seminales de séparation ou plus ou moins divisé en compartiments avec de nombreux ovules, ceux-ci fixés en plusieurs rangées sur les bandes seminales. Fruit court, globulaire. Graines nombreuses.

S. brachyantha Griseb.

S. portoricensis Urb.

Famille 162. PEDALIACEÆ

Herbes ou sous-arbrisseaux; herbages couverts de glandes spéciales qui sécrètent une substance visqueuse. Feuilles opposées ou les feuilles supérieures alternes. Fleurs bisexuées, irrégulières. Calice pentalobé; corolle gamo-

pétale, pentalobée, légèrement bilabiée ou non; étamines 4, didynames, généralement avec 1 staminode entier, subépépétales; disque irrégulier; ovaire supérieur ou rarement inférieur de 2-4 lobes ou apparemment uniloculaire. Fruit, une capsule ou une structure dure indéhiscence, généralement couverte d'épines recourbées ou d'ailes.

Sesamum L.

Caractères de la famille.

S. orientale L. «Jijiri,» «Roroli,» «Hoholi,» «Sésame» (Haïti), «Ajonjili» (St-Domingue).

Famille 163. MARTYNIACEÆ

Herbes annuelles ou vivaces, avec tiges épaisses, branchues. Feuilles opposées ou alternes, épaisses, simples, généralement rétrécies en pétioles. Fleurs parfaites, irrégulières. Calice inférieur, lobes 4-5; corolle gamopétale, généralement voyante, bords bilabiés, lobes 5, divergents, légèrement inégaux. Etamines fertiles 4, didynames ou les 2 postérieures dépourvues d'anthères; filets allongés; disque régulier; ovaire supérieur, de 2 carpelles, mais uniloculaire, allongé avec 2 placentas pariétaux qui forment parfois une fausse cloison, la cavité alors devient apparemment biloculaire — quadriloculaire; styles grêles; stigmates 2, parfois dilatés; ovules peu ou nombreux. Fruit, une capsule rostrée.

x. Etamines fertiles 2 **Martynia**, p. 341

x. Etamines fertiles 4 **Craniolaria**, p. 341

Martynia L.

Herbes dressées. Tube du calice avec 5 lobes inégaux; corolle tubulaire, cylindrique, élargie à la base. Fruit, une capsule rostrée, très dure, avec 8 côtes, une graine dans chaque côte.

M. annua L. «Hortensia» (Haïti). Ornemental.

Craniolaria L.

Herbes rampantes, avec de grandes fleurs blanches ou jaunâtres. Calice gamosépale, avec 5-3 dents; corolle avec tube long. Graines et fruit semblables à ceux du genre **Martynia**, excepté que le fruit est glabre et avec 2-4 graines dans la rainure centrale.

C. annua L.

Famille 164. GESNERIACEÆ

Herbes ou rarement arbustes ou arbrisseaux, les formes herbacées avec tiges rhizomateuses, tubéreuses ou rampantes, les formes ligneuses dressées ou grimpantes. Feuilles opposées, parfois alternes ou verticillées, simples. Fleurs bisexuées. Calice tubulaire, avec 5 dents ou segments; corolle généralement pentamère, le tube généralement allongé, les segments généralement inégaux, bords souvent bilabiés. Etamines épépétales, généralement 4, didynames, rarement 5, ou 2; disque hypogyne; ovaire supérieur ou inférieur, de 2 carpelles, uniloculaire, ou apparemment biloculaire ou quadriloculaire; ovules nombreux; style 1; stigmates 1-2. Fruit charnu, avec placenta pulpeux ou capsulaire ou en forme de silique avec des valves tordues.

x. Ovaire supérieur:

2x. Disque annulaire, non séparé par glandes **Besleria**, p. 342

2x. Disque séparé en plusieurs glandes dont 1 seule généralement très développée:

3x. Anthères libres **Alloplectus**, p. 342

3x. Anthères cohérentes **Columnea**, p. 342

- x. Ovaire entièrement ou partiellement infère:
 2x. Feuilles opposées ou en verticilles de 3 ou rarement 4:
 3x. Disque annulaire, souvent pentalobé; corolle généralement avec tube allongé.... *Achimenes*, p. 343
 3x. Disque rudimentaire; corolle rotacée ou campanulée:
 4x. Herbes..... *Niphaea*, p. 343
 4x. Petits arbrisseaux..... *Bellonia*, p. 342
 2x. Feuilles alternes:
 3x. Filets adnés à la base du tube de la corolle..... *Gesneria*, p. 343
 3x. Filets adnés au-dessus du tube de la corolle. *Rhytidophyllum*, p. 343

Besleria L.

Herbes ou arbrisseaux, avec feuilles opposées, généralement grandes, minces. Inflorescence axillaire; fleurs jaunes, rarement blanches ou écarlates. Corolle tubulaire; étamines 4, avec les filets élargis à la base; disque annulaire, épais; ovaire ovoïde ou subglobulaire; stigmate plus ou moins bilobé. Fruit baccaire, ou avec péricarpe coriacé, enveloppé par le calice, et généralement globulaire.

- B. lutea* L.
B. lutea L. Var. *leucantha* Urb.

Alloplectus Mart.

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux généralement avec tiges grimpantes, radicales aux nœuds. Feuilles opposées. Fleurs agrégées dans les axes, rarement solitaires, généralement environnées par de grandes bractées. Calice généralement coloré, souvent denté ou pinnatifide; tube de la corolle allongé, souvent en forme de poche à la base, lobes 5, arrondis ou frangés; étamines 4; disque grand avec glandes postérieures; ovaire supère. Fruit coriacé, s'ouvrant à la fin par 2 valves.

- A. domingensis* Urb.

Columnnea L.

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux généralement procombants. Feuilles opposées. Fleurs solitaires, axillaires ou agrégées. Calice généralement incolore, profondément pentalobé; corolle plus ou moins cylindrique; filets élargis à la base; disque avec une grande glande bilabée à l'intérieur ou avec 2-3 petites glandes à l'extérieur. Fruit, une baie enveloppée dans le calice. Graines nombreuses, enfouies dans la pulpe.

- C. sanguinea* (Pers.) Hanst. «Sangre de Cristo» (St-Domingue), d'après Urban.
C. tulæ Urb.

Bellonia L.

Arbrisseaux petits, généralement avec des épines opposées dans l'axe des feuilles opposées, rugueuses, oblongues ou ovoïdes, dentées ou serrées. Fleurs blanches, calice campanulé avec 5-7 petits lobes quelque peu inégaux; corolle généralement dépourvue de tube, rotacée, avec 4-6 larges lobes; étamines 4-5, insérées à la base de la corolle; filets très courts, dressés; anthères libres; ovaire soudé à la base du tube du calice; styles épais. Capsule semi-infère, rostrée, bivalvée. Graines très petites et nombreuses.

- B. aspera* L.
B. spinosa Sw.

Niphaea Lindl.

Herbes rampantes, pubescentes. Feuilles ovales, pétiolées, munies de dents ou d'écaillés grossières. Propagation végétative à l'aide de stolons squameux. Calice campanulé, toujours avec 5 lobes; corolle pareille à celle du genre *Bellonia*, mais toujours pentamère; étamines comme dans le genre *Bellonia*; ovaire semi-infère avec style recourbé. Capsule s'ouvrant par 2 valves, les parties libres, coniques. Fleurs blanches, agglomérées dans l'axe des feuilles.

- N. domingensis* Urb. et Ekm.

Achimenes Adans.

Herbes généralement villeuses, avec des rhizomès souterrains, squameux. Feuilles opposées ou verticillées, serrées ou dentées. Fleurs solitaires ou fasciculées dans les axes. Tube du calice adné à l'ovaire, lobes 5, généralement petits, subégaux; corolle rouge — violette, rarement blanche, avec tube cylindrique et 5 lobes divergents; étamines 4, insérées à la partie inférieure du tube de la corolle; staminodes représentant la cinquième étamine; disque annulaire, parfois pentagone ou pentalobé; ovaire infère; stigmates dilatés ou bilobés. Capsule bivalvée.

- A. coccinea* (Scop.) Pers.

Gesneria L.

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux rampants. Feuilles généralement agrégées au sommet des branches. Fleurs solitaires ou agrégées en cymes dans l'axe des feuilles. Tube du calice généralement avec 5 côtes; tube de la corolle plus ou moins cylindrique, écarlate; étamines généralement insérées au tube de la corolle; filets quelque peu élargis à la base; disque annulaire, généralement avec 5 lobes ou 5 angles; stigmate en forme d'orifice ou quelque peu bilobé. Capsule infère, généralement avec 5 angles, déhiscente par 2 valves.

- G. ventricosa* Sw.
G. cubensis (Dcne.) O. Ktze.
G. dolichostyla Urb.
G. fruticosa (L.) O. Ktze.
G. humilis L.
G. cuneifolia Sessé et Moc.
G. christii Urb.
G. barahonensis Urb.
G. decapleura Urb.
G. bullata Urb. et Ekm.
G. aspera Urb. et Ekm.
G. hypoclada Urb. et Ekm.
G. lanceolata Urb. et Ekm.
G. scopulorum Urb. et Ekm.
G. ekmanii Urb.
G. subalata Urb. et Ekm.
G. mornicola Urb. et Ekm.
G. sintenisii Urb.
G. hybocarpa Urb. et Ekm.

Rhytidophyllum Mart.

Arbrisseaux petits, généralement poilus. Fleurs avec longs pédoncules, disposées en cymes axillaires. Calice généralement poilu, avec des côtes régulières, lobes courts; corolle généralement verdâtre avec tube divergent élargi

et lobes courts; filets élargis à la base, soudés au tube de la corolle; anthères unies; disque et stigmate pareils à ceux du genre *Gesneria*. Capsule infère, déhiscente par 2 valves.

- R. berterioanum* Mart.
- R. leucomallon* Hanst.
- R. auriculatum* Hook.
- R. auriculatum* Hook. Var. *genuinum* Urb. Var. *stipulare* Urb. Var. *plumierianum* (P. DC.) Urb. Var. *angustatum* Urb.
- R. petiolare* P. DC.
- R. bicolor* Urb.
- R. lonatum* Urb. et Ekm.
- R. vernicosum* Urb. et Ekm.

Famille 165. LENTIBULARIACEÆ

Herbes petites avec hampes ou caulescentes, poussant dans l'eau ou dans les endroits humides; tiges souvent submergées. Feuilles submergées et disséquées en segments linéaires ou filiformes, parfois ressemblant à de petites racines et généralement avec des vessies, parfois aériennes, basilaires, entières, ou rarement absentes. Hampes nues ou garnies de petites écailles, portant une ou beaucoup de fleurs. Fleurs irrégulières, parfaites, généralement voyantes. Calice de 2 ou 5 sépales herbacés; corolle bilabée, tube éperonné ou en forme de poche, hypogyne; étamines 2, adnées à la base du tube de la corolle; filets aplatis, tordus; anthères confluentes uniloculaires; pistil simple uniloculaire avec un placenta libre central, généralement globulaire; style épais et court; stigmate généralement bilabé, lèvres inégales; ovules nombreux, anatropes. Fruit, une capsule, bivalvée ou irrégulièrement déhiscente.

Utricularia L.

Caractères de la famille.

- U. foliosa* L.
- U. pusilla* Vahl.
- U. obtusa* Sw.

Famille 166 ACANTHACEÆ

Herbes, arbrisseaux ou arbustes, souvent pubescents, généralement amers ou acides. Feuilles opposées, généralement entières, sans stipules. Tiges allongées aux nœuds. Fleurs parfaites, généralement irrégulières, souvent soutendues par des bractées voyantes. Calice infère, segments 5, rarement 4, souvent unis en bas; corolle de 5 pétales partiellement unis ou bilabée. Etamines fertiles 4 ou 2, attachées au tube de la corolle, la 5ème (ou les 2 autres) représentée par les staminodes. Styles simples, avec stigmates bilobés. Fruit, une capsule biloculaire, déhiscente, avec 2 ou plusieurs graines.

- x. Etamines fertiles 4:
- 2x. Anthères toutes biloculaires:
- 3x. Filets libres:
- 4x. Bractéoles grandes, enveloppant tout le calice..... *Thunbergia*, p. 346
- 4x. Bractéoles petites, n'enveloppant pas le calice:
- 5x. Corolle pentalobée; calice avec 4 lobes..... *Barleria*, p. 347
- 5x. Corolle bilabée; calice avec 5 lobes..... *Lepidagathis*, p. 347
- 3x. Filets plus ou moins connés à la base:
- 4x. Corolle pentalobée, non manifestement bilabée:

- 5x. Placentas se séparant librement des valves de la capsule..... *Blechum*, p. 346
- 5x. Placentas attachés avec persistance aux valves de la capsule:
- 6x. Sépales unis en un tube plus ou moins long. Capsule de 4 graines, presque sessile..... *Dyschoriste*, p. 346
- 6x. Sépales distincts jusqu'à la base. Capsule de 4-8 graines, stipitée ou de 6-16 graines non stipitée..... *Ruellia*, p. 347
- 4x. Corolle manifestement bilabée..... *Hygrophyla*, p. 346
- 2x. Anthères toutes non biloculaires ou uniloculaires:
- 3x. Anthères antérieures biloculaires; anthères postérieures uniloculaires..... *Barleriola*, p. 347
- 3x. Anthères toutes uniloculaires:
- 4x. Bractées courtes n'enveloppant pas le calice. Corolle plus ou moins manifestement bilabée..... *Stenandrium*, p. 348
- 4x. Bractées longues enveloppant le calice. Corolle manifestement bilabée..... *Aphelandra*, p. 348
- x. Etamines fertiles 2:
- 2x. Staminodes présents 2:
- 3x. Corolle convolutive dans le bourgeon:
- 4x. Graines 3-4 dans la loge..... *Sanchezia*, p. 346
- 4x. Graines 2 dans la loge..... *Eranthemum*, p. 347
- 3x. Corolle imbriquée dans le bourgeon:
- 4x. Epines 2 dans l'axe des feuilles. Bractéoles absentes..... *Anthacanthus*, p. 349
- 4x. Epines absentes dans l'axe des feuilles. Bractéoles présentes:
- 5x. Anthères obtuses à la base..... *Graptophyllum*, p. 348
- 5x. Anthères aiguës à la base..... *Odontonema*, p. 349
- 2x. Staminodes absents:
- 3x. Feuilles normales seulement à la base de la tige..... *Elytraria*, p. 345
- 3x. Feuilles normales sur la tige:
- 4x. Herbes ou arbustes:
- 5x. Loges de l'anthère obtuses ou très rarement petites et aiguës:
- 6x. Calice hyalin. Inflorescence composée, en cymes rétrécies..... *Dicliptera*, p. 349
- 6x. Calice non hyalin. Inflorescence paniculée, spiciforme, élargie..... *Pachystachys*, p. 348
- 5x. Loges de l'anthère éperonnées ou très acuminées:
- 6x. Capsule non stipitée..... *Andrographis*, p. 348
- 6x. Capsule stipitée:
- 7x. Bractées imbriquées..... *Drejerella*, p. 349
- 7x. Bractées non imbriquées..... *Justicia*, p. 350
- 4x. Arbres..... *Samuelsonia*, p. 349

Elytraria Michx.

Herbes vivaces, caulescentes, avec feuillage glabre. Tiges quelquefois en forme de hampes. Feuilles alternes ou presque opposées, basilaires ou placées en grand nombre à l'extrémité des branches, limbes membraneux ou presque membraneux, entiers. Fleurs parfaites, en épis denses; bractées imbriquées. Calice scarieux, limbes étroits, entiers ou dentés presque au sommet; corolle blanche ou bleue, tube grêle et cylindrique, limbe bilabé, lèvre supérieure entaillée ou bilobée, lèvre inférieure trilobée; étamines 2, légèrement exsertes; anthères biloculaires, sacs égaux, parallèles, quelquefois en pointe à la base;

staminodes généralement absents; ovaire biloculaire; ovules 6-10 dans chaque loge. Capsule étroite, contractée à la base, aiguë ou en forme de bec au sommet.

E. squamosa (Jacq.) Lindau.

Thunbergia L. f.

Plantes ligneuses ou herbacées, généralement grimpantes. Feuilles opposées, simples, hastées à la base. Fleurs solitaires dans les axes ou racémeuses, sous-tendues par 2 grandes bractées plus ou moins foliacées. Calice varié ou tronqué, ou de 5-15 lobes; corolle grande, infundibuliforme, ou quelque peu campanulée, pentalobée; étamines didynames, attachées près de la base du tube; ovules 2 dans chaque loge. Capsule portant les graines à la base, développée en forme de bec.

T. alata Bojer.

T. grandiflora Roxb. Ornemental.

T. fragrans Roxb. Ornemental.

Sanchezia Ruiz. et Pav.

Herbes solides, grandes, dressées et plantes ligneuses. Feuilles grandes avec fortes nervures pennées, entières ou quelque peu dentées. Fleurs grandes et voyantes, de couleur orange, rouge ou pourpre, avec de grandes bractées en forme de calice, disposées en épis terminaux et axillaires ou solitaires dans quelques espèces. Tube de la corolle long, cylindrique au-dessous et élargi au sommet, les 5 lobes courts et larges; étamines parfaites 2, insérées au-dessous du milieu du tube, avec 2 staminodes entre elles, les 2 loges de l'anthère mucronées; ovules 4 dans chaque loge; style très grêle, légèrement bilobé au sommet. Capsule légèrement contractée à la base. Graines 8 normalement.

S. nobilis Hook f.

Hygrophila R. Br.

Herbes parfois armées d'épines axillaires. Feuilles opposées, entières. Fleurs solitaires dans les axes ou généralement agrégées. Calice persistant, lobes 5, étroits, légèrement inégaux; corolle généralement blanche, bilabée, lèvre supérieure dressée, concave, crénelée ou bilobée, lèvre inférieure plus ou moins divergente, bilobée; étamines 4, didynames; filets légèrement dilatés à la base; anthères biloculaires, sacs égaux, parallèles; staminode petit ou obsolète; ovaire biloculaire; ovules 2, 4 ou plus dans chaque loge. Capsule cylindrique ou aplatie, contrairement au septum.

H. brasiliensis (Spreng.) Lindau.

H. lacustris (Schlecht et Cham) Nees.

Blechum Juss.

Herbes généralement poilues. Feuilles entières ou serrées. Fleurs petites, généralement solitaires dans l'axe des bractées ou agrégées terminales; bractées grandes, avec bractéoles petites. Calice avec 5 lobes presque égaux ou généralement bilabié, avec 2 segments beaucoup plus grands; filets antérieurs plus longs. Fruit capsulaire, avec 6 graines ou plus.

B. pyramdatum (Lam.) Urb.

Dyschoriste Nees.

Herbes annuelles avec petites feuilles. Fleurs axillaires; bractéoles petites. Sépales unis jusqu'au milieu, tube du calice cylindrique; corolle rarement quelque peu bilabiée; étamines antérieures avec filets plus longs. Fruit capsulaire. Graines 2 dans chaque loge.

D. diffusa (Nees) Urb. Var. *glabrata* Urb.

Ruellia L.

Herbes ou arbrisseaux. Feuilles opposées, entières ou dentées, souvent pétiolées. Fleurs parfaites, solitaires ou agrégées dans les axes ou en cymes ou panicules terminales. Calice étroit, avec lobes lancéolés; corolle infundibuliforme ou en forme de soucoupe, tube étroit, dilaté en une gorge plus ou moins ample, lobes 5, plus ou moins inégaux; convolutés, divergents; étamines 4; ovaire biloculaire; styles recourbés au sommet; ovules 3-10 dans chaque loge. Capsule oblongue ou clavée, cylindrique ou aplatie.

R. tuberosa L. «Fleurs pétards.»

R. nudiflora (Engelm et Gray) Urb. «Fleurs pétards.»

R. nudiflora (Engelm et Gray) Urb. Var. *insularis* Léonard.

R. lepidota Urb. Plaine du Cul de Sac.

R. geminiflora H. B. K.

R. domingensis Spreng.

R. coccinea (L) Vahl.

Eranthemum L.

Herbes et plantes ligneuses. Feuilles entières ou quelque peu dentées. Fleurs bleues ou roses enveloppées de bractées et disposées en épis souvent paniculés. Calice pentalobé ou pentafide couvert par les bractées; corolle avec tube long, très grêle, souvent courbé, limbe étendu et pentalobé, non bilabié; étamines parfaites 2, attachées à la gorge de la corolle. Capsule ovoïde ou oblongue avec 4 graines ou peut-être moins par avortement.

E. nervosum (Vahl.) R. Br. Ornemental.

Lepidagathis W.

Herbes généralement rampantes, avec des épines dans l'inflorescence. Feuilles entières ou irrégulièrement sinuées. Fleurs disposées en épis latéraux, souvent avec des bractées et de petites bractéoles. Segments postérieurs du calice plus larges, segments antérieurs généralement plus élevés, segments latéraux petits, tube cylindrique légèrement campanulé; corolle bilabée; filets inégaux; anthères généralement poilues, 1 généralement insérée plus haut; disque annulaire. Capsule généralement avec 4 angles. Graines plates, rondes, généralement 2.

L. alopecuroïdea (Vahl.) R. Br.

Barleria L.

Herbes ou arbrisseaux, glabres ou pubescents, dressés, parfois épineux. Feuilles entières. Fleurs voyantes, solitaires ou fasciculées dans les axes, parfois en épis terminaux, accompagnées de grandes bractées souvent épineuses. Calice quadrilobé, les 2 lobes externes larges, les lobes internes latéraux, petits et étroits; tube de la corolle généralement long, la partie inférieure grêle, la partie supérieure large, lobes 5 larges, divergents, généralement presque égaux; étamines parfaites 4, didynames, attachées près de la base de la corolle; ovules 2 dans chaque loge; styles généralement entiers. Capsule ovoïde ou oblongue, portant normalement 4 graines.

B. lupulina Lindl. «Barré volé.»

B. cristata L.

Barleriola Oerst.

Arbrisseaux petits, avec 1 ou 2 épines axillaires. Feuilles petites. Fleurs sessiles, axillaires; bractéoles petites. Segments postérieurs du calice ovales, segments antérieurs plus petits, segments latéraux courts, linéaires; tube mince;

filets inégaux; anthères postérieures uniloculaires, anthères antérieures biloculaires; disque infère; stigmate large; ovules 2 dans chaque loge. Capsule sessile. Graines 2-4, plates.

B. solanifolia (L.) Oerst. «Barré volé.»

B. inermis Urb. et Ekm. Var. *glabrata* Urb.

B. multiflora Urb. et Ekm.

Stenandrium Nees.

Herbes avec feuillage pubescent. Feuilles plates, entières. Fleurs en épis terminaux avec des bractées. Calice sessile, lobes 5 étroits, légèrement inégaux; corolle rose ou pourpre, tube cylindrique, grêle, légèrement courbé à la gorge, lobes 5, inégaux, imbriqués; étamines 4, didynames, incluses; anthères uniloculaires; ovaire biloculaire; stigmate bilobé; ovules 2 dans chaque loge. Capsule légèrement angulée, oblongue ou subfusiforme.

S. tuberosum (L.) Urb.

S. acuminatum Urb.

S. scabrosum (Sw.) Nees.

S. undulatum Urb. et Ekm.

Aphelandra R. Br.

Herbes ou arbrisseaux. Feuilles généralement nombreuses, entières ou dentées. Fleurs sessiles, axillaires et terminales, avec de grandes bractées souvent colorées; corolle jaune, orange, rouge, fortement bilabiée, lèvre supérieure ascendante, lèvre inférieure déclive ou enroulée; étamines parfaites 4, attachées à la base cylindrique de la corolle, les anthères uniloculaires, égales et pointues; ovules généralement 4 dans chaque loge; styles entiers. Capsule oblongue.

A. pectinata Willd.

Andrographis Nees.

Herbes basses ou élevées, glabres ou poilues. Fleurs en panicules souvent unilatérales ou plus ou moins compactes; bractées et bractéoles petites. Segments du calice le plus souvent petits, tube mince dilaté à la partie supérieure, courbé, lèvre supérieure parfois entière; filets très élargis à la partie inférieure, projetés au dehors; loges de l'anthère égales ou loge interne plus grosse, pointues et poilues à la partie inférieure; connectif souvent poilu à la partie postérieure; disque en forme de plat; stigmate très légèrement bifide; ovules 3-6 dans les loges. Capsule oblongue, courbée du côté dorsal. Graines 4-12, presque globulaire.

A. paniculata (Burm.) Nees. Ornamental.

Graptophyllum Nees.

Arbrisseaux glabres. Feuilles entières ou dentées généralement colorées et bigarrées. Fleurs pédicellées, rouges ou pourpres, sessiles; bractées et bractéoles très petites. Corolle avec tube courbé, bilabié, lèvre supérieure bilobée, lèvre inférieure trilobée; étamines fertiles 2, staminodes 2 et petits; anthères biloculaires et pointues au-dessous; ovules 2 dans chaque loge; styles quelque peu bidentés. Fruit capsulaire.

G. pictum (L.) Griff. Ornamental.

Pachystachys Nees.

Herbes et arbrisseaux glabres. Feuilles grandes souvent lisses. Fleurs jaunes ou rouges, 1-3 dans l'axe des bractées; bractées souvent absentes. Calice court, lobes postérieurs souvent plus larges, tube long; corolle bilabiée, lèvre supé-

rieure longue, lèvre inférieure plus large; filets attachés à la base du tube de la corolle.

P. coccinea (Aubl.) Nees, «Panache» d'après Urban.

Anthacanthus Nees.

Arbrisseaux glabres, petits, avec des épines opposées, axillaires. Feuilles petites, entières. Fleurs solitaires ou nombreuses dans les axes; pédoncules courts; bractées très petites; bractéoles absentes. Calice profondément pentaloqué, lobes égaux, tube cylindrique; corolle pentaloquée ou bilabiée; filets courts, loges de l'anthère égales ou la loge externe plus petite; staminodes 2; disque annulaire. Capsule avec long pédoncule. Graines 4 ou moindres.

A. acicularis (Sw.) Nees.

A. spinosus (Jacq.) Nees.

Odontonema Nees.

Arbrisseaux ou herbes. Feuilles généralement grandes, entières. Fleurs rouges et épis terminaux ou axillaires. Corolle quelque peu bilabiée, lèvre postérieure entière ou bilobée, lèvre antérieure trilobée; étamines 2, attachées à la partie supérieure du tube; staminodes 2, petits; ovules 2 dans chaque loge.

O. christii Lindau.

Samuelssonina Urb. et Ekm.

Arbres d'Hispaniola, inermes. Feuilles égales par paires, ovales—oblongues, entières ou crénelées, munies de cystolithes très grandes, verruciformes, faisant saillie de part et d'autre. Inflorescence axillaire avec 3 fleurs pédonculées, mais portant toujours une fleur à l'extrémité de la cyme; bractées et prophylles le plus souvent ovées et relativement grandes. Sépales 5, charnus, brun pourpre, unis à la base, imbriqués dans le bourgeon, presque égaux, très allongés, oblongs, lancéolés, aigus; corolle quadrilobée; lobe postérieur à l'intérieur dans le bourgeon, un seul externe, latéral, les autres presque couverts, ascendants, imbriqués, bilabiés: lèvre postérieure ovée, étrécie à la partie supérieure avec 2 petites dents au dedans d'une petite membrane linéaire adnée au milieu et libre des autres, les 3 lobes antérieurs presque inégaux, arrondis. Étamines 2, anthères biloculaires à loges parallèles et obtuses des 2 côtés; grain de pollen ellipsoïdal; disque court, entier; style entier au sommet. Capsules ovales—acuminées, presque cylindriques, faisant saillie par en bas. Graines 2 dans chaque loge, cordées, émarginées à la base, légèrement obtuses ou obtuses au sommet, plano-convexes, lisses; radicule 2 fois plus courte que les cotylédons réniformes.

S. verrucosa Urb. et Ekm. «Bonnet carré» Massif de la Hotte, près de St-Louis du Sud.

Drejerella Lindau

Herbes. Inflorescence spiciforme, compacte, terminale. Bractées lancéolées ou subspatulées, imbriquées. Bractéoles lancéolées. Calice pentaloqué. Corolle bilabiée; lèvre supérieure bi-denticulée; lèvre inférieure obtuse, trilobée. Étamines 2; filets attachés à la gorge de la corolle. Loges de l'anthère presque superposées.

D. mirabiloides (Lam.) Lindau.

Dicliptera Juss.

Herbes dressées, pubescentes. Fleurs rouges, violettes ou bleues; inflorescence souvent épineuse; bractéoles hyalines, lancéolées, petites. Calice généralement hyalin, avec des lobes presque égaux; tube de la corolle généralement

plus court que le bord, amplifié au-dessus, bords bilabiés, lèvre supérieure dressée ou ascendante et entière ou bidentée, lèvre inférieure plus ou moins profondément trilobée; filets plus courts que la lèvre supérieure; loges des anthères souvent inégales, obtuses, loge supérieure rarement appendiculée, loges inférieures toujours appendiculées; disque généralement entier; stigmaté courtement bilobé.

D. mucronata Urb.

D. obtusifolia Urb. Var. *ciliifera* Urb.

D. assurgens (L.) Juss.

Justicia L.

Herbes ou arbrisseaux. Feuilles entières. Fleurs petites ou grandes, blanches, pourpres ou rouges, disposées de différentes façons. Calice de 4-5 lobes, segments étroits; tube de la corolle généralement plus court que le bord, amplifié au-dessus, bord bilabiés: lèvre supérieure dressée ou ascendante et entière ou bidentée, lèvre inférieure divergente et trilobée; étamines 2, loges de l'anthère inégales, loges inférieures appendiculées à la base; stigmaté capité ou bidenté; ovules 2 dans chaque loge. Capsule ovée ou oblongue, avec 2 ou 4 graines.

J. carthagenensis Jacq.

J. periplocifolia Jacq.

J. reptans Sw.

J. comata (L.) Lam.

J. pectoralis Jacq. «Z'Herbe Charpentier» (Haïti), «Curia» (St-Domingue). Médicinal.

J. sessilis Jacq.

J. buchii Urb.

J. peratanthoides Urb et Ekm.

J. abeggii Urb. et Ekm.

J. disparifolia Urb. et Ekm.

J. spinigera Urb. et Ekm.

Famille 167. MYOPORACEÆ

Arbres, arbustes ou arbrisseaux glandulaires et lanifères. Feuilles alternes ou opposées, simples, entières ou rarement dentées. Fleurs bisexuées, régulières ou irrégulières, axillaires, solitaires ou fasciculées, subsessiles ou pédicellées. Calice de 5 segments persistants; corolle gamopétale, le bord de 5-6 lobes, parfois bilabié; étamines 4, didynames, la 5ème représentée par 1 staminode, épipétales; ovaire supère biloculaire ou apparemment de 3-10 loges; ovules généralement 1-2, rarement 8 dans une loge; style 1; stigmates 1-2. Fruit drupacé.

Bontia L.

Caractères de la famille.

B. daphnoïdes L. «Olivier bâtard», d'après Urban.

Ordre XLI. PLANTAGINALES

Ordre gamopétale de parenté incertaine. Herbes généralement acaules. Feuilles principalement ou entièrement basilaires, limbes de 1 à plusieurs côtes. Fleurs parfaites, monoïques ou dioïques, disposées en épis. Calice de 4 sépales partiellement unis ou presque distincts; corolle de 4 pétales partiellement unis, membraneux et sans nervures. Androcée de 4 ou 2 étamines. Gynécée, un pistil composé, supère. Fruit capsulaire, généralement une pyxide.

Famille 168. PLANTAGINACEÆ

Plantes annuelles ou vivaces, acaules ou pourvues d'une tige courte, rarement stolonifères. Feuilles alternes; stipules absentes. Inflorescence en épis terminaux sur des hampes ou des pédoncules axillaires; fleurs sous-tendues par des bractées, sessiles, parfaites, monoïques ou dioïques. Calice infère, de 4 sépales persistants, légèrement unis; corolle hypogyne, scarieuse ou membraneuse, sans nervures, généralement persistante, avec 4 lobes imbriqués, dressés ou divergents. Étamines 4-2; filets adnés au tube ou à la gorge de la corolle; anthères oscillantes, biloculaires, à déhiscence longitudinale. Ovaire 1, supère, sessile, de 1-2 loges, ou apparemment de 3-4 loges; stigmaté simple, filiforme ou grêle; ovules 1 — beaucoup, amphytrope, pelté. Fruit, une capsule circonsisile ou une pyxide.

Plantago L.

Caractères de la famille.

P. major L. Plantain. Médicinal.

P. lanceolata L. «Chaise dodine».

Ordre XLII. RUBIALES

Herbes, arbustes ou arbres. Feuilles opposées, parfois verticillées; limbes principalement entiers, dentés ou divisés. Fleurs parfaites ou rarement polygames, solitaires ou en cymes modifiées de façons diverses; hypanthium bien développé. Sépales 3-6 ou rarement 10, parfois très petits; corolle de 3-6 ou rarement 10 pétales partiellement unis. Androcée d'autant d'étamines qu'il y a de pétales ou du double ou parfois moindres; anthères distinctes. Gynécée de 1 — plusieurs carpelles unis; ovaire 1-10 loges; styles unis; ovules 1 — beaucoup dans chaque cavité de l'ovaire. Fruit, une capsule, une baie, une drupe ou une espèce de fruit coriacé ou crustacé.

- x. Étamines 1-3, toujours moindres que les lobes de la corolle 171. Valerianaceæ, p. 369
- x. Étamines 4-5. Feuilles opposées ou verticillées:
 - 2x. Feuilles opposées ou perfoliées, mais ni verticillées, ni pourvues de vraies stipules 170. Caprifoliaceæ, p. 369
 - 2x. Feuilles ou opposées et stipulées ou verticillées et sans vraies stipules 169. Rubiaceæ, p. 351

Famille 169. RUBIACEÆ

Arbrisseaux, arbustes ou arbres ou généralement herbes, parfois spinifères. Feuilles opposées ou verticillées, entières-stipulées. Fleurs parfaites ou polygames, régulières ou parfois légèrement irrégulières; hypanthium varié adné à l'ovaire. Calice infère, le bord entier ou lobé, rarement obsolete; corolle gamopétale, les lobes valvés, imbriqués ou contordus, de 3-6, rarement 10 pétales, plus ou moins unis. Étamines généralement aussi nombreuses que les lobes de la corolle et alternes avec eux, insérées sur le tube ou la gorge de la corolle. Styles simples ou de 2-10 fentes; ovaire plus ou moins adné à l'hypanthium; ovules parfois solitaires et dressés, parfois nombreux, anatropes ou amphytropes. Fruit, une capsule, une drupe ou une baie. Graines généralement aplaties sur un côté.

- x. Ovules nombreux dans chaque loge de l'ovaire:
 - 2x. Fruit sec:
 - 3x. Fleurs radiées:
 - 4x. Lobes de la corolle valvés:
 - 5x. Graines très nombreuses, horizontales; (Stipules entières ou bipartites). Arbres et arbustes, avec

- généralement de grandes fleurs très voyantes:
- 6x. Corolle ronde; valves simples:
- 7x. Inflorescence axillaire; stipules décidues *Chimarrhis*, p. 355
- 7x. Inflorescence terminale, stipules persistantes *Picardaea*, p. 355
- 6x. Corolle angulaire; valves réduites:
- 7x. Capsule tardivement loculicide au sommet *Portlandia*, p. 355
- 7x. Capsule septicide *Isidorea*, p. 355
- 5x. Graines moins nombreuses, perpendiculaires; (Stipules fendues très souvent sétacées). Herbes ou sous-arbrisseaux, rarement arbustes; fleurs petites ou très petites:
- 6x. Graines angulaires parfois ailées *Oldenlandia*, p. 355
- 6x. Graines en forme d'un petit navire ou planoconvexes *Lucya*, p. 356
- 4x. Lobes de la corolle imbriqués ou contournés:
- 5x. Capsule semi-supère *Rachicallis*, p. 356
- 5x. Capsule infère ou presque infère:
- 6x. Tube du calice beaucoup plus long que les lobes. Fleurs quadripartites, axillaires. Ovaire oblong *Neomazaea*, p. 356
- 6x. Tube du calice court ou obsolète:
- 7x. Calice de 4-6 lobes, persistant. Inflorescence axillaire ou terminale *Rondeletia*, p. 356
- 7x. Calice bilobé, décliné; corolle de 5-7 parties. Fleurs axillaires *Stevensia*, p. 357
- 3x. Fleurs bilabiées; étamines inégales fixées très haut dans le tube:
- 4x. Lobes de la corolle valvés dans le bourgeon *Manettia*, p. 357
- 4x. Lobes de la corolle contournés ou imbriqués dans le bourgeon:
- 5x. Lobes de la corolle contournés *Hillia*, p. 358
- 5x. Lobes de la corolle imbriqués *Exostema*, p. 358
- 2x. Fruit juteux:
- 3x. Lobes de la corolle valvés:
- 4x. Inflorescence terminale:
- 5x. Inflorescence non compacte *Gonzalagunia*, p. 358
- 5x. Inflorescence capitée *Schradera*, p. 358
- 4x. Inflorescence axillaire:
- 3x. Lobes de la corolle contournés ou imbriqués *Coccocypselum*, p. 359
- 4x. Lobes de la corolle contournés:
- 5x. Graines moyennes avec testa lisse ou fibreux:
- 6x. Inflorescence terminale ou terminale et latérale *Casasia*, p. 359
- 6x. Inflorescence axillaire:
- 7x. Tube de la corolle villos à la gorge et à la base; style pointu *Genipa*, p. 359
- 7x. Tube de la corolle villos soit à la gorge, soit à la base; style non pointu *Randia*, p. 359

- 5x. Graines petites, angulaires, avec testa sculpté de petites cavités *Bertiera*, p. 360
- 4x. Lobes de la corolle imbriqués:
- 5x. Ovaire de 4-5 loges *Hamelia*, p. 360
- 5x. Ovaire de 2 loges *Catesbaea*, p. 360
- x. Ovule solitaire dans chaque loge:
- 2x. Graines pendantes; radicule supère:
- 3x. Etamines insérées à la gorge ou au milieu du tube de la corolle:
- 4x. Fruit drupacé, indéhiscent ou se déchirant par la chute ou par la décomposition:
- 5x. Calice caduc *Guettarda*, p. 360
- 5x. Calice persistant:
- 6x. Filets courts; stipules triangulaires:
- 7x. Stipules non sécrétives. Fleurs solitaires, axillaires *Ottoschmidtia*, p. 361
- 7x. Stipules sécrétives. Fleurs cymeuses *Antirrhoea*, p. 362
- 6x. Filets longs *Laugeria*, p. 362
- 4x. Fruit se séparant à maturité en 2 coques longues et étroites, semi-cylindriques *Machaonia*, p. 362
- 3x. Etamines insérées à la base du tube de la corolle:
- 4x. Lobes de la corolle valvés:
- 5x. Inflorescence terminale *Erithalis*, p. 362
- 5x. Inflorescence axillaire *Chiococca*, p. 362
- 4x. Lobes de la corolle imbriqués:
- 5x. Fleurs de grandeur moyenne *Chione*, p. 363
- 5x. Fleurs petites, minces *Scolosanthus*, p. 363
- 2x. Graines ascendantes; radicule infère:
- 3x. Lobes de la corolle contournés ou imbriqués:
- 4x. Lobes de la corolle contournés:
- 5x. Fleurs avec calicule *Coffea*, p. 363
- 5x. Fleurs sans calicule; tube de la corolle 2-3 fois plus long que le tube *Ixora*, p. 363
- 4x. Lobes de la corolle imbriqués *Strumpfia*, p. 364
- 3x. Lobes de la corolle valvés:
- 4x. Ovules fixés à la base de l'ovaire:
- 5x. Ovaire biloculaire, rarement pluriloculaire, avec cloison épaisse:
- 6x. Etamines insérées généralement à la gorge de la corolle:
- 7x. Inflorescence de beaucoup de fleurs, terminale ou latérale et terminale:
- 8x. Inflorescence non involucree:
- 9x. Corolle dressée, non gibbeuse; les branches de l'inflorescence ne sont ni jaunes, ni rougeâtres *Psychotria*, p. 364
- 9x. Corolle généralement quelque peu courbée ou gibbeuse; les branches de l'inflorescence généralement jaunes ou rouges *Palicourea*, p. 365
- 8x. Inflorescence involucree, capitée:

- 9x. Graines plates sur le côté ventral..... **Geophila**, p. 365
- 9x. Graines munies de rides étroites sur le côté ventral..... **Uragoga**, p. 365
- 7x. Inflorescence de beaucoup ou peu de fleurs, en cymes axillaires, souvent composées:
- 8x. Ovaire de 3- beaucoup de loges..... **Lasianthus**, p. 365
- 8x. Ovaire de 2 loges..... **Margaritopsis**, p. 366
- 6x. Etamines généralement insérées à la base de la corolle..... **Peratanthe**, p. 366
- 5x. Ovaire uniloculaire ou biloculaire avec cloison très mince..... **Faramea**, p. 366
- 4x. Ovules fixés à la cloison de séparation:
- 5x. Arbres et arbrisseaux; stipules entières et non foliacées..... **Morinda**, p. 366
- 5x. Plantes herbacées ou sous-arbrisseaux:
- 6x. Stipules relativement petites ou peu voyantes, plus ou moins fendues:
- 7x. Fruit drupacé, les carpelles ni déhiscent, ni séparables..... **Ernodea**, p. 366
- 7x. Fruit non drupacé, les carpelles déhiscent ou séparables:
- 8x. Les carpelles se séparent à maturité en coques:
- 9x. Coques entièrement fermées sur le côté interne:
- 10x. Herbes..... **Diodia**, p. 367
- 10x. Sous-arbrisseaux..... **Tortuella**, p. 367
- 9x. Coques ouvertes à la base sur le côté interne..... **Hemidiodia**, p. 367
- 8x. Les carpelles sont déhiscent à maturité:
- 9x. Capsule à déhiscence longitudinale, les valves unies à la base, les 2 carpelles s'ouvrent dorsalement..... **Borreria**, p. 367
- 9x. Les capsules se séparent en valves, l'une d'elles s'ouvre par la cloison médiane, l'autre reste fermée:
- 10x. Lobes du calice présents..... **Spermacoce**, p. 368
- 10x. Lobes du calice nuls..... **Micrasepalum**, p. 368
- 9x. Capsule à déhiscence septifrage..... **Mitracarpus**, p. 368
- 6x. Stipules foliacées, ressemblant généralement à des feuilles:
- 7x. Lobes du calice petits, libres ou généralement absents:
- 8x. Fleurs non protégées par un involucre..... **Galium**, p. 368
- 8x. Fleurs protégées de 2-4 petites bractées foliacées..... **Relbunium**, p. 369
- 7x. Lobes du calice 6, foliacés, de grosseur moyenne, soudés à la base..... **Sherardia**, p. 368

Picardaea Urb.

Arbrisseaux glabres avec rameaux arrondis et stipules interpétiolaires, courtes, triangulaires, coriaces, entières, persistantes. Feuilles pétiolées, ovées-elliptiques, cunéiformes à la base, parsemées de tout petits points. Inflorescence en grappes pédonculées; fleurs pentamères. Calice en forme de huppe avec bord court, entier; corolle coriacée, infundibuliforme, duvetée à l'intérieur et au milieu, segments valvés dans le bourgeon, charnus à l'intérieur et sur le bord avec des poils très courts; étamines adhérentes au milieu du tube de la corolle; filets épais—linéaires—coniques; anthères dorsifixes, oblongues, à déhiscence longitudinale; disque charnu, concave; ovaire biloculaire, style filiforme avec 2 stigmates oblongs-linéaires, tronqués, unis au-dessous. Capsule ovée ou obovée, avec 10 côtes, plate au sommet; exocarpe coriacé; endocarpe dur, ligneux, lisse à l'intérieur. Endosperme charnu, embryon cylindrique avec cotylédons ovales; graines très nombreuses.

P. haïtiensis Urb.

Chimarrhis Jacq.

Arbres ou arbustes, avec feuilles glabres, coriaces; stipules interpétiolaires, caduques. Fleurs petites, blanchâtres, disposées en grandes panicules décussées; bractéoles 2. Calice court, en forme de coupe, persistant, glandes internes absentes; corolle courte, infundibuliforme, très profondément lobée, gorge poilue; étamines adnées à la gorge; ovaire biloculaire; ovules nombreux dans chaque loge. Fruit capsulaire s'ouvrant par 2 valves, valves bilobées. Graines très petites.

C. cymosa Jacq.

Portlandia L.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles à pétiole court, coriaces, persistantes. Fleurs grandes, axillaires ou terminales, solitaires ou fasciculées. Corolle infundibuliforme, les lobes courts, redupliqués-valvés. Fruit capsulaire, biloculaire, à déhiscence loculicide par 2 valves. Graines nombreuses, comprimées-angulées.

P. domingensis Britton.

Isidorea A. Rich.

Arbres, arbustes ou arbrisseaux. Segments du calice 5, subulés, dénués de glandes à l'intérieur; corolle tubulaire, pentagone avec angles épaissis, glabre à l'intérieur, segment court avec bord épaissi; étamines adnées à la base de la corolle; filets épaissis à la base, pendants, poilus; nectaires pulviniformes. Capsule ovoïde, coniforme, pentagone, ligneuse, divisée en cloison, bifide, chaque valve fendue en 2 au sommet. Graines angulées, entourées à la base d'un tégument spongieux.

I. leonardi Urb.

I. pungens (Lam.) Robins, «Palo de cruz», «Yaya» (St-Domingue).

I. pedicellaris Urb. et Ekm.

I. leptantha Urb.

I. tetramera Urb. et Ekm. Ile de la Tortue.

I. brachyantha Urb.

Oldenlandia L.

Herbes ou plantes ligneuses. Feuilles opposées, généralement étroites, avec des stipules étroites. Fleurs en panicules terminales ou axillaires; hypanthium turbiné ou subglobulaire. Sépales 4; corolle blanche ou rose, rotacée—infundibuliforme, tube généralement glabre dans la gorge, lobes valvés 4 ou ra-

rement 5; étamines 4 ou rarement 5, filets adnés à la gorge de la corolle; ovaire biloculaire, styles grêles unis au dessous, ovules généralement nombreux dans chaque loge. Capsule membraneuse, cylindrique ou angulée, à déhiscence loculicide. Graines souvent angulées.

- O. herbacea* P. DC.
- O. corymbosa* L.
- O. selleana* Urb.
- O. callitrichoides* Griseb.

Lucya P. DC.

Calice quadridenté, persistant avec des segments intermédiaires; corolle rotacée; étamines adnées au tube, incluses; ovaire biloculaire, style court, bifide. Capsule semi-supère, coriacée; 2 valves divisées en compartiments; valves recourbées finalement.

- L. tetandra* (L.) K. Schum.

Rhachicallis P. DC.

Arbrisseaux dressés ou procombants. Feuilles oblongues — obovées, obtuses ou aiguës, coriacées. Fleurs jaunes, solitaires, sessiles dans l'axe des feuilles. Corolle en forme de soucoupe, couverte de poils très doux, bords quadrilobés. Capsule bivalvée, à déhiscence septicide. Graines nombreuses.

- R. americana* (Jacq.) O. Ktze.

Neomazaea Krug. et Urb.

Arbustes ou arbres, glabres ou pubescents; branches cylindriques. Stipules interpétiolaires, triangulaires, aiguës, persistantes; feuilles opposées, avec court pétiole, coriacées. Fleurs solitaires dans l'axe des feuilles ou en racemes axillaires ou en panicules; bractéoles 2, très petites; hypanthium étroitement oblong. Calice avec un tube distinct, quadrilobé, les lobes ouverts dans le bourgeon, obtus, égaux ou inégaux; corolle en forme de plateau, glabre à l'intérieur, tube cylindrique, gorge annulaire — épaissie, les 4 lobes imbriqués, ovés, charnus; étamines 4, insérées dans la gorge de la corolle; filets très solides; anthères dorsifixes, oblong-linéaires, obtuses, incluses; style filiforme, glabre, bilobé; disque annulaire, pileux; ovaire oblong, comprimé, biloculaire, costé; ovules peu dans chaque loge (2-6); placenta pelté. Capsule oblong-linéaire ou elliptique; exocarpe mince, crustacé; endocarpe subosseux, à déhiscence septicide au début, les valves finalement bipartites profondément. Graines peu nombreuses.

- N. pungens* Urb.

Rondeletia L.

Arbustes ou arbrisseaux. Fleurs disposées en cymes terminales ou axillaires, en corymbes ou panicules. Calice de 4-5 lobes; corolle infundibuliforme ou en forme de soucoupe, tube grêle, le bord quadrilobé ou pentalobé, les lobes imbriqués. Fruit capsulaire, biloculaire, à déhiscence loculicide ou septicide par 2 valves. Graines nombreuses, souvent ailées ou appendiculées.

- R. ochracea* Urb.
- R. christii* Urb.
- R. azuensis* Urb.
- R. heterochroa* Urb.
- R. brauseana* Urb. St-Domingue.
- R. berteriana* P. DC. Département de l'Artibonite.
- R. fuertesii* Urb.

- R. royenifolia* P. DC.
- R. brachycarpa* (Griseb) C. Wright.
- R. virgata* Sw.
- R. microcarpa* Urb. et Ekm.
- R. mornicola* Urb. et Ekm.
- R. areolata* Urb.
- R. brigandina* Urb. et Ekm.
- R. carnea* Urb. et Ekm.
- R. selleana* Urb. et Ekm.
- R. brachyantha* Urb.
- R. cacuminis* Urb. et Ekm.
- R. merillona* Urb.
- R. chrysantha* Urb. et Ekm.
- R. formonia* Urb. et Ekm.
- R. nalgensis* Urb. et Ekm.
- R. domatiata* Urb.
- R. pitreana* Urb. et Ekm.
- R. hincheana* Urb. et Ekm.

Stevensia Poit.

Arbustes plus ou moins pubescents, branches cylindriques. Stipules engainantes, développées derrière les pétioles comme des lobes, triangulaires, obtuses, persistantes; feuilles opposées, avec court pétiole, épaissies, coriacées. Fleurs solitaires dans l'axe des feuilles, pédonculées; bractéoles 2. Calice fermé avant l'anthèse et enveloppant la corolle, ovoïde — oblong, rostré — acuminé, décidu; corolle en forme de plateau avec tube cylindrique, glabre à l'intérieur, la gorge nue, lobes 5-7 imbriqués dans le bourgeon, arrondis au sommet, charnus, divergents; étamines 5-7 insérées dans la gorge de la corolle; filets très courts; anthères dorsifixes oblong-linéaires, émarginées à la base, obtuses au sommet, incluses; styles glabres, bifides ou bilobés, les lobes linéaires, tronqués; disque annulaire; ovaire obovoïde, subcomprimé, hirsute, biloculaire; ovules nombreux, multisériés; placentas peltés. Capsule petite, globulaire; exocarpe crustacé; endocarpe subosseux. Graines nombreuses, ovoïdes — oblongues, réticulées, ailées; embryon très petit.

- S. buxifolia* Poit.
- S. laurifolia* Urb.
- S. samanensis* Urb.
- S. ovatifolia* Urb. et Ekm.

Manettia Mut.

Herbes ou arbrisseaux glabres ou villex, faibles et grimpants. Feuilles pétiolées, opposées ou rarement verticillées. Fleurs axillaires, solitaires ou en corymbes courts ou paniculés, blanches, jaunes ou rouges. Lobes du calice 4-8, parfois foliacés; corolle de 4-5 lobes, les lobes généralement plus courts que le tube; étamines 4-5, insérées à la bouche ou dans la gorge de la corolle. Capsule ovoïde ou turbinée, biloculaire, déhiscence. Graines nombreuses.

- M. domingensis* Sprague.
- M. secundiflora* (Poir.) P. DC.
- M. calycosa* Griseb.
- M. lygistum* (L.) Sw.

Hillia Jacq.

Arbrisseaux épiphytes, avec feuilles quelque peu coriacées; stipules interpétiolaires. Fleurs grandes, solitaires, terminales. Lobes du calice absents ou 2-6, libres ou soudés à la base, généralement caducs; corolle en forme de soucoupe, rarement infundibuliforme. Capsule cylindrique, longue, bivalvée. Graines fusiformes, avec une longue touffe de poils.

H. parasitica Jacq. Près de Vallière.

H. tetandra Sw. Barahona.

Exostema L. C. Rich.

Arbustes ou arbres. Feuilles opposées; stipules interpétiolaires, entières ou bifides. Fleurs parfaites, axillaires et solitaires ou en corymbes ou panicules terminaux. Tube du calice cylindrique ou obové; sépales 5, étroits; tube de la corolle généralement long et grêle, lobes 5 étroits, imbriqués, 2 lobes externes; étamines 5, adnées à la base du tube de la corolle; disque annulaire; ovaire biloculaire, styles unis, filiformes, stigmaté entier ou bilobé, ovules nombreux dans chaque loge. Capsule allongée, biloculaire, à déhiscence septicide, par 2 valves entières ou bipartites. Graines nombreuses, ailées.

E. longiflorum (Lam.) R. et Sch.

E. santæ Lucie (Kentish) J. Britton.

E. coriaceum (Poir.) R. et Sch.

E. nitens Urb.

E. caribaeum (Jacq.) R. et Sch. «Quinquina pays» ou «Chandelle anglais» (Haïti), «Pini pini» (St-Domingue), d'après Urban.

E. caribaeum (Jacq.) R. et Sch. Var. *velutinum* Urb.

E. acuminatum Urb.

E. angustifolium (Sw.) R. et Sch.

E. lineatum (Vahl.) R. et Sch.

E. picardæ Krug. et Urb.

E. subcordatum Krug. et Urb.

E. subcordatum Krug. et Urb. Var. *büchii* Urb.

E. rupicolum Urb.

E. elegans Krug. et Urb.

E. spinosum (Vavass) Krug. et Urb.

E. spinosum (Vavass) Krug. et Urb. Var. *tortuense* Urb.

E. selleanum Urb. et Ekm.

E. polyphyllum Urb. et Ekm.

Gonzalagunia R. et P.

Herbes ou arbrisseaux, parfois quelque peu grimpants. Feuilles oblongues; stipules interpétiolées. Fleurs petites, en épis terminaux ou en petites capitules en forme d'épis. Calice en forme de coupe, avec 4-5 dents, glandulaire; corolle infundibuliforme ou en forme de soucoupe; ovaire de 2-4 loges. Fruit, une baie globulaire, avec 2-4 noyaux.

G. brachyantha (A. Rich) Urb.

G. spicata (Lam.) G. Maza.

G. haïtiensis Urb. et Ekm.

G. microsepala Urb. et Ekm.

Schradera Vahl.

Arbrisseaux glabres, épiphytes, grimpants, avec feuilles coriacées; stipules caduques. Fleurs disposées en petits capitules, solitaires ou agrégées à l'ex-

trémité des branches. Calice en forme de coupe; corolle en forme de soucoupe, avec 5-10 loges, charnues; étamines 5-10, adnées au milieu du tube de la corolle; ovaire de 2-4 loges, styles épais, de 2-4 lobes. Fruit fusiforme, couronné par le calice.

S. capitata Vahl.

Coccocypselum Sw.

Herbes s'étendant sur le sol, envoyant de nombreuses racines. Feuilles oblongues, souvent avec long pétiole; stipules subulées entre les pétioles. Fleurs en capitules, rarement en épis interrompus bifides. Segments du calice 4 (rarement 5), libres près de la base, avec des glandes entre les segments, persistants; corolle infundibuliforme, poilue à l'intérieur, le tube souvent élargi à la gorge; étamines adnées à la gorge ou au tube; (fleurs hétérostyles); ovaire biloculaire, style bifide. Fruit globulaire, ellipsoïde.

C. repens Sw. «Indigo savane» (Haïti), d'après Urban.

C. tenuis Urb.

Casasia A. Rich.

Arbrisseaux, arbustes ou arbres, avec stipules interpétiolaires. Calice en forme de coupe, avec 5 dents inégales; corolle en forme de soucoupe, avec tube glabre; étamines attachées dans la gorge; ovaire uniloculaire, avec 2 placenta pariétaux; styles robustes, bilobés, poilus au dos. Fruit grand, globulaire, ligneux, juteux à l'intérieur.

C. ekmanii Urb.

C. ekmanii Urb. Var. *ovalifolia* Urb.

C. haïtiensis Urb. et Ekm.

C. domingensis Urb.

Randia L.

Arbustes ou arbres, spinifères ou inermes, avec tiges dressées ou grimpantes. Feuilles opposées généralement coriacées. Fleurs parfaites, solitaires, généralement axillaires; hypanthium turbiné, obovoïde ou ovoïde, cylindrique ou garni de côtes. Sépales 4, très bas ou obsoletes; corolle blanche, jaune ou rose, infundibuliforme, campanulée ou en forme de soucoupe, lobes 5, convolutés; étamines 5 adnées à la gorge de la corolle, filets courts ou presque absents; disque annulaire ou en forme de coussin; ovaire biloculaire ou très rarement de 3-4 loges, styles généralement unis, ovules nombreux ou parfois 2 ou davantage dans chaque loge. Fruit, une baie généralement biloculaire. Graines libres ou enfouies dans une pulpe.

R. aculeata L. «Croc à chien», d'après Urban.

R. erythrocarpa Krug. et Urb. «Bois sadine.»

R. parvifolia Lam. «Azota criollo» (St-Domingue), d'après Urban.

Genipa L.

Arbustes ou arbres. Feuilles opposées, coriacées, brillantes; pétiole court; stipules décidues. Fleurs parfaites, en cymes axillaires, courtement pédonculées; hypanthium turbiné ou campanulé. Calice tronqué ou avec 5-6 sépales obtus; corolle blanche ou jaune en forme de soucoupe ou presque rotacée, tube pubescent dans la gorge, lobes 5-6 plus longs que le tube; étamines 5-6, adnées à la bouche du tube de la corolle; anthères sessiles, étroites; disque en forme de coupe; ovaire de 1-2 loges, ovules nombreux dans chaque loge. Fruit, une baie épaisse, pulpeuse, subglobulaire. Graines nombreuses, angulées.

G. americana L. «Gêne-pas» ou «Génipayer.»

Bertiera Aubl.

Calice en forme de coupe avec 5 (4) dents; corolle infundibuliforme ou tubulaire ou campanulée, poilue à la gorge; étamines en forme de flèche, pointues, fixées à la gorge, incluses; ovaire biloculaire, style muni de 2 nœuds. Fruit le plus souvent avec 10 rides. Arbrisseaux avec des feuilles légèrement coriacées, pointues et des stipules subulées. Fleurs paniculées terminales, décussées, en rouleaux.

B. guianensis Aubl.

Hamelia Jacq.

Arbrisseaux ou arbustes. Feuilles opposées ou verticillées, membraneuses, pétioolées; stipules interpétioles. Fleurs jaunes ou rouges, disposées principalement en cymes terminales scorpioides; hypanthium turbiné ou obovoïde. Calice de 5 lobes ou 5 dents; corolle tubulaire ou infundibuliforme, le tube avec 5 côtes, glabre dans la gorge, lobes 5 courts, imbriqués; étamines 5, adnées à la base du tube de la corolle; ovaire pentaloculaire, stigmates fusiformes. Fruit, une petite baie pentaloculaire, pentalobée. Graines nombreuses, très petites, angulées.

H. patens Jacq. «Corail» (Haïti), «Buzunuco» (St-Domingue). d'après Urban. Ornemental.

H. intermedia Urb. et Ekm.

H. lutea Rohr. «Buzunuco» (St-Domingue), d'après Urban.

H. cuprea Griseb. Var. **haïtiensis** Urb.

Catesbaea L.

Arbrisseaux ou arbustes glabres spinescents. Feuilles opposées; stipules interpétioles, petites, décidues. Fleurs solitaires dans les axes; pédicelles courts; hypanthium oblong ou campanulé, cylindrique ou quadrangulé. Sépales 4, très étroits, persistants; corolle blanche, campanulée ou infundibuliforme, glabre dans la gorge; lobes 4, courts, valvés; étamines 4, adnées à la base de la corolle; anthères étroites parfois appendiculées; disque annulaire; ovaire biloculaire, stigmate bilobé, ovules nombreux. Fruit, une baie coriacée-charnue, biloculaire. Graines aplaties et angulées.

C. glabra Urb.

C. sphaerocarpa Urb.

C. parvifolia P. DC.

C. fuertesii Urb.

C. microcarpa Urb.

C. ekmaniana Urb.

Guettarda L.

Arbustes ou arbres. Feuilles opposées ou rarement verticillées, plates; stipules caduques. Fleurs petites, parfaites ou polygamo-dioïques, généralement en cymes axillaires, parfois solitaires, généralement unilatérales. Calice tronqué ou denté, sépales 2-4 et irréguliers ou 4-9 réguliers; corolle infundibuliforme ou en forme de soucoupe, tube allongé avec gorge glabre, lobes 4-9 obtus et imbriqués; étamines 4-9, filets entièrement ou partiellement unis au tube de la corolle, anthères presque sessiles; ovaire de 4-9 loges, ovule solitaire dans chaque loge. Fruit drupacé, globulaire ou légèrement allongé. Noyau dur, de 4-9 loges, les loges monospermes.

G. scabra (L.) Lam.

G. preneloupuii Urb. «Goavier marron.»

G. ovalifolia Urb.

G. mollis P. DC.

G. membranacea Sw.

G. multinervis Urb. «Calle noire.»

G. lindeniana A. Rich.

G. baltenweckii Urb.

G. aculeolata Urb.

G. elliptica Sw.

G. apiculata Urb. et Ekm.

G. fuertesii Urb.

G. angustata Urb. et Ekm.

G. stenophylla Urb.

G. crenulata Urb. et Ekm.

G. saxicola Urb.

G. erosa Urb. et Ekm.

G. pungens Urb.

G. lacornea Urb. et Ekm.

G. rotundifolia Urb.

G. tortuensis Urb. et Ekm.

G. argentea Lam. Var. **glabrata** Urb.

G. polytheca Urb. et Ekm.

G. punctata Urb. et Ekm.

G. dictyophylla Urb.

G. barahonensis Urb.

G. spinifera Urb.

G. xanthocarpa Britton.

G. tenuiramis Urb.

G. cahosiana Urb. et Ekm.

G. nannocarpa Urb. et Ekm.

G. psiloclada Urb.

G. oxyphylla Urb.

G. insularum Urb. et Ekm.

G. turpinii Urb.

Ottoschmidtia Urb.

Arbustes non visqueux. Feuilles décussées, opposées, petites, presque sessiles, rigides, coriacées, recourbées, réunies sur des tiges très courtes; stipules interpétioles, petites, triangulaires, épaisses, persistantes, indurées et souvent spinescentes. Fleurs 1-2, sur des rameaux très courts, solitaires dans les axes, presque sessiles, violacées; bractées courtes, entières ou plus ou moins dentées, développées seulement d'un côté, connées en cupule au-dessus de l'ovaire; fleurs régulières, hermaphrodites, quadrimères. Tube du calice cylindro-globulaire en dessous et développé au-dessus de l'ovaire, limbe légèrement tubulaire, persistant, quadridenté, triangulaire, obtus; tube de la corolle étroit, cylindrique, gorge nue, lobes 4 courts imbriqués dans le bourgeon. Étamines 4, incluses, fixées au-dessus du milieu du tube; filets très courts; anthères linéaires, dorsifixes. Disque très court, cylindrique, entourant la base du style. Ovaire infère, biloculaire; ovule solitaire dans chaque loge, pendant au sommet; style filiforme avec 2 lobes très courts au sommet. Drupe petite, obovée ou cylindrique, ronde, à chair mince, putamen ligneux, criblée de petits trous plurisériés, chargés de résine. Graines pendantes au sommet des loges avec

funicule très épais, oblongues; testa membraneux, endosperme légèrement charnu; embryon dressé; radicule allongée, cylindrique au-dessus; cotylédons ovés, obtus, presque plats, 3 fois $\frac{1}{2}$ plus courts que la radicule.

O. haïtiens Urb.

Antirrhoea Comm.

Arbustes ou arbres. Feuilles coriacées, souvent brillantes; stipules interpétiolaires. Fleurs petites, disposées en une cyme unisexuée, 1-2 fois fourchue, parfaites ou polygamo-dioïques. Calice persistant, petit, denté ou lobé; corolle infundibuliforme, tube allongé, lobes imbriqués; étamines adnées à la gorge de la corolle; ovaire de 2-8 loges, styles de 2-3 lobes. Fruit drupacé, petit, oblong, de 2-8 lobes.

A. involucrata Urb. et Ekm.

A. lucida (Sw.) Hook. «Avocat marron» (Haïti), «Palo de cuello» (St-Domingue).

A. pitoniana Urb. et Ekm.

A. oligantha Urb.

A. heteroneura Urb. et Ekm.

A. albobrunea Urb. et Ekm.

A. cahosiana Urb. et Ekm.

Laugeria Vahl.

Arbustes ou arbrisseaux glabres. Feuilles coriacées; stipules engainantes. Fleurs en cymes latérales. Calice tubulaire; corolle avec lobes imbriqués, claviforme—infundibuliforme; étamines adnées au milieu du tube de la corolle; filets allongés; ovaire de 4-5 loges, stigmaté capité de 4-5 lobes. Fruit drupacé, oblong.

L. hotteana Urb.

L. lineolata Urb.

L. densiflora (Griseb.) Hitchc.

Machaonia Humb. et Bompl.

Arbustes ou arbres, parfois épineux, avec des feuilles coriacées; stipules interpétiolaires. Fleurs petites, en panicules décussées, parfois corymbeuses; fleurs parfaites, régulières, hétérostyles. Calice persistant de 4-5 lobes imbriqués; corolle courte, infundibuliforme, avec lobes imbriqués, gorge de la corolle poilue; étamines adnées à la gorge de la corolle; ovaire biloculaire, stigmaté bilobé. Fruit sec, se séparant en 2 coques.

M. haïtiens Urb. et Ekm.

Erithalis L.

Arbrisseaux avec feuillage glabre; feuilles opposées, coriacées; stipules glabres, interpétiolaires. Fleurs parfaites, disposées en cymes terminales corymbeuses ou très rarement solitaires; hypanthium obovoïde ou subglobulaire. Sépales 5-10 ou obsoletes; corolle infundibuliforme ou rotacée, tube glabre dans la gorge, lobes 5-10 étroits, souvent carénés à l'intérieur; étamines 5-10, adnées à la base de la corolle; filets filiformes, généralement pubescents; ovaire de 5-10 loges; styles unis, épais; ovule solitaire dans chaque loge, pendant. Baie subglobulaire, se séparant en 5-10 akènes cartilagineux ou osseux. Graines aplaties.

E. fruticosa L.

E. parviflora Griseb.

Chiococca L.

Arbustes ou arbrisseaux, souvent grimpants ou sarmenteux. Feuilles oppo-

sées, coriacées, plates, brillantes; stipules persistantes. Fleurs petites, généralement blanches, disposées en racemes axillaires, simples ou paniculées; racemes généralement unilatéraux; hypanthium obové ou turbiné. Sépales 5, persistants; corolle infundibuliforme, gorge glabre, lobes 5 divergents ou réfléchis, valvés; étamines 5, essentiellement libres du tube de la corolle; ovaire biloculaire ou rarement triloculaire; styles unis, filiformes; stigmaté cylindrique, parfois clavé; ovule solitaire dans chaque loge, pendant. Fruit petit, drupacé, comprimé, orbiculaire, composé de 2 carpelles monospermes.

C. alba (L.) Hitchcock. «Croc souris» (Haïti), «Bejuco timacle» (St-Domingue).

C. alba (L.) Hitchcock. Var. *parvifolia* (Wulfschlag) Urb.

Chione P. DC.

Arbustes ou arbres. Feuilles glabres, coriacées; stipules présentes. Fleurs grandes, en panicules terminales corymbeuses. Calice en forme de coupe, plus ou moins pentalobé; corolle infundibuliforme, ou presque campanulée, lobes larges, imbriqués, gorge glabre; étamines adnées presque à la base du tube, libres; ovaire biloculaire, styles épais. Fruit drupacé, avec noyau biloculaire.

C. venosa (Sw.) Urb.

C. seminervis Urb. et Ekm.

C. exserta (P. DC.) Urb. «Lirio» ou «Palo amarillo» (St-Domingue), d'après Urban.

Scolosanthus Vahl.

Arbustes inermes op épineux. Feuilles coriacées, polies à la partie supérieure; stipules petites entre les pétioles. Fleurs petites et grêles, axillaires, solitaires ou en cymes et alors généralement agrégées. Segments du calice 5, subulés ou ovoïdes, persistants; corolle infundibuliforme, dressée ou rarement légèrement recourbée, avec gorge glabre et segments courts, imbriqués; étamines 4, incluses, fixées à la base du tube et là soudées ensemble; filets poilus; ovaire biloculaire, style avec extrémité claviforme plus ou moins profondément bipartite. Fruit drupacé, comprimé ou ovoïde, 1-2 noyaux.

S. acanthoides (Spreng.) Urb.

S. triacanthus (Spreng) P. DC.

S. densiflorus Urb.

S. selleanus Urb. et Ekm.

Coffea L.

Arbustes ou arbrisseaux glabres. Feuilles généralement opposées; pétiole court. Fleurs blanches ou crème, agrégées dans l'axe des feuilles. Lobes du calice de 5, rarement 4 dents; corolle en forme de soucoupe, la gorge parfois villeuse, lobes 5 aigus; étamines insérées dans ou au-dessous de la gorge de la corolle. Fruit, une baie ovale ou subglobulaire, rouge. Graines 2, osseuses, semi-ellipsoïdes.

C. arabica L. «Café.»

Ixora L.

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles opposées ou verticillées. Fleurs voyantes, disposées en corymbes terminaux ou axillaires, généralement compacts, blanches, roses ou écarlates; pédicelle muni de bractées; corolle avec un tube très long et grêle, la gorge parfois poilue, lobes 4-5 larges, divergents; étamines 4-5 insérées sur la gorge, filets courts ou absents; styles filiformes, exerts, bifurqués; ovaire sur un disque charnu, biloculaire; ovule solitaire. Fruit, une

baie dure ou charnue, avec 2 pyrènes.

- I. *coccinea* L. «Ixora» Ornamental.
- I. *ferrea* (Jacq.) Benth. Ornamental.
- I. *jucunda* Bot. «Ixora» Ornamental.
- I. *odorata* Hook f. Ornamental.

Strumpfia Jacq.

Arbrisseaux; tiges très ramifiées; feuillage pubescent. Feuilles en verticilles de 3, nombreuses, étroites, coriaces. Fleurs parfaites, très petites, en racemes axillaires; hypanthium obovoïde, garni de côtes. Sépales persistants, 5; corolle blanche, tube très court, lobes 5, longs et étroits, imbriqués; étamines 5, adnées à la base du tube de la corolle; filets légèrement monadelphes; anthères biloculaires; styles unis, pubescents; ovule solitaire dans chaque loge, anatrope. Fruit, une drupe avec 1 ou 2 noyaux. Graines dressées, oblongues.

S. maritima Jacq.

Psychotria L.

Arbres, arbustes ou arbrisseaux, ou rarement herbes ou sarments. Feuilles opposées, rarement verticillées; stipules parfois engainantes. Fleurs parfaites, rarement polygamo-dioïques, disposées en cymes terminales ou axillaires, panicules ou corymbes; hypanthium court. Sépales 5, rarement 4-6, généralement décidus; corolle infundibuliforme, tube court ou allongé, lobes 4-5-6, valvés; étamines aussi nombreuses que les lobes de la corolle, adnées au sommet de la gorge ou de la bouche du tube de la corolle; anthères attachées à la base; ovaire biloculaire; ovule solitaire dans chaque loge. Fruit, une petite baie ou drupe, généralement garnie de côtes, contenant 2 noyaux monospermes. Presque toutes ces espèces s'appellent vulgairement «Bois cabrit».

- P. tetrapyrena* Urb.
- P. uliginosa* Sw.
- P. pinularis* Sessé et Moc.
- P. nutans* Sw. «Bois laitelle»
- P. haïtiensis* Urb.
- P. christii* Urb.
- P. heterochroa* Urb.
- P. undata* Jacq.
- P. undata* Jacq. Var. *poitaei* Urb.
- P. ligustrifolia* (Northrop) Millsp.
- P. cyclophylla* Urb.
- P. revoluta* P. DC.
- P. surianii* Urb.
- P. pernitida* Urb.
- P. viridialba* Urb.
- P. mornicola* Urb.
- P. fuertesii* Urb.
- P. baltenweckii* Urb.
- P. buchii* Urb.
- P. barahonensis* Urb.
- P. plumierii* Urb. «Café marron» d'après Urban.
- P. grandis* Sw.
- P. horizontalis* Sw.
- P. tenuifolia* Sw.
- P. microdon* (DC.) Urb. [*P. pinularis* Sessé et Moc.]

- P. sulzneri* Small.
- P. brachiata* Sw.
- P. pubescens* Sw.
- P. berteriana* P. DC.
- P. agnata* P. DC.
- P. coelocalyx* Urb.
- P. lasiophthalma* Griseb.
- P. granulata* Urb. et Ekm.
- P. pendula* (Jacq.) Urb.
- P. dolichocalyx* Urb. et Ekm.
- P. browni* Spreng.
- P. alpestris* Urb. et Ekm.
- P. marmeladensis* Urb.
- P. holoxantha* Urb. et Ekm.

Palicourea Aubl.

Arbrisseaux ou arbustes. Fleurs petites, en panicules terminales, généralement thyrsiformes, parfois corymbueuses. Calice entier ou campanulé; tube de la corolle allongé, dressé ou courbé, souvent gibbeux, pentalobé; lobes valvés. Fruit, une baie contenant généralement 2 akènes monospermes.

- P. domingensis* (Jacq.) P. DC.
- P. alpina* (Sw.) P. DC. «Tafetan» (St-Domingue).
- P. alpina* (Sw.) P. DC. Var. *eriantha* (P. DC.) Griseb.
- P. crocea* (Sw.) R. et Sch.
- P. barbinervia* P. DC.
- P. torbeciana* Urb. et Ekm.
- P. brachystigma* Urb.
- P. micrantha* Urb. et Ekm.
- P. patens* (Sw.) Urb.

Geophila Don.

Herbes petites, avec feuilles cordiformes ou reniformes; pétioles longs; stipules interpétiolaires, généralement ovoides. Fleurs disposées en cymes corymbueuses, sessiles; fleurs parfaites. Calice persistant, court, de 5-7 lobes; corolle tubulaire—infundibuliforme, avec gorge poilue; étamines 4-7 soudées au tube de la corolle; ovaire biloculaire, styles bilobés. Fruit juteux.

G. herbacea (Jacq.) K. Schum.

Uragoga L.

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux, rarement herbes, avec des feuilles obovées-oblongues. Fleurs disposées en capitules, sous-tendues par de larges bractées. Calice persistant, 4-7 dents; corolle en forme de soucoupe ou infundibuliforme; étamines 4-5, adnées à la gorge de la corolle. Ovaire biloculaire, rarement 3-4 loges. Fruit drupacé.

- U. domingensis* Urb.
- U. domingensis* Urb. Var. *barahonensis* Urb. Var. *fuertesii* Urb.

Lasianthus Jack.

Arbrisseaux ou arbustes. Fleurs blanches ou verdâtres, disposées dans l'axe des feuilles; pédoncules courts; fleurs généralement cymeuses, parfaites, généralement unisexuées. Calice persistant de 3-6 dents; corolle infundibuliforme, en forme de soucoupe ou campanulée, poilue à la gorge; étamines 4-6, adnées à la gorge ou au bord; ovaire de 4-12 loges. Fruit avec 4-12 akènes.

L. lanceolatus (Griseb) G. Maza, «Palo de Peo» (St-Domingue).

Margaritopsis Sauv.

Lobes du calice 4-5, inégaux, persistants, ciliés au bord; corolle tubulaire,—campanulée, avec gorge glabre; étamines assujetties au tube par un anneau de poils, fixées à la base et incluses; ovaire biloculaire, style bilobé. Fruit, une drupe juteuse avec 2 noyaux.

M. triflora Urb. Morne la Selle.

M. lanceifolia Urb.

Peratanthe Urb.

Herbes avec des racines aux nœuds, glabres; tiges filiformes, allongées. Stipules entières, interpétiolaires, libres, solitaires ou par paires; feuilles opposées, pétiolées, entières, légèrement penninerves, membraneuses, pipéracées. Fleurs hermaphrodites, terminales, solitaires, sessiles, enveloppées à la partie supérieure par 1 ou 2 paires de feuilles. Tube du calice ové ou ovale, avec 2 petits lobes dentiformes, persistants; corolle membraneuse, glabre à l'intérieur, tube légèrement turbiné, quadrilobé, valvé dans le bourgeon; étamines étendues, 4, légèrement adnées à la base du tube de la corolle; filets linéaires, plus courts que le corolle; anthères fixées à la base de la partie dorsale, arrondies au sommet et dépassant le tube de la corolle; disque nul; ovaire biloculaire; style filiforme, bifide sur le quart de sa longueur; ovule solitaire dans chaque loge, fixé par la base, anatrophe, dressé, étroitement obové. Fruit charnu, ovale, avec 2 pyrènes, les pyrènes lisses, cartilagineux, ovales — elliptiques, plano-convexes, concaves à la face ventrale. Graines légèrement déformées à la face ventrale par les pyrènes et garnies de côtes longitudinalement; testa lisse et membraneux; albumen abondant et crustacé; embryon dressé; cotylédons ovés, plus courts que la radicule.

P. ekmanii Urb.

Faramea Aubl.

Arbustes ou arbres glabres. Feuilles à pétiole court, coriacées, brillantes. Fleurs blanches, odoriférantes, pédicellées, disposées en cymes terminales et axillaires. Calice tronqué, très rarement à 4 dents; corolle en forme de soucoupe, gorge nue, lobes étroits; ovaire uniloculaire, styles filiformes, bilobés. Fruit drupacé, uniloculaire, monosperme.

F. occidentalis (L.) A. Rich.

Morinda L.

Arbustes ou arbres; tiges dressées ou grimpantes. Feuilles opposées ou rarement verticillées, membraneuses. Fleurs généralement parfaites, agrégées; pédoncules axillaires ou terminaux. Calice persistant, tronqué ou légèrement denté; corolle blanche ou rouge, infundibuliforme ou en forme de soucoupe, lobes 5, rarement 4-5, valvés, coriacés; étamines adnées à la gorge de la corolle; ovaire biloculaire ou imparfaitement quadriloculaire, styles unis par fois pubescents; ovule solitaire dans chaque loge. Fruit syncarpé.

M. buchii Urb.

M. royoc L. «Safran.»

M. citrifolia L. «Fromagier», «Douleur» (Haïti), «Pina de puerco» (St-Domingue), d'après Urban.

Ernodea Sw.

Plantes vivaces, avec tiges décombantes. Feuillage glabre; feuilles opposées, coriacées, étroites, entières; stipules frangées, persistantes. Fleurs parfaites solitaires et sessiles dans les axes. Sépales 4-6, persistants; corolle jaunâtre, infundibuliforme, nue dans la gorge, lobes 4-6 étroits, valvés; étamines adnées

au tube de la corolle; disque charnu; ovaire biloculaire, ovule solitaire dans chaque loge, stigmate capité ou légèrement bilobé. Drupe quelque peu charnue, avec 2 crénelures.

E. litoralis Sw.

E. uninervis Urb.

Diodia Gronov.

Herbes annuelles ou vivaces. Feuilles opposées, entières, sessiles, généralement striées longitudinalement; stipules engainantes. Fleurs parfaites, axillaires; hypanthium obovoïde ou obconique. Sépales 2-4, parfois accompagnés de dents plus petites; corolle blanche ou lilas, infundibuliforme ou en forme de soucoupe, lobes 4 courts, valvés; étamines adnées à la gorge du tube de la corolle; ovaire biloculaire, ovule solitaire dans chaque loge, styles unis, stigmate bilobé. Fruit oblong ou globulaire. Graines allongées, libres.

D. rigida Cham et Schlecht.

D. rigida Cham et Schlecht. Var. *buchii* Urb.

D. domingensis P. DC.

D. scandens Sw.

D. sarmentosa Sw.

D. maritima Thonn.

D. perforata Urb.

Tortuella Urb.

Sous-arbrisseaux. Feuilles opposées, sessiles, rigides, coriacées; stipules présentes. Fleurs solitaires ou peu nombreuses dans l'axe des feuilles, hermaphrodites. Calice quadridenté; tube de la corolle cylindrique, quadrilobé, valvé; étamines subsessiles insérées à la gorge du tube de la corolle; disque convexe; ovaire de 2-3 loges; styles filiformes, glabres; ovule solitaire dans chaque loge. Fruit charnu, se séparant en coques.

T. abietifolia Urb. et Ekm.

Hemidiodia K. Schum.

Herbes vivaces. Feuilles lancéolées ou oblongues; stipules engainantes. Fleurs petites, capitées, blanchâtres. Sépales 4, unis à la base; corolle infundibuliforme; étamines 4-5, adnées au bord du tube; ovaire biloculaire. Capsule déhiscente à la base.

H. ocimifolia (Willd.) K. Schum.

Borreria G. F. W. Mey.

Herbes ou plantes ligneuses. Feuilles opposées, plates, entières; stipules engainantes. Fleurs parfaites, solitaires dans les axes, ou en cymes agrégées, axillaires ou terminales; hypanthium obovoïde ou turbiné. Sépales 2-4, rarement 5, persistants, parfois accompagnés de petites dents; corolle blanche, rose ou bleue, infundibuliforme ou en forme de soucoupe, lobes 4 valvés, divergents; étamines adnées au tube de la corolle, parfois au haut de la gorge; ovaire biloculaire, ovule solitaire dans chaque loge. Fruit coriacé ou crustacé, les 2 carpelles s'ouvrant le long des faces internes.

B. rosea Urb.

B. brachysepala Urb.

B. ocimoides (Burm. f.) P. DC.

B. verticillata (L.) G. F. W. Mey.

B. densiflora P. DC.

B. litoralis Urb.

B. laevis (Lam.) Griseb, «Couper colonne.»

B. laevis (Lam.) Griseb, Var. *sintenisii* Urb.

Spermacoce L.

Herbes ou arbrisseaux très bas; tiges généralement quadrangulées. Fleurs opposées; stipules engainantes. Fleurs parfaites, solitaires dans les axes, ou disposées de différentes façons; hypanthium obovoïde, turbiné. Sépales 2-4-5, généralement persistants, parfois accompagnés de petites dents; corolle blanche, rose ou bleue, infundibuliforme ou en forme de soucoupe, lobes généralement 4, valvés, divergents; étamines adnées à la gorge du tube de la corolle ou plus bas; ovaire biloculaire, styles filiformes, ovule solitaire dans chaque loge. Fruit coriacé ou crustacé, de 2 carpelles, l'un s'ouvrant par la face ventrale, l'autre reste fermé.

S. tenuior L.

S. glabra Michx.

Micrasepalum Urb.

Sous-arbrisseaux légèrement poilus. Feuilles opposées, petites, sessiles, coriacées, rigides, oblongues—lancéolées ou oblongues-linéaires, mucronées ou aiguës, à 1 nervure obsolète; stipules persistantes, solitaires entre les pétioles. Fleurs hermaphrodites, blanches, solitaires, terminales au sommet des rameaux, sessiles. Tube du calice légèrement obové—obconique, sans bord; tube de la corolle légèrement cylindrique, nu à la gorge, glabre à l'intérieur, lobes 4, valvés à la préfloraison, de même longueur que le tube, oblongs-linéaires, recourbés à l'anthèse. Étamines 4, légèrement insérées dans les sinus de la corolle, plus courtes que les lobes de la corolle; filets filiformes, courts; anthères ovées-exertes, fixées à la partie dorsale, au-dessous du milieu; disque charnu, muni de nombreux petits poils. Ovaire biloculaire; style filiforme, glabre, légèrement bifide à l'extrémité, les branches obtuses; ovule solitaire, dans chaque loge, fixé au-dessous du milieu de la cloison.

M. haïtienne Urb. et Ekm.

Mitracarpus Zucc.

Herbes annuelles ou vivaces, généralement poilues ou rarement arbrisseaux. Feuilles lancéolées. Fleurs petites, blanches, disposées en capitules axillaires ou terminaux; bractées présentes. Sépales 4; corolle infundibuliforme; étamines 4-5, adnées au bord du tube de la corolle; ovaire biloculaire. Fruit, capsulaire, ligneux ou coriacé, à déhiscence circomscissile.

M. christii Urb.

M. brachystigma Urb.

M. haïtiens Urb.

M. haïtiens Urb. Var. *glabrata* Urb.

M. sagraeanus P. DC.

M. hirtus (L.) P. DC.

M. decumbens Urb.

Sherardia Dill.

Herbes avec feuilles verticillées. Calice persistant, généralement de 6 lobes; corolle infundibuliforme, quadrilobée, gorge glabre; étamines 4, attachées au tube de la corolle; ovaire biloculaire, styles bilobés, stigmaté capité. Fruit bilobé, sec, coriacé.

S. arvensis L.

Galium L.

Herbes ou rarement arbrisseaux, avec tiges quadrangulées. Feuilles apparemment verticillées; stipules généralement aussi grandes que les feuilles. Fleurs petites, généralement en cymes axillaires ou terminales. Sépales géné-

ralement obsolètes; corolle rotacée, blanche, verdâtre ou pourpre, lobes 3-4 valvés; ovaire biloculaire, avec un ovule solitaire dans chaque loge; styles 2, stigmaté capité. Fruit didyme, sec ou charnu, biloculaire, indéhiscence.

G. aparine L.

G. brevipes Urb.

G. pilosum Ait.

G. pilosum Ait. Var. *puncticulosum* (Michx.) Torr. et Gray.

G. trifidum L.

Relbunium Endl.

Herbes vivaces. Feuilles verticillées, lancéolées ou elliptiques; verticilles 4. Fleurs axillaires, solitaires ou 2-3 agrégées; involucre de 2-4 bractées. Calice absent; corolle rotacée, quadrilobée; ovaire biloculaire, styles profondément bilobés, stigmaté globulaire. Fruit charnu ou coriacé. Graines soudées à la membrane du fruit.

R. hypocarpium (L.) Hemsl.

Famille 170. CAPRIFOLIACEÆ

Arbrisseaux ou arbustes, très rarement herbes. Feuilles opposées, simples ou pinnées, généralement sans stipules. Fleurs bisexuées, régulières ou irrégulières. Calice de 4-5 dents, ou 4-5 segments, tube adné à l'ovaire; corolle gamopétale de 4-5 lobes, tubulaire ou rotacée; étamines aussi nombreuses que les lobes de la corolle et alternes avec eux, épipétales; ovaires infère, de 1-5 loges, chaque avec 1—beaucoup d'ovules; style 1 ou obsolète, stigmates 1-5. Fruit, une drupe, une baie ou une capsule.

x. Feuilles pinnées *Sambucus*, p. 369

x. Feuilles simples *Lonicera*, p. 369

Sambucus L.

Arbrisseaux, arbustes ou arbres. Feuilles pinnées ou bipinnées; folioles serrées, avec ou sans stipules et stipelles. Fleurs petites, généralement bisexuées et pentamères, encymes terminales composées ou panicules. Lobes du calice très petits; corolle rotacée ou presque rotacée; filets courts; ovaire de 3-5 loges; styles courts de 3-5 lobes. Fruit, une petite drupe, avec 3-5 akènes cartilagineux.

S. canadensis L. «Fleur sureau.» Ornemental et médicinal.

S. canadensis L. Var. *laciniata* A. Gray.

Lonicera L.

Arbrisseaux dressés ou grimpants. Feuilles opposées, entières ou rarement sinuées; pétiole généralement court, parfois avec des stipules distinctes. Fleurs plus ou moins irrégulières, disposées en épis—capitules. Calice pentadenté; corolle tubulaire, infundibuliforme ou campanulée, pentalobée ou bilabée; ovaire généralement de 2-3, rarement 5 loges. Fruit, une baie de peu—beaucoup de graines.

L. japonica Thunbg. «Chèvre-feuille.» Ornemental.

L. caprifolium L. Ornemental.

Famille 171. VALERIANACEÆ

Herbes, parfois arbrisseaux. Feuilles opposées, sans stipules. Fleurs petites, bisexuées ou polygamo-dioïques, agrégées, cymeuses ou capitées. Calice de 3-5 sépales, parfois papyracés ou obsolètes; corolle gamopétale, tubulaire, infundibuliforme ou parfois en forme de soucoupe, le tube parfois développé en forme de sac près de la base, lobes 3-5, imbriqués. Étamines 1-4, adnées au

tube de la corolle, moins nombreuses que les lobes. Ovaire infère, triloculaire, mais une seule cavité parfaite, les 2 autres abortives; styles terminaux, unis; stigmates parfois unis; ovule pendant, solitaire, dans la cavité parfaite de l'ovaire, anatrophe. Fruit, une espèce d'akène, coriacé ou crustacé, nu ou couronné avec le calice.

Valeriana L.

Caractères de la famille.

V. domingensis Urb.

V. scandens Loeff.

V. candolleana Gardn.

Ordre XLIII. CUCURBITALES

Herbes caulescentes, annuelles ou vivaces, d'une grande valeur économique, généralement rampantes ou grimpantes. Feuilles alternes, palminerves ou lobées, souvent pubescentes, avec des poils grossiers. Inflorescence axillaire, agrégée, paniculée ou racémeuse, 1 seule fleur dans un axe; fleurs monoïques ou dioïques. Calice de 4-5, rarement 6 sépales plus ou moins unis, adhérent à l'ovaire, lobes imbriqués; corolle d'autant de pétales que de sépales, plus ou moins unis et adhérent au calice, les lobes entiers ou frangés. Étamines 3, 2 avec anthères biloculaires, 1 avec anthère uniloculaire ou rarement 1-2-4-5 étamines; anthères extrorses plus ou moins contordues. Ovaire rarement uniloculaire, avec 1 ovule pendant, généralement triloculaire avec de nombreux ovules horizontaux en plusieurs séries; styles terminaux unis; stigmates épais, dilatés ou frangés. Fruit, une baie charnue ou sèche, appelée *peponide*.

Famille 172. CUCURBITACEÆ

Caractères de l'ordre.

x. Filets libres ou soudés seulement à la base:

2x. Filets 5, rarement 4..... *Fevillea*, p. 371

2x. Filets 3, rarement 2 ou plus de 3:

3x. Loges des grains de pollen dressées ou légèrement recourbées:

4x. Disque présent à la base du style..... *Melothria*, p. 371

4x. Disque absent à la base du style..... *Anguria*, p. 371

3x. Loges des grains de pollen spiralées en forme d'S ou d'U:

4x. Ovules horizontaux, souvent nombreux:

5x. Corona rotacée:

6x. Tube du calice des fleurs staminées court; anthères libres ou légèrement unies:

7x. Anthères libres; étamines fixées à la gorge du calice..... *Momordica*, p. 371

7x. Anthères libres; étamines fixées dans le tube du calice:

8x. Fruit sec. Fleurs staminées en grappes..... *Luffa*, p. 372

8x. Fruit charnu. Fleurs staminées solitaires ou parfois plus d'une fleur dans l'axe.....

9x. Vrilles ramifiées (fendues en 2-3)..... *Citrullus*, p. 372

9x. Vrilles simples..... *Cucumis*, p. 372

6x. Tube du calice des fleurs staminées long; anthères le plus souvent toutes unies en capitules. *Lagenaria*, p. 372

5x. Corona campanulée..... *Cucurbita*, p. 372

4x. Ovules dressés, 1-4 dans chaque loge... *Cayaponia*, p. 373

x. filets unis en une colonne:

2x. Ovules pendants:

3x. Fruit charnu. Anthères libres..... *Sechium*, p. 373

3x. Fruit coriacé ou presque ligneux..... *Sicyos*, p. 373

2x. Ovules horizontaux..... *Enicopeia*, p. 373

Fevillea L.

Arbrisseaux volubiles. Feuilles pétiolées, cordiformes, plus ou moins lobées; vrilles bides. Fleurs petites, blanches, vertes, pourpres ou rouge pâle, dioïques. Tube du calice court, campanulé ou en forme de coupe; pétales 5; staminodes soudés aux sépales; niets minimes, sphériques; pistillodium absent. Fleurs femelles: staminodes présents ou absents, 20 glandes à la base de la corolle; ovaire incomplètement triloculaire; styles 3, stigmate reniforme; ovules 6 dans chaque loge ou moins, disposés en 2 rangées. Fruit grand; graines cordiformes. *F. coruitoria* L. «Cacorne poison» ou «Cacorne zombi» (Haïti), «Hayamo» (St-Domingue).

F. cordifolia L. Var. *hederacea* (Poir.) Cogn.

Melothria L.

Herbes; tiges grêles, rampantes ou grimpantes. Feuilles entières, lobées ou palmées; pétiole garni axillairement de vrilles. Fleurs monoïques ou rarement dioïques, les fleurs mâles généralement disposées en racemes ou corymbes. Sépales 5; corolle blanche ou jaune, avec 5 lobes; étamines 3 ou rarement 5; anthères plus ou moins connées. Fleurs pistillées solitaires, souvent avec pédoncules grêles; calice étroit au-dessous, divergent au-dessus; ovaire globulaire ou allongé, uniloculaire, inséré dans un disque; ovules nombreux, horizontaux. Baie petite, pendante, avec plusieurs graines.

M. guadalupensis (Spreng) Cogn.

M. domingensis Cogn. «Mirliton marron» d'après Urban.

Anguria L.

Herbes vivaces, grimpantes, presque glabres, avec feuilles simples, lobées; vrilles simples. Fleurs grandes, sans bractées, dioïques, rarement monoïques; corolle rotacée. Fleurs mâles disposées en épis ou racemes; pistillodium absent. Fleurs femelles solitaires ou parfois 2-3; staminodes 2; ovaire oblong, avec 2 placentas; styles filiformes; stigmates 2, bilobés; ovules nombreux. Fruit oblong ou ovoïde, quadrangulé ou bifurqué, avec de nombreuses graines.

A. trifoliata L.

A. pedata (L.) Jacq.

A. pedata (L.) Jacq. Var. *dentata* (Schlechtend) Cogn. Var. *affinis* (Schlechtend) Cogn.

A. trilobata (L.) Jacq.

Momordica L.

Herbes annuelles ou vivaces, avec tiges grimpantes et vrilles simples. Feuilles entières, lobées ou composées-pédalées. Fleurs monoïques ou dioïques, les fleurs mâles solitaires ou paniculées; hypanthium court, campanulé; sépales 5; corolle rotacée, pentalobée, blanche ou jaune; étamines 3 ou très rarement 2; filets courts, distincts. Fleurs femelles solitaires; calice et corolle pareils à ceux des fleurs mâles; staminodes absents ou en forme de glandes; ovaire

uniloculaire, avec 3 placentas; styles grêles; stigmates 3; ovules nombreux, horizontaux. Fruit, une baie allongée, rarement trivalvée.

M. charantia L.

M. charantia L. Var. *abbreviata* Ser. «Sorrosie», «Assorossie», «Yesquin.» Médicinal.

Luffa Adans.

Herbes annuelles, avec feuilles de 5-7 lobes. Feuilles glabres ou presque glabres; vrilles ramifiées. Fleurs jaunes ou blanchâtres, voyantes, monoïques; fleurs mâles racemeuses, fleurs femelles solitaires. Corolle de 5 pétales; anthères libres; ovaire avec 3 placentas; stigmates 3, bilobés; ovules nombreux. Fruit long et cylindrique, ou court et clavé, la pelure devenant sèche et papyracée, l'intérieur fibreux.

L. cylindrica (L.) M. J. Roem, «Torchon.» Industriel.

L. acutangula Roxb. «Torchon.» Industriel.

Citrullus Schrad.

Herbes annuelles ou vivaces; tiges rampantes; vrilles de 2-3 branches. Feuilles de 3-5 lobes, ceux-ci dentés ou relobés. Fleurs monoïques, solitaires. Fleurs mâles avec 5 sépales, 1 grande corolle jaune, pentalobée; étamines 3, avec des filets très courts; anthères cohérentes, connectif non développé au-delà des sacs. Fleurs femelles avec des étamines rudimentaires et 1 ovaire plus ou moins allongé; styles courts, stigmate reniforme; ovules nombreux, horizontaux. Baie globulaire ou oblongue, très charnue, avec de nombreuses graines.

C. vulgaris Schrad, «Melon d'eau.» Comestible.

Cucumis L.

Herbes annuelles ou vivaces, rampantes ou grimpantes, avec des vrilles simples; tiges souvent enveloppées d'une pubescence grossière. Feuilles entières ou de 3-7 lobes, à long pétiole. Fleurs monoïques. Fleurs mâles agrégées ou rarement solitaires, hypanthium campanulé ou turbiné; corolle jaune de 5 pétales plus ou moins unis; étamines 3; filets courts, distincts; connectif développé au-delà des sacs de l'anthère. Fleurs femelles solitaires; calice et corolle semblables à ceux des fleurs mâles; staminodes absents; ovaire uniloculaire, avec 3-5 placentas; stigmate obtus; ovules nombreux, horizontaux. Baie pulpeuse, avec une pelure molle, lisse ou échinée.

C. anguria L. «Ti cocombre.» Alimentaire.

C. melo L. «Melon France», «Melon d'Espagne.» Comestible.

C. sativus L. «Cocombre.» Alimentaire.

Cucurbita L.

Plantes grimpantes ou rampantes, recouvertes de poils grossiers; vrilles ramifiées. Feuilles simples, généralement lobées. Fleurs solitaires dans les axes; fleurs mâles grandes, jaunes, avec longs pédoncules. Corolle gamopétale et lobée; anthères unies; ovaire uniloculaire, avec 3-5 placentas; stigmates 3-5 bilobés. Fruit, une grande peponide.

C. moschata Duch. «Giraumont.» Alimentaire.

C. moschata Duch. Var. *condensa* Bailey, «Courge.» Alimentaire.

Lagenaria Ser.

Plantes annuelles, stolonifères, monoïques ou rarement dioïques. Fleurs solitaires, blanches, voyantes, avec 5 pétales; fleurs staminées sur de très longs

pédoncules, souvent dépassant le feuillage. Anthères légèrement cohérentes, mais non connées; ovaire long ou court, avec 3 placentas; ovules nombreux et horizontaux. Fruit de forme et de dimensions variées avec une enveloppe très dure.

L. leucantha Rusby [*L. vulgaris* Ser.] «Calebasse franc.»

Cayaponia Manso.

Sarments vivaces, glabres ou pubescents, grimpants au moyen de vrilles simples ou composées. Feuilles de 3-7 lobes, ou rarement divisées ou les feuilles supérieures parfois entières. Fleurs monoïques ou dioïques, plutôt petites, en grappes, racemes ou panicules, ou parfois solitaires. Fleurs mâles staminées, avec un hypanthium campanulé et un calice pentalobé; corolle blanche ou vert-jaunâtre, campanulée ou rotacée, pentalobée; étamines 3, filets distincts, anthères cohérentes au-dessus. Fleurs femelles avec calice et corolle pareils à ceux des fleurs mâles; staminodes 3; ovaire trilobulaire; stigmates 3, dilatés; ovules 1-4 dans chaque loge, ascendants. Baie plus ou moins charnue, généralement avec 3 graines.

C. racemosa (Sw.) Cogn.

C. americana (Lam.) Cogn.

C. americana (Lam.) Cogn. Var. *subintegrifolia* Cogn. Var. *vulgaris* Cogn. Var. *angustiloba* Cogn.

Penelopeia Urb.

Herbes grêles, grimpantes, glabres. Feuilles petites, plus ou moins manifestement trilobées ou profondément pentalobées. Fleurs dioïques, solitaires, à longs pédoncules, jaune d'or. Calice cupuliforme, subrotacé, avec 5 dents; corolle insérée au fond du calice, pentalobée (rarement 4 lobes), imbriquée; étamines 3, connées; ovaire rudimentaire, avec 3 ailes inégales. Fleurs femelles: calice pareil à celui de la fleur mâle; staminodes triangulaires; ovaire infère, oblong, trilobulaire; stigmates 3; ovules nombreux, horizontaux. Fruit globulaire.

P. suburceolata (Cogn.) Urb.

Sechium Juss.

Sarments glabres ou légèrement poilus; vrilles grandes, ramifiées. Fleurs monoïques, petites; fleurs mâles en petites grappes pédonculées, fleurs femelles avec plus courts pédoncules dans le même axe. Corolle en forme de coupe, ou rotacée, profondément pentalobée; anthères libres, mais les filets aussi bien que les styles connés. Fruit charnu avec une grosse graine.

S. edule (Jacq.) Sw. «Mirilton.» Alimentaire.

Sicyos L.

Sarments avec tiges ramifiées allongées, grimpant au moyen de vrilles composées. Feuilles membraneuses, angulaires-lobées, ou rarement avec 3-5 lobes profonds. Fleurs monoïques. Fleurs mâles en racemes ou corymbes; hypanthium largement campanulé ou presque plat; sépales 5, séparés; corolle blanche ou verdâtre, rotacée, pentalobée; étamines avec leurs filets unis en une courte colonne; anthères 2-5, distantes ou unies. Fleurs femelles généralement agrégées qui s'élèvent du même nœud que le pédoncule mâle; staminodes absents; ovaire uniloculaire, rarement glabre; styles courts, stigmates 3; ovule solitaire, pendant. Fruit plat ou angulé, de forme variée: Graine remplissant la cavité du fruit.

S. laciniatus L.

Ordre XLIV. CAMPANULALES

Herbes, arbustes ou rarement arbres. Feuilles principalement alternes, limbes simples, entières, dentées ou lobées. Fleurs parfaites, monoïques ou dioïques, régulières ou irrégulières, ou agrégées sur un réceptacle et entourées d'un involucre de bractée. Calice de 5 sépales distincts ou légèrement unis ou formé d'une ou de 2 rangées de soies, d'écailles ou représentant une couronne ou obsolète ou entièrement absent; corolle de 5—plusieurs pétales distincts ou plus ou moins unis. Androcée de 3—5 étamines ou rarement d'une seule; anthères distinctes ou unies. Gynécée de 2—5 carpelles unis ou rarement plus. Ovaire infère; styles unis; stigmates 2 — plusieurs. Fruit, une capsule ou une baie ou un akène.

- x. Fruit, une capsule ou une baie:
 2x. Corolle régulière..... 173. Campanulaceæ, p. 374
 2x. Corolle fendue sur un côté et par ailleurs plus ou moins irrégulière:
 3x. Stigmates non indusés; étamines unies soit par les anthères ou les filaments, soit par les 2..... 174. Lobeliaceæ, p. 374
 3x. Stigmates indusés; étamines distinctes ou rarement unies par les anthères..... 175. Goodeniaceæ, p. 375
 x. Fruit, un akène..... 176. Compositæ, p. 376

Famille 173. CAMPANULACEÆ

Herbes, rarement plantes ligneuses, avec sève quelque peu acide. Feuilles quelque peu alternes, sans stipules, entières, simples, dentées, parfois lobées, les caulinaires et les basilaires souvent très dissemblables. Inflorescence terminale ou axillaire en épis ou racemes; fleurs parfaites, régulières. Calice de 5 sépales partiellement unis, persistants; corolle de 5 pétales unis campanulés, tubulaires ou rotacés, généralement pentalobés. Etamines 5, insérées avec la corolle; filets distincts, souvent ciliés; anthères introrsées. Ovaire infère ou presque infère, généralement de 2—5 loges; styles unis; stigmates rarement capités; généralement avec autant de lobes qu'il y a de loges dans l'ovaire, divergents ou recourbés; ovules horizontaux, anatropes, sur des placentas ou dans l'angle central de chaque loge. Fruit, une capsule de 2—8 loges, à déhiscence loculicide ou par pores.

Specularia Heist.

Caractères de la famille.

S. perfoliata (L.) A. DC.

Famille 174. LOBELIACEÆ

Herbes, rarement arbustes ou arbres, généralement avec une sève laiteuse, acide. Feuilles alternes ou basilaires, simples, entières, dentées ou divisées-pinnées. Fleurs solitaires, en épis, racemes ou panicules. Calice avec 5 lobes ou segments, lobes égaux ou inégaux; corolle gamopétale, irrégulière, souvent bilabée, tube souvent ouvert sur un côté, près de ou tout-à-fait à la base, lobes 5. Etamines 5, insérées avec la corolle; filets formant parfois un tube; anthères unies autour du style. Ovaire infère, de 2—5 loges; stigmate frangé. Fruit, une capsule ou une baie. Graines nombreuses.

- x. Tube de la corolle ouvert à la base sur un côté. *Lobelia*, p. 375
 x. Tube de la corolle entièrement fendu ou entièrement fermé:
 2x. Etamines fixées au sommet du tube de la corolle ou au-dessus du milieu..... *Isotoma*, p. 375
 2x. Etamines fixées à la base du tube de la corolle..... *Siphocampylus*, p. 375

Lobelia L.

Herbes, rarement sous-arbrisseaux ou arbustes. Feuilles alternes, les caulinaires parfois réduites à des bractées. Fleurs bleues, rouges, jaunâtres, ou blanches, disposées en racemes, épis ou panicules terminaux. Calice avec tube court ou globulaire et dents courtes; tube de la corolle fendu à la base sur un côté, pentalobé, les 3 lobes sur le bord inférieur, les 2 autres (1 de chaque côté de la fente) dressés ou recourbés; anthères unies en forme de tube autour du style; ovaire biloculaire, pluriovulé. Fruit, une capsule bivalvée.

- L. ekmanii* Urb.
L. domingensis A. DC.
L. cliffortiana L.
L. rotundifolia Juss.
L. christii Urb.
L. assurgens L. «Coq shango.»
L. assurgens L. Var. *portoricensis* (A. DC.) Urb.
L. salicina Lam.

Siphocampylus Pohl.

Sous-arbrisseaux ou herbes. Fleurs rouges, orange, rarement verdâtres, solitaires, latérales ou en grappes terminales, souvent corymbeuses. Feuilles alternes, le plus souvent dentées ou serrées. Ovaire circulaire ou rarement semi-globulaire, le plus souvent conique. Fruit capsulaire bivalvé. Les 2 plus petites anthères poilues au sommet, les plus grandes nues.

- S. igneus* Urb.
S. domingensis A. DC.
S. decumbens (Rich.) Juss.
S. tuerckheimii Urb.
S. laciniatus (Lam.) Urb.

Isotoma Lindl.

Herbes. Feuilles entières ou divisées pennées. Fleurs solitaires, latérales ou en racemes terminaux. Tube de la corolle cylindrique, entier ou courtement fendu, les segments le plus souvent de longueur égale; anthères 2, munies au sommet d'une soie ou de poils, les 3 plus grandes nues. Fruit capsulaire, bivalvé.

I. longiflora (L.) Presl. «Feuilles crabe» (Haïti); «Ginbey» (St-Domingue), d'après Urban.

Famille 175. GOODENIACEÆ

Plantes herbacées ou ligneuses, avec sève aqueuse. Feuilles alternes, ou parfois opposées, sans stipules; limbes entiers ou dentés ou rarement pinnatifides. Fleurs parfaites, régulières ou irrégulières, disposées de différentes manières. Calice pentadenté; corolle pentalobée et plus ou moins profondément fendue sur un côté, de couleur variée, lobes valvés, parfois ailés. Etamines 5, distinctes; anthères généralement libres, à déhiscence longitudinale. Ovaire généralement infère, uni ou biloculaire; styles généralement unis; stigmates environnés d'une indusie; ovules 1—2 ou plus, dans chaque loge, généralement dressés ou ascendants. Fruit drupacé, en forme de baie ou capsulaire. Graines généralement 1 dans chaque loge.

Scaevola L.

Caractères de la famille.

S. plumierii (L.) Vahl.

Famille 176. COMPOSITÆ

Herbes, arbustes ou arbres, avec sève aqueuse ou résineuse ou rarement laiteuse. Feuilles opposées ou alternes, parfois toutes basilaires, simples; stipules absentes. Fleurs agrégées en capitules sur un réceptacle, environnées par un involucre, parfaites, pistillées ou non, parfois monoïques ou dioïques; réceptacle varié; involucre de bractées distinctes ou partiellement unies en 1 ou plusieurs séries. Calice varié ou absent; corolle de 5 pétales, partiellement unis, pentaloquée ou développée en une ligule latérale en cas de fleurs marginales. Les capitules se divisent en 2 groupes distincts: capitules radiés et capitules discoïdes. Étamines 5, partiellement adnées au tube de la corolle; anthères souvent appendiculées au sommet et parfois à la base, généralement soudées en forme d'anneau. Gynécée de 2 carpelles; ovaire infère, uniloculaire; stigmate des fleurs fructifère; ovule solitaire. Fruit, un akène couronné par une aigrette caractéristique, importante pour l'identification des différents genres.

TRIBUS

- x. Plantes avec jus laiteux. Corolle ligulée dans toutes les fleurs du capitule; toutes les fleurs parfaites. Feuilles alternes..... 11. Cichorieæ, p. 397
- x. Plantes sans jus laiteux. Corolle tubulaire dans toutes les fleurs parfaites, régulièrement pentaloquée (rarement 3-4 loges); ligules seulement dans les fleurs marginales ou à rayons qui, si elles sont présentes, sont ou pistillées seulement ou neutres (avec ni étamines ni pistil):
 - 2x. Anthères caudées à la base:
 - 3x. Corolles toutes bilabées. Involucres de bractées graduellement indurées..... 10. Mutisieæ, p. 396
 - 3x. Corolles tubulaires ou filiformes. Involucres de bractées non graduellement indurées:
 - 4x. Anthères sans appendices allongés au sommet..... 4. Inuleæ, p. 383
 - 4x. Anthères sans appendices allongés, cartilagineux, le plus souvent connés au sommet..... 9. Cynareæ, p. 396
 - 2x. Anthères non caudées à la base:
 - 3x. Branches du style allongées, aiguës, hispiduleuses extérieurement sur toute leur longueur:
 - 4x. Capitules jaunes..... 8. Senecioneæ, p. 394
 - 4x. Capitules blancs ou pourpres, jamais jaunes:
 - 5x. Akènes ni clavés, ni quadrangulaires; aigrette non formée de paléoles, munie d'une forte nervure médiane..... 1. Vernonieæ, p. 377
 - 5x. Akènes clavés, quadrangulaires; aigrette formée de paléoles et munie d'une forte nervure médiane..... 6. Helenieæ, p. 393
 - 3x. Branches du style autrement:
 - 4x. Branches du style généralement allongées, linéaires ou clavées, obtuses, non hispiduleuses au sommet et à l'extérieur, les lignes stigmatiques situées seulement au-dessous du milieu et peu voyantes. Capitules jamais jaunes:
 - 2. Eupatorieæ, p. 379

- 4x. Branches du style, si elles sont allongées, hispides à l'extrémité ou au sommet; lignes stigmatiques arrivant jusqu'au sommet. Capitules souvent jaunes:
 - 5x. Bractées de l'involucre à bord scarieux; capitules inclinants, petits, discoïdes ou disciformes. Sommet du style tronqué, hispiduleux..... 7. Anthemideæ, p. 394
 - 5x. Bractées de l'involucre à bord non scarieux; capitules non inclinants. Sommet du style aigu:
 - 6x. Réceptacle paléolifère au moins dans les capitules staminés; les feuilles, en outre, sont principalement ou entièrement opposées. Aigrettes non formées de soies..... 5. Heliantheæ, p. 384
 - 6x. Réceptacle non paléolifère (rarement sèteux). Feuilles alternes:
 - 7x. Aigrette présente, formée principalement ou entièrement de soies molles, capillaires. Involucre non glandulaire-ponctué:
 - 8x. Extrémités du style tronquées ou presque tronquées..... 8. Senecioneæ, p. 394
 - 8x. Extrémités du style aiguës..... 3. Astereæ, p. 381
 - 7x. Aigrette absente ou formée de toutes petites écailles, d'arêtes ou de poils rigides. Involucre glandulaire-ponctué:
 - 8x. Feuilles alternes..... 3. Astereæ, p. 381
 - 8x. Feuilles opposées au moins en dessous..... 6. Helenieæ, p. 393

Tribu I. VERNONIEÆ

- x. Capitules de plusieurs—beaucoup de fleurs, distincts:
 - 2x. Aigrette, un anneau cartilagineux, entier ou muni de toutes petites dents. Tiges herbacées:
 - 3x. Aigrette sans poils..... Sparganophorus, p. 377
 - 3x. Aigrette munie de nombreux poils à l'intérieur de la coupe..... Pacourina, p. 378
 - 2x. Aigrette persistante ou quelque peu décidue dans quelques espèces avec 1-10 capitules, formée d'écailles et de poils. Tiges herbacées et ligneuses:
 - 3x. Aigrette garnie de poils et d'écailles..... Vernonia, p. 378
 - 3x. Aigrette garnie uniquement d'écailles..... Piptocoma, p. 378
- x. Capitules plus ou moins nombreux, réunis en un capitule composé:
 - 2x. Feuilles alternes..... Elephantopus, p. 378
 - 2x. Feuilles en partie verticillées, en partie alternes..... Distreptus, p. 378

Sparganophorus Crantz.

Herbes annuelles. Capitules plutôt petits, solitaires ou agrégés dans l'axe des feuilles; involucre semi-globulaire. Corolle de 3-4 segments. Fruit de 3-4 angles; aigrette, une petite coupe cartilagineuse.

S. vaillantii Crantz.

Pacourina Aubl.

Herbes avec feuilles dentées, poilues au bord. Capitules 2 cm. $\frac{1}{2}$ de large, solitaires, latéraux, sessiles; involucre papyracé, sec. Fruit grand (1 cm. $\frac{1}{2}$ de long), avec 10 côtes, les poils intérieurs de l'aigrette caducs.

P. edulis Aubl.

Vernonia Schreb.

Herbes, arbrisseaux ou arbustes, avec feuilles alternes et capitules généralement pourpres. Involucre cylindrique ou hémisphérique; bractées graduées, sèches ou indurées, rarement avec les pointes herbacées; fleurs — 1 — beaucoup, tubulaires, hermaphrodites, fertiles; réceptacle nu. Anthères sagittées à la base. Akènes 4–10 côtes; aigrettes bisériées, l'une externe plus courte, subpaleacée ou sétueuse, l'autre interne sétueuse.

V. sprengeliana Schultz.

V. buxifolia (Cass.) Less.

V. tuerckheimii Urb.

V. albicaulis Pers.

V. fruticosa (L.) Sw.

V. buchii Urb.

V. stenophylla Less.

V. sericea L. C. Rich. Subspec. *racemosa* (Delponte) Ekm.

V. cinerea (L.) Less.

V. barkerii Urb. et Ekm.

V. saepium Ekm. Msc. «Ti baume marron.»

V. ekmanii Urb.

Piptocoma Cass.

Arbrisseaux avec feuilles duvetées en dessous. Capitules de 6–12 fleurs avec involucre ovoïde, disposés en ombelles terminales. Fruit avec 5 angles, strié; aigrette bisériée, légèrement caduque, la série interne de 10 petites écailles quelque peu dressées, la série externe formée d'autant d'écailles, mais plus courtes.

P. rufescens Cass.

Elephantopus L.

Herbes. Feuilles alternes. Capitules de 2–5 fleurs, discoïdes, glomérules sous-tendues par 2–3 petites bractées foliacées; involucre aplati; bractées en 2 séries, bractées externes plus courtes que les internes; réceptacle nu. Corolle régulière, sauf une fente plus profonde sur le côté interne; stigmate pubescent. Akène tronqué, avec 10 côtes; aigrette simple ou double, de plusieurs soies rigides persistantes.

E. angustifolius Sw.

E. mollis H. B. K.

Distreptus Cass.

Herbes vivaces avec feuilles en partie verticillées, en partie alternes. Capitules de 2–5 fleurs avec involucre oblong-cylindrique; bractées de l'involucre décussées en de nombreuses rangées bi-articulées, les 4 écailles externes plus courtes; capitules nombreux. Corolle régulière ou quelque peu irrégulière du fait que le bord interne est plus profondément lobé et plus tourné vers l'extérieur. Fruit avec 10 côtes; aigrette avec 1 ou 2 cercles de soies ou en forme de petite couronne.

D. spicatus (Juss.) Cass. «Langue bœuf.»

Tribu II. EUPATORIÆ

x. Anthères non appendiculées:

2x. Fruit lisse avec des côtes très saillantes *Piqueria*, p. 379

2x. Fruit glandulaire ou plissé avec des côtes peu saillantes *Adenostemma*, p. 379

x. Anthères appendiculées:

2x. Fruit muni de 3–5 côtes:

3x. Aigrette garnie d'écailles libres ou soudées, obtuses, aiguës ou barbuës ou rarement une petite couronne marginée *Ageratum*, p. 379

3x. Aigrette garnie de poils ou d'arêtes:

4x. Bractées de l'involucre 6, parfois plus nombreuses *Eupatorium*, p. 379

4x. Bractées de l'involucre 4, parfois avec une petite écaille externe courte *Mikania*, p. 380

2x. Fruit muni de 8–10, généralement 10, rarement 6 côtes *Brickellia*, p. 381

Piqueria Cav.

Herbes ou arbrisseaux. Feuilles opposées. Capitules petits, nombreux en petites panicules cymeuses; involucre campanulé. Akène de 4–5 angles; aigrette absente ou un cercle de très petites aigrettes, ou un petit anneau légèrement caduc.

P. laxiflora Robins et Seat. Morne l'Hôpital.

P. trinervia Cav. Furcy.

Adenostemma Forst.

Herbes. Feuilles opposées. Capitules assez petits, disposés en panicules compactes; bractées égales en 1–2 séries, bractées libres ou rarement soudées l'une sur l'autre. Akène de 3–5 angles, souvent glandulaire sur la surface dans le jeune fruit; soies de l'aigrette aussi nombreuses que les angles du fruit, souvent claviformes.

A. verbesina (L.) Schultz-Bip.

A. berterii P. DC.

Ageratum L.

Herbes ou arbrisseaux. Feuilles généralement opposées, ovées ou lancéolées, capitées ou généralement agrégées en corymbes terminales sur un long pédoncule. Involucre généralement campanulé, en 2–3 séries, avec des bractées presque égales, étroites, quelque peu imbriquées; réceptacle nu ou paléacé. Akène de 5 angles; aigrette, une couronne paléacée ou d'écailles distinctes ou unies à la base, parfois aristées.

A. domingense Spreng.

A. conyzoides L.

A. conyzoides L. Var. *inæquipaleaceum* Hieron.

A. latifolium Cav.

Eupatorium L.

Herbes, arbrisseaux ou arbustes. Feuilles le plus souvent opposées. Capitules homogames, de 1 — beaucoup de fleurs, généralement en panicules corymbes ou thyrsoides. Corolle rouge, pourpre, bleue ou blanche, rarement jaune verdâtre ou ocre; anthères appendiculées au sommet, entières à la base; branches du style filiformes ou clavées, souvent colorées. Akène de 5 côtes ou 5 angles; aigrette de beaucoup de soies blanche ou paille, rose, pourpre, généralement sub-égales, parfois les soies externes beaucoup plus courtes.

- E. macrophyllum* L. «Feuilles bounda.»
E. odoratum L. «Langue chatte.» Médicinal. «Langa chata» (St-Domingue).
E. corymbosum Aubl.
E. ivifolium L.
E. selleanum Urb.
E. sinuatum Lam.
E. sinuatum Lam. Var. *desportesii* Urb.
E. fuertesii Urb.
E. jagerianum Urb.
E. havanense H. B. K.
E. havanense H. B. K. Var. *domingense* (DC.) Robins.
E. buchii Urb.
E. barahonense Urb.
E. pachyneurum Urb.
E. miragoanæ Urb.
E. gibbosum Urb.
E. gabbii Urb.
E. jacquemontii Urb.
E. semicrenatum Urb.
E. tapeinanthum Urb.
E. picardæ Urb.
E. sciatriphes Robins.
E. larcheanum Urb.
E. heptaneurum Urb.
E. constanzæ Urb.
E. puberulum P. DC.
E. calcicolum Urb.
E. dolichopus Urb.
E. triradiatum Urb.
E. obtusissimum P. DC.
E. microstemon Cass.
E. sophiæfolium L.
E. dictyoneurum Urb.
E. illitum Urb.
E. inæquidens Urb.
E. urbanii Ekm.
E. jenssenii Urb.
E. reversum Urb.

Mikania Willd.

Herbes ou arbrisseaux volubiles. Feuilles opposées, généralement ovées pétiolées. Capitules paniculés, 4 fleurs; involucre de 4 bractées égales. Akène de 5 angles; aigrette multiséteuse, unisériée.

- M. papillosa* Klatt.
M. lepidophora Urb.
M. polycephala Urb.
M. polychæta Urb.
M. cordifolia (L. fil.) Willd. «Liane François», d'après Urban.
M. buchii Urb.
M. scandens (L.) Willd. «Liane François», d'après Urban.
M. barahonensis Urb.
M. tripartita Urb.

- M. swartziana* Griseb.
M. cyanosma Urb. et Ekm.

Brickellia Ell.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles alternes ou opposées. Capitules petits ou de grandeur moyenne, de 3-50 fleurs; involucre cylindrique, parfois campanulé; bractées nombreuses, les bractées internes plus longues. Akène avec 10 côtes; aigrette, un cercle de soies parfois très courtes.

- B. diffusa* (Vahl.) A. Gray.

Tribu III. ASTEREÆ

- x. Plantes dioïques. Fleurs radiées absentes ... *Baccharis*, p. 382
x. Plantes non dioïques. Fleurs radiées présentes ou rarement absentes:
2x. Capitules avec des fleurs radiées ligulées qui sont de même couleur que les fleurs discoïdes ou homogames. Aigrette présente *Solidago*, p. 381
2x. Capitules avec les fleurs mâles en 2-beau-coup de séries avec corolle actinomorphe ou filiforme. Aigrette absente. *Læstadia*, p. 381
2x. Capitules avec les fleurs radiées d'une couleur autre que celles des fleurs discoïdes, rarement homogames:
3x. Aigrette rabougrie, une sorte d'anneau ou une coupelle cartilagineuse. *Egletes*, p. 381
3x. Aigrette bien développée, le plus souvent sétacée:
4x. Fruit plat, comprimé. Plantes généralement herbacées:
5x. Involucre le plus souvent en plus de 2 séries; fleurs ligulées le plus souvent unisériées, le plus souvent oblongues; extrémités du style aigües ou acuminées. *Aster*, p. 382
5x. Involucre très rarement bisérié; fleurs ligulées étroites, linéaires, le plus souvent plurisériées; extrémités du style courtes, obtuses. *Erigeron*, p. 382
4x. Fruit cylindrique. Plantes généralement frutescentes. *Gundlachia*, p. 382

Solidago L.

Herbes, rarement sous-arbrisseaux. Capitules petits, rarement de grandeur moyenne; involucre oblong, légèrement campanulé; inflorescence généralement racemuse; ligules des fleurs femelles parfois très courtes, rarement absentes. Fruit cylindrique 8-12 côtes, les soies de l'aigrette minces en 1-2 rangées, généralement égales, parfois rangée externe plus courte.

- S. canadensis* L.

Laestadia Kunth.

Herbes basses, vivaces ou sous-arbrisseaux. Feuilles petites agrégées. Capitules petits, solitaires, pédonculés; involucre large. Fleurs femelles avec corolle campanulée, leurs fruits rétrécis en un bec glandulaire. Fleurs parfaites généralement stériles. Aigrette absente.

- L. domingensis* Urb.

Egletes Cass.

Herbes. Feuilles profondément coupées en segments filiformes. Capitules de grandeur moyenne, au dernier moment sphériques, solitaires ou peu nom-

breux, terminaux ou axillaires. Fruit quelque peu comprimé, avec nervure marginale, mais le plus souvent sans côtes. Aigrette, une petite coupe cartilagineuse ou un anneau.

E. prostrata (Sw.) O. Ktze.

Aster L.

Herbes, rarement sous-arbrisseaux ou arbrisseaux. Feuilles alternes, généralement entières ou légèrement dentées. Capitules moyens ou grands, rarement petits, solitaires — paniculés, radiés ou rarement discoïdes, les rayons blancs — violets, jamais jaunes; disque blanchâtre ou jaune, souvent pourpre; involucre généralement gradué, les bractées généralement étroites et herbacées pointues, les branches du style aiguës ou acuminées. Aigrette formée de nombreuses soies grêles subégales.

A. dumosus L.

A. heleius Urb.

Erigeron L.

Plantes annuelles ou vivaces acaules ou avec tiges dressées. Feuilles entières ou rarement disséquées, celles de la tige alternes. Capitules radiés, solitaires ou agrégés; involucre campanulé ou hémisphérique; bractées étroites, presque égales en 2 séries; rayons en 2 ou plusieurs séries, généralement roses, violets ou pourpres, rarement de couleur crème ou blanche. Aigrette de soies molles.

E. cuneifolius P. DC.

E. vegænsis Urb.

E. bellioïdes P. DC.

E. domingensis Urb.

E. fuertesii Urb.

E. canadensis L.

E. subalpinus Urb.

E. bonariensis L.

E. spathulatus Vahl. «Quinze sous.»

E. jamaïcensis L.

E. dissectus Urb.

E. cæruleus Urb.

E. pinetorum Urb.

E. buchii Urb.

E. araneosus Urb.

E. tuerckheimii Urb.

E. mucronatus P. DC. Cultivé.

Gundlachia A. Gray.

Arbrisseaux. Capitules en panicules avec 1-3 courtes ligules blanches et 3-5 fleurs parfaites jaunes. Fruit cylindrique avec 5 nervures. Aigrette en 1 série formée de soies.

G. floribunda Urb.

G. domingensis (Spreng.) A. Gray.

G. domingensis (Spreng.) A. Gray. Var. *genuina* Urb.

G. lindeniana (A. Rich) Urb.

G. lindeniana (A. Rich) Urb. Var. *corymbosa* (Urb.) Britton.

Baccharis L.

Arbrisseaux, rarement sous-arbrisseaux dioïques. Feuilles alternes, entières ou dentées. Capitules petits ou de grandeur moyenne, discoïdes, blanchâtres,

disposés en cymes ou panicules, rarement solitaires; involucre de bractées sèches, parfois avec la nervure médiane verte; réceptacle nu, très rarement paléacé. Capitules femelles avec corolle tubulaire filiforme; capitules mâles avec les fleurs hermaphrodites stériles, corolle tubulaire pentadentée. Akène petit, 5-10 nervures; aigrette femelle composée de soies capillaires molles en 1 — plusieurs séries, persistantes; aigrette mâle avec les soies quelque peu dilatées.

B. haïtiensis Heering.

B. myrsinites (Lam.) Pers. «Bois balai» (Haïti), «Palo de toro» (St-Domingue), d'après Urban.

B. myrsinites (Lam.) Pers. Var. *mornicola* Urb.

B. dioeca Vahl.

Tribu IV. INULEÆ

- x. Fleurs hermaphrodites souvent stériles; bractées de l'involucre non scarieuses. Plantes non laineuses **Pluchea**, p. 383
- x. Fleurs hermaphrodites souvent stériles. Plantes le plus souvent couvertes d'un duvet gris. Feuilles tombantes..... **Pterocaulon**, p. 383
- x. Fleurs hermaphrodites fertiles; bractées de l'involucre scarieuses. Plantes duvetées de gris ou laineuses..... **Gnaphalium**, p. 383

Pluchea Cass.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles alternes, entières ou dentées. Capitules disciformes, de grandeur moyenne, cymeux ou cymeux-paniculés, pourpres ou blanchâtres; involucre plurisériel de bractées sèches, souvent pourpres. Fleurs externes pistillées, plurisérielles, avec corolle filiforme. Fleurs internes hermaphrodites, anthères sagittées à la base, avec auricules caudées. Akène petit, 4-5 angles; aigrette unisériée, séteuse.

P. purpurascens (Sw.) P. DC. «Salvia» (St-Domingue), d'après Urban.

P. odorata (L.) Cass. «Tabac marron» ou «La chose» (Haïti), «Salvia blanca» (St-Domingue). Médicinal.

P. eggersii Urb.

Pterocaulon Ell.

Herbes généralement couvertes de poils gris avec feuilles pendantes. Capitules petits, en masse sphérique compacte; glomérules tantôt solitaires, tantôt agrégés en épis. Fleurs parfaites, solitaires ou peu nombreuses, rarement nombreuses, généralement stériles. Aigrette en 1-2 séries de soies.

P. alopecuroïdeum (Lam.) P. DC.

P. virgatum (L.) P. DC.

Gnaphalium L.

Herbes, rarement arbrisseaux, tomenteux. Feuilles alternes, entières. Capitules petits, cymeux ou paniculés, souvent groupés en masses sphériques; involucre formé de bractées scarieuses; capitules de beaucoup de fleurs disciformes, les fleurs externes pistillées avec corolle filiforme, les fleurs internes hermaphrodites tubulaires, anthères caudées à la base. Aigrette séteuse, les soies dans les fleurs hermaphrodites parfois clavellées.

G. viscosum H. B. K. «Camomille pays.» Médicinal.

G. rosillense Urb.

G. domingense Lam.

G. eggersii Urb.

G. indicum L.

G. spicatum Lam.

G. stachydifolium Lam. «Camomille pays» d'après Urban.

G. spathulatum Lam.

Tribu V. HELIANTHÆ

- x. Réceptacle paléolifère absent ou à peine développé. Capitules le plus souvent de peu de fleurs (fleurs moindres que 10, excepté dans le genre *Clibadium* où elles sont plus nombreuses). Fleurs parfaites le plus souvent stériles:
 - 2x. Fleurs pistillées sans corolle..... *Pinillosia*, p. 386
 - 2x. Fleurs pistillées avec corolle:
 - 3x. Capitules avec moins de 10 fleurs:
 - 4x. Capitule solitaire sur une tige grêle, très petit, formé de 4 fleurs..... *Tetranthus*, p. 387
 - 4x. Capitule non comprimé, en nœuds denses ou en forme d'ombelle, formé de 2 fleurs, 1 pistillée, 1 parfaite..... *Lantanopsis*, p. 387
 - 3x. Capitules avec plus de 10 fleurs..... *Clibadium*, p. 387
 - x. Réceptacle entièrement paléolifère et très développé:
 - 2x. Corolle des fleurs pistillées absente ou fort peu développée:
 - 3x. Bractées unies dans l'involucre femelle..... *Ambrosia*, p. 387
 - 3x. Bractées libres dans l'involucre femelle..... *Xanthium*, p. 388
 - 2x. Fleurs pistillées absentes ou avec corolle très développée:
 - 3x. Fleurs en disque, persistant sur le fruit et tombant avec lui:
 - 4x. Akènes des fleurs en disque fortement comprimés..... *Zinnia*, p. 388
 - 4x. Akènes des fleurs en disque convexes..... *Selleophytum*, p. 388
 - 3x. Fleurs en disque absentes ou se fanant à la maturité du fruit et caduques:
 - 4x. Fleurs en rayons stériles:
 - 5x. Akènes courts, non plats..... *Acanthospermum*, p. 387
 - 5x. Akènes remarquablement plats..... *Parthenium*, p. 387
 - 4x. Fleurs en rayons fertiles:
 - 5x. Aigrette absente ou en forme d'une petite couronne ou garnie d'une simple aiguille ou de fortes soies parfois rugueuses à la partie postérieure ou de petites écailles minces:
 - 6x. Fruit non comprimé ou comprimé seulement sur les côtés:
 - 7x. Les bractées internes de l'involucre très larges ou enveloppant les fruits des fleurs en disque:
 - 8x. Fleurs pistillées unisériées..... *Siegesbeckia*, p. 388
 - 8x. Fleurs pistillées plurisériées. Plantes aquatiques..... *Enhydra*, p. 388
 - 7x. Les bractées internes de l'involucre plates:
 - 8x. Réceptacle paléolifère très étroit..... *Eclipta*, p. 389
 - 8x. Réceptacle paléolifère très large:
 - 9x. Fruit des fleurs parfaites épais, de 4-5 angles ou légèrement comprimé sur les côtés:

- 10x. Aigrette absente (ou le fruit entouré à la partie supérieure d'un limbe denté)..... *Wulfa*, p. 389
- 10x. Aigrette garnie de petites écailles ou de fortes aiguilles ou des 2 à la fois:
 - 11x. Capitules avec des fleurs discoïdes pistillées:
 - 12x. Arbrisseaux. Fruit à 4 angles aigus..... *Borrchia*, p. 389
 - 12x. Herbes ou sous-arbrisseaux. Fruit avec angles imperceptibles ou obtus..... *Wedelia*, p. 389
 - 11x. Capitules avec des fleurs en rayons, unisexuées, parfaitement déployées:
 - 12x. Aigrette garnie de petites écailles libres ou généralement de 2 aiguilles. Feuilles, au moins les supérieures le plus souvent alternes..... *Tithonia*, p. 389
 - 12x. Aigrette garnie de 1-3 aiguilles à peine caduques..... *Helianthus*, p. 390
 - 11x. Capitules homogames ou avec des fleurs à disque, unisexuées, très courtes, liguliformes..... *Eleutheranthera*, p. 390
 - 10x. Aigrette garnie de nombreuses petites soies courtes à peine caduques..... *Melanthera*, p. 390
 - 9x. Fruit des fleurs à disque, plat, comprimé, avec des angles aigus ou ailé:
 - 10x. Fruit mûr non ailé:
 - 11x. Herbes. Capitule solitaire, vertical..... *Spilanthus*, p. 390
 - 11x. Arbrisseaux. Inflorescence paniculée..... *Salmea*, p. 390
 - 10x. Fruit mûr, ailé à la base..... *Verbesina*, p. 390
 - 6x. Fruit plus ou moins comprimé à la partie postérieure:

- 7x. Aigrette absente ou un petit anneau ou garnie d'aiguilles qui ne sont pas, au moins dans les fleurs à disque, munies de dents dressées à la partie postérieure:
- 8x. Feuilles opposées (seulement les feuilles supérieures parfois alternes):
- 9x. Involucre simple. Fruit ailé..... *Synedrella*, p. 391
- 9x. Involucre double:
- 10x. Appendice de la branche du style des fleurs hermaphrodites, absent ou court. Racines non tuberculeuses..... *Coreopsis*, p. 391
- 10x. Appendice de la branche du style des fleurs hermaphrodites long: Capitule gros. Racines tuberculeuses..... *Dahlia*, p. 391
- 8x. Feuilles alternes..... *Chrysanthellum*, p. 391
- 7x. Aigrette garnie de soies dentées à la partie postérieure:
- 8x. Fruits distincts; akènes externes ailés, non rostrés, akènes internes rostrés et peu ou légèrement ailés..... *Heterospermum*, p. 391
- 8x. Fruits pareils (ou les akènes externes rabourgris):
- 9x. Plantes herbacées:
- 10x. Fleurs radiées jaunes, blanches ou absentes. Fruit non rostré..... *Bidens*, p. 392
- 10x. Fleurs pourpres ou rouges. Fruit plus ou moins rostré..... *Cosmos*, p. 392
- 9x. Plantes frutescentes..... *Narvalina*, p. 392
- 5x. Aigrette, au moins dans les fleurs à disque, garnie de plus grosses écailles ou de soies pectinées pennées, parfois absente dans les fleurs marginales:
- 6x. Capitules petits, écailles de l'aigrette frangées..... *Galinsoga*, p. 392
- 6x. Capitules de grosseur moyenne; écailles ou soies de l'aigrette en forme de peigne ou ciliées-plumeuses..... *Tridax*, p. 392

Pinillosia Ossa.

Herbes petites. Capitules petits, solitaires, avec longs pédoncules; corolle des fleurs femelles absente. Fruit avec une aigrette de 4 soies très rigides, qui deviennent dans les fruits mûrs 4 cornes très dures.

P. berterii (Spreng) Urb.

Tetranthus Ew.

Herbes procombantes. Capitules très petits de 4 fleurs, solitaires dans l'axe des feuilles. Aigrette formée d'une toute petite couronne courte frangée.

T. cupulatus Urb.

T. litoralis Sw.

T. hirsutus Spreng.

Lantanopsis C. Wright.

Sous-arbrisseaux ressemblant au genre *Lantana*. Capitules très petits en corymbes épais terminaux avec une fleur femelle dont la corolle tubulaire très légèrement caduque et avec une fleur parfaite. Fruit sans aigrette, enveloppé d'un involucre de 4 bractées entières.

L. hispidula C. Wright.

L. hoffmanni Urb.

Clibadium L.

Arbustes ou arbrisseaux ou arbres. Feuilles opposées, serrées. Capitules nombreux, petits, disciformes, blanchâtres, cymeux-paniculés; bractées peu nombreuses. Les fleurs femelles sous-tendues par des glumes, leur corolle grêle ou tubulaire, denticulée. Fleurs hermaphrodites, stériles, leur corolle pentadentée. Akène obovoïde, obcomprimé.

C. surinamense L.

Acanthospermum Schrank.

Herbes annuelles, plutôt grossières, avec feuillage pubescent et tiges dressées ou rampantes. Feuilles opposées, larges, souvent coriacées, dentées. Capitules radiés, mais peu voyants, axillaires aux bractées foliacées; involucre double, un externe de 5 bractées plates, herbacées, et un interne de plusieurs bractées plus petites; réceptacle concave ou convexe, les fleurs en rayons en une seule série; ligule très petite, jaunâtre, concave ou capuchonnée. Fleurs en disque parfaites, mais stériles; anthères entières à la base. Akène beaucoup plus large au-dessus, légèrement courbé. Aigrette absente.

A. humile (Sw.) P. DC. «Dessalines» ou «Thé métile»

A. hispidum P. DC.

Parthenium L.

Herbes ou arbrisseaux. Feuilles alternes, entières. Capitules petits, radiés, blancs, en cymes terminales ou panicules; bractées généralement bisériées, suborbiculaires, sèches; rayons courts, dressés, fertiles, le disque stérile. Akène obcomprimé, bords nerviformes, adnés à la base aux glumes involutées des 2 fleurs externes opposées et à maturité se séparant du corps de l'akène presque au sommet, le tout tombe ensemble. Aigrette de 2-3 arêtes courtes ou absentes.

P. hysterophorus L. «Balai amer» ou «Absinthe marron» (Haïti), «Escobita amarga» (St-Domingue). Médicinal.

Ambrosia L.

Herbes annuelles ou vivaces, caulescentes, souvent ligneuses. Fleurs monoïques ou rarement dioïques. Feuilles opposées ou alternes, lobées ou divisées ou rarement entières. Capitules non voyants, les capitules mâles en épis ou racemes terminaux, les femelles solitaires ou agrégées au-dessous des mâles; involucre mâles en forme de saucière ou hémisphériques, avec 5-12 bractées ou absents; réceptacle presque plat, nu avec des glumes filiformes; corolle infundibuliforme, pentalobée; anthères mucronées au sommet; style simple, souvent

pénicillé au sommet. Involucres femelles turbinés — subglobulaires, uniflores, avec plusieurs épines ou tubercules en 1 rangée; corolle absente; stigmates filiformes. Akènes ovoïdes — obovoïdes; aigrette absente.

A. panniculata L. C. Rich.

A. panniculata L. C. Rich. Var. *cumanensis* (H. B. K.) O. E. Schulz, var. *peruviana* (W.) O. E. Schulz.

A. velutina O. E. Schulz.

A. hispida Pursh.

Xanthium L.

Herbes annuelles ou vivaces généralement grossières, avec tiges dressées ou diffuses, lisses ou armées d'épines. Feuilles alternes, dentées ou lobées, souvent amples. Capitules monoïques, les mâles en grappes, épis ou bouquets terminaux, les femelles axillaires. Involucres mâles courts, de plusieurs bractées distinctes en 1-3 rangées; réceptacle paléacé, cylindrique; corolle tubulaire, pentalobée; filets monadelphes, anthères mucornées, libres; style simple. Involucres femelles fermés, 1-3 becs, oblongs-ovoïdes, spinifères biloculaires; corolle absente; stigmates 2. Akène solitaire dans chaque loge de l'involucre; aigrette absente.

X. echinatum Murray.

Zinnia L.

Herbes ou sous-arbrisseaux avec feuilles sessiles, opposées ou rarement verticillées. Capitules terminaux, généralement solitaires, rouges ou jaunes, rarement blancs; involucre unisérié de bractées sèches à extrémité subherbacée; fleurs radiées fertiles, les ligules sessiles persistantes, les akènes sans arêtes ou avec 1-3 arêtes courtes. Disque fertile, les akènes fortement comprimés, bidentés, avec 1-2 arêtes ou sans arêtes.

Z. multiflora L. «Mariéla.» Près de Terre-Neuve.

Selleophytum Urb.

Sous-arbrisseaux dressés, glabres. Feuilles opposées, sessiles, entières. Capitules solitaires ou 3 disposés en ombelles; pédoncules longs; capitules hétérogames, radiés; les fleurs en rayons femelles, unisériées, les fleurs en disque parfaites, toutes fertiles. Involucre vrai, unisérié; bractées 4-5, libres; réceptacle convexe; corolle jaune. Akènes des fleurs en rayons, comprimés au dos; akènes des fleurs en disque, convexes au dos; les deux sortes non ailées. Aigrette de 2 soies égales, persistantes et de 1-2 petites écailles intermédiaires.

S. buchii Urb.

Siegesbeckia L.

Herbes annuelles avec feuilles opposées. Capitules petits, disposés en panicules peu compactes, avec involucre généralement pourvu de 5 glandes. Fruit de la fleur femelle enveloppé dans l'involucre si celui-ci n'est pas aussi annulaire; aigrette absente.

S. agrestis Poepp. et Endl. Morne la Selle.

Enhydra Lour.

Plantes marécageuses. Capitules de grandeur moyenne, solitaires, sessiles, généralement entre 2 stipules sessiles ou légèrement pétiolées. Fleurs femelles en plusieurs séries avec de courtes ligules. Fruit entièrement enveloppé par l'involucre; aigrette absente.

E. sessilis (Sw.) P. DC. Près de Jacmel.

Eclipta L.

Herbes annuelles caulescentes. Feuilles opposées, étroites, entières ou quelque peu dentées. Capitules radiés, mais peu voyants; pédoncules courts; involucre hémisphérique ou campanulé; bractées en 2 séries, série externe parfois plus longue que série interne. Réceptacle plat ou convexe, les fleurs en rayons pistillées, fertiles; ligule petite blanche; fleurs en disque parfaites, principalement fertiles; bractéoles en forme d'arêtes; stigmate des fleurs en disque avec extrémités obtuses ou triangulaires. Akène varié, ceux du rayon trigones, ceux du disque aplatis. Aigrette de plusieurs dents courtes ou absentes.

E. alba (L.) Hassk.

Wulffia Neck.

Herbes. Feuillage pubescent; feuilles opposées, sinuées-dentées. Capitules de grandeur moyenne, solitaires ou agrégées, homogames, ou avec des fleurs nues externes. Fruit quadrangulé ou quelque peu comprimé, tronqué, souvent charnu à la fin.

W. havanensis P. DC. St-Domingue.

Borrchia Adans.

Arbrisseaux, avec feuilles opposées, entières, souvent charnues. Capitules de grandeur moyenne, solitaires à l'extrémité des branches, pédonculés; rayons fertiles; bractées de l'involucre hémisphériques, imbriquées; réceptacle plat, couvert de glumes lancéolées, rigides et persistantes. Akène quelque peu cuneiforme, 3-4 angles; aigrette, une petite couronne de 4 dents.

B. arborescens (L.) P. DC. «Té marino,» (St-Domingue) d'après Urban.

Wedelia Jacq.

Herbes ou sous-arbrisseaux aux feuilles opposées, ressemblant au genre *Borrchia*, sauf pour les fruits. Fruit épais, dans les fleurs femelles, triangulaire; dans les fleurs parfaites, légèrement comprimé avec les angles obtus, parfois courtement pédonculé; aigrette en forme de petite coupe d'écailles soudées, avec ou sans arêtes.

W. trilobata (L.) Hitchc.

W. trilobata (L.) Hitchc. Var. *hirtella* O. E. Schulz.

W. gracilis L. C. Rich.

W. reticulata P. DC.

W. ehrenbergii Schlechtend.

W. ehrenbergii Schlechtend. Var. *mayerhoffii* O. E. Schulz.

W. serrata L. C. Rich. «Feuille-z'arien,» «Plante rageur» (Haïti), d'après Urban.

W. longipes Urb.

W. jacquinii L. C. Rich.

Tithonia Desf.

Herbes ou arbrisseaux avec feuilles alternes ou opposées en dessous. Capitules grands, sur des pédoncules épais; involucre hémisphérique, largement campanulé; bractées externes généralement foliacées; fleurs en rayons neutres. Fruit comprimé quadrangulaire; aigrette absente ou avec de nombreuses petites écailles, avec ou sans soies.

T. rotundifolia (Mill.) Blake.

T. tagetiflora Desf.

T. diversifolia (Hemsl.) A. Gray, «Fleurs soleil.» Ornemental.

Helianthus L.

Herbes ou sous-arbrisseaux, avec feuilles opposées ou alternes. Capitules petits — grands, les rayons jaunes, le disque jaune, rouge ou pourpre; involucre 2 — plusieurs séries, série externe souvent herbacée à l'extrémité; fleurs en rayons neutres. Akène épais; aigrette caduque, de 2 arêtes paléacées et parfois de plusieurs écailles intermédiaires.

H. tuberosus L. Cultivé dans les jardins.

H. annuus L. «Fleurs soleil.» Ornamental.

Eleutheranthera Poit.

Herbes annuelles. Feuilles opposées, pétiolées. Capitules petits, presque sessiles; fleurs neutres, en rayons absents ou atrophiés; connectif non appendiculé, mais élargi entre les lobes de l'anthère. Aigrette formée d'écailles soudées, avec ou sans arêtes.

E. ruderalis (Sw.) Schultz-Bip.

Molanthera Rohr.

Herbes vivaces, avec feuillage grossier ou pubescent. Feuilles opposées, entières, dentées ou hastées, pétiolées. Capitules discoïdes, peu voyants, pédonculés; involucre hémisphérique, de plusieurs fleurs; bractées imbriquées en 2 à 3 séries, presque égales. Réceptacle hémisphérique; fleurs en rayons absentes; les fleurs en disque parfaites, fertiles; corolle avec gorge large; anthères non caudées; stigmaté avec appendice tubulé, pubescent. Akène quadrangulé, élargi au sommet, tronqué; aigrette de 2 — plusieurs arêtes caduques.

M. buchii Urb. «Ouache-ouache.»

M. molliuscula O. E. Schulz.

M. amethystina O. E. Schulz. St-Domingue.

Spilanthes L.

Herbes. Feuilles opposées, plates, souvent dentées, pétiolées. Capitules radiés ou discoïdes, pédonculés; involucre campanulé; bractées étroites, environ en 2 séries; réceptacle convexe ou allongé. Fleurs pistillées en rayons, fertiles; ligule blanche ou jaune, les fleurs parfaites en cymes, fertiles, chacune environnée d'une bractéole; corolle jaune; stigmaté des fleurs en disque allongé, parfois pénicillé. Akènes variés, ceux des fleurs en rayons trigones ou quelque peu aplatis, ceux des fleurs en disque aplatis, marginés. Aigrette d'1 — plusieurs arêtes.

S. urens Jacq.

S. iodescaea A. H. Moore.

S. uliginosa Sw.

Salmea P. DC.

Arbrisseaux généralement grimpants avec feuilles opposées. Capitules homogames, assez petits, en panicules corymbeuses; involucre campanulé ou rotacé; réceptacle conique; stigmaté obtus, non appendiculé. Fruit avec les bords aigus, contordus ou légèrement ailés. Aigrette de 2 soies.

S. scandens (L.) P. DC.

Verbesina L.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles alternes ou opposées, entières ou dentées, plus ou moins décurrentes dans la tige. Capitules plusieurs — beaucoup, discoïdes ou radiés; involucre hémisphérique ou campanulé; bractées imbriquées en peu de séries, étroites, quelque peu appressées; réceptacle convexe ou conique, paléacé. Fleurs en rayons, neutres ou fertiles; ligule blanche ou

jaune, peu voyante ou absente. Fleurs en disque, parfaites, généralement fertiles, entourées de bractéoles; anthères obtuses à la base; stigmaté du disque avec des appendices papilleux. Akènes variés, ceux des fleurs en rayons triangulaires, ceux des fleurs en disque aplatis, ailés ou non ailés. Aigrette d'1 — 3 arêtes, parfois accompagnée d'autant d'écailles.

V. alata L.

V. domingensis Urb.

V. tetraptera Urb. et Ekm.

Synedrella Gaertn.

Herbes pubescentes, annuelles. Feuilles opposées, simples, généralement dentées. Capitules radiés, peu voyants; involucre de plusieurs fleurs; bractées peu nombreuses, 1-2 herbacées, plusieurs paléacées. Les fleurs en rayons pistillées, fertiles; ligule jaune. Les fleurs en disque parfaites fertiles; corolle quadrilobée; stigmaté des fleurs en disque avec appendice allongé. Akènes des fleurs en rayons, aplatis, bi-ailés; ceux des fleurs en disque, aplatis ou triangulaires. Aigrette de 2-3 arêtes nues.

S. nodiflora (L.) Gaertn. «Feuilles dépôt.»

Coreopsis L.

Herbes annuelles ou vivaces. Feuilles variées. Capitules radiés ou discoïdes. Fleurs en rayons neutres, jaunes ou partiellement colorées; fleurs en disque parfaites, fertiles. Involucre campanulé ou hémisphérique; bractées en 2 séries toutes plus ou moins unies à la base, celles de la série externe généralement étroites et herbacées, la série interne large, de couleurs variées, mince et scarieuse ou avec les bords scarieux; réceptacle plat ou légèrement convexe, paléacé; glumes plates ou légèrement concaves. Akène plat ou plus ou moins convexe au dos, oblong-orbiculé, avec ou sans ailes; aigrette de 2 écailles finbriolées, arêtes délicates, dents petites, 1 bord coroniforme ou aigrette absente.

C. rosea Nutt.

Dahlia Cav.

Herbes avec feuilles opposées, profondément lobées en segments généralement dentés. Capitules avec disque jaune et rayons rouges, pourpres, roses ou blancs, hétérogames; involucre de 2 séries de bractées; réceptacle aplati ou courbé, paléacé. Akène oblong, comprimé; aigrette absente ou de 2 dents.

D. variabilis (Willd) Desf. «Dahlia.» Ornamental.

D. pinnata Cav. «Dahlia.» Ornamental.

Chrysanthellum L. C. Rich.

Herbes annuelles avec feuilles alternes, profondément lobées. Capitules petits, avec les fleurs en rayons pistillées. Fleurs parfaites, avec appendices longs, minces et poilus; aigrette absente.

C. americanum (L.) Vatke.

Heterospermum Cav.

Herbes annuelles avec feuilles opposées. Capitules petits, axillaires ou terminaux, avec longs pédoncules, les fleurs femelles en rayons; involucre de peu de bractées, les bractées internes soudées à la base. Fruit des fleurs femelles ailé, parfois sans aigrette; fruit des fleurs parfaites plus petit, ailé ou non ailé, avec 2 arêtes recourbées.

H. diversifolium H. B. K.

Bidens L.

Herbes, rarement sous-arbrisseaux. Feuilles opposées ou les feuilles supérieures parfois alternes; limbes simples ou divisés. Capitules nombreux, radiés ou rarement discoïdes, chacun avec un involucre double; involucre externe foliacé, involucre interne scarieux et appressé; réceptacle plat ou presque plat, paléacé. Les fleurs en rayons neutres, les ligules blanches ou jaunes; les fleurs en disque parfaites, fertiles. Akène plat, quadrangulé ou presque cylindrique, sans bec; aigrette de 2-4 arêtes hispides rigides ou dents ou rarement absente.

B. cynapiifolius H. B. K. «*Alfiler*» (St-Domingue), d'après Urban.

B. cynapiifolius H. B. K. Var. *portoricensis* (Spreng) O. E. Schulz. Var. *tenuis* O. E. Schulz.

B. bigelovii A. Gray.

B. domingensis O. E. Schulz.

B. pilosus L. «*Z'aiguille*».

B. pilosus L. Var. *radiatus* C. H. Schultz-Bip. Var. *brachycarpus* (P. DC.) O. E. Schulz. Var. *bimucronatus* (Turcz.) O. E. Schulz.

Cosmos Cav.

Herbes annuelles ou vivaces. Feuilles opposées, entières, lobées ou de 2-3 folioles. Capitules radiés, pédonculés; involucre presque hémisphérique; bractées minces, imbriquées en 2 séries et unies à la base; série externe parfois plus petite que série interne; réceptacle plat ou légèrement convexe. Fleurs en rayons neutres, ligule rose, pourpre (rarement jaune orange); fleurs en disque parfaites, fertiles. Corolle jaune; anthères entières ou très légèrement bidentées à la base; stigmat des fleurs en disque avec appendice grêle ou touffu. Akène de 5 angles ou aplati au dos, rostré; aigrette de 2-4 arêtes hispides plus ou moins persistantes ou 1 couronne.

C. caudatus H. B. K.

C. aurantiacus Klak.

Narvalina Cass.

Ressemblant au genre *Bidens*. Tiges ligneuses; feuilles et bractées coriaces. Inflorescence paniculée, épaisse. Fruit ailé.

N. domingensis Cass.

Galinsoga R. et P.

Herbes annuelles. Feuilles opposées, simples, dentées. Capitules radiés peu voyants; involucre campanulé ou hémisphérique; bractées imbriquées en 2 séries, minces, série interne parfois plus longue que série externe; réceptacle conique ou quelque peu allongé, paléacé. Fleurs en rayons 4-5, pistillées, fertiles, ligules blanches très courtes; fleurs en disque parfaites, fertiles. Corolle jaune; anthères sagittées à la base; stigmat avec appendice aigu. Akène élargi au sommet, 4-5 angles ou les angles externes légèrement aplatis; aigrettes variées, celles des fleurs en rayons de plusieurs soies ou absentes; celles des fleurs en disque de plusieurs écailles lacérées ou finbriées.

G. parviflora Cav.

Tridax L.

Herbes vivaces, caulescentes, généralement ramifiées à la base. Feuilles opposées, limbes incisés-dentés ou pinnatifides, segments étroits. Capitules hétérogames, radiés avec long pédoncule; involucre ovoïde-campanulé; bractées en peu de séries; réceptacle plat quelque peu convexe, en forme de paille. Fleurs radiées pistillées, produisant des fruits; fleurs discoïdes parfaites, produisant aussi des fruits. Anthères auriculées sagittées à la base; stigmates des fleurs

parfaites pubescents au sommet et munis d'appendices subulés. Akènes élargis à la partie supérieure, généralement pubescents; aigrettes formées de nombreuses écailles aristées, acuminées, plumeuses-ciliées.

T. procumbens L. «*Piquant jambe*» ou «*Piquant pied*».

Tribu 6. **HELENIEÆ**

x. Plantes dépourvues de glandes oléifères..... **Helenium**, p. 393

x. Plantes avec de grosses glandes oléifères dans les feuilles et les bractées:

2x. La colonne du style des fleurs parfaites très longue:

3x. Aigrette de 3-6 écailles très inégales **Tagetes**, p. 393

3x. Aigrette formée de nombreuses soies fines, en 1-2 séries..... **Porophyllum**, p. 393

2x. La colonne du style des fleurs parfaites, très courte..... **Pectis**, p. 393

Helenium L.

Herbes dressées, grossières, annuelles ou vivaces. Feuilles alternes, entières ou dentées, souvent decurrentes sur la tige, ponctuées. Capitules radiés ou rarement discoïdes, pédonculés; involucre aplati; bractées étroites, en 1-2 séries, divergentes ou réfléchies; réceptacle convexe, oblong ou sub-globulaire, nu. Fleurs en rayons pistillées et fertiles ou neutres, ligules jaunes ou brunes à la base; fleurs en disque parfaites, fertiles. Corolle jaune, pourpre, ou brune, avec des lobes glandulaires; anthères bidentées ou sagittées à la base; stigmates des fleurs en disque aplatis et tronqués. Akène élargi au sommet, tronqué; aigrette de 5-8 écailles, entières, dentées ou lacérées, acuminées ou à extrémités en forme de soies.

H. tenuifolium Nutt.

H. quadridentatum Lab.

Tagetes L.

Herbes fortement aromatiques, généralement annuelles, branchues, dressées ou diffuses, glabres, avec des glandes oléifères sur les feuilles et les involucre. Feuilles généralement opposées, disséquées-pinnées ou rarement serrulées. Capitules radiés, solitaires ou agrégés, petits à grands; bractées involucreales en 1 série, unies presque entièrement en 1 tube long ou coupe. Akène avec aigrette de 3-6 écailles ou soies inégales.

T. patula L. «*Fleur souci*» Ornemental.

Porophyllum Adans.

ternes, entières, sinuées ou rarement dentées, glandulaires-ponctuées sur le bord

Herbes ou arbrisseaux, souvent glauques, glabres. Feuilles apposées ou alou au sommet ou parfois sur la surface. Capitules discoïdes, jaunes, blanchâtres ou pourpres; involucre de quelques bractées fermes, égales, presque unisériées, généralement glandulaire-ponctuées. Akènes grêles; aigrette formée de nombreuses arêtes.

P. ellipticum Cass.

Pectis L.

Herbes souvent fortement aromatiques, généralement glandulaires-ponctuées, glabres. Feuilles opposées, étroites, entières, généralement ciliées. Capitules petits, radiés, disposés en cymes; involucre étroit, de plusieurs fleurs; bractées distinctes, en 1 série, carénées; réceptacle nu. Fleurs en rayons pistillées, fertiles, ligules larges; fleurs en disque parfaites. Corolle parfois bilabée; anthères entières à la base; stigmat obtus dans les fleurs à disque. Akènes étroits, cylindriques ou angulés; aigrette de plusieurs écailles, arêtes ou soies.

- P. swartziana* Less.
P. humifusa Sw.
P. domingensis Urb.
P. samanensis Urb.
P. christii Urb.
P. multiceps Urb.
P. ciliaris L.
P. carthusianorum Less.
P. brevicaulis Urb.
P. leptcephala (Cass.) Urb.
P. pusilla Urb.
P. elongata H. B. K. «Citronnelle espagnole.» Médicinal.
P. linifolia L.

Tribu 7. ANTHEMIDEÆ

- x. Capitules en rayons. Corolle des fleurs par-
 faites pentadentée. Akènes sessiles..... *Leucanthemum*, p. 394
 x. Capitules discoïdes. Corolle des fleurs parfaites
 quadridentée. Akènes stipités..... *Artemisia*, p. 394

Leucanthemum Mill.

Herbes annuelles ou vivaces, souvent fortement aromatiques. Feuilles alternes, dentées, incises ou disséquées; segments grossiers. Capitules généralement radiés; involucre plats ou hémisphériques; bractées en plusieurs séries, série interne plus longue que série externe; réceptacle plat ou hémisphérique, nu. Fleurs en rayons pistillées, fertiles, ligules blanches, roses ou jaunes; fleurs en disque parfaites, fertiles. Corolle avec tube cylindrique ou ailé; anthères entières et obtuses à la base; stigmate des fleurs en disque tronqué, pennicillé. Akène cylindrique ou angulé; aigrette une coupe squameuse, ou absente.

L. vulgare Lam. Morne la Selle.

Artemisia L.

Herbes ou sous-arbrisseaux amers, aromatiques. Feuilles alternes, souvent disséquées. Capitules entièrement discoïdes, petits et peu voyants, nombreux, disposés en panicules et généralement nutants; fleurs jaunes ou blanchâtres; involucre imbriqués en plusieurs séries. Akène dépourvu de graines.

A. absinthium L. «Absinthe.» Médicinal.

A. domingensis Urb.

Tribu 8. SENECEONEÆ

- x. Involucre multisérié..... *Liabum*, p. 395
 x. Involucre généralement uni-bisérié, parfois de
 3-4 séries:
 2x. Réceptacle paléolifère; involucre de 3-4 sé-
 ries..... *Neurolaena*, p. 395
 2x. Réceptacle non paléolifère, nu ou lacuneux,
 rarement poilu ou en forme de rayons de
 miel
 3x. Capitules avec des fleurs mâles margina-
 les; corolle filiforme; capitules hétéro-
 games..... *Erechthites*, p. 395
 3x. Capitules homogames ou avec des fleurs
 mâles marginales ligulées (rarement bi-
 labiées). Aigrettes garnies de poils (ra-
 rement munies de soies très courtes
 squameuses). Involucre rarement tri-
 sérié:
 4x. Feuilles opposées. Corolle jaune..... *Herodotia*, p. 395
 4x. Feuilles alternes ou basilaires:

- 5x. Fleurs radiées absentes; involucre
 non garni de bractéoles externes..... *Emilia*, p. 395
 5x. Fleurs radiées présentes, fertiles;
 involucre généralement renforcé à
 la base de bractées plus courtes
 ou de bractéoles caliciformes..... *Senecio*, p. 396

Liabum Adans.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles opposées, rarement ternées, pétioolées, blanchâtres-tomenteuses en dessous. Capitules radiés ou discoïdes, jaunes, généralement petits et paniculés; involucre gradués, généralement quadrisériés; réceptacle parfois poilu. Akène court, subcylindrique; aigrette composée généralement d'une série interne de soies grêles et d'une série externe de petites écailles ou la dernière absente.

L. umbellatum (L.) Schultz-Bip.

Neurolaena R. Br.

Sous-arbrisseaux couverts de poils rugueux. Capitules homogames avec fleurs blanchâtres. Aigrette avec soies très nombreuses (en 1 ou 2 rangées) persistantes. Les feuilles distinctes sont alternes.

N. lobata (L.) R. Br. «Manzanilla» (St-Domingue), d'après Urban.

Erechthites Raf.

Herbes annuelles, grossières. Feuilles alternes, plates, non rigides, généralement dentées ou pinnatifides. Capitules hétérogames, discoïdes en corymbes ou en corymbes paniculés; involucre étroits, quelque peu renflés à la base; bractées généralement en 1 série, étroites, la série principale parfois accompagnée de plus petites; réceptacle nu, plat ou concave. Fleurs pistillées marginales; fleurs parfaites centrales, pareilles aux fleurs pistillées fertiles. Corolle tubulaire, blanche ou verdâtre; anthères obtuses à la base. Akène étroit, angulé ou strié; aigrettes abondantes, voyantes, formées de soies allongées, molles, blanches.

E. hieracifolia (L.) Raf. «Côté soleil.»

Emilia Cass.

Herbes grêles, annuelles ou vivaces, avec feuilles alternes. Capitules discoïdes, plutôt petits, solitaires ou agrégés; involucre très simples, en forme de coupe; bractées externes absentes; fleurons tous bisexués. Akène avec 5 angles aigus ciliés.

E. sonchifolia (L.) P. DC.

E. sagittata (Vahl.) P. DC.

Herodotia Urb.

Plantes sarmenteuses, glabres. Feuilles opposées, à pétioles courts, serru-
 lées, penninerves. Inflorescence terminale subcorymbeuse; capitules homoga-
 mes, discoïdes; fleurs 2-3, toutes hermaphrodites, fertiles; involucre sub-
 cylindriques; bractées 4, libres, imbriquées, herbacées, 3-5 nervures; récep-
 tacle plane, nu. Corolle tubulaire; anthères exertes, presque libres, non
 appendiculées à la base; ligules oblongues, obtuses; stigmate tronqué, courte-
 ment pennicillé. Akène comprimé, glabre; aigrette avec soies nombreuses,
 libres, bisériées, légèrement denticulées.

H. haïtiensis Urb. et Ekm.

H. mikainoides Urb. et Ekm.

Senecio L.

Herbes, sous-arbrisseaux ou arbrisseaux, parfois grimpants ou volubiles. Feuilles alternes ou parfois toutes basilaires. Capitules solitaires ou agrégés, de couleur variée, généralement radiés; les fleurs en rayons fertiles ou rarement absentes; les fleurs en disque tubulaires, parfaites, pentadentées. Bractées involucreales en 1 série, généralement renforcées à la base par des bractées plus courtes ou bractéoles ayant l'apparence d'un calice. Akène généralement cylindrique et muni de côtes; aigrette formée de soies molles blanchâtres, souvent abondantes.

- S. haïtiensis* Krug. et Urb.
- S. trineurus* Griseb.
- S. lucens* (Poir.) Urb.
- S. picardæ* Krug. et Urb.
- S. fuertesii* Urb.
- S. plumbeus* Griseb.
- S. constanzæ* Urb.
- S. vulgaris* L.
- S. cancellatus* (Rud) P. DC.
- S. hotteana* Urb. et Ekm.
- S. buchii* Urb.
- S. stenodon* Urb.

Tribu 9. CYNAREÆ

- x. Réceptacle charnu *Cynara*, p. 396
- x. Réceptacle non charnu *Cirsium*, p. 396

Cirsium Scop.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles plus ou moins épineuses. Capitules homogames, rarement hétérogames; fleurs en rayons stériles, plutôt petits — grands, solitaires ou en panicules. Involucre épineux; bractées internes généralement inermes; fleurs pourpres ou jaunâtres, rarement blanchâtres. Fruit glabre, lisse ou rarement muni de côtes, généralement quelque peu comprimé, quadrangulaire, les soies de l'aigrette duvetées.

- C. mexicanum* P. DC.

Cynara L.

Herbes à feuilles disséquées, distinguées par les bractées charnues de l'involucre comestible.

- C. scolymus* L. «Artichaut.» Alimentaire.

Tribu 10. MUTISIEÆ

- x. Corolles toutes régulières *Anastrophia*, p. 396
- x. Corolles toutes bilabées:
 - 2x. Branche du style non tronquée:
 - 3x. Tige ramifiée, couverte de feuilles; capitules nombreux *Proustia*, p. 397
 - 3x. Tige non ramifiée; feuilles presque toujours basilaires. Capitule, 1 seul *Chaptalia*, p. 397
 - 2x. Branche du style tronquée *Trixis*, p. 397

Anastrophia Don.

Arbrisseaux avec feuilles dentées, les dents épineuses. Capitules moyens — grands, homogames, terminaux sur les rameaux. Bractées de l'involucre pointues. Styles bilobés. Fruit soyeux — poilu. Aigrettes de soies en 2 séries.

- A. picardæ* Urb.
- A. oligantha* Urb.

- A. buchii* Urb.
- A. rosei* Britton.
- A. tortuensis* Urb.

Proustia Lag.

Arbrisseaux en partie épineux. Capitules plutôt petits, en panicules homogames; involucre ovoïdes, de beaucoup de bractées, en plusieurs séries. Corolle bilabée, lèvre inférieure tridentée, lèvre supérieure bilobée, rarement entière; stigmate bilobé, recourbé, avec des poils sur la partie inférieure. Aigrette de soies en plusieurs séries.

- P. crassinervis* Urb.
- P. stenophylla* Urb. et Ekm.

Chaptalia Vent.

Herbes tomenteuses, avec feuilles basilaires; tige aphyllé, environnée de bractées. Capitules hétérogames radiés, solitaires et terminaux; involucre de nombreuses fleurs; bractées étroites en quelques séries, les séries internes de plus en plus grandes. Fleurs en rayons femelles, fertiles, ligules parfois rose pourpre; fleurs en disque parfaites, entièrement ou partiellement neutres. Corolles blanches ou pourpres, plus ou moins bilabées; corolle externe avec 3 lobes à lèvre inférieure; corolle interne avec 2 lobes. Akènes pentanerves, en forme de colonne ou fusiformes; aigrette de nombreuses arêtes molles.

- C. nutans* (L) Polakowsky.
- C. dentata* (L) Cass.
- C. leiocarpa* (P. DC.) Urb.
- C. angustata* Urb.
- C. eggersii* Urb.
- C. membranacea* Urb.

Trixis Gmel.

Arbrisseaux, rarement herbes, avec feuilles alternes, entières ou dentées. Capitules cymeuses ou paniculées, jaunes; involucre doubles; les bractées externes, très peu, généralement plus courtes, linéaires, herbacées; les bractées internes 5-10, égales, subherbacées. Toutes les fleurs parfaites avec corolle bilabée, lèvre externe tridentée, lèvre interne avec 2 fentes; anthères caudées à la base. Akène subcylindrique, papilleux; aigrette formée de nombreuses soies généralement brunes.

- T. radialis* (L.) Lag.
- T. divaricata* (H. B. K.) Spreng.
- T. antimenorrhoea* (Schrank) Mart.

Tribu 11. CICHORIEÆ

- x. Aigrette absente *Lampsana*, p. 398
- x. Aigrette présente:
 - 2x. Les poils de l'aigrette disposés comme les barbes d'une plume:
 - 3x. Bractées de l'involucre en plusieurs rangées de longueur inégale *Leontodon*, p. 398
 - 3x. Bractées de l'involucre en une rangée, de longueur approximativement égale *Tragopogon*, p. 398
 - 2x. Les poils de l'aigrette simples, durs au toucher:
 - 3x. Akènes fortement muriqués au dessus *Taraxacum*, p. 398
 - 3x. Akènes non muriqués au dessus:
 - 4x. Akènes plats ou un peu plats:
 - 5x. Fleurs 50 ou plus dans chaque capitule. Akènes rostrés *Sonchus*, p. 398

- 5x. Fleurs 6-30 dans chaque capitule.
 Akènes généralement rostrés *Lactuca*, p. 398
 4x. Akènes en forme de colonne, grêles *Hieracium*, p. 399

Lampsana L.

Herbes grêles annuelles, branchues. Feuilles angulées, ou dentées. Capitules petits, en panicules peu compactes; fleurs 8-12, jaunes; involucre cylindrique; bractées 8, dressées, une courte série externe présente aussi; réceptacle nu. Akène oblong; aigrette absente.

L. communis L.

Leontodon L.

Herbes basses et vivaces, acaules, avec des feuilles basilaires, dentées ou pinnatifides, et des hampes portant 1 ou plusieurs capitules jaunes. Capitules de nombreuses fleurs; involucre légèrement imbriqué, mais avec plusieurs bractéoles à la base. Akènes fusiformes, striés, tous pareils; aigrette persistante, composée de soies plumeuses qui sont élargies et aplaties vers la base, avec parfois une couronne externe paléacée. Réceptacle non paléacé.

L. taraxacoïdes (Will.) Mérat.

Tragopogon L.

Plantes herbacées dressées, glabres, annuelles ou vivaces avec des feuilles étroites en forme d'herbes. Fleurs pourpres, roses, violettes ou le plus souvent jaunes, disposées en grands capitules; involucre cylindrique ou presque cylindrique, avec des bractées de longueur approximativement égale en une seule rangée; anthères sagittées; les branches du style grêles. Fruit de 5-10 côtes, le plus souvent rostré; aigrettes composées, poils plumeux, en une seule série.

T. scorzonerifolius L.

Taraxacum Hall.

Herbes vivaces. Feuilles radicales, pinnatifides ou roncinnées. Fleurs jaunes. Capitules de nombreuses fleurs, grands, solitaires, sur une hampe creuse et grêle. Involucre double; l'externe formé de bractées, l'interne avec de longues bractées dressées en une seule rangée. Akène oblong — ové — fusiforme, muni de 4-5 côtes grossières. Sommet du fruit développé en un bec très grêle, portant une aigrette, blanche, molle et capillaire.

T. vulgare (Lam.) Schrank.

T. officinale Weber.

Sonchus L.

Herbes grossières, à tiges feuillues, principalement lisses et glauques, avec des capitules en corymbes ou en ombelles de fleurs jaunes. Capitules de nombreuses fleurs, turgescents à la base; involucre plus ou moins imbriqué. Akène obcomprimé, muni de côtes ou strié, non rostré; aigrette abondante, de soies très blanches, molles et fines.

S. oleraceus L. «Chicorée marron.» Médicinal.

S. asper L.

Lactuca L.

Herbes. Feuilles alternes, variables, souvent pinnatifides. Capitules petits, en longues panicules irrégulières, les fleurs en rayons blanches, jaunes, roses ou bleues; involucre cylindrique, avec plusieurs séries de bractées imbriquées, dont les externes sont courtes; réceptacle plat et nu; les fleurs en rayons peu — nombreuses, tronquées, mais pentadentées au sommet. Akène plat, avec

3-5 côtes; aigrette molle, mince, blanche ou brune, élevée sur un bec long ou court.

L. canadensis L.

L. sativa L. «Laitue.» Alimentaire et médicinal.

L. intybacea Jacq. «Chicorée.» Alimentaire et médicinal.

Hieracium L.

Herbes vivaces, souvent hirsutes, avec des tiges généralement feuillues et une touffe rosulée de feuilles basilaires. Feuilles souvent dentées, mais jamais profondément lobées. Capitules disposés en panicules variées ou rarement solitaires; réceptacle, généralement nu. Akène oblong ou en forme de colonne, couronné par une aigrette rigide généralement brunâtre.

H. gronovii L.

H. gronovii L. Subspec. *domingense* Zahn.

H. gronovii L. Var. *normale* Zahn, Var. *pinetorum* Zahn, Var. *glabrescens* Zahn, Var. *virescens* Zahn, Var. *alpestre* Zahn, Var. *subvenosum* Zahn.

H. pennsylvanicum E. Fries.

GLOSSAIRE

A

Acaule ou **acaulescent**—Se dit d'une plante qui n'a pas de tige apparente.

Accombant—Se dit de la partie d'un végétal couchée sur une autre partie.

Accrescent—Qui continue après la fécondation à s'accroître jusqu'à la maturité du fruit.

Actinomorphe—Se dit des fleurs régulières, capables de se diviser en 2 ou plusieurs plans en des moitiés semblables.

Aculéiforme—En forme d'aiguillon.

Acuminé—Elevé en forme de cône, pointu.

Acutangulé—Qui a des angles aigus.

Adné—Toute partie attachée à une autre et qui semble faire corps avec elle.

Adventif—Organe qui se développe dans un point où l'on ne trouve pas d'organe de même nature.

Agame—Plantes dépourvues d'étamines et de pistils.

Aigrette—Se dit de la réunion des poils ou des appendices de formes variées qui couronnent le fruit ou accompagnent la graine.

Akène ou **achaine**—Fruit sec, indéhiscent, uniloculaire, uniovulé et dont le péricarpe n'est pas soudé à la graine.

Albumen—Réserve nutritive renfermée dans la graine.

Aliforme—En forme d'aile.

Amphitrope—Embryon dont les 2 extrémités sont recourbées.

Amplexicaule—Se dit des feuilles, branches, pétioles, stipules etc. lorsqu'ils embrassent la tige.

Anatrope—Ovule dont le micropyle est placé près du hile, tandis que la chalaze est à l'autre extrémité.

Ancipité—Qui a deux tranchants comme un glaive.

Androcée—Ensemble des étamines constituant le troisième verticille floral.

Androgynophore—Qui porte à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles dans la même inflorescence.

Anémophile—Se dit des plantes qui doivent leur fécondation à l'action du vent.

Anguiforme—En forme de serpent.

Angulé—Pourvu d'angles.

Angustifolié—Qui a des feuilles très étroites.

Annelé—Pourvu d'anneaux.

Anthère—Petit sac situé à la partie supérieure de l'étamine et qui renferme le pollen.

Anthérifères—Qui porte des anthères.

Anthèse—Epanouissement de la fleur qui donne issue au pollen.

Anthocarpe—Fruit formé par le fruit proprement dit et des organes floraux.

Antitrope—Embryon qui a une direction contraire à celle de la graine.

Apétale—Qui n'a pas de pétales.

Aphyllé—Qui n'a pas de feuilles.

Apical—Qui a rapport au sommet.

Apiculé—Terminé au sommet en pointe courte, aiguë et peu consistante.

Apocarpé—Se dit des fruits formés de carpelles distincts et libres.

Apophyse—Eminence qui s'élève à la surface d'un organe et qui fait corps avec lui.

Appendice—Nom donné généralement à tous les organes latéraux par opposition à l'axe.—S'applique dans un sens plus restreint aux écailles qui entourent quelquefois l'ovaire, et aux autres prolongements des organes floraux ou foliaires.

Appendiculé—Pourvu d'appendices.

Aptère—Dépourvu d'ailes.

Arénaire—Qui croît dans le sable.

Arête—Filet sec, grêle, roide qui termine souvent les glumes et les glumelles des plantes de la Famille des Poaceae ou Graminées; vulgairement appelé Barbe.

Arille—Tégument accessoire qui dans certaines plantes, se développe au voisinage du hile.

Arillé—Qui est pourvu d'un arille.

Aristé—Qui est muni d'un appendice en forme d'arête.

Articulaire—Se dit des feuilles qui naissent des nœuds ou articulations de la tige ou de ses ramifications.

Ascendant—Se dit de tous les organes qui sont coudés à la base, puis redressés.

Asperme—Dépourvu de graines ou semences.

Aspérifolié—Avec des feuilles rugueuses.

Atténué—Se dit des parties d'une plante qui diminuent de la base au sommet ou du sommet à la base.
Auriculé—Qui a des appendices en forme d'oreilles sur deux côtés opposés.

B

Baccifère—Qui produit des baies.
Bacciforme ou **baccaire**—En forme de baie.
Baie—Fruit charnu, indéhiscant, qui ne renferme pas de noyau, mais une ou plusieurs graines.
Barbe—Arête ou filet qu'on remarque sur certaines fleurs ou certains fruits. Chez les Poacées, prolongement filiforme, roide, coriace, naissant brusquement sur le dos ou au sommet des valves de la glume ou quelquefois simple prolongement d'une des nervures.
Barbu—Pourvu de barbe.
Bicapsulaire—Fruits composés de 2 carpelles analogues à des capsules.
Bicuspidé—Fendu au sommet de manière à former 2 pointes.
Bidenté—Qui porte 2 dents.
Bidigité—Ayant 2 folioles à l'extrémité comme un pétiole.
Bifarié—Disposé sur 2 séries ou rangées opposées.
Bifide—Fendu en 2 parties séparées par un angle aigu assez profond.
Biflore—Qui porte ou renferme 2 fleurs.
Bifolié—Qui porte 2 feuilles.
Bifoliolé—Se dit des feuilles composées de 2 folioles.
Bifurqué—Divisé en 2 branches.
Bigéminé—Se dit en particulier des feuilles dont le pétiole commun se divise en 2 pétioles secondaires; portant chacun une paire de folioles.
Bijugué—Se dit des feuilles composées qui présentent 2 paires de folioles.
Bilabié—Corolle ou calice divisé en 2, de manière à figurer 2 lèvres.
Bilamellé—Se dit des organes qui présentent 2 lamelles.
Bilatéral—Qui peut être séparé par un plan médian en 2 sections symétriques.
Biligulé—Qui est muni de 2 ligules ou appendices en forme de bandelette.
Bilobé—Divisé en 2 lobes.
Biloculaire—Divisé en 2 loges.
Bimarginé—Qui présente 2 marges ou bords ailés.

Biparti, ite—Se dit d'un organe divisé en 2 segments jusqu'à partie de sa base.
Bipennatifide ou **bipinnatifide**—Se dit des feuilles partagées en 2 lobes latéraux, atteignant presque jusqu'à la nervure moyenne et divisés eux-mêmes comme une feuille pinnatifide.
Bipennatissequé—Se dit des feuilles dont les nervures sont pennées et dont le limbe est divisé en 2 lobes.
Bipétalé—Qui a 2 pétales.
Bipinné ou **bipenné**—Se dit des feuilles composées dont le pétiole commun porte de chaque côté, un certain nombre de pétioles secondaires sur lequel les folioles sont rangées comme dans une feuille pennée.
Birostré—Qui porte 2 becs.
Bisériel—Disposé sur 2 rangs ou en 2 séries.
Bisexué—Qui porte des fleurs mâles et femelles.
Bractée—Toute feuille, qui étant placée au voisinage d'une fleur ou d'un groupe de fleurs, tire de cette situation une forme, une structure ou des dimensions particulières.
Bractéole—Bractée d'ordre secondaire.
Bractéolé—Pourvu de bractéoles.

C

Calice—Enveloppe externe des fleurs qui porte les sépales.
Caliciforme—En forme de calice.
Calicule—Calice supplémentaire qui enveloppe certaines fleurs.
Campanulé—En forme de cloche.
Campylotrope—Se dit d'un ovule dont l'axe est courbé de telle sorte que le micropyle soit rapproché du hile.
Capité—Se dit de tout organe terminé en tête arrondie.
Capitule—Inflorescence dans laquelle l'axe porte sur son sommet renflé un grand nombre de fleurs sessiles, rapprochées côte à côte.
Capréolé—Contourné à la façon des vrilles.
Capsule—Tous les fruits à péricarpe sec et déhiscant, renfermant plusieurs graines.
Carène—Nom donné aux pétales inférieurs des fleurs papilionacées qui simulent la carène des vaisseaux.
Caréné—Qui porte les carènes.
Caroncule—Renflement charnu qui entoure le hile de certaines graines.
Carpelle—Organe foliaire primitif de l'ovaire d'une fleur et son fruit.

Carpophore—La partie du réceptacle prolongé entre les carpelles sous forme d'un axe central.
Caulescent—Qui est muni d'une tige ou qui a l'aspect d'une tige.
Chaton—Sorte d'inflorescence ou d'épi de fleurs unisexuées dont les étamines ou les pistils sont protégés par de simples écailles, soit par l'absence totale du périanthe, soit par sa réduction à un calice écailleux.
Choripétale—Ayant des pétales distincts.
Cil—Poils ou filaments qui naissent sur les bords d'une partie quelconque d'une plante.
Cilié—Garni de cils.
Circiné—Enroulé en forme de crosse.
Circumscissile—Qui s'ouvre comme s'il était coupé circulairement.
Cirriforme—En forme de cirre ou de vrille.
Clavé—En forme de massue, c'est-à-dire qui va en grossissant de la base au sommet.
Claviforme—En forme de massue.
Clinandrium ou **clinandre**—Cavité située au sommet du gynostème de certaines Orchidacées et formant une fossette dans laquelle se loge l'anthère.
Clypéiforme—En forme de bouclier.
Coalescent—Pièces unies, soudées en une masse où se confondant.
Coccifère—Portant ou produisant des baies.
Cochléariforme—Qui a la forme d'une cuiller.
Commissure—Ligne de jonction des 2 carpelles chez les Umbellifères.
Connectif—Partie de l'anthère qui unit les 2 paires de sacs polliniques.
Connivent—Qui tend à se rapprocher.
Contordu ou **contorsile**—Dont le support est susceptible de torsion.
Convoluté—Se dit de tout organe enroulé sur lui-même en spirale ou en cornet.
Coque ou **cocci**—Fruit multiloculaire à loges closes, déhiscantes.
Corona—Tout corps qui intervient entre la corolle et les étamines.
Côte—Nom vulgaire de la nervure médiane des feuilles.—Chacune des lignes saillantes du fruit des Umbellifères.—Saillies qui se trouvent sur les ovaires et les fruits.
Corymbe—Inflorescence indéterminée dans laquelle les pédoncules sont d'autant plus courts qu'ils partent de plus haut de manière que toutes les fleurs sont situées à peu près dans le même plan.

Couronne—Réunion des appendices libres ou soudés qui surmontent la gorge de la corolle ou du périanthe.—Ensemble des fleurs occupant la circonférence d'un capitule.
Crénelé—Pourvu de crénélures, c'est-à-dire de dents obtuses, arrondies sur les bords des organes foliacés.
Cunéiforme—En forme de coin.—Se dit des organes qui vont en s'élargissant de la base au sommet.
Cupule—Sorte de petite coupe plus ou moins ouverte qui enveloppe la base du fruit chez certains végétaux.
Cuspidé—Ayant un bout pointu.
Cyathium—Inflorescence qui comprend les bractées involucrales avec des glandes entre les étamines qui équivalent chacune à une fleur mâle et un ovaire triloculaire.
Cymbiforme—En forme de nacelle.
Cyme—Inflorescence dont l'axe est terminé par une fleur au dessous de laquelle il émet un rameau latéral ou 2 rameaux opposés.

D

Décidu—Qui se détache de bonne heure, se dit par opposition à persistant.
Décliné—Se dit par opposition à ascendant, des organes qui se dirigent en bas et en dehors et particulièrement des étamines et des pistils.
Décomposé—Se dit des feuilles partagées en nombreuses divisions ou folioles portées par les nervures secondaires.
Décussé—Se dit des feuilles opposées dont les paires successives se croisent à angle droit.
Défléchi—Synonyme de Recourbé. Se dit de certains organes qui, après s'être élevés à une certaine hauteur, décrivent un arc et retombent vers le sol.
Deltaïde—Ayant à peu près la forme d'un delta.
Diadelphie—Réunion des filets des étamines en 2 faisceaux.
Dichotome—Bifurqué.
Dichotomique—Qui se bifurque, qui se divise et se subdivise de 2 en 2.
Didyme—Qui se trouve par paire; divisé en 2 lobes.
Didynme—Se dit des étamines au nombre de 4 dont 2 longues et 2 courtes.
Dioïque—Se dit d'une espèce végétale chez laquelle les fleurs mâles et les fleurs femelles ou, d'une manière plus générale, les organes mâles et les organes femelles sont portés sur des pieds différents.

Dispermatique—Synonyme de Disperme. Qui contient 2 graines.
Disciforme—Qui est plat et arrondi comme un disque.
Discoïde—Qui a 2 faces planes parallèles et un bord circulaire.
Disque—Bourrelet qui dans certaines fleurs, entoure la base de l'ovaire. Portion centrale du capitule chez les Composées-radiées. Partie centrale et circulaire qui dans les fleurs radiées, porte les fleurs.
Divariqué—Se dit de 2 pièces contiguës à la base et très écartées à l'extrémité.
Divergent—Se dit des parties des plantes qui partant d'un point commun, s'en écartent en formant une sorte de cône ou d'éventail.
Dorsifixe—Se dit d'une anthère fixée à l'extrémité du filet par sa face dorsale.
Drupacé—Qui ressemble ou qui se rapporte à la drupe ou qui a pour fruit une drupe.
Drupe—Fruit à noyau.

E

Echiné—Hérissé ou recouvert de poils ou de pointes dures et piquantes.
Eglandulaire ou **églanduleux**—Dépourvu de glandes.
Emarginé—Qui est échancré superficiellement et à l'extrémité.
Endosperme—Tissu de réserve qui accompagne l'embryon à l'intérieur de la graine.
Ensiforme—Qui a la forme d'une épée.
Eperon—Saillie par laquelle se termine le calice ou la corolle de certaines fleurs.
Epi—Partie terminale de la tige des Poacées, portant, groupées autour d'un axe les graines de la plante. Inflorescence dérivée de la grappe, dans laquelle les pédoncules floraux sont si courts que les fleurs semblent insérées directement sur l'axe de l'inflorescence.
Epicarpe—Membrane qui revêt extérieurement le péricarpe.
Epigé—Qui se développe au dessus du sol.
Epigyne—Se dit d'une étamine insérée sur l'ovaire, ce qui arrive lorsque celui-ci est infère ou adhérent.
Épillet—Ensemble des petits épis secondaires dont la réunion constitue l'épi composé.
Epiphyte—Végétal qui vit fixé sur un autre sans lui emprunter d'éléments nutritifs.

Epipétale—Qui croît sur les pétales ou sur la corolle.
Epitrope—Se dit d'un ovule anatrope avec son raphé tourné derrière quand il est ascendant ou donnant face à l'axe principal quand il est suspendu.
Etendard ou **vexillum**—Pétale supérieur de la corolle d'une papilionacée, dressé et étalé à la façon d'un étendard.
Exerti—Saillant, qui dépasse les parties environnantes.
Exocarpe—Couche externe d'un péricarpe.
Extorse—Se dit par opposition à intorse, des anthères qui s'ouvrent vers l'extérieur de la fleur.

F

Fasciculé—Réuni en touffe ou faisceau.
Filiforme—En forme d'un fil.
Fimbrié—Muni d'appendice filiforme interposé aux fleurs à la surface d'un réceptacle.
Flabellé—En forme d'éventail.
Flexueux—Courbé alternativement dans deux sens différents; ondulé.
Foliole—Se dit de chaque division du limbe d'une feuille composée.
Foliolé—Qui est composé ou muni de folioles.
Follicule—Fruit à péricarpe sec et déhiscent ordinairement polysperme; provenant d'un carpelle clos et s'ouvrant à sa maturité par une fente unique qui passe entre les 2 rangées de graines.
Frutescent—Se dit des plantes à tiges ligneuses; ordinairement ramifiées dès la surface du sol.
Fruticuleux ou **fruticuleux**—Ayant l'aspect d'un arbrisseau.
Funicule—Cordon qui rattache l'ovule au placenta de l'ovaire.

G

Gaine—Base élargie des feuilles enveloppant la tige dans une partie de sa longueur.
Gamopétale—Se dit d'une corolle à pétales concrescents.
Geminiflore—Dont les fleurs sont disposées 2 à 2.
Gibbeux—Qui est bossu, muni d'une bosse.
Glabre—Dépourvu de poils.
Glande—Organe destiné à sécréter des sucs particuliers.
Glandulaire—Qui a l'aspect, la forme et la texture d'une glande.

Glanduliforme—Qui a la forme d'une petite glande.
Globulaire—De forme sphérique.
Glochidé—Qui a des poils disposés en glochide.
Glochidia ou **glochide**—Poils ou soies en forme de barbe.
Glomérule—Inflorescence contractée qui ressemble au capitule, mais qui est une cyme à fleurs sessiles différent du capitule par son développement centrifuge.
Glume—Une des bractées verdâtres qui enveloppe extérieurement un épillet de Poacées.
Glumelle—Une des deux bractées verdâtres qui enveloppent immédiatement chaque fleur à l'intérieur d'un épillet de Poacées.
Glumellule—Une des paillettes presque incolores et transparentes qui paraissent représenter les rudiments d'un périlanthe dans une fleur de Poacées.
Grappe ou **raceme**—Assemblage de fruits ou de fleurs disposés par étages et portés par des pédoncules attachés à un axe commun.
Gynécée—Voir Pistil.
Gynobaque—Qui part de la base du pistil, c'est-à-dire du fond de la profonde dépression qui sépare les 2 carpelles.
Gynophore—Sorte de pédicelle au sommet duquel est porté le pistil.
Gynostégium—Couronne staminale chez les Asclepiadaceae.
Gynostémium ou **gynostème**—Organe résultant chez certaines plantes à ovaire infère, d'une concrescence qui se poursuit entre l'androcée et le gynécée au dessus du niveau auquel le calice et la corolle reprennent leur indépendance.

H

Hampe—Axe florifère allongé, terminé par une fleur unique ou un groupe de fleurs et dépourvu de feuilles dans toute sa partie inférieure.
Hermaphrodite—Fleurs qui renferment à la fois l'androcée et le gynécée.
Hespéridie—Sorte de fruits charnus dont l'orange, le citron, les chadèques sont des exemples.
Hile—Cicatricule laissée à la surface extérieure de la graine par la rupture du funicule. Dans l'ovule, point d'insertion du tégument sur le funicule.

Hispidé—Se dit des surfaces végétales couvertes de poils.
Hispiduleux—Un peu velu et hérissé.
Hyalin—Transparent ou diaphane.
Hypanthium ou **hypanthe**—Partie inférieure du calice.
Hypocratériforme—Se dit d'une corolle gamopétale, régulière, tubulée dont le tube, assez long, se continue par un limbe plan ou peu concave.
Hypogé—Se dit des cotylédons qui restent sous la terre lors de la germination; se dit aussi des plantes dont les fruits s'enfoncent dans le sol pour achever leur maturité.
Hypogyne—Se dit plus spécialement d'une étamine insérée directement sur le réceptacle, au dessous de l'ovaire.

I

Imbriqué—Se dit des organes placés en recouvrement les uns sur les autres comme les tuiles d'un toit.
Imparipenné ou **imparipinné**—Se dit des feuilles pennées qui se terminent par une foliole impaire.
Incombant—Se dit des cotylédons d'un embryon quand l'axe de ce dernier (radicule et tigelle) se relève et s'applique contre la face dorsale de l'un d'eux.
Indupliqué—Se dit quand les bords des sépales ou des pétales se replient en dedans.
Inerme—Qui n'a pas d'épines ou d'aiguillons.
Infère ou **adhérent**—Se dit d'un ovaire situé au dessous du plan d'insertion apparente des pièces florales appartenant aux verticilles plus externes.
Inflorescence—Mode de groupements des fleurs d'une plante ou ensemble des fleurs ainsi groupées.
Infundibuliforme—Dont la forme rappelle celle d'un entonnoir.
Intorse—Se dit d'une anthère dont les fentes de déhiscence sont tournées du côté de l'intérieur de la fleur.
Involucelle—Involucre secondaire qu'on observe notamment dans les ombelles composées.
Involucre—Ensemble de bractées, d'organes foliacés rapprochés autour de la base d'une fleur ou d'une inflorescence.

J

Jonciforme—Qui a la forme ou l'aspect d'un jonc.

L

- Labelle** ou **labellum**—Pétale supérieur de la corolle des Orchidacées qui par suite de la torsion du pédicelle floral, occupe la partie inférieure de la fleur et offre la plus grande variété de formes.
- Lacinié**—Se dit d'un organe qui offre des incisions profondes à sommet aigu.
- Lanifère**—Qui est couvert d'une matière laiteuse ou cotonneuse.
- Lanugineux**—Qui est chargé de duvets, qui est de la nature de la laine.
- Lemma**—Glume fertile d'une Poacée.
- Lèvre**—Nom donné aux deux lobes principaux d'une cavité ou d'une corolle bilabée ou personnée.
- Loculaire**—Qui est partagé en plusieurs loges.
- Loculicide**—Qui s'ouvre par le milieu de chacune de ses loges.
- Lomentacé**—Se dit du fruit des Légumineuses quand il est divisé par des cloisons transversales en une série d'articles monospermes.
- Lyraté** ou **lyré**—Dont la forme rappelle celle d'une lyre, (une feuille lyratée est une feuille pinnatifide avec les lobes d'autant plus grands qu'ils sont plus élevés).

M

- Marcescent**—Se dit d'un organe qui se flétrit sur la plante, sans s'en détacher.
- Marginé**—Pourvu d'un bord coloré, d'une marge.
- Méricarpe**—Nom pour désigner les fruits partiels des Umbellifères.
- Micropyle**—Petit orifice par lequel les tubes polliniques pénètrent jusqu'au nucelle.
- Monadelphé**—Se dit des étamines concrescentes par leurs filets en un seul faisceau.
- Monocarpe**—Qui ne produit qu'un fruit ou n'en porte qu'un.
- Monoïque**—Se dit d'une plante à fleurs unisexuées dans laquelle les fleurs mâles et les fleurs femelles sont réunies sur le même pied.
- Monosperme**—Qui ne renferme qu'une seule graine.
- Mordicant**—Acre et produisant un picotement par son action corrosive.
- Mucroné**—Muni d'une petite pointe.
- Multifide**—Se dit des parties fendues à peu près jusqu'à leur moitié en lanières étroites.
- Multiovulé** ou **pluriovulé**—Qui renferme un grand nombre d'ovules.

Multisperme ou **plurisperme**—Qui renferme plusieurs semences.

N

Nutant—Se dit des végétaux et des parties de végétal dont le sommet est légèrement incliné vers le sol.

O

- Obcomprimé**—Se dit de l'ovaire et des graines quand leur plus grand diamètre est de droite à gauche.
- Obové** ou **obovoïde**—Qui a la forme d'un œuf dressé sur son petit bord.
- Obsolète**—Presque effacé ou très peu marqué.
- Ochrea** ou **ocréa**—Graine complète qui existe à la base du pétiole de certaines plantes.
- Ocréiforme**—De la forme d'un ocréa.
- Ombelle**—Mode d'inflorescence caractérisé par des axes secondaires qui partent d'un même point de l'axe central.
- Ombellé**—Disposé en ombelle ou en parasol.
- Ombelliforme**—Qui a la forme d'une ombelle.
- Opercule**—Pièce foliacée qui recouvre un orifice.
- Operculé**—Muni d'opercule.
- Onglet**—Partie inférieure et rétrécie de certains pétales.
- Onguiculé**—Pourvu d'un onglet.
- Orbiculaire**—Qui est de forme sphérique, circulaire.
- Orthotrope**—Se dit d'un ovule dans lequel les centres du micropyle, de la chalaze et du hile sont en ligne droite.
- Oscillant** ou **versatile**—Se dit des anthères qui tiennent au filet par un très petit point et s'y soutiennent comme en équilibre, exécutant autour de ce petit point des mouvements alternatifs.

P

- Palea**—Lame surmontant le fruit des Compositées ou garnissant leur réceptacle. Glumelle des Poacées.
- Paleacé**—Qui est muni de paillettes.
- Paléole**—Petite glumelle.
- Palmé**—Se dit d'un organe dont les éléments sont disposés en divergeant comme les doigts autour de la main ou comme les rayons d'un éventail.
- Palminerve**—Se dit d'une feuille à nervation palmée.
- Palmiparti, ite**—Se dit d'un organe foliacé à nervures palmées et à découpures aiguës séparées par des sinus très profonds.

- Panicule**—Grappe d'épillets simple ou composée ou inflorescence à axe principal portant des rameaux, eux-mêmes ramifiés, mais moins longs.
- Papilleux**—Parsemé de papilles.
- Papyracé**—Qui a la nature, la consistance du papier ou qui en a la minceur.
- Pauciflore**—Qui ne porte que peu de fleurs.
- Pédicelle**—Rameau qui porte une fleur à son extrémité.
- Pédicellé**—Qui porte un pédicelle.
- Pédoncule**—Organe interne et allongé supportant un autre organe.—Axe supportant les pédicelles.
- Pelté**—Qui a la forme d'un bouclier.
- Pénicillé**—Qui est en forme de pinceau.
- Pennatifide** ou **pinnatifide**—Se dit d'une feuille pennée dont chaque moitié est découpée en lobes aigus.
- Pennatiséqué**—Se dit des feuilles qui diffèrent des pennatifides en ce que les lobes s'étendent jusqu'à la nervure médiane.
- Pennée** ou **pinnée**—Se dit des feuilles composées de folioles disposées autour d'un axe médian à la manière des barbes d'une plume.
- Penninerve**—Se dit d'une feuille dont la nervation est pennée.
- Pentalobé**—Qui est divisé en 5 lobes.
- Pentaloculaire**—Qui est divisé en 5 loges ou compartiments.
- Pentamère**—Qui a 5 divisions.—Se dit d'une fleur construite sur le type de 5.
- Péponide**—Nom que l'on donne aux fruits des Cucurbitacées.
- Périanthe**—Enveloppe de la fleur, souvent différenciée en calice et en corolle.
- Péricarpe**—Enveloppe du fruit.
- Pétale**—Nom de chacune des pièces foliacées de la corolle.
- Pétaloïde**—Qui ressemble aux pétales par l'aspect et la couleur.
- Pistil** ou **gynécée**—Organe femelle des Phanérogames.
- Pistillé** ou **pistillaire**—Qui a rapport au pistil.
- Pistillodium**—Organes floraux changés en carpelles.
- Plumeux**—Couvert de petites plumes.
- Plurilobé**—Formé de plusieurs lobes ou partagé en plusieurs lobes.
- Pluriloculaire**—Qui renferme plusieurs loges.
- Pluriovulé**—Qui renferme plusieurs ovules.
- Pluripétale** ou **pluripétalé**—Composé de plusieurs pétales.

- Plurisérié**—Composé de plusieurs rangs ou séries.
- Pollen**—Poussière contenue dans les sacs de l'anthère.
- Pollinie** ou **pollinide**—Masse formée par des grains de pollen soudés entre-eux et qui ne peuvent se disséminer.
- Polygame**—Se dit des plantes qui portent des fleurs hermaphrodites et des fleurs unisexuées, soit sur le même pied, soit sur des pieds différents.
- Pontiforme**—En forme de point.
- Procombant**—Se dit des tiges qui restent étendues sur la terre et ne jettent pas de racines.
- Proterogyne**—Fleurs hermaphrodites chez lesquelles la maturation du pistil devance celle des étamines.
- Pseudo-bulbe**—Sorte de tubercule qui naît aux entre-nœuds chez diverses Orchidacées.
- Pseudocarpe**—Fruit qui ressemble à une baie, mais qui est un cône de forme globuleuse.
- Pubescent**—Garni de poils fins et courts.
- Putamen**—Noyau de fruit.—Endocarpe durci d'un fruit à noyau.
- Pyrène** ou **nucule**—Fruit sec, indéhiscence à péricarpe osseux ou coriace.
- Pyriforme** ou **piriforme**—En forme de poire.
- Pyxide**—Capsule qui s'ouvre transversalement, la partie supérieure se soulevant comme un couvercle.

Q

- Quadrifide**—Qui a 4 divisions profondes.
- Quadriloculaire**—Qui présente 4 loges ou compartiments.
- Quadrilobé**—Qui a 4 lobes ou partagé en 4 lobes.
- Quadrimère**—Qui comprend 4 divisions.—Se dit d'une fleur construite sur le type de 4.
- Quadrivalve** ou **quadrivalvé**—Qui comprend 4 valves.
- Quinquéfide**—Qui a 5 divisions profondes.

R

- Racème**—Nom scientifique de la grappe.
- Racémeux**—Qui a les fleurs disposées en grappes.
- Rachis**—Axe central de l'épi des graminées, des chatons, des grappes, du régime, des Palmées. Pétiole des fleurs composées.

Radical—Qui appartient à la racine, qui en provient ou semble en provenir.
Radicaire—Se dit des tiges qui émettent des racines sur différents points de leur longueur.
Raphé—Petit cordon qui continue le funicule et qui court entre les deux enveloppes de la graine en faisant communiquer le hile et la chalaze.
Réduptique—Se dit d'une feuille dont les deux bords s'appliquent l'un contre l'autre par la face inférieure.
Réniforme—Qui a la forme d'un rein.
Réticulé—Dont l'arrangement figure un réseau.
Révoluté—Qui est roulé en dehors et en dessous.
Rhizomateux—Qui ressemble au rhizome, qui possède un rhizome.
Rhizome—Tige oblique ou horizontale, souterraine dont les bourgeons s'élèvent au dehors pendant leur évolution complète.
Rostre—Extrémité du capuchon de certaines corolles.
Rostré—Qui est allongé en forme de bec.
Rotacé—Qui présente la forme d'une roue.

S

Sagitté—Qui présente la forme d'une flèche.
Samare—Fruit sec et indéhiscent à péricarpe prolongé en aile membraneuse.
Sarcocarpe—Nom donné au mésocarpe charnu.
Sarment—Tige ou branche ligneuse grimpante.
Sarmenteux—Qui pousse des sarments.
Scarieux—Se dit des organes membraneux, secs, minces et translucides.
Scissure—Sillon ou fente naturelle creusé à la surface de certains organes.
Scorpioïde—Recourbé en queue de scorpion.
Scutiforme—En forme de bouclier.
Septicide—Qui s'ouvre par le doublement des cloisons.
Septifrage—Mode de déhiscence des fruits dans lequel les cloisons se trouvent rompues.
Septum—Cloison membraneuse qui délimite deux cavités.
Serraté—En forme de scie.
Sétacé—Se dit de tout organe qui a la forme d'une soie de cochon.
Séteux—Qui est composé ou garni de poils roides.

Silicule—Sorte de silique dont la longueur ne dépasse pas 3 fois la largeur.
Silique—Sorte de capsule plus longue que large qui se divise par une cloison en 2 parties.
Siliciforme—En forme de silique.
Spadice—Inflorescence dont les fleurs sont enveloppées par une large bractée.
Spathe—Bractée plus ou moins développée à bords recouverts d'un côté et recouvrants de l'autre, enveloppant une inflorescence nommée spadice.
Spathé ou spathacé—Muni d'une spathe.
Spatulé—Qui a la forme d'une spatule, sorte de couteau moussé et flexible employé en pharmacie.
Spiciforme—Qui a la forme d'un épi. On dit aussi épié.
Spinescent ou spinifère—Qui est couvert d'épines ou qui en porte.
Squameux—Ecailleux, composé d'écaillies.
Squamiforme—Qui a la forme d'une écaille.
Staminal—Qui appartient ou se rapporte à l'étamine.
Staminé—Se dit des fleurs qui ne renferment que des étamines ou organes mâles.
Staminode—Étamine latérale, rudimentaire, stérile; parfois étamine incomplètement transformée en pétale.
Stellaire—Se dit des poils affectant la forme d'une étoile.
Stigmate—Portion papilleuse et plus ou moins développée qui surmonte le style ou couronne l'ovaire quand le style est absent.
Stigmatique—Qui se rapporte ou qui appartient au stigmate.
Stipelle—Petite stipule qui accompagne les folioles des feuilles composées.
Stipellé—Dont les feuilles sont garnies de stipelles.
Stipité—Se dit des organes munis d'un support ou d'une sorte de pied.
Stipule—Nom des petites dépendances de la feuille situées vers son point d'attache ou adhérentes à son pétiole.
Stipuliforme—En forme de stipule.
Stolon—Nom des bourgeons axillaires de beaucoup de plantes vivaces qui en se développant, allongent démesurément leur premier entrenœud et s'enracinent au niveau de la première feuille.

Stolonifère—Se dit des plantes qui émettent des stolons.
Strobile—Inflorescence ou fruit composé, formé par la réunion de bractées et de semences qui les accompagnent.
Strobiliforme—Qui a la forme d'un cône ou d'un strobile.
Style—Prolongement de l'ovaire surmonté par le ou les stigmates.
Styliforme—Ressemblant au style.
Stylopodium ou stylopode—Support du style.—Renflement de la base du style.
Subcaréné—Qui a la disposition d'une carène peu accentuée.
Subcaulescent—Qui a un commencement de tige peu développée.
Subcilié—Qui a des poils ressemblant un peu à des cils.
Subcordiforme—Qui approche de la forme d'un cœur.
Subfasciculé—Presque réuni en faisceau.
Subfiliforme—Qui a presque la forme d'un fil.
Subfusiforme—Qui a presque la forme d'un fuseau.
Subglobulaire—Presque globulaire.
Subépépétalé—Presque épépétalé.
Subpétaloïde—Presque pétaloïde.
Subrostré—Qui se prolonge en petit bec.
Subrotacé—Affectant presque la forme d'une roue.
Subombellé—Ayant presque la forme d'une ombelle.
Suborbiculaire—Presque rond.
Subsessile—Presque sessile.
Subulé—Droit, terminé en pointe aiguë et fine comme une alène.
Suffrutescent—Qui ressemble à un sous arbrisseau.
Sympétale—Se dit des étamines qui réunissant ensemble les pétales, donnent à une corolle polypétale, l'apparence d'une corolle monopétale.
Syzcarpe—Fruit composé de plusieurs utricules à demi soudés en une masse unique.
Syncarpé—Qui a le caractère du syncarpe.

T

Terné—Se dit des organes et particulièrement des feuilles qui se trouvent réunies par trois à leur point d'insertion.
Ternatiséqué—Se dit des feuilles à nervures pennées et dont le limbe est divisé en 3 lobes.

Test ou testa—Enveloppe ou tégument des graines.
Tétradynome—Se dit des étamines lorsqu'elles sont au nombre de 6 dont quatre plus longues que les autres.
Tétramère—Divisé en quatre parties.
Thyrsoïde—En forme de Thyrses, sorte de panicule rameuse et dressée.
Tomenteux—Recouvert de fibrilles courtes et serrées ressemblant à un duvet.
Trifide—Se dit des organes partagés en trois divisions profondes.
Triflore—Qui porte trois fleurs.
Trifolié—Dont les feuilles sont disposées par 3 au bout du pétiole.
Trifoliolé—Dont le pétiole se termine par trois folioles.
Trijugué—Se dit des feuilles pennées qui sont composées de 3 couples ou paires de folioles.
Trilobé—Divisé en trois lobes.
Triloculaire—Qui se partage intérieurement en 3 loges.
Trinervé—Se dit des feuilles qui ont trois nervures.
Triovulé—Qui a trois ovules.
Tripétale—Dont la corolle est formée de 3 pétales.
Trivalve—Qui a 3 valves.
Tube—Partie inférieure et tubuleuse des calices ou des corolles gamopétales.
Tubercule—Renflement que présente la partie souterraine de certaines plantes.
Tuberculé—Garni de tubercules.
Tuberculeux—Qui est de la nature des tubercules.
Tuberculiforme—Qui a la forme d'un tubercule.
Tubériforme—Qui a la forme d'une truffe.
Tubulaire, tubulé ou tubuleux—En forme de tube.

U

Unciforme—Qui a la forme d'un crochet.
Unciné—Qui porte un crochet, qui se termine par un crochet.
Unicapsulaire—Qui porte une seule capsule.
Unicarpellaire ou unicarpellé—Qui n'a qu'un seul carpelle.
Unicaule—Qui n'a qu'une tige.
Unicuspidé—Qui n'a qu'une pointe.
Unidenté—Qui n'a qu'une dent.
Uniflore—Qui ne porte qu'une fleur.
Unifolié—Qui ne porte qu'une seule feuille.

Unifoliolé—Qui ne porte qu'une seule foliole.

Unilatéral—Situé d'un seul côté.

Unilobé—Qui n'a qu'un lobe.

Uniloculaire—Qui n'a qu'une loge, qui n'est pas divisé en compartiments.

Uniovulé—Qui ne renferme qu'un seul ovule.

Unisériel—Qui ne forme qu'une série; qui est disposé sur un seul rang.

Unisexe—Qui n'a qu'un seul sexe.

Unisperme—Qui n'a qu'une semence.

Unistrié—Qui n'a qu'une strie.

Univalve ou univalvé—Se dit des fruits capsulaires formés d'une seule pièce—qui ne s'ouvre que d'un côté, en partant d'un péricarpe.

Urcéole—Organe en forme de sac, de godet.

Urcéolé—Renflé vers le milieu et rétréci à la partie supérieure.

Utricule—Cavité des graines de pollen qui contient le liquide fécondant—Sorte de fruit sec, monosperme, à péricarpe peu développé.

Utriculé—Qui a la forme d'une petite outre.

V

Valvacé—Indéhiscence bien que formé de valves dont la soudure est apparente.

Valvaire—Qui appartient ou qui se rapporte aux valves.

Valve—Nom donné aux pièces du péricarpe des fruits déhiscents—qui s'ouvrent au moment de la maturité, employé également pour désigner certaines parties des glumes et des spathes.

Valvé—Muni ou composé de valves.

Verruciforme—Qui a la forme d'une verrue.

Verruqueux—Dont la surface présente des excroissances en forme de verrues.

Versatile—Voir Oscillant.

Verticille—Réunion d'organes similaires insérés au même niveau autour d'un axe commun.

Vésicule—Cavité close.—Renflement plein d'air qui dans les plantes aquatiques forme une sorte de vessie natatoire.

Vésiculeux—Qui est renflé à la manière d'une vessie, d'un vésicule.

Vexillaire—Qui a la forme d'un étendard—Se dit d'un mode particulier de préfloraison dans lequel un pétale est ployé en 2 de manière à recouvrir tous les autres.

Vexillum—Voir Etendard.

Villeux—Qui est couvert de longs poils touffus.

Volubile—Se dit des plantes dont la tige grêle s'enroule autour des corps voisins.

Z

Zygomorphe—Se dit des fleurs qui sont divisibles en deux moitiés égales dans un seul plan, généralement le plan antéro-postérieur.

INDEX

Abé marron, 169
 Abey, 143
 Abraza palo, 338
 Abricot de St-Domingue, 232
 Abricotier, 232
 Abrojo, 164
 Abrus L., 153
 precatorius L., 153
 Absinthe, 394
 Absinthe marron, 387
 Abutilon Gartn., 216, 217
 abutiloides C. Schum., 217
 buchii Urb., 217
 giganteum Sweet, 217
 haitiense Urb., 217
 hirtum Sweet, 217
 inclusum Urb., 217
 indicum Sweet, 217
 leonardi Urb., 217
 picardae Urb., 217
 pubescens Urb., 217
 trisulcatum Urb., 217
 umbellatum Sweet, 217
 Acacia Willd., 135, 136, 137
 barahonensis Urb. et Ekm., 137
 farnesiana Willd., 137
 lutea Britt., 137
 muricata Willd., 137
 riparia H. B. K., 137
 scleroxyla Tuss., 137
 tortuosa Willd., 137
 vogeliana Steud., 137
 zapatensis Urb. et Ekm., 137
 Acajou, 171, 196
 Acalypha L., 179, 187
 alopecuroïdea Jacq., 187
 angustifolia Sw., 187
 arcuata Urb., 187
 carpinifolia Poir., 187
 chamaedrifolia Mull. Arg., 187
 cuspidata Jacq., 187
 glechomifolia A. Rich., 187
 hispaniolæ Urb., 187
 hispidata Burmf., 187
 hotteana Urb., 187
 persimilis Mull. Arg., 187
 platyodonta Urb., 187
 pycnantha Urb., 187
 setosa A. Rich., 187
 tomentosa Sw., 187
 wilkesiana Mull. Arg., 187

Acanthaceæ, 304, 344
 Acanthospermum Schrank, 384, 387
 hispidum P. DC., 387
 humile P. DC., 387
 Achimenes Adans, 342, 343
 coccinea Pers., 343
 Achras L., 283, 284
 zapota L., 284
 Achyranthes L., 103, 104
 aspera L., 104
 indica Mull., 104
 Acidocroton Griseb., 178, 189
 horridus Urb. et Ekm., 190
 littoralis Urb. et Ekm., 190
 montanus Urb. et Ekm., 190
 Acidoton Sw., 179, 188
 hotteanus Urb. et Ekm., 188
 lanceolatus Urb. et Ekm., 188
 microphyllus Urb., 188
 variifolius Urb. et Ekm., 188
 Acisanthera Adans, 262, 263
 quadrata Juss., 263
 Acnida L., 102, 104
 cuspidata Bertero, 104
 Acnistus Schott., 327, 328
 arborescens Schlecht, 328
 Acomât, 285
 Acomât rouge, 285
 Acrocomia Mart., 37, 42
 aculeata Lodd., 42
 Adansonia L., 222, 223
 digitata L., 223
 Adelia L., 179, 187
 ricinella L., 187
 Adenanthera L., 134, 138
 pavonina L., 138
 Adenaria H. B. K., 249, 251
 floribunda H. B. K., 251
 Adenocalymma Mart., 337
 obovatum Urb., 337
 Adenostemma Forst., 379
 berterii P. DC., 379
 verbesina Schultz-Bip., 379
 Aechmea R. et P., 47, 48
 nudicaulis Griseb., 48
 Aegiphila Jacq., 315, 318
 elata Sw., 318
 nervosa Urb., 318
 subopposita Urb. et Ekm., 318

Aeschynomene L., 148, 149
 americana L., 149
 var. villosa Urb., 149
 evenia Ch. Wr., 149
 pleuronervia P. DC., 149
 sensitiva Sw., 149
 Afio, 32
 Agave L., 54, 55
 antillarum Descourt., 55
 brevipedata Trel., 55
 brevispina Trel., 55
 intermixta Trel., 55
 rigida L., 55
 var. elongata Bakm., 55
 var. sisalana Engelm., 55
 Ageratum L., 379
 conyzoides L., 379
 var. inaequipaleaceum Hieron, 379
 domingense Spreng, 379
 latifolium Cav., 379
 Agrimonia L., 131, 132
 parviflora Ait., 132
 polyphylla Urb., 132
 Agrostemma L., 113
 githago L., 113
 Agrostideæ, 11, 24
 Agrostis L., 25
 hiemata (Walt) B. S. P., 25
 perennans Tuckerm., 25
 Aguacale, 121
 Aguacatello, 187
 Ail, 52
 Aizoaceæ, 100, 110
 Ajonjili, 341
 Aki, 207
 Albahaca, 326
 Albahaca de vaca, 326
 Albizzia Durazz, 135, 136
 lebbeck Benth., 136
 Alchemilla L., 131, 132
 domingensis Urb., 132
 Alchornea Sw., 179, 186
 haitiensis Urb., 187
 latifolia Sw., 187
 Alchorneopsis Mull. Arg., 179, 186
 portoricensis Urb., 186
 Aleli, 295
 Aleurites Forst., 178, 189
 moluccana Willd., 189
 Alfalfa, 145
 Alfiler, 203, 392
 Algalia, 221
 Algodon, 221
 Algodon cimarron, 221

- Alismataceæ, 7, 8
 Allamanda L., 294, 299
 cathartica L., 299
 Alligator pear, 121
 Alligator wood, 172
 Allionia L., 107
 incarnata L., 107
 Allioniaceæ, 100, 106
 Allium L., 52
 ascalonicum L., 52
 cepa L., 52
 porrum L., 52
 sativum L., 52
 schoenoprasum L., 52
 Allophylus L., 203, 205
 cominia Sw., 205
 crassinervis Radlk., 205
 haïtiensis Radlk. et Ekm., 205
 occidentalis Radlk., 205
 rigidus Sw., 205
 f. incana Radlk., 205
 Alloplectus Mart., 341, 342
 domingensis Urb., 342
 Aloe L., 52
 vera L., 52
 Almacigo, 170
 Almacigo blanco, 170
 Almendrillo, 172
 Almendro, 254
 Alpine Strawberry, 131
 Alpinia L., 59
 allughas Roscoe, 59
 speciosa K. Schum., 59
 Alternanthera Forsk., 103, 105
 ficoidea R. Br., 105
 geniculata Urb., 105
 paronychioides St-Hil., 105
 peploides Urb., 105
 serphyllifolia Urb., 105
 sessilis R. Br., 105
 spinosa R. et Sch., 105
 Alvaradoa Liebm., 168, 169
 haïtiensis Urb., 169
 Alysicarpus Neck., 148, 151
 nummularifolius P. DC., 151
 Amacey, 170
 Amandier des Indes, 254
 Amandier des bois, 201
 Amandier grandes feuilles, 132
 Amandier petites feuilles, 132
 Amarantaceæ, 100, 102
 Amaranthus L., 102, 103
 crassipes Schlecht., 103
 paniculatus L., 103
 polygonoides L., 103
 spinosa L., 103

- tristis L., 103
 viridis L., 103
 Amaryllidaceæ, 51, 53
 Amaryllis L., 53, 54, 55
 belladonna L., 54
 Ambrosia L., 384, 387
 hispida Pursh, 388
 paniculata L. C. Rich., 388
 var. cumanensis O. E. Schulz., 388
 velutina O. E. Schulz., 388
 Amitié, 120, 305
 Ammannia L., 250
 coccinea Rottb., 250
 latifolia L., 250
 Amomis O. Berg., 256, 257
 anisomera Urb. et Ekm., 257
 caryophyllata Krug. et Urb., 257
 var. grisea Krug. et Urb., 257
 hispaniolensis Urb., 257
 ozua Urb. et Ekm., 257
 pauciflora Urb., 257
 Ampalis Bojer, 88
 madagascariensis Bojer, 88
 mauritanica Urb., 88
 Ampelocera Klotzsch, 87
 cubensis Griseb., 87
 Ampelocissus Planch., 211, 212
 robinsonii Planch., 212
 Amyris L., 164, 166
 abegii Ekman, 166
 apiculata Urb. et Ekm., 166
 balsamifera L., 166
 diatrypa Spreng., 166
 elemifera L., 166
 intermedia Urb. et Ekm., 166
 maritima Jacq., 166
 phlebotaenioides Urb. et Ekm., 166
 pungens Urb. et Ekm., 166
 sylvatica Jacq., 166
 Anacardiaceæ, 195, 196
 Anacardium L., 196
 occidentale L., 196
 Anagallis L., 282
 arvensis L., 282
 var. phoenicea Gren. et Godr., 282
 pumila Sw., 282
 Anamu, 109
 Ananas, 48
 Ananas L., 47
 comosus Mirr., 48

- Ananas sativus* Schult., 48
 Anastrophia Don., 396
 buchii Urb., 397
 oligantha Urb., 396
 picardae Urb., 396
 rosei Britt., 397
 tortuensis Urb., 397
 Anatherum Beauv., 13, 14
 zizanioides Hitchc. et Chasse, 14
 Andira Lam., 151, 153
 jamaicensis Urb., 153
 Andrachne L., 178, 181
 cuneifolia Britton, 181
 Andrographis Nees, 345, 348
 paniculata Nees, 348
 Andropogon L., 13, 14
 annulatus Forsk., 14
 bicornis L., 14
 brevifolius Sw., 14
 condylostichus Hochst., 14
 domingensis Hubb., 14
 glomeratus B. St-P., 14
 Andropogon gracilis Spreng., 14
 leucostachyus H. B. K., 14
 saccharoides Sw., 14
 semiberbis Kunth., 14
 tener Kunth., 14
 urbanianus Hitchc., 14
 virgatus Desv., 14
 virginicus L., 14
 Andropogoneæ, 11, 12
 Anechites Griseb., 294, 297
 nerium Urb., 297
 Anethum L., 334
 graveolens L.
 Angelita, 74
 Angelito, 74
 Angelonia H. et B., 332, 333
 angustifolia Benth., 333
 salicariifolia H. et B., 333
 Angiospermæ, 2, 3, 5
 Anguria L., 370, 371
 Anguria pedata Jacq., 371
 var. affinis Cogn., 371
 var. dentata Cogn., 371
 trifoliata L., 371
 trilobata Jacq., 371
 Anis, 274
 Aniseia Choisy, 305, 306
 martinicensis Choisy, 307
 salicifolia Choisy, 307
 Anisillo, 87
 Anon, 119
 Anon de majagua, 152
 Anonillo de majagua, 152
 Annona L., 118, 119
 bicolor Urb., 119

- cascarilloides R. E. Tr., 119
 cherimola Mill., 119
 frutescens R. E. Tr., 119
 glabra L., 119
 gracilis R. E. Tr., 119
 haïtiensis R. E. Tr., 119
 helicoidea Ekm., 119
 micrantha Bertero, 119
 montana Macf., 119
 muricata L., 119
 reticulata L., 119
 rosei Saff., 119
 squamosa L., 119
 urbaniana R. E. Tr., 119
 Annonaceæ, 114, 118
 Anoda Cav., 216, 219
 hastata Cav., 219
 Anthacanthus Nees, 345, 349
 acicularis Nees, 349
 spinosus Nees, 349
 Anthemideæ, 377, 394
 Anthephora Schreb., 15
 hermaphrodita O. Ktze, 15
 Anthurium Schott., 43, 44
 acaule Schott., 44
 scandens Engl., 44
 scolopendrinum Kunth., 44
 Antigonon Endl., 98, 99
 cinerascens Mart., J. Gal., 99
 leptopus Hook. et Arn., 99
 Antirrhinum L., 332, 333
 antirrhiniflorum Hitchc., 334
 orontium L., 334
 Antirrhoea Comm., 353, 362
 Antirrhoea albobrunnea Urb. et Ekm., 362
 cahosiana Urb. et Ekm., 362
 heteroneura Urb. et Ekm., 362
 involuta Urb. et Ekm., 362
 lucida Hook., 362
 oligantha Urb., 362
 pitoniana Urb. et Ekm., 362
 Ants wood, 132
 Apasote, 101
 Apetalæ, 76
 Aphelandra R. Br., 345, 348
 pectinata Willd., 348
 Appétit marron, 114
 Apteris Nutt., 61
 hymenantha Miq., 61

- Apium* L., 273, 274
 ammi Urb., 274
 graveolens L., 274
 Apocynaceæ, 288, 293
 Aquifoliaceæ, 195, 198
 Arabo, 163
 Araceæ, 43
 Arachis L., 148, 150
 hypogaea L., 150
 Arales, 5, 42
 Araliaceæ, 271
 Araucaria Juss., 4
 excelsa R. Br., 4
 Arbre à pain, 90
 Arbre de Noël, 306
 Arbre fricassé, 207
 Arbre soie, 301
 Arbre véritable, 90
 Arceuthobium M. Bieb., 95, 96
 bicarinate Urb., 96
 Arcoa Urb., 139, 142
 gonavensis Urb., 143
 Arcontophoenix, 37, 41
 alexandrae Wendl. et Drude, 41
 Ardisia Sw., 280
 angustata Urb., 281
 brachypoda Urb., 281
 escallonioides Ch. et Schl., 280
 fuertesii Urb., 281
 guadalupensis Duchass., 281
 Ardisia obovata Desv., 280
 picardae Urb., 281
 Areca L., 37, 41
 catechu L., 41
 Arenaria L., 113, 114
 lanuginosa Rohrb., 114
 Argemone L., 122, 123
 mexicana L., 123
 Argithamnia Sw., 178, 184
 candicans Sw., 185
 oblongifolia Urb., 185
 ovalifolia Urb., 185
 Argyreia Lour., 304, 309
 speciosa Sweet, 309
 Aristida L., 24, 25
 adscensionis L., 25
 neglecta Leon et Hitch., 25
 purpurascens Poir., 25
 refracta Griseb., 25
 rosei Hitchc., 25
 swartziana Stend., 25
 ternipes Cav., 25
 Aristolochia L., 98
 bilabiata L., 98
 bilobata L., 98
 brachyura Duchartre, 98
 calceiformis Urb., 98
 caudata Jacq., 98
 ehrenbergiana Cham., 98
 ekmanii O. C. Schmidt., 98
 elegans M. Mast., 98
 fuertesii Urb., 98
 leptosticta Urb., 98
 oblongata Jacq., 98
 peltata L., 98
 punctata Lam., 98
 stenophylla Urb., 98
 trilobata L., 98
 Aristolochiaceæ, 97
 Aristolochiales, 77, 97
 Aristos, 148
 Arracacia Bancr., 273, 274
 xanthorrhiza Bancr., 274
 Arrayan, 258, 260, 312
 Arrow-root, 60
 Artemisia L., 394, 395
 absinthium L., 395
 domingensis Urb., 395
 Artichaut, 396
 Arthrostylidium Rupr., 30
 Artocarpus Griseb., 30
 haïtiens H. et C., 30
 multispicatum Pilger, 30
 sarmetosum Pilger, 30
 Artocarpus L., 88, 89
 incisa L. f., 89
 Arundinaria Michx., 30
 capillifolia Hack., 30
 haïtiens Pielg., 30
 microclada Pielg., 30
 Arundinella Raddi, 16
 berteroniana Hitchc. et Chase, 16
 confinis Hitchc. et Chase, 16
 Arundo L., 28, 29
 donax L., 29
 Asclepiadaceæ, 288, 299
 Asclepias L., 300
 curassavica L., 301
 var. concolor Krug. et grandiflora Griseb., 312
 nivea L., 301
 Ascyrum L., 231
 hypericoides L., 231
 Asparagus L., 52
 officinalis L., 52
 plumosus Baker, 52
 Asparagus fern, 52
 Asperge, 52
 Aspidosperma Mart. et Zucc., 294, 295
 domingense Urb., 296
 Assorossi, 372
 Astephanus H. B. K., 300
 leptophyllus Schlecht., 300
 Aster L., 381, 382
 dumosus L., 382
 heleius Urb., 382

- Asteræ, 377, 381
 Ateleia Moc. et Sessé, 144
 gummifera D. Dietr., 144
 Atiayo, 326
 Atriplex L., 101
 crispa Urb., 101
 pentandra Standl., 101
 Attalea H. B. K.
 crassipatha Burret, 41
 Attrape-sotte, 188
 Aubergine, 329
 Avé, 109
 Avenæ, 11, 25
 Averrhoa L., 162
 bilimbi L., 162
 carambola L., 162
 Avicennia L., 315, 320
 nitida Jacq., 320
 Avocado pear, 121
 Avocat, 121
 Avocat marron, 362
 Axonopus Beauv., 17, 19
 compressus Beauv., 19
 Ayenia L., 224, 225
 pusilla L., 225
 violacea Urb., 225
 virgata Urb. et Ekm., 225
 Ayau, 249
 Azota criollo, 359
 Azulejo, 319
 Baccharis L., 381, 382
 dioeca Vahl, 383
 haïtiens Heering, 383
 myrsinites Pers., 383
 var. mornicola Urb., 383
 Bactris Mart., 37, 42
 chaetophylla Mart., 42
 plumeriana Mart., 42
 Badi, 323
 Baie à onde, 142
 Baitoa, 87
 Balai amer, 387
 Balai doux, 335
 Balai glissé, 215
 Balai lalou, 215
 Balai la montagne, 201
 Balai velours, 125
 Balanophoraceæ, 94, 97
 Balisier, 60
 Balsaminaceæ, 195, 207
 Bambos Rctz., 30
 vulgaris Schrad., 31
 Bambou, 23, 31
 Bambuseæ, 11, 30
 Banane, 58
 Banane zombi, 60
 Bananier marron, 58
 Banara Aubl., 235, 236
 domingensis Benth., 236

- Barbarea R. Br., 126, 127
 praecox R. Br., 127
 Barbe pangnole, 48
 Barbieria P. DC., 146, 147
 pinnata Baill., 147
 Barleria L., 344, 347
 cristata L., 347
 lupulina Lindl., 347
 Barleriola Oerst., 345, 347
 inermis Urb. et Ekm., 348
 multiflora Urb. et Ekm., 348
 solanifolia Oerst., 348
 Barré volé, 347, 348
 Barringtonia Forst., 252
 speciosa Forst., 252
 Basella L., 112
 alba L., 112
 rubra L., 112
 Basellaceæ, 100, 112
 Basilique, 326
 Basilique grandes feuilles, 326
 Bastard brazilleto, 130
 Bastard tamarind, 138
 Bastardia H. B. K., 216, 219
 bivalvis H. B. K., 219
 viscosa H. B. K., 219
 Batidaceæ, 100, 108
 Batis L., 108
 maritima L., 108
 Battre à caïman, 152
 Battre autour, 328
 Bauhinia L., 139, 140
 divaricata L., 140
 monandra S. Kurz., 140
 tomentosa L., 140
 ungula Jacq., 140
 Bay, 257
 Bay-rum tree, 257
 Bayahon, 138
 Bayahonda, 138
 Bayahonde, 132
 Bayarone, 138
 Bayonette, 53
 Bayonette pingouin, 47
 Bead tree, 172
 Beaumontia Wall., 294, 298
 grandiflora Wall., 298
 Bébelle, 311
 Begonia L., 242
 brachypoda O. E. Schulz, 242
 domingensis A. DC., 242
 exilis O. E. Schulz, 242
 plumieri A. DC., 242
 var. barahonensis O. E. Schulz, 242
 Begonia repens Lam., 242
 rotundifolia Lam., 242
 Begoniaceæ, 228, 241
 Bejuco ahoja vaca, 298
 Bejuco de arana, 299
 Bejuco de costilla, 204
 Bejuco de grajo, 302
 Bejuco de indio, 211
 Bejuco de name, 56
 Bejuco caro, 212
 Bejuco culebra, 337
 Bejuco mangle, 297
 Bejuco timacle, 363
 Bejuquito, 302
 Belle-belle, 311
 Belle de nuit, 106
 Belle-mère soleil, 50
 Belle mexicaine, 99
 Belle orchidée, 71
 Belle z'amie, 208
 Bellonia L., 342
 aspera L., 342
 spinosa Sw., 342
 Benzolive, 129
 Berengena de gallina, 329
 Béréginn, 329
 Bergia L., 233
 sessiliflora Griseb., 233
 Bertiera Aubl., 353, 360
 guianensis Aubl., 360
 Bernardia Adans., 179, 185
 corensis Mull-Arg., 185
 dichotoma Mull-Arg., 185
 leprosa Mull-Arg., 185
 tenuifolia Urb., 185
 Besleria L., 341, 342
 lutea L., 342
 var. leucantha Urb., 342
 Beta L., 101
 vulgaris L., 101
 Betterouge, 101
 Beureria Jacq., 310, 312
 albo-punctata O. E. Schulz, 312
 Beureria brachypoda O. E. Schulz, 312
 domingensis Griseb., 312
 grandiflora Griseb., 312
 maritima O. E. Schulz, 312
 nashii Britton, 312
 ovata Miers, 312
 var. hirtella O. E. Schulz, 312
 succulenta Jacq., 312
 var. canescens O. E. Schulz, 312
 var. revoluta O. E. Schulz, 312

- tomentosa G. Don, 312
 var. modesta O. E. Schulz, 312
 urbanii O. E. Schulz, 312
 velutina Gurke, 312
 virgata G. Don, 312
 var. vestita O. E. Schulz, 312
 Biajama, 152
 Bidens L., 386, 392
 bigelovii A. Grav., 392
 cynapiifolius H. B. K., 392
 var. portoricensis O. E. Schulz, 392
 var. tenuis O. E. Schulz, 392
 domingensis O. E. Schulz, 392
 pilosus L., 392
 var. bimucronatus O. E. Schulz, 392
 var. brachycarpus O. E. Schulz, 392
 var. radiatus C. H. Schulz, 392
 Bignoniaceæ, 304, 336
 Bija, 234
 Bisgoeppertia O. Ktze., 291, 292
 scandens Urb., 292
 Bixa L., 234
 orellana L., 234
 Bixaceæ, 227, 233
 Blackberry, 131
 Black medick, 145
 Blechum Juss., 345, 346
 pyramidatum Urb., 346
 Bletia R. et P., 63, 72
 patula W. Hook., 72
 purpurea P. DC., 72
 Blighia Koen., 204, 206
 sapida Koen., 207
 Blimblin, 162
 Bocconia L., 122, 123
 frutescens L., 123
 Bœhmeria Jacq., 91, 93
 cylindrica Sw., 93
 ehrenbergiana Urb., 93
 nivea Gand., 93
 repens Wedd., 93
 Bœrhaavea L., 106
 Bœrhaavea coccinea Mill., 107
 erecta L., 106
 f. subpunctata Heimerl., 106
 panniculata L. C. Rich., 106
 var. leiocarpa Heimerl., 106
 scandens L., 107
 viscosa Lag. et Rodr., 107

- Bohahunda, 138
 Bois à cochon, 232
 Bois amer, 276
 Bois arada, 172
 Bois balai, 383
 Bois bandé, 279
 Bois blanc, 87, 168, 183
 Bois blanc grandes feuilles, 87
 Bois brûlant, 192
 Bois bourro, 137
 Bois bourro marron, 148
 Bois ca, 136
 Bois cabrit, 141, 183, 364
 Bois caca, 125
 Bois cacorne, 140
 Bois caïman, 152
 Bois caleçon, 140
 Bois campêche, 142
 Bois capable, 201
 Bois cassave, 107
 Bois chandelle, 4, 166
 Bois chique, 311
 Bois cochon, 170
 Bois codine, 123
 Bois coq, 117, 123, 214
 Bois corne, 176
 Bois côtelette, 183
 Bois crapaud, 187, 281
 Bois courré, 205
 Bois d'Anjou, 271
 Bois d'anneau, 141
 Bois de chêne, 339
 Bois d'ébène, 312
 Bois de fer, 209, 211
 Bois de lance, 118
 Bois dentelle, 249
 Bois dents marron, 263
 Bois de rose, 194, 209
 Bois de satanier, 206
 Bois de savane, 319
 Bois de soie, 87
 Bois de soie marron, 214
 Bois d'Inde, 285
 Bois d'Inde marron, 230
 Bois d'Inde français, 257
 Bois dine, 260, 311
 Bois diou, 232
 Bois d'leau, 91
 Bois d'orme, 225
 Bois d'ortie, 215, 319
 Bois d'ortie rouge, 215
 Bois écorce, 138
 Bois enivré, 147
 Bois espagnol, 197
 Bois ferblanc, 211
 Bois feuilles blanches, 87
 Bois galle, 138
 Bois graines noires, 206
 Bois gris-gris, 254, 255
 Bois guêpes, 183
 Bois huile, 286
 Bois immortel, 156
 Bois jambette, 318
 Bois jaune, 89
 Bois la fièvre, 205
 Bois lait, 192
 Bois lait femelle, 297
 Bois laitelle, 364
 Bois lait mâle, 296
 Bois le tremble, 281
 Bois lubin, 3
 Bois mabel, 130
 Bois mabi, 211
 Bois mahaut, 88
 Bois marbré, 193
 Bois margot, 254
 Bois mériç, 89
 Bois mulâtre, 197, 260
 Bois mulet, 207
 Bois myrte, 260
 Bois nago, 152, 339
 Bois nan-non, 144
 Bois nègre, 205
 Bois négresse, 272
 Bois noir, 119, 136
 Bois pâle, 152
 Bois palmiste, 153
 Bois panier, 103
 Bois petit garçon, 201
 Bois petites feuilles, 260
 Bois pigeon, 267
 Bois pin, 4
 Bois pin marron, 201
 Bois pinni ou piné, 165
 Bois plomb, 136, 281
 Bois poison, 169
 Bois poivre, 205
 Bois raide, 287
 Bois raie, 87
 Bois rave, 125
 Bois rouge, 172
 Bois sadine, 359
 Bois saisissement, 297
 Bois sang, 136
 Bois savanne, 281, 339
 Bois savonnette, 205
 Bois Sénégal, 125
 Bois senti, 144, 174
 Bois soldat, 213
 Bois soumis, 311
 Bois tanniste rouge, 125
 Bois trembler, 272
 Bois trompette, 90
 Bois vache, 187
 Bomarea Mirb., 54, 55
 edulis Herb., 55
 Bombacaceæ, 213, 222
 Bombax L., 222
 ellipticum H. B. K., 222
 tussacii Urb., 222
 Bon Dieu mouré, 50
 Bon garçon, 194
 Bonania A. Rich., 180, 192
 domingensis Urb., 192
 linearifolia Urb. et Ekm., 192

Bonbon capitaine, 311
 Bonbon coq d'Inde, 109
 Bonbonnier, 316
 Boniface, 51
 Bonnet carré, 221, 349
 Bonnet chinois, 319
 Bontia L., 350
 daphnoides L., 350
 Borrache, 314
 Borraginaceae, 303, 310
 Borreria G. F. W. Mey,
 354, 367
 Borreria brachysepala Urb.,
 367
 densiflora P. DC., 367
 laevis Griseb., 367
 var. sintenisii Urb.,
 367
 litoralis Urb., 367
 ocimoides P. DC., 367
 rosea Urb., 367
 verticillata G. F. W.
 Mey, 367
 Borrichia Adans, 385, 389
 arborescens P. DC., 389
 Bouchea Cham., 314, 317
 ehrenbergii Cham., 317
 Bougainvillea Commers.,
 106, 107
 glabra Choisy, 107
 intermedia Heimerl., 107
 spectabilis Willd., 107
 Bougainvillier, 107
 Bouillon blanc, 333
 Boule de Mars, 50
 Bourreria nashii Britton,
 succulenta Jacq.
 Boussingaultia H. B. K.,
 112
 leptostachys Moq., 112
 Bouteloua Lag., 26, 27
 americana Scribn., 27
 Bouteloua heterostega Griff.,
 27
 juncea Hitchc., 27
 Boyau diable, 53
 Brachionidium Lindl., 65,
 69
 sherringii Rolfe, 70
 Bramble 131
 Brassia R. Br., 64, 74
 caudata Lindl., 74
 Brassica L., 126, 127
 campestris L., 128
 f. auriculata O. E.
 Schulz., 128
 integrifolia O. E. Schulz,
 128
 napus L., 128
 oleracea L., 128
 urbaniana O. E. Schulz,
 128
 Brassicaceae, 122, 125

Brazil, 143
 Brésillet, 143, 197
 Brickellia Ell., 379, 381
 diffusa A. Gray, 381
 Brignolle, 259, 331
 Brillol, 210
 Briser ménage, 141
 Bromelia L., 47
 karatas L., 47
 pinguin L., 47
 Bromeliaceae, 46, 47
 Bromus L., 28, 30
 sterilis L., 30
 uniloides H. B. K., 30
 Broughtonia R. Br., 65, 71
 domingensis Rolfe, 71
 Browallia L., 327, 331
 americana L., 331
 Brunella L., 320, 322
 vulgaris L., 322
 Brunellia R. et P., 130
 comocladifolia H. et B.,
 130
 Brunelliaceae, 129, 130
 Brunfelsia L., 327, 331
 americana L., 331
 nitida Benth., 331
 picardae Urb., 331
 Brusca blanca, 141
 Brusca macho, 141
 Brya Bronn., 148, 149
 buxifolia Urb., 149
 Bryophyllum Salisb., 129
 pinnatum S. Kurz, 129
 Bryophyta, 1, 2
 Buchenavia Eichl., 254
 capitata Eichl., 254
 Buchnera L., 333, 336
 elongata Sw., 336
 Bucida L., 254, 255
 buceras L., 255
 Buddlejia L., 290, 291
 calicola Urb., 291
 domingensis Urb., 291
 Buettneria Loeff., 224, 225
 microphylla Jacq., 225
 Buis ou Ptit buis, 176
 Bulbostylis Kunth., 33, 34
 alpestris Urb., 34
 capillaris Clarke, 34
 curassavica Britton, 34
 var. pallescens, 34
 ekmanii Kuk., 34
 haitiensis Kunth, 34
 hispaniola Kuk. et Ekm.,
 34
 Bulbostylis junciformis
 Clarke, 34
 tuerckheimii Urb., 34
 subefimbriata Kuk., 34
 vestita Kunth., 34
 Bull-hoof, 140
 Bumelia Sw., 283, 285
 buchii Urb., 285

heterophylla Urb., 285
 horrida Griseb., 286
 lineolata Urb. et Ekm.,
 286
 navasana Urb. et Ekm.,
 286
 obovata A. DC., 285
 pachyclada Urb. et Ekm.,
 286
 parvifolia A. DC., 285
 picardae Urb., 285
 subintegra Urb. et Ekm.,
 285
 Bun, 166
 Bunchosia L. C. Rich., 173,
 175
 ekmanii Urb. et Ndz.,
 175
 glandulosa L. C. Rich.,
 175
 var. typica, 175
 haitiensis Urb. et Ndz.,
 175
 hotteana Ndz. et Ekm.,
 176
 macrophylla Ekm. et
 Ndz., 176
 media P. DC., 175
 nitida L. C. Rich., 175
 obovata Ndz., 175
 punicifolia Ekm. et Ndz.,
 175
 Bunzunuco, 360
 Bursera Jacq., 170
 brunea Urb. et Ekm.,
 170
 gracilipes Urb. et Ekm.,
 170
 nashii Urb., 170
 ovata Urb. et Ekm., 170
 simaruba Sarg., 170
 spinescens Urb. et Ekm.,
 170
 Burseraceae, 161, 169
 Burmaniceae, 61
 Butomaceae, 7, 8
 Butterfly flower, 140
 Buxaceae, 195
 Buxus L., 196
 glomerata Mull-Arg., 196
 Byrsonima L. C. Rich.,
 173, 176
 coriacea Kunt., 176
 crassifolia H. B. K., 176
 lucida L. C. Rich., 176
 spicata L. C. Rich., 176
 tenuifolia Urb. et Ndz.,
 176
 Cabidma, 172
 Cabirne, 172
 Cabra, 201
 Cabuja, 55
 Cacahuil, 186
 Cacao 225

Cacao bobo, 208
 Cachiman canelle, 119
 Cachiman cœur bœuf, 119
 Cachiman La Chine, 119
 Cachiman marron, 119, 238
 Cachiman zombi, 119
 Cacaoon, 139
 Cacorne, 139
 Cacorne marron, 140
 Cacorne poison, 371
 Cacorne zombi, 371
 Cactaceae, 242
 Cadillo, 220
 Cadillo amarillo, 220
 Cadillo de trepine, 220
 Caesalpinia, 134, 139
 Caesalpinia L., 139, 143
 anacantha Urb., 143
 barkeriana Urb. et Ekm.,
 143
 barahonensis Urb., 143
 bonduc Roxb., 143
 brasiliensis L., 143
 buchii Urb., 143
 ciliata Urb., 143
 coriaria Willd., 143
 crista L., 143
 domingensis Urb., 143
 glandulosa Bert., 143
 pauciflora C. Wr., 143
 pellucida Vogel., 143
 pulcherrima Sw., 143
 rosei Urb., 143
 secundiflora Urb., 143
 sepiaria Roxb., 143
 sphaerosperma Urb. et
 Ekm., 143
 vesicaria L., 143
 Café, 363
 Café cimarron, 238
 Café de gallina, 238
 Café marron, 312, 318,
 364
 Caguasia, 239
 Caiman marron 152
 Caïmite, 286
 Caïmite marron, 152, 286
 Caïmito, 286
 Caïmito blanco cimarron,
 286
 Caïmito cimarron, 286
 Caïmoncillo, 109
 Cajanus P. DC., 154, 158
 indicus Spreng., 158
 Cajuil, 196
 Cakile Gaertn., 126, 127
 lanceolata O. E. Schulz,
 127
 subsp. domingensis O.
 E. Schulz, 127
 Caladium Vent., 43, 44
 bicolor Vent., 44
 Calalou gombo, 221

Calamagrostis Adans, 25
 leonardi Chase, 25
 Calanthe R. Br., 63, 72
 mexicana Rchb. f., 72
 Calathea G. F. W. Mey, 60
 allouia Lindl., 60
 Callebasse, 340
 Callebasse franc, 373
 Callebasse marron, 340
 Callebassie, 240
 Callebassier zombi, 116
 Calle noire, 361
 Calliandra Benth., 135, 136
 caracasana Benth., 136
 colletioïdes Griseb., 136
 var. gonavensis Urb.
 et Ekm., 136
 gracilis Griseb., 136
 hæmatostoma Benth., 136
 var. glabrata Griseb.,
 136
 Calliandra nervosa Urb. et
 Ekm., 136
 pedicellata Benth, 136
 portoricensis Benth, 136
 Callicarpa L., 315, 318
 aculeolata Schauer, 318
 selleana Urb. et Ekm.,
 318
 sordida Urb., 318
 Callisia L., 49, 50
 monandra Schult., 50
 repens L., 50
 Callitrichaceae, 160, 195
 Callitriche L., 195
 tuerckheimii Urb., 195
 Calmouc, 167
 Calocarpum Pierre, 283,
 284
 mammosum Pierre, 284
 Calonyction Choisy, 305,
 308
 aculeatum House, 308
 Calophyllum L., 231, 232
 calaba Jacq., 232
 Calopogonium Desv., 154,
 156
 caeruleum Benth, 157
 galactioides Benth., 157
 orthocarpum Urb., 157
 Calotropis R. Br., 300,
 301
 procera R. Br., 301
 Calumette, 21
 Calycogonium P. DC., 262,
 266
 apiculatum Urb. et Ekm.
 266
 brevifolium Urb. et
 Ekm., 266
 calycopteris Urb., 266
 domatiatum Urb. et
 Ekm., 266

ekmanii Urb., 267
 hispidulum Cogn., 266
 maculatum Urb. et Ekm.,
 266
 ramossissimum Urb. et
 Ekm., 266
 rhamnoïdeum Naud,
 266
 rhomboïdeum. Urb. et
 Ekm., 266
 torbeccianum Urb. et
 Ekm., 266
 turbinatum Urb. et
 Ekm., 266
 Calyptanthus Sw., 256,
 258
 arborea Urb. et Ekm.,
 258
 barkerii Urb. et Ekm.,
 259
 Calyptanthus bracteosa Urb.
 et Ekm., 259
 calophylla Urb. et Ekm.,
 259
 chrysophylloïdes Urb. et
 Ekm., 259
 var. minor Urb. et
 Ekm., 259
 collina Urb., 258
 densifolia Urb. et Ekm.,
 259
 ekmanii Urb., 259
 eriocephala Urb., 258
 hotteana Urb. et Ekm.,
 258
 nummularia Berg., 258
 pallens Griseb., 258
 picardae Krug. et Urb.,
 258
 pitoniana Urb. et Ekm.,
 258
 salicifolia Urb. et Ekm.,
 259
 samuelssonii Urb. et
 Ekm., 259
 selleana Urb. et Ekm.,
 259
 sintenisii Kiaersk., 258
 sordida Urb. et Ekm.,
 258
 syzygium Sw., 258
 ternifolia Urb. et Ekm.,
 258
 Calyptrogyne H. Wendl.,
 37, 39
 occidentalis G. Maza, 40
 Calyptropsidium Berg.,
 256, 257
 bracteosum Urb., 257
 Cambodge thistle, 123
 Cambron, 142
 Cameraria L., 294, 295
 angustifolia L., 295

- latifolia L., 295
linearifolia Urb., 295
Camomille pays, 383, 384
Campanilla, 306
Campanulaceæ, 374
Campanulales, 80, 374
Campêche, 142
Campêche marron, 135
Campelia L. C. Rich., 49, 50
zanonia H. B. K., 50
Camphor tree, 121
Campylocentrum Benth., 64
75
filiforme Rolfe, 75
micranthum Rolfe, 75
monteverdi Rolfe, 75
Cana, 141
Cana fistula, 141
Cananga Hookf. et Thoms., 118, 119
odorata Hookf. et Thoms., 119
Canavalia P. DC., 154, 157
ensiformis P. DC., 158
maritima Thou., 158
rusiosperma Urb., 158
Candélabre, 194
Candélon, 137
Candongo, 119
Canelilla, 234
Canella Murr., 234
alba Murr., 234
Canellaceæ, 227, 234
Canelle, 121
Canelle poivrée, 234
Canique, 143
Canna L., 60
coccinea Mill., 60
domingensis Urb., 60
glauca L., 60
jaegeriana Urb., 60
orchioïdes Bailey, 60
Cannaceæ, 57, 59
Canne à sucre, 13
Canne à gratter, 14
Canne madère, 44
Canne roseau, 59
Caoba, 171
Caoutchouc, 90, 297, 299, 300
Canyuète, 72
Cap berry, 122
Capa blanco, 319
Caperonia St-Hil., 179, 185
castaneifolia St-Hil., 185
palustris St-Hil., 185
Capitaine, 175
Capparidaceæ, 122, 123
Capparis L., 124, 125
amplissima Lam., 125
Capparis baducca L., 125
comosa Jacq., 125
cynophallophora L., 125
dolichopoda Helwig, 125
eustachiana Jacq., 125
ferruginea L., 125
flexuosa L., 125
gonavensis Helwig, 125
Capraria L., 333, 335
biflora L., 335
Caprice, 296
Caprifoliaceæ, 351, 369
Capriola dactylon Kuntze, 26
Capsella Medik., 126, 127
bursa pastoris Medik., 127
Capsicum L., 327, 328
annuum L., 328
baccatum L., 328
frutescens L., 328
Carabana, 286
Caracoli, 135
Caracoli de Puerto-Rico, 255
Caractère des hommes, 140
Caraïbe, 44, 45
Caraïbe gratté, 45
Carambomba, 137
Carapa Aubl., 171
guianensis Aubl., 171
Cardamine L., 126, 128
africana L., 128
flexuosa With., 128
subsp. debilis O. E. Schulz, 128
subsp. pennsylvanica O. E. Schulz, 128
hirsuta L., 128
jamesonii Hook., 128
impatiens L., 128
Cardiospermum L., 203, 204
corindum L., 204
f. villosa Radlk., 204
halicacabum L., 204
var. microcarpum Bl., 204
Cardo santo, 123
Carex L., 32, 36
albulutescens Schwein., 36
cladostachya Wahlbg., 36
cubensis Kuk., 36
var. flaccida Kuk., 36
ekmanii Kuk., 36
var. hottensis Kuk. et Ekm., 36
pseudocyperus L., 36
var. polysticha Kunth, 36
scabrella Wahlbg., 36
stellulata Good., 36
var. angustata Carey, 36
subscabrella Kuk., 36
Carga agua, 141

- Carica L., 240
papaya L., 240
Caricaceæ, 228, 240
Caro, 212
Carossier, 41
Carotte, 275
Carludovica Ruiz. et Pav., 42
palmota Ruiz. et Pav., 42
Carpodiptera Griseb., 214
cubensis Griseb., 215
hexaptera Urb. et Ekm., 215
simonis Urb., 215
Carya Nutt., 85
pecan Aschers et Graebn., 86
Caryophyllaceæ, 100, 113
Caryota L., 36, 39
mitis Lour., 39
urens L., 39
Carzazo, 143
Casasia A. Rich., 352, 359
domingensis Urb., 359
ekmanii Urb., 359
var. ovalifolia Urb., 359
haïtiens Urb. et Ekm., 359
Casearia Jacq., 236, 237
aculeata Jacq., 238
Casearia arborea Urb., 238
bahamensis Urb., 238
bicolor Urb., 238
decandra Jacq., 238
ehrenbergiana Urb., 238
guianensis Urb., 238
hirsuta Sw., 238
ilicifolia Vent., 238
spinescens Benth., 238
sylvestris Sw., 238
Cashaw, 138
Cashew, 196
Casse, 141
Casse espagnole, 141
Casse marron, 141
Casser hâche, 209
Casser hâche gris, 87
Casser rage, 185
Casser sèche, 237
Cassé zo, 107
Cassia L., 139, 140
adenosperma Urb., 141
aeschynomene P. DC., 141
alata L., 141
angustifolia Vahl, 141
angustisiliqua Lam., 141
bicuspidata L., 141
brachycarpa Urb., 141
buchii Urb., 141
cahosiana Urb. et Ekm., 141
crista Jacq., 141
var. oligophylla Urb., 141
diffusa P. DC., 141
diphylla L., 141
domingensis Spreng., 141
emarginata L., 141
fistula L., 141
Cassia grammica Spreng., 141
grandis L. f., 141
indecora H. B. K., 141
ligustrina L., 141
var. eggersiana Urb., 141
var. jaegeriana Urb., 141
lineata Sw., 141
mexicana Jacq., 141
obovata Coll., 141
occidentalis L., 141
pedicellaris P. DC., 141
pinetorum Urb., 141
var. picardæ Urb., 141
polyphylla Jacq., 141
pygmæa P. DC., 141
quinquangulata L. C. Rich., 141
selleana Urb., 141
sophora L., 141
spectabilis P. DC., 141
strigillosa Benth., 141
swartzii Wikstr., 141
tora L., 141
tortuensis Urb., 141
tuerckheimii Urb., 141
uniflora Mill., 141
Cassia stick tree, 141
Cassipourea Aubl., 253
obtusula Urb., 253
Cassytha L., 120, 122
americana Nees, 122
Castanea Adans., 86
sativa Mill., 86
Castela Turp., 167
depressa Turp., 168
Castilloa elastica Cerv., 90
Castor, 214, 218
Casuarina equisetifolia L., 80
Casuarinaceæ, 80
Casuarinales, 76, 80
Catalpa Juss., 337, 338
denticulata Urb., 339
domingensis Urb. et Ekm., 339
ekmaniana Urb., 339
longissima Sims, 339
oblongata Urb. et Ekm., 339
obovata Urb. et Ekm., 339

- Catastres 243, 244
Catesbaa L., 253, 360
ekmaniana Urb., 360
fuertesii Urb., 360
Catesbaa glabra Urb., 360
microcarpa Urb., 360
parvifolia P. DC., 360
sphaerocarpa Urb., 360
Catié, 40
Catin, 86
Catopsis Griseb., 47, 48
berteroniana Mez., 48
fulgens Griseb., 48
nitida Griseb., 48
nutans Griseb., 48
Cattleypopsis Lemaire, 65, 71
rosea Mansf., 71
Caya, 124
Caya amarilla, 285
Caya de loma, 285
Caya prieta, 285
Cayaponia Manso, 371, 373
americana Cogn., 373
var. angustiloba Cogn., 373
var. subintegrifolia Cogn., 373
var. vulgaris Cogn., 373
racemosa Cogn., 373
Cayepon, 289
Cecropia L., 88, 90
peltata L., 90
Cèdre 172, 233
Cedrela L., 171, 172
odorata L., 172
Ceiba Gaertn., 222
pentandra Gaertn., 223
Celandine, 123
Celastraceæ, 195, 199
Céleri, 274
Celosia L., 102, 103
argentea L., 103
nitida Vahl., 103
virgata Jacq., 103
Celtis L., 87
berteroana Urb., 87
iguanæa Sarg., 87
punctata Urb. et Ekm., 87
trinervia Lam., 87
Cenchrus L., 16, 23
echinatus L., 23
mysuroïdes H. B. K., 23
pauciflorus Benth., 23
tribuloides L., 23
viridis Spreng., 23
Centella L., 273, 275
asiatica Urb., 275
Centrosema Benth., 154, 155
Centrosema dubium Hemsl., 155
haïtiens Urb. et Ekm., 155
plumieri Benth., 155
pubescens Benth., 155
virginianum Benth., 155
var. angustifolium Griseb., 155
Cephalocereus Pfeiff., 243, 245
hermentianus Britt. et Rose, 245
monoclonos Britt. et Rose, 245
polygonus Britt. et Rose, 245
schlumbergeri Urb., 245
Cerastium L., 113
glomeratum Thuill., 114
Ceratophyllaceæ, 114, 115
Ceratophyllum L., 115
demersum L., 115
Cercidium Tul., 139, 142
praecox Harms, 142
Cerise marron, 259
Cerisier, 175
Cestrum L., 327, 330
abegii Urb. et Ekm., 331
angulosum Urb., 331
azuense Urb. et Ekm., 331
bicolor Urb., 331
brevifolium Urb., 330
var. gracillimum O. E. Schulz, 331
cahosianum Urb. et Ekm., 331
celophlebium O. E. Schulz, 330
daphnoides Griseb., 330
var. laxiflorum O. E. Schulz, 330
Cestrum diurnum L., 330
dolichopus Urb. et Ekm., 331
domingense O. E. Schulz, 330
farinosum Urb. et Ekm., 331
filipes Urb. et Ekm., 331
fuertesii O. E. Schulz, 330
heterophyllum Urb., 330
hotteanum Urb. et Ekm., 331
inclusum Urb., 330
laurifolium l'Hér., 330
linearifolium Urb., 330
macrophyllum Vent., 330

marmoratum Urb. et Ekm., 331
 mononeurum Urb. et Ekm., 331
 nocturnum L., 330
 parviflorum Urb., 331
 pumile Urb. et Ekm., 331
 sphærocarpum O. E. Schulz, 331
 tuerckheimii O. E. Schulz, 331
 violaceum Urb., 330
 virgaurea Urb. et Ekm., 331
 Chadèque, 167
 Chadron bérin, 123
 Chatocalyx P. DC., 148, 149
 pubescens P. DC., 149
 Chaise dodine, 351
 Chamærops L., 36, 38
 humilis L., 38
 Chamissoa H. B. K., 102, 103
 altissima H. B. K., 103
 Chandelier, 221
 Chandelle anglais, 358
 Chandelle blanc, 166
 Chandelle marron, 207
 Chapeau carré, 214
 Chapeau chinois, 219
 Chaptalia Vent., 396, 397
 angustata Urb., 397
 dentata Cass., 397
 eggersii Urb., 397
 leiocarpa Urb., 397
 membranacea Urb., 397
 nutans Polak, 397
 Chardon cardasse, 247
 Charianthus D. Don, 262, 264
 coccineus D. Don, 264
 Chascotheca Urb., 178, 182
 domingensis Urb., 182
 Chêne, 339
 Chêne à glandes, 339
 Chêne calébassie, 319
 Chêne caparo, 311
 Chêne noir, 312
 Chenopodiaceæ, 100, 101
 Chenopodiales, 77, 100
 Chenopodium L., 101
 ambrosioides L., 101
 murale L., 101
 Chevalier, 340
 Cheveux de Vénus, 309
 Chèvre-feuille, 369
 Chiboué, 170
 Chic-chic, 205
 Chicharron, 172, 197, 238
 Chicharron de tres espinas, 172
 Chicorée, 399
 Chicorée marron, 398
 Chiendent, 26
 Chilita Orcutt, 243, 246
 multiceps Orc., 246
 Chimarrhis Jacq., 352, 355
 cymosa Jacq., 355
 Chimophila Pursh, 277
 domingensis Blake, 277
 Chiococca L., 353, 362
 alba Hicb., 363
 var. parvifolia Urb., 363
 Chione P. DC., 353, 363
 exserta Urb., 363
 seminervis Urb. et Ekm., 363
 venosa Urb., 363
 Chloranthaceæ, 80, 84
 Chloridæ, 11, 26
 Chloris Sw., 26, 27
 angustiflora Aresch., 27
 barbata Nash, 27
 ciliata Sw., 27
 cubensis Ekm., 27
 paraguayensis Steud., 27
 petraea Sw., 27
 Chloris radiata Sw., 27
 sagraana A. Rich., 27
 virgata Sw., 27
 Chlorophora Gaud., 88, 89
 tinctoria Gaud., 89
 Chou, 128
 Chou moutarde, 128
 Chou palmiste, 40
 Chou rave, 128
 Chrysalidocarpus Wendl., 38, 40
 glaucescens Waby, 40
 Chrysanthellum L. C. Rich., 386, 391
 americanum Vathek, 391
 Chrysobalanus L., 131, 132
 icaco L., 132
 var. pellocarpa P. DC., 132
 Chrysophyllum L., 283, 286
 angustifolium Lam., 286
 argenteum Jacq., 286
 bicolor Poir., 286
 brachystylum Urb., 286
 cañito L., 286
 gonavense Urb., 286
 heterochroum Urb., 286
 miragoaneum Urb., 286
 montanum Urb., 286
 oliviforme L., 286
 Chrysophyllum picardæ Urb., 286
 platyphyllum Urb., 286
 Chusquea Kunth, 30
 abietifolia Griseb., 30
 Cichoriæ, 376, 397

Cinnamomum Blume, 120, 121
 camphora Nees et Eberm., 121
 zeilanicum Breyn., 121
 Cinnamon tree, 121
 Circassian seed, 138
 Cirsium Scop., 396
 mexicanum P. DC., 396
 Cirouelle, 197
 Cissampelos L., 116, 117
 pareira L., 117
 var. caepeba Griseb., 117
 Cissus L., 211, 212
 buchii Urb., 213
 carnifolia Urb. et Ekm., 213
 caustica Tuss., 213
 cordifolia L., 212
 dissecta Urb. et Ekm., 212
 erosa L. C. Rich., 213
 fuertesii Urb., 213
 gonavensis Urb. et Ekm., 213
 Cissus haïtiens Urb. et Ekm., 213
 hotteana Urb. et Ekm., 213
 intermedia A. Rich., 213
 macilenta Urb., 213
 micrantha Poir., 213
 var. tripartita Urb. et Ekm., 213
 picardæ Urb., 213
 sicyoides L., 212
 var. parvifolia Griseb., 212
 trifoliata L., 213
 Cistaceæ, 227, 233
 Citharexylum L., 315, 318
 caudatum L., 318
 fruticosum L., 318
 var. villosum O. E. Schulz, 318
 glandulosum Urb. et Ekm., 318
 microphyllum O. E. Schulz, 318
 schulzii Urb. et Ekm., 318
 stenophyllum Urb. et Ekm., 318
 Citron, 167
 Citronelle, 14
 Citronelle marron, 166
 Citronelle espagnole, 394
 Citrullus Schrad., 370, 372
 vulgaris Schrad., 372
 Citrus L., 164, 167
 aurantifolia Swingle, 167
 aurantium L., 167
 lima Lunan, 167

Citrus limetta Risso, 167
 limonum Osbeck, 167
 maxima Merr., 167
 medica L., 167
 nobilis Louv., 167
 var. deliciosa Swingle, 167
 peretta Risso, 167
 var. domingensis Tuss., 167
 sinensis Osbeck, 167
 vulgaris Risso, 167
 Cive, 52
 Cizana, 323
 Cladium Crantz, 32, 35
 ekmanii Kuentz, 35
 mariscus R. Br., 35
 restioides Benth., 35
 var. effusa Clarke, 35
 Clavija Ruiz. et Pav., 279, 280
 domingensis Urb. et Ekm., 280
 Clematis L., 116
 barahonensis Urb., 116
 bidens Urb., 116
 diœca L., 116
 flammulastrum Griseb., 116
 fuertesii Urb., 116
 picardæ Urb., 116
 Cleome L., 124
 aculeata L., 124
 christii Urb., 124
 ciliata Schum et Thonn., 124
 erosa Urb., 124
 procumbens Jacq., 124
 serrata Jacq., 124
 spinosa Jacq., 124
 Clerodendron L., 315, 319
 aculeatum Schelcht, 319
 fallax Lindl., 319
 fragrans Vent., 319
 var. pleniflora Schauer, 319
 picardæ Urb., 319
 spinosum Spreng., 319
 Clibadium L., 384, 387
 surinamense L., 387
 Clidemia D. Don, 263, 268
 capillaris Griseb., 268
 domingensis Cogn., 268
 erythropogon DC., 268
 fuertesii Cogn., 268
 hirta D. Don., 268
 Clidemia oligantha Urb., 268
 plumosa P. DC., 268
 pusilliflora Cogn., 268
 pycnantha Urb. et Ekm., 268
 rubrinervis Cogn., 268

rubripila Cogn., 268
 strigillosa P. DC., 268
 tetragonoloba Cogn., 268
 tetraptera Cogn., 268
 vegansii Cogn., 268
 Clitoria L., 154
 laurifolia Poir., 155
 plumieria Tuss., 155
 rubiginosa Juss., 155
 ternatea L., 155
 Clochette, 307, 334
 Clusia L., 230, 232
 domingensis Urb., 232
 minor L., 232
 picardæ Urb., 232
 plumierii Pl. et Tr., 232
 rosea Jacq., 232
 Cobano, 137
 Cobano blanco, 136
 Coccocypselum Sw., 352, 359
 repens Sw., 359
 tenuis Urb., 359
 Coccoloba L., 98, 99
 borgesienii O. C. Schmidt, 99
 buchii O. C. Schmidt, 99
 diversifolia Jacq., 99
 eggersiana Lindau, 99
 flavesces Jacq., 99
 fuertesii Urb., 99
 incrassata Urb., 99
 laurifolia Jacq., 99
 mansfeldii O. C. Schmidt, 100
 mornicola Urb., 99
 neurophylla Urb., 100
 nodosa Lindau, 99
 obtusifolia Jacq., 99
 pauciflora Urb., 99
 picardæ Urb., 99
 pubescens L., 99
 retusa Griseb., 100
 rotundifolia Meissn., 99
 scrobiculata Lindau, 99
 subcordata Lindau, 99
 subtruncata Urb., 99
 taylorii Urb., 99
 tortuensis Ekm. et O. C. Schmidt, 100
 uvifera L., 100
 venosa L., 100
 verruculosa Lindau, 100
 Coccothrinax Sarg., 36, 38
 anomala Becc., 38
 argentea Sarg., 38
 concolor Burret, 38
 ekmanii Burret, 38
 fragrans Burret, 38
 gracilis Burret, 38
 montana Burret, 38
 scoparia Becc., 38
 Cochenilla, 197

Cockscomb, 103
 Cocoa plum, 132
 Coco macaque, 39
 Cocombre, 372
 Cocos L., 37, 41
 nucifera L., 31
 Cocotier, 41
 Codæum Rumph., 178, 191
 variegatum Bl., 191
 Cœloneurum Radlk., 327, 331
 ferrugineum Urb., 331
 Cœur saignant, 44
 Coffea L., 353, 363
 arabica L., 363
 Coix L., 11, 12
 lacryma Jobi L., 12
 Cojoba, 138
 Cola Schott, 224, 226
 acuminata R. Br., 226
 Coleus Lour., 321
 amboinicus Lour., 325
 blumei Benth., 325
 laciniatus Benth., 325
 scutellarioides Benth., 325
 Colle-colle, 217
 Collège Matouri, 140
 Collet Notre-Dame, 81
 Collier, 136
 Colocasia Shott, 43, 44
 esculenta Shott, 44
 Colorade, 222
 Colubrina Brongn., 209, 210
 berteriana Urb., 211
 ferruginosa Brongn., 211
 reclinata Brongn., 211
 Columnea L., 341, 342
 sanguinea Hanst., 342
 tulæ Urb., 342
 Combretaceæ, 248, 253
 Combretum L., 254, 255
 cordatum G. Don., 255
 eriopetalum G. Don., 255
 laxum Jacq., 255
 Commelina L., 49, 50
 Commelina geniculata Desv., 50
 haïtiens Urb. et Ekm., 50
 nudiflora L., 50
 virginica L., 50
 Commelinaceæ, 46, 49
 Comocladia L., 196, 197
 cuneata Britt., 197
 dentata Jacq., 197
 dodonæa, 197
 domingensis Britt., 197
 ehrenbergii Engl., 197
 ekmaniana Helwig, 197
 gilgiana Helwig, 197

- glabra* Spreng., 197
 var. *acuminata* Urb., 197
gracilis Helwig, 197
mollifolia Ekm. et Helwig, 197
pinnatifolia L., 197
Compositæ, 374, 376
Concombre zombi, 330
Congea Roxb., 315, 319
tomentosa Roxb., 320
Conium L., 273, 274
maculatum L., 274
Connaraceæ, 129, 133
Conocarpus L., 254
erecta L., 255
 var. *sericea* Griseb., 255
Conostegia D. Don., 262, 264
affinis Urb., 264
clidmioides Ch. Wr., 264
hotteana Urb. et Ekm., 264
subhirsuta P. DC., 264
Consulida, 175
Convolvulaceæ, 303, 310
Copahy, 183, 184
Copernicia Mart., 36, 39
berteroana Becc., 39
ekmanii Burret, 39
Coq chango, 375
Coquelicot, 123, 311
Coque molle, 209, 279, 328
Coquillo, 311
Corail, 319, 360
Corallorrhiza R. Br., 63, 67
ekmanii Mansf., 67
Corazon de paloma, 236
Corchorus L., 214, 215
acutangulus Lam., 215
hirsutus L., 215
hirtus L., 215
Corchorus olitorius L., 215
siliquosus L., 215
Cordia L., 310, 311
alba R. et Sch., 311
alliodora Cham., 311
anisodonta Urb., 311
areolata Urb., 311
badeava Urb. et Ekm., 312
barahonensis Urb., 311
bombardensis Urb. et Ekm., 312
brittonii Macbride, 311
buchii Urb., 311
calicicola Urb., 311
chabrensis Urb. et Ekm., 312
claviceps Urb. et Ekm., 311
collococca L., 311
corymbosa G. Don., 311
cylindrostachya R. et Sch., 311
dependens Urb. et Ekm., 312
domingensis Lam., 311
ensifolia Urb., 311
exarata Urb., 311
fasciculata Urb. et Ekm., 311
fitchii Urb., 311
gerascanthus L., 311
gibberosa Urb. et Ekm., 312
Cordia globosa H. B. K., 311
haïtiensis Urb., 311
igneæ Urb. et Ekm., 311
integrifolia R. et Sch., 311
jeremiensis Urb. et Ekm., 311
junglandifolia Jacq., 311
laevigata Lam., 311
lamprophylla Urb., 311
lima R. et Sch., 311
 var. *subinflata* Urb., 311
microphylla R. et Sch., 311
nashii Urb. et Britt., 311
nitida Vahl., 311
 var. *angustata* Urb., 311
oligodonta Urb., 311
perroyana Urb. et Ekm., 312
picardæ Urb., 311
sebestena L., 311
selleana Urb., 311
serrata Gurke, 311
sulcata P. DC., 311
tortuensis Urb. et Ekm., 311
Cordylina Comm., 52, 53
terminalis Kunth, 53
Coreopsis L., 386, 391
rosea Nutt., 391
Cormier, 269
Corn poppy, 123
Cornaceæ, 271, 276
Corne cabrite, 298, 302
Cornutia L., 315, 319
pyramidata L., 319
Corosse, 42
Corossol, 119
Corossol marron, 119
Corossol zombi, 119
Corymbis flava Hesml., 68
Corymborchis Pet-Thou., 63, 68
flava O. Ktze, 68
Corynella P. DC., 146, 148
dubia Urb., 148
paucifolia P. DC., 148
Cosmos Cav., 386, 392
aurantiacus Klak., 392
caudatus H. B. K., 392
Costus L., 59
 cylindricus Jacq., 59
Côte soleil, 395
Cotelle, 185
Cotelette, 183
Coton, 221
Coton fleurs, 223
Coton mahodème, 223
Coton marron, 220
Coton soie, 301
Coulante, 273
Coup d'air, 309
Coupe pied, 112
Couper colonne, 367
Courbaril, 189
Courge, 372
Couronne du Christ, 194
Couroupita Aubl., 252
guianensis Aubl., 253
Cousin, 220
Cousin gros nègre, 215
Cousin vent, 317
Cowhage, 156
Cowich, 156
Cracca Benth., 146, 148
caribaea Benth., 148
Cranichis Sw., 62, 67
diphylla Sw., 67
muscosa Sw., 67
Craniolaria L., 341
annua L., 341
Crassulaceæ, 129
Crataeva L., 124, 125
apetala Urb., 125
Crescentia L., 337, 340
cujete L., 340
linearifolia Miers, 340
Cresson, 126
Cresson danois, 127
Cresson savanne, 128
Crête coq, 313
Crête coq simple, 103
Crin, 115
Crinum L., 53, 54
amabile Donn., 54
erubescens Ait., 54
palustre Urb., 54
Crisse marine, 168
Croc, 94
Croc chien, 107, 359
Crocro, 41
Crocro Guinée, 41
Croc souris, 363
Crotalaria L., 145
incana L., 145
lotifolia L., 145
pumila Ortega, 145
retusa L., 145
sagittalis L., 145
stipularia Desv., 145
verrucosa L., 145
Croton, 191
Croton L., 178, 183
abegii Urb. et Ekm., 183
allicophyllus Urb., 183
angustatus Urb., 183
angustifolius Desv., 183
aridicola Urb., 183
artibonitensis Urb., 183
astrophorus Urb., 183
azuensis Urb., 183
barahonensis Urb., 183
belanseanus Urb. et Ekm., 183
betulinus Vahl., 183
brachytrichus Urb., 183
Croton brevifolia Urb., 183
buchii Urb., 183
cascariilloides Geisel, 183
chaetodus Urb., 183
 var. *gonavensis* Urb., 183
citrifolius Lam., 183
coronatus Urb., 183
corylifolius Lam., 183
curvipes Urb., 183
discolor Willd., 183
flavens L., 183
flocculosus Geisel, 183
fuertesii Urb., 183
glabellus L., 183
glandulosus L., 183
gonavensis Urb. et Ekm., 183
humilis L., 183
jacmelianus Urb., 183
jagerianus Mull-Arg., 183
inæquidens Urb., 183
kenscoffii Urb., 183
krugianus Urb., 183
lindmanii Urb., 183
linearis Jacq., 183
lobatus L., 183
lucidus L., 183
mansfeldii Urb., 183
Croton megaladenus Urb., 183
microcarpus Desv., 183
microdon Urb., 183
microstachyus Desv., 183
moustiquensis Urb., 183
multicostatus Mull-Arg., 183
nanus Urb. et Ekm., 183
niveus Jacq., 183
nummularifolius A. Rich., 183
organifolius Lam., 183
ovalifolius Vahl., 183
pachysepalus Griseb., 183
pallidus Mull-Arg., 183
picardæ Urb., 183
plumieri Urb., 183
poitaei Urb., 183
polytomus Urb., 183
populifolius Lam., 183
prunifolius Vahl., 183
sidifolius Lam., 183
spiralis Mull-Arg., 183
strigosus Spreng., 183
sublucidus Mull-Arg., 183
vaillanti Geisel, 183
velutinus Bert., 183
waltherioides Urb., 183
Crudiâ Schreb., 139, 140
antillana Urb., 140
Cryptogamæ, 1
Cryptophorantus Barb. Rodr., 63, 68
atropurpureus Rolfe, 68
Cryptorhiza Urb., 256, 257
haïtiensis Urb., 257
Cryptostegia R. Br., 300
grandiflora R. Br., 300
Cubanthus Urb., 180, 194
umbelliformis Urb. et Ekm., 195
Cucumis L., 370, 372
anguria L., 372
melo L., 372
sativus L., 372
Cucurbita L., 371, 372
moschata Duch., 372
 var. *condensa* Bailey, 372
Cucurbitaceæ, 370
Cucurbitales, 80, 370
Cuero de puerco, 224
Cuervo de buey, 207
Culantro, 273
Cunoniaceæ, 129, 130
Cupania L., 203, 206
americana L., 206
triquetra A. Rich., 206
Cupey, 232
Cupeyejo, 232
Cupeyito, 232
Cuphea Adans., 250
ciliata Koehne, 251
cordifolia Koehne, 251
ekmanii O. C. Schmidt., 251
melanium R. Br., 251
micrantha H. B. K., 251
parsonsia R. Br., 251
riparia Ekm. et Schmidt., 251
rotundifolia Koehne, 251
urens Koehne, 251
Cupressus L., 4, 5
macrocarpa Hartw., 5
Curamaguey, 302
Curatella L., 228
americana L., 228
Curculigo Gaertn., 54, 55
scorzonerifolia J. G. Bak., 55
Curcuma L., 59
longa L., 59
Curia, 350
Cuscuta L., 304, 305
americana L., 305
domingensis Urb., 305
indecora Choisy, 305
umbellata H. B. K., 305
Cyathula Lour., 103, 104
achyranthoides Moq., 104
Cycadaceæ, 3
Cycadales, 3
Cycas L., 3
revoluta L., 3
Cyclanthaceæ, 42
Cyclanthales, 6, 42
Cydista Miers, 336, 338
æquinoctialis Miers, 338
Cymbocarpa Miers, 61
refracta Miers, 61
Cymbopogon Spreng., 13, 14
nardus Rendle, 14
Cymodocea Koen., 7, 8
manatorum Aschers., 8
Cynara L., 396
scolymus L., 396
Cynareæ, 376, 396
Cynoctonum Gmel., 290
mitreola Britton, 290
Cynodon Pers., 26
dactylon Pers., 26
Cynometra L., 139
americana Vogel, 139
portoricensis Krug. et Urb., 139
Cyperaceæ, 10, 31
Cyperus L., 31, 32
amabilis Vahl, 32
alternifolius L., 32
 var. *flabelliformis* Kuk., 32
articulatus L., 32
bruneus Clarke, 33
capillaris Vahl., 33
cayennensis Urb., 33
compressus L., 32
confertus Sw., 33
constanza Urb., 32
densus Link., 33
digitatus Roxb., 33
distans L., 32
eggersii Boeck, 32
ehrenbergianus Boeck, 33
elegans L., 32

esculentus L., 33
 var. *phymatodes* Kuk., 33
Cyperus ferax L. C. Rich., 32
filiformis Sw., 33
flabelliformis H. B. K., 33
flavescens Reichb., 33
flavus Nees., 32
fuligineus Chapm., 32
giganteus Vahl., 32
globulus Aubl., 33
 var. *multiflorus* Kuk. et Ekm., 33
gracilis Vahl., 33
haspan L., 32
 subsp. *juncoides* Lam., 32
 var. *amplissimus* Kuk., 32
hermaphroditus Urb., 33
humilis Kunth, 33
lævigatus L., 32
ligularis Urb., 33
luzula Rottb., 32
multisii H. B. K., 33
ochraceus Vahl., 32
odoratus Urb., 33
olfersianus Kunth., 33
picardæ Boeck., 32
planifolius L. C. Rich., 32
 var. *navassanus* Kuk. et Ekm., 32
polystachyus Rottb., 32
pulicaris Kuk., 32
radiatus Vahl., 32
rotundus L., 32
Cyperus sphacelatus Rottb., 32
swartzii Boeck., 32
tenuis Sw., 32
unioloides R. Br., 33
vahili Steud., 33
virens Nich., 33
 Cyprès, 5
Cypselea Turp., 110, 111
humifusa Turp., 111
Cyrilla Garden, 198
racemiflora L., 198
Cyrtillacæ, 195, 197
Cyrsium Scop., 396
mexicanum P. DC., 396
Cyrtopodium R. Br., 63, 72
punctatum Lindl., 72
Dactylæna Schrad., 124
ekmanii Helwig, 124
Dactyloctenium Willd., 26, 27
egyptium Richt., 27
Daguillo, 168
Dahlia Cav., 386, 391

pinnata Cav., 391
variabilis Desf., 391
Dalbergia L. f., 151
berterii Urb., 152
brownei Urb., 152
hecatophyllum Taub., 152
monetaria L. f., 152
Dalbergiæ, 144, 151
Dalea L., 146
domingensis P. DC., 147
Dalechampia L., 180, 188
scandens L., 189
Dalemarie, 232
Damage, 232
Dame-Marie, 232
Danneaux, 152
Danthonia P. DC., 25, 26
domingensis Hack. et Pilg., 26
shrevei Britton, 26
Daphnopsis Mart. et Zucc., 248, 249
americana Johnst., 249
oblongifolia Britt. et Wils., 249
uniflora Urb. et Ekm., 249
Dattier, 38
Datura L., 327, 330
fastuosa L., 330
metel L., 330
Datura stramonium L., 330
suaveolens H. et B., 330
tatula L., 330
Daucus L., 273, 274
carota L., 275
Delonix Rafin., 139, 142
regia Rafin., 142
Dendrocereus Britt. et Rose, 243, 245
undulosus Britt. et Rose, 245
Dendropemon Bl., 95
glatus V. Tiegh., 95
brachycarpus Urb., 95
coloratus Urb., 95
constantiæ Krug. et Urb., 95
emarginatus Stend., 95
laxiflorus Stend., 95
loranthoides V. Tiegh., 95
oliganthus Urb., 95
parvifolius Stend., 95
picardæ Krug. et Urb., 95
purpureus Krug. et Urb., 95
pycnophyllus Krug. et Urb., 95
rostratus Urb., 95
sessiliflorus Urb., 95

Dendropemon subsessilis Urb., 95
uniflorus Stend., 95
Dendrophthora Eichl., 95, 96
biseriata Urb., 96
brachylepsis Urb., 96
brachystachya Urb., 96
buxifolia Eichl., 97
cupressoides Eichl., 96
cupulata Eichl., 96
domingensis Eichl., 96
flagelliformis Krug. et Urb., 96
fuertesii Urb., 96
hians Urb., 96
marmeladensis Urb., 96
remotiflora Urb., 96
selleana Urb. et Ekm., 97
ternata Urb., 96
tetrastachya Urb., 96
versicolor Urb. et Ekm., 97
wrightii Eichl., 97
Dendrophylax Rchb. f., 64, 75
varius Urb., 75
Dendropogon Raf., 47, 48
usneoides Raf., 48
Derrière dos, 181
Derrière gonflé, 187
Desmanthus Willd., 134, 138
depressus H. et B., 138
virgatus Willd., 138
 var. *strictus* Griseb., 138
Desmodium Desv., 148, 150
affine Schlechtend., 151
ascendens P. DC., 151
axillare P. DC., 151
 var. *obtusifolium* Urb., 151
 var. *sintenisii* Urb., 151
barbatum Benth., 151
canescens P. DC., 151
ciliare P. DC., 151
cubense Griseb., 151
denudatum P. DC., 151
intortum Urb., 151
molle P. DC., 151
procumbens Hitchc., 151
scorpiurus Desv., 151
supinum P. DC., 151
 var. *amblyophyllum* Urb., 151
 var. *angustifolium* Urb., 151
tortuosum P. DC., 151
triflorum P. DC., 151
Desalines, 387

Deux hommes, 194
 Deux jumelles, 140
 Deux saisons, 194
Dichæa Lindl., 64, 75
Dichæa echinocarpa Lindl., 75
glaucia Lindl., 75
graminoides Lindl., 75
morrisii Fawc. et Rendle, 75
muricata Lindl., 75
trichocarpa Lindl., 75
Dichæopsis Pfitz., 75
glaucia Schlechter, 75
graminoides Schlechter, 75
morrisii Schlechter, 75
Dichapetalaceæ, 160, 177
Dichondra Forst., 304, 305
micrantha Urb., 306
repens Forst., 306
 var. *sericea* Choisy, 306
Dichromena Vahl., 31, 34
ciliata Vahl., 34
colorata Hitchc., 34
radicans Schl. et Cham., 34
Dicliptera Juss., 345, 349
assurgens Juss., 350
mucronata Urb., 350
obtusifolia Urb., 350
Dicotyledoneæ, 2, 5, 75
Didymopanax Dcne et Pl., 271, 272
morototoni Dcne et Pl., 272
tremulum Krug. et Urb., 272
Dieffenbachia Schott., 43
seguine Schott., 44
Digitaria Haller, 16, 19
argillacæ H. et C., 19
digitata Urb., 19
leucocoma Nash., 19
panicea Urb., 19
sanguinalis Scop., 19
villosa Walt., 19
Dilleniaceæ, 227, 228
Diodia Gronov., 354, 367
domingensis P. DC., 367
maritima Thonn., 367
perforata Urb., 367
rigida Ch. et Schl., 367
 var. *buchii* Urb., 367
sarmentosa Sw., 367
scandens Sw., 367
Dioscorea L., 56
alata L., 56
Dioscorea altissima Lam., 56
bulbifera L., 56

cayennensis Lam., 56
haïtiens Knuth., 56
occidentalis Knuth., 56
pilosiuscula Bert., 56
polygonoides H. et B., 56
tamoides Griseb., 56
trifida L., 56
Dioscoreaceæ, 51, 55
Diospyraceæ, 287
Diospyros L., 287
tetrasperma Sw., 287
Dipholis A. DC., 283, 285
angustifolia Urb., 285
anomala Urb., 285
domingensis Pierre et Urb., 285
leptopoda Urb. et Ekm., 285
repens Urb. et Ekm., 285
salicifolia A. DC., 285
Diplanthera Thouars, 7, 8
wrightii Aschers, 8
Diploptaxis DC., 126, 128
muralis DC., 128
Disciphania Eichl., 116
domingensis Urb., 116
Distichlis Raf., 28, 30
spicata Greene, 30
Distictis Mart., 337
lactiflora P. DC., 337
Distreptus Cass., 377, 378
spicatus Cass., 378
Ditaxis Vahl., 178, 184
haïtiens Urb., 184
Ditta Griseb., 179, 192
myricoides Griseb., 192
Divi-divi, 143
Dodonæa L., 203, 207
viscosa Jacq., 207
 var. *angustifolia* Benth., 207
 var. *spatulata* Benth., 207
 var. *vulgaris* Benth., 207
repandra Radlk., 207
Dog wood, 152
Dombou, 172
Domingoa Schlechter, 64, 71
hymenodes Schlechter, 71
nodosa Schlechter, 71
Dorstenia L., 88, 89
caimitensis Urb., 89
cordifolia Sw., 89
domingensis Urb. et Ekm., 89
ekmanii Urb., 89
fawcettii Urb., 89
flagellifera Urb. et Ekm., 89

hotteana Urb. et Ekm., 89
marginata Urb. et Ekm., 89
multisquamæ Urb., 89
nipensis Urb. et Ekm., 89
numularia Urb. et Ekm., 89
peltata Spreng., 89
tricolor Urb. et Ekm., 89
Douleur, 366
Doxantha Miers, 337, 338
unguis cati Miers, 338
Dracontium L., 43, 44
polyphyllum L., 44
Drejerella Lindau, 345, 349
mirabiloides Lindau, 349
Drepanocarpus G. F. W. Mey, 151, 152
lunatus G. F. W. Mey, 152
Drymaria Willd., 113, 114
Drymaria cordata Willd., 114
Drypetes Vahl., 178, 182
alba Poit., 182
glaucia Vahl., 182
lateriflora Krug. et Urb., 182
picardæ Krug. et Urb., 182
piriformis Urb., 182
Duende, 54
Duranta L., 315, 318
erecta L., 318
 var. *domingensis* Urb., 318
repens L., 318
Du riz, 24
Dwarf banana, 58
Dyschoriste Nees, 345, 346
diffusa Urb., 346
 var. *glabrata* Urb., 346
Ebenaceæ, 283, 287
Ebenales, 79, 283
Echalotte, 52
Echinochloa Beauv., 17, 22
colona Link., 22
crus galli Beauv., 22
spectabilis Link., 22
Echinodorus L. C. Rich., 8
cordifolius Griseb., 8
tenellus Buchen., 8
Echites L., 294, 297
agglutinata Jacq., 297
angustifolia Poir., 297
breviflora Urb., 297
dolichopetala Urb., 297
glomerata Poir., 297

- longiflora Ekm. et Helwig, 297
 picardæ Urb., 297
 repens Jacq., 297
 umbellata Jacq., 297
 Eclipta L., 384, 389
 alba Hassk., 389
 Egletes Cass., 381
 prostrata O. Ktze., 382
 Ehretia L., 310, 312
 tinifolia L., 312
 Eichhornia Kunth., 51
 azurea Kunth., 51
 crassipes Solms., 51
 diversifolia Urb., 51
 Ekmaniocharis Urb., 263, 267
 crassinervis Urb., 268
 Ekmanianthe Urb., 337, 339
 longiflora Urb., 339
 Elæis Jacq., 37, 41
 guineensis L., 41
 Elaeocarpaceæ, 213
 Elaeodendron Jacq. fil., 199, 201
 ehrenbergii Urb., 201
 lanceolatum Urb. et Ekm., 201
 xylocarpum P. DC., 201
 Elatinaceæ, 227, 233
 Elatinoides Wettst., 332, 333
 elatine Wettst., 333
 Elephantopus L., 378
 angustifolius Sw., 378
 mollis H. B. K., 378
 Elleanthus Presl., 63, 72
 capitatus Rchb. f., 72
 linifolius Presl., 72
 Eleusine Gaertn., 26, 27
 indica Gaertn., 27
 verticillata Roxb., 27
 Eleutheranthera Poit., 385, 390
 ruderalis Schultz-Bip., 390
 Eleutherine Herb., 57
 bulbosa Urb., 57
 Elytraria Michx., 345
 squamosa Lindau, 346
 Emilia Cass., 395
 sagittata P. DC., 395
 sonchifolia P. DC., 395
 Enallagma Baill., 337, 340
 cucurbitina Baill., 340
 Enhydra Lour., 384, 388
 sessilis P. DC., 388
 Enicostema Bl., 291, 292
 verticillatum Engl., 292
 Entada Adans., 134, 138
 gigas Fawc. et Rendle, 139
 polystachya P. DC., 139
 scandens Benth., 139
 Enterolobium Mart., 134, 135
 cyclocarpum Griseb., 135
 saman Prain., 135
 Epidendrum L., 65, 70
 anceps Jacq., 71
 atropurpureum Willd., 70
 bifidum Aubl., 70
 blancheanum Urb., 71
 boothianum Lindl., 71
 buchii Cogn., 70
 christii Cogn., 70
 cochleatum L., 70
 corymbosum Lindl., 71
 difforme Jacq., 71
 domingense Cogn., 70
 eggersii Cogn., 70
 ekmanii Mansf., 71
 fragrans Sw., 70
 fucatum Lindl., 70
 fuertesii Cogn., 70
 globosum Jacq., 70
 imbricatum Lindl., 71
 isochilum Rchb. f., 70
 var. tridens Rchb. f., 70
 nocturnum Jacq., 71
 var. latifolium Lindl., 71
 olivaceum Cogn., 70
 ottonis Rchb. f., 70
 porpax Rchb. f., 71
 var. domingense Cogn., 71
 ramosum Jacq., 71
 repens Cogn., 71
 Epidendrum rigidum Jacq., 71
 rivulare Lindl., 71
 strobiliferum Rchb. f., 71
 var. swartzii Rchb. f., 71
 teretifolium Sw., 70
 truncatum Cogn., 70
 variegatum W. Hook., 70
 var. coriaceum Lindl., 70
 wrightii Lindl., 71
 Epilobium L., 270
 coloratum Muhl., 270
 domingense Urb., 270
 Epines du Christ, 247
 Equisetinae, 2
 Eragrostis Host., 28, 29
 amabilis Wight, 29
 berteroniana Steud., 29
 ciliaris Link., 29
 elliptii S. Wats., 29
 hypnoides B., St. et P., 29
 minor Host, 29
 pilosa Beauv., 29
 prolifera Steud., 29
 tephrosanthos Schult., 29
 Eranthemum L., 245, 247
 nervosum R. Br., 347
 Erechthites Raf., 394, 395
 hieracifolia Raf., 395
 Ericaceæ, 277
 Ericales, 79, 276
 Erigeron L., 381, 382
 araneosus Urb., 382
 bellioides P. DC., 382
 bonariensis L., 382
 buchii Urb., 382
 caeruleus Urb., 382
 canadensis L., 382
 cuneifolius P. DC., 382
 dissectus Urb., 382
 domingensis Urb., 382
 fuertesii Urb., 382
 jamaicensis L., 382
 mucronatus P. DC., 382
 pinetorum Urb., 382
 spathulatus Vahl., 382
 subalpinus Urb., 382
 tuerckheimii Urb., 382
 vegaensis Urb., 382
 Eriocaulaceæ, 46
 Eriochloa H. B. K., 17, 19
 punctata Desv., 19
 Eriochrysis Beauv., 12, 13
 cayennensis Beauv., 13
 Eriosema DC.
 adulterinum Urb. et Ekm.
 crinitum G. Don.
 domingense Urb. et Ekm.
 simplicifolium G. Don.
 Erithalis L., 353, 362
 fruticosa L., 362
 parviflora Griseb., 362
 Ernodea Sw., 354, 366
 litoralis Sw., 367
 uninervis Urb., 367
 Eryngium L., 273
 foetidum L., 273
 Erythrina L., 153, 156
 berteroniana Urb., 156
 indica Lam., 156
 leptopoda Urb. et Ekm., 156
 micropteryx Poepp.
 Erythroides Blume, 62, 66
 hirtella Fawc. et Rendle, 66
 plantaginea Fawc. et Rendle, 66
 sagræana A. Rich., 66
 Erythroxylaceæ, 161, 163
 Erythroxylon L., 163
 areolatum L., 163
 barahonense O. E. Schulz et Ekm., 163
 brevipes P. DC., 163
 havanense Jacq., 163
 var. haïtiense O. E. Schulz, 163
 minutifolium Griseb., 163
 rufum Cav., 163
 suave O. E. Schulz, 163
 urbanii O. E. Schulz, 163
 Escobilla, 325
 Escobita amarga, 387
 Escobon, 260
 Espagnol marron, 181
 Espinillo, 165
 Eubracion Hook f., 95, 97
 ambiguum Engl., 97
 Eucalyptus l'Hér., 256, 261
 Eugenia L., 256, 259
 abegii Urb. et Ekm., 260
 aeruginea P. DC., 259
 axillaris Willd., 259
 belladerensis Urb. et Ekm., 259
 bicincta Urb. et Ekm., 259
 biflora P. DC., 259
 var. ludibunda Krug. et Urb., 259
 Eugenia brachyclada Urb. et Ekm., 260
 buxifolia Willd., 260
 cahosiana Urb. et Ekm., 260
 calumettæ Urb. et Ekm., 260
 christii Urb., 259
 chrootricha Urb. et Ekm., 260
 confusa DC., 260
 cordata P. DC., 259
 var. sintenisii Krug. et Urb., 259
 crenulata Willd., 259
 delpechiana Urb. et Ekm., 260
 dictyophylla Urb., 260
 ehrenbergiana Berg., 259
 esnardiana Urb. et Ekm., 260
 floribunda West., 260
 formonica Urb. et Ekm., 260
 fragrans Willd., 260
 glabrata P. DC., 260
 gonavensis Urb., 260
 haïtiensis Krug. et Urb., 259
 heteroclita Tuss., 260
 jambos L., 260
 intermedia Berg., 259
 isabeliana Kiærsk., 259
 lævis Berg., 260
 lindahlil Urb. et Ekm., 260
 ligustrina Willd., 259
 linearis L. C. Rich., 259
 Eugenia lineata P. DC., 259
 var. racemosa Berg., 259
 lineolata Urb. et Ekm., 260
 malangensis Urb. et Ekm., 260
 melanadenia Krug. et Urb., 259
 minguetii Urb., 260
 monticola P. DC., 259
 var. latifolia Krug. et Urb., 259
 mornicola Urb., 259
 mucronata Berg., 259
 namophylla Urb. et Ekm., 260
 odorata Berg., 259
 orthioneura Urb., 260
 perriniana Urb. et Ekm., 260
 picardæ Krug. et Urb., 259
 pilosula Krug. et Urb., 259
 pitoniana Urb. et Ekm., 260
 pitrensis Urb., 260
 pitresia Urb., 260
 plinioides Urb. et Ekm., 260
 polyclada Urb. et Ekm., 260
 pomifera Urb., 259
 var. angustissima Urb., 259
 var. latifolia Urb., 259
 procera Poir., 260
 pseudopsidium Jacq., 260
 var. sintenisii Krug. et Urb., 260
 reticularis Berg., 259
 rhombea Krug. et Urb., 260
 Eugenia tussacii Urb. et Ekm., 260
 umbellulifera Krug. et Urb., 260
 uniflora L., 259
 vanderveldei Urb. et Ekm., 260
 vigiensis Urb. et Ekm., 260
 Eulophia R. Br., 63, 72
 alta Fasc. et Rendle, 72
 Eupatorieæ, 376, 379
 Eupatorium L., 379
 barahonense Urb., 380
 buchii Urb., 380
 calcicolum Urb., 380
 constanzæ Urb., 380
 corymbosum Aubl., 380
 dictyonium Urb., 380
 dolichopus Urb., 380
 fuertesii Urb., 380
 gabii Urb., 380
 gibbosum Urb., 380
 havanense H. B. K., 380
 var. domingense Robins., 380
 heptaneurum Urb., 380
 jacquemontii Urb., 380
 jagerianum Urb., 380
 jenssenii Urb., 380
 illitum Urb., 380
 Eupatorium inæquidens Urb., 380
 ivifolium L., 380
 larcheanum Urb., 380
 macrophyllum L., 380
 microstemon Cass., 380
 miragoanæ Urb., 380
 obtusissimum P. DC., 380
 odoratum L., 380
 pachyneurum Urb., 380
 picardæ Urb., 380
 puberulum P. DC., 380
 reversum Urb., 380
 sciatriphes Robins., 380
 selleanum Urb., 380
 semicrenatum Urb., 380
 sinuatum Lam., 380
 sophiaefolium L., 380
 tapeinanthum Urb., 380
 triradiatum Urb., 380
 urbanii Ekm., 380
 Euphorbia L., 180, 193
 adenoptera Bertol., 193
 barkeri Urb. et Ekm., 193
 berteriana Balb., 193
 buxifolia Lam., 193
 cassythoides Boiss., 193
 Euphorbia defoliata Urb., 193
 eggersii Urb., 193
 excisa Urb. et Ekm., 193
 helwigii Urb. et Ekm., 193
 hepatica Urb. et Ekm., 193
 heterophylla L., 193
 var. graminifolia Engelm.
 hypericifolia L., 193
 hyssopifolia L., 193
 inflexa Urb. et Ekm., 193
 lactea Haw., 193
 lasiocarpa Klotzsch., 193

- nutans Lag., 193
 parviflora Urb., 193
 peplus L., 193
 petiolaris Sims., 193
 pilulifera L., 193
 prostrata Ait., 193
 pulcherrima Willd., 193
 serpens H. B. K., 193
 splendens Bojer, 193
 tuerckheimii Urb., 193
 turpini Boiss., 193
 umbrosa Bert., 193
 villosula Urb., 193
 Euphorbiaceae, 160, 177
 Eurya Thumb., 229, 230
 albopunctata Griseb., 230
 nummularia Urb. et Ekm., 230
 vaccinioides O. C. Schmidt, 230
 Eustoma Salisb., 293
 exaltatum Salisb., 293
 Euterpe Gaertn., 37, 40
 globosa Gaertn., 40
 Evolvulus L., 304, 306
 alsinoides L., 306
 arbuscula Poir., 306
 glaber Spreng., 306
 nummularius L., 306
 sericeus Sw., 306
 Exostema L. C. Rich., 352, 358
 acuminatum Urb., 358
 angustifolium R. et Sch., 358
 caribaeum R. et Sch., 358
 var. velutinum Urb., 358
 coriaceum R. et Sch., 358
 elegans Krug. et Urb., 358
 lineatum R. et Sch., 358
 longiflorum R. et Sch., 358
 Exostema nitens Urb., 358
 picardae Krug. et Urb., 358
 polyphyllum Urb. et Ekm., 358
 rupicolum Urb., 358
 sanctae Luciae J. Britt., 358
 selleanum Urb. et Ekm., 358
 spinosum Krug. et Urb., 358
 var. tortuense Urb., 358
 subcordatum Krug. et Urb., 358
 var. buchii Urb., 358
- Exothea Macf., 203, 207
 penniculata Radlk., 207
 Fagaceae, 86
 Fagales, 77, 86
 Fagara L., 164, 165
 azuensis Urb. et Ekm., 165
 coriacea Krug. et Urb., 165
 domingensis Krug. et Urb., 165
 elephantipes Krug. et Urb., 165
 flava Krug. et Urb., 165
 furcensis Urb., 165
 haïtiens Urb., 165
 leonardi Urb., 165
 martinicensis Lam., 165
 monophylla Lam., 165
 Fagara nashii Urb., 165
 nigrescens Urb. et Ekm., 165
 obcordata Urb. et Ekm., 165
 obtusangularis Urb., 165
 pimpinelloides Lam., 165
 pterota L., 165
 spinifex Jacq., 165
 tetraphylla Urb. et Ekm., 165
 tragodes Jacq., 165
 trifoliata Sw., 165
 venosa Urb., 165
 Fagus L., 86
 silvatica L., 86
 False boxwood, 200
 Faramaea Aubl., 354, 366
 occidentalis A. Rich., 366
 Feregosa, 335
 Festuca L., 28, 30
 myurus L., 30
 Festuceae, 11, 28
 Feuille à cœur, 82
 Feuille avé, 109
 Feuille bounda, 380
 Feuille crabe, 375
 Feuille dépôt, 391
 Feuille macaque, 53
 Feuille malfini, 310
 Feuille St-Jean, 194
 Feuille pè, 45, 184
 Feuille sirop, 81
 Feuille z'arien, 389
 Feuille L., 370, 371
 cordifolia L., 371
 var. hederacea Cogn., 371
 Ficus L., 88, 90
 aurea Nutt., 90
 carica L., 90
 eggersii Warb., 90
 elastica Roxb., 90

- hotteana Urb. et Ekm., 90
 jacquinifolia A. Rich., 90
 mitrophora Warb., 90
 nitida Thunb., 90
 picardae Warb., 90
 plumerii Urb., 90
 populnea Willd., 90
 var. brevifolia Warb., 90
 var. hispaniolae Urb., 90
 populloides Warb., 90
 var. dilatata Warb., 90
 religiosa L., 90
 rubricosta Warb., 90
 serrata L., 90
 wrightii Warb., 90
 Fideo, 305
 Fides, 122
 Figue, 58
 Figue banane, 58
 Figue France, 90
 Figue naine, 58
 Figuier blanc, 90
 Figuier cannelle, 90
 Figuier maudit, 232
 Figuier maudit marron, 232
 Figuier rouge, 90
 Filicineae, 2
 Filière, 312
 Fimbristylis Vahl., 31, 33
 Fimbristylis annua R. et Schl., 33
 complanata Link., 33
 ferruginea Vahl., 33
 glomerata Urb., 33
 monostachya Hassk., 33
 spadicea Vahl., 33
 Fish geranium, 161
 Flacourtiaceae, 227, 235
 Flamboyant, 142
 Flame tree, 142
 Flemingia Roxb., 154, 159
 strobilifera R. Br., 159
 Fleur capre, 164
 Fleur cygne, 98
 Fleur d'artres, 141
 Fleur dent, 311
 Fleur la cigale, 316
 Fleur languette, 155
 Fleur palmiste, 141
 Fleur pétards, 347
 Fleur soleil, 389, 390
 Fleur St-Christophe, 141
 Fleur souci, 393
 Fleur sureau, 369
 Fleurya Gaudich., 91
 aestuans Gaudich., 91
 var. limacana Wedd., 91
 cuneata Wedd., 91
- Foeniculum L., 273, 274
 officinale All., 274
 vulgare Mill., 274
 Forchhammeria Liebm., 124
 125
 brevipes Urb., 125
 sphærocarpa Krug. et Urb., 125
 Forestiera Poir., 289
 rhamnifolia Griseb., 289
 Forestiera segregata Krug. et Urb., 289
 selleana Urb. et Ekm., 289
 Forget me not, 282
 Forsteronia G. F. W. Mey., 295, 299
 corymbosa G. F. W. Mey., 299
 Fougères, 2
 Four o'clock, 106
 Fragaria L., 131
 vesca L., 131
 Fraise, 131
 Franc basin, 326
 Francillade, 143
 Frangipane, 295
 Frangipanier, 295
 Frangipanier épineux, 295
 Frangipanier marron, 295
 Frangipanier rose, 295
 Frêne, 168
 Frigol, 125
 Frœlichia Moench, 103, 104
 interrupta Moq., 104
 Fromagier, 222, 366
 Fuchsia L., 270
 pringsheimii Urb., 270
 triphylla L., 270
 Fuertesia Urb., 240
 domingensis Urb., 241
 Fuertesella Schlechter, 65, 66
 pterichoides Schlechter, 66
 Fuirena Rottb., 31, 34
 umbellata Rottb., 34
 Fumaria L., 122, 123
 muralis Sonder, 123
 Funastrum Fourn., 300, 302
 clausum Schlecht., 302
 Funtumya Stapf., 294, 299
 elastica Stapf., 299
 Furcraea Vent., 54, 55
 gigantea Vent., 55
 hexapetala Urb., 55
 tuberosa Ait. f., 55
 Fustic, 89
 Gagnepin, 59
 Gaïac, 163
 Gaïac bâtard, 163
 Gaïac femelle, 163

- Gaïac franc, 163
 Gaïac mâle, 163
 Galactia Michx., 154, 157
 buchii Urb., 157
 caïmitensis Urb. et Ekm., 157
 dubia DC., 157
 var. ehrenbergii Urb., 157
 excisa Urb. et Ekm., 157
 filiformis Benth., 157
 var. abboreviata Urb., 157
 fuertesii Urb., 157
 glomerata Urb., 157
 jussiaeana Kunth., 157
 leucocarpa Desv., 157
 lignosa Urb., 157
 Galactia longifolia Benth., 157
 parvifolia A. Rich., 157
 schomburgkii Urb., 157
 striata Urb., 157
 var. cubensis Urb., 157
 var. tomentosa Urb., 157
 synandra Urb., 157
 Galatas, 55
 Galegae, 144, 145
 Galinsoga R. et P., 386, 392
 parviflora Cav., 392
 Galium L., 354, 368
 aparine L., 369
 brevipes Urb., 369
 pilosum Ait., 369
 var. punctulosum Torr. et Gray, 369
 trifidum L., 369
 Galle-galle, 149, 210
 Gallito, 87
 Galphimia Cav., 173, 174
 gracilis Bartl., 174
 Gamelle, 99
 Gamopetalae, 76, 79
 Garcia Rohr., 178, 189
 nutans Rohr., 189
 Garden nasturtium, 162
 Garden pea, 153
 Garrya Dougl., 276
 fadyenii Hook., 276
 Garryaceae, 276
 Gaultheria L., 277, 278
 coccinea Urb., 278
 domingensis Urb., 278
 Gaya H. B. K., 216, 219
 domingensis Urb., 219
 occidentalis H. B. K., 219
 Gayoides Small., 216, 217
 crispum Small., 217
 Gazon, 19
 Gène-pas, 359
- Génévrier, 5
 Gengibre cimarron, 59
 Genipa L., 352, 359
 americana L., 359
 Genipayer, 359
 Genistae, 144, 145
 Gentianaceae, 288, 291
 Gentianales, 288
 Geonoma W., 37, 39
 oxycarpa Mart., 39
 Geophila Don, 354, 365
 herbacea K. Schum., 365
 Geraniaceae, 161
 Geraniales, 160
 Geranium, 161
 Geranium L., 161
 dissectum L., 161
 robertianum L., 161
 rotundifolium L., 161
 Gerardia L., 333, 336
 domingensis Spreng., 336
 Gesneria L., 342, 343
 aspera Urb. et Ekm., 343
 barahonensis Urb., 343
 bullata Urb. et Ekm., 343
 christii Urb., 343
 cubensis O. Ktze., 343
 cuneifolia Sessé et Moc., 343
 Gesneria decapleura Urb., 343
 dolichostyla Urb., 343
 ekmanii Urb., 343
 fruticosa O. Ktze., 343
 humilis L., 343
 hybocarpa Urb. et Ekm., 343
 hypoclada Urb. et Ekm., 343
 lanceolata Urb. et Ekm., 343
 mornicola Urb. et Ekm., 343
 scopulorum Urb. et Ekm., 343
 sintenisii Urb., 343
 subalata Urb., et Ekm., 343
 ventricosa Sw., 343
 Gesneriaceae, 304, 341
 Gilia R. et P., 309
 incisa Benth., 309
 Gilibertia R. et P., 271, 272
 arborea E. March., 272
 brachypoda Urb., 272
 selleana Urb. et Ekm., 272
 Ginbey, 375
 Gingembre, 59
 Gingembre marron, 59
 Ginoria Jacq., 250, 251
 callosa O. C. Schmidt, 251

lanceolata O. C. Schmidt, 251
 rohrrii Koehne, 251
 Giramont, 372
 Gladiolus L., 57
 Glaieul, 60
 Glinus L., 110, 111
 radiatus Rohrb., 111
 Gliricidia H. B. K., 146, 147
 sepium Steud., 147
 Glycomis Correa, 165, 166
 pentaphylla Correa, 166
 Gnaphalium L., 383
 domingense Lam., 383
 eggersii Urb., 383
 indicum L., 383
 rosillense Urb., 383
 spathulatum Lam., 384
 spicatum Lam., 384
 stachydifolium Lam., 384
 viscosum H. B. K., 383
 Goavier marron, 360
 Gombo marron, 221
 Gomidesia O. Berg., 256, 259
 lindeniana Berg., 259
 Gommier blanc, 170
 Gomphrena L., 103, 105
 dispersa Standl., 105
 globosa L., 105
 Gonolobus R. Br., 300, 302
 dictyopetalus Urb. et Ekm., 303
 membranaceus Schlecht, 303
 pauciflorus Spreng., 303
 Gonzalagunia R. et P., 352, 358
 brachyantha Urb., 358
 haïtiens Urb. et Ekm., 358
 microsepala Urb. et Ekm., 358
 spicata Maza, 358
 Gopher plum, 132
 Goric, 168
 Goodeniaceae, 374, 375
 Gossypium L., 216, 221
 barbadense L., 221
 ekmanianum Wittmach, 221
 hirsutum L., 221
 Gouane goul, 135
 Gouania Jacq., 208, 211
 lupuloides Urb., 211
 var. aptera Urb., 211
 f. macroptera Urb., 211
 polygama Urb., 211
 Gounelle, 208
 Gouyave, 257
 Govenia Lindl., 63, 72

utriculata Lindl., 73
 Grab's eyes, 153
 Graffenrieda P. DC., 262, 264
 chrysandra Triana, 264
 Grain d'or, 187
 Graine canique, 205
 Graine chapelet, 12
 Graine de lin pays, 137
 Graine maldioc, 12
 Granado, 252
 Granalino, 137
 Grand jonc, 7
 Granolino, 136
 Graptophyllum Nees, 345, 348
 pictum Griff., 348
 Gratte-galle, 149
 Grenade, 252
 Grenade marron, 187
 Grenadine, 240
 Griffes chatte, 338
 Gri-gri, 319
 Gris-gris des montagnes, 255
 Gros mahaut, 221
 Gros peau, 205
 Gros petites feuilles, 260
 Gros tête, 322
 Guacajaco, 166
 Guajacum L., 163
 officinale L., 163
 sanctum L., 163
 Guajavo, 141
 Guama, 135
 Guanabana, 119
 Guanabana cimarrona, 119
 Guanabanito, 119
 Guanavana, 119
 Guanaverra, 119
 Guan banza, 56
 Guandula, 158
 Guao, 197
 Guara, 206
 Guarana, 206
 Guarape, 100
 Guarea L., 171, 172
 sphenophylla Urb., 172
 trichilioïdes L., 172
 Guasara, 259
 Guasima, 225
 Guatabo, 158
 Guatapaná, 143
 Guattaria R. et P., 118, 119
 blainii Urb., 119
 Guava, 257
 Guayaba de Indio, 279
 Guayacan, 163
 Guayacan bastarde, 163
 Guayiga, 3
 Guayuyo, 81
 Guayuyo blanco, 81
 Guazuma Adans, 224, 225

tomentosa H. B. K., 225
 ulmifolia Lam., 225
 Guérit tout, 44
 Guérit vite, 268
 Gueule de lion, 324
 Guettarda L., 353, 360
 aculeolata Urb., 361
 angustata Urb. et Ekm., 361
 apiculata Urb. et Ekm., 361
 argentea Lam., 361
 var. glabrata Urb., 361
 baltenweckii Urb., 361
 barahonensis Urb., 361
 cahosiana Urb. et Ekm., 361
 crenulata Urb. et Ekm., 361
 dictyophylla Urb., 361
 elliptica Sw., 361
 erosa Urb. et Ekm., 361
 fuertesii Urb., 361
 insularum Urb. et Ekm., 361
 lacornea Urb. et Ekm., 361
 lindeniana A. Rich., 361
 membranacea Sw., 361
 mollis P. DC., 361
 multinervis Urb., 361
 nannocarpa Urb. et Ekm., 361
 ovalifolia Urb., 361
 oxyphylla Urb., 361
 polytheca Urb. et Ekm., 361
 Guettarda prenleloupil Urb., 360
 psiloclada Urb., 361
 punctata Urb. et Ekm., 361
 pungens Urb., 361
 rotundifolia Urb., 361
 saxicola Urb., 361
 scabra Lam., 360
 spinifera Urb., 361
 stenophylla Urb., 361
 tenuiramis Urb., 361
 tortuensis Urb. et Ekm., 361
 turpinii Urb., 361
 xanthocarpa Urb. et Ekm., 361
 Gui, 95
 Guiguite, 70
 Guilleminea H. B. K., 103, 104
 lanuginosa Hook, 104
 Guimaube, 217, 220
 Gundlachia A. Gray, 381, 382

domingensis A. Gray, 382
 floribunda Urb., 382
 lindeniana Urb., 382
 var. corymbosa Britton, 382
 Guttiferae, 230
 Guzmania R. et P., 47, 49
 berteroniana Mez., 49
 clavata Urb., 49
 ekmanii Urb., 49
 lingulata Mez., 49
 monostachya Rusby, 49
 Gyminda Sarg., 199, 200
 latifolia Urb., 200
 Gymnanthes Sw., 180, 193
 lucida Sw., 193
 pallens Mull-Arg., 193
 Gymnopogon Beauv., 26
 foliosus Nees, 27
 Gymnospermae, 2, 3
 Gynandropsis P. DC., 124
 gynandra Briq., 124
 Gynerium H. et B., 28, 29
 sagittatum Beauv., 29
 Gyrotonia Griseb., 91
 myriocarpa Griseb., 91
 Habenaria Willd., 62, 65
 alata Hook., 65
 distans Griseb., 65
 var. jamaicensis Cogn., 65
 eustachya Rchb. f., 65
 macrocratites Willd., 65
 monorrhiza Rchb. f., 65
 repens Nutt., 65
 Hamatoxylon L., 139, 142
 brasiletto Karst., 142
 campechianum L., 142
 Hænanthus Urb., 289, 290
 oblongatus Urb., 290
 Haïtia Urb., 249, 251
 buchii Urb., 251
 pulchra Ekm., et Schmidt., 251
 Halimium Spach, 233
 domingense Urb., 233
 stenophyllum Urb., 233
 Halodule wrightii Aschers, 8
 Hamelia Jacq., 353, 360
 cuprea Griseb., 360
 var. haïtiens Urb., 360
 intermedia Urb. et Ekm., 360
 lutea Rohrb., 360
 patens Jacq., 360
 Hamo, 50
 Haquimey, 201
 Harrisia Britton, 243

divaricatus Britt., 243
 nashii Britt., 243
 Havamo, 371
 Hayay, 249
 Hedysarea, 144, 148
 Hedyosmum Sw., 84
 domingense Urb., 84
 nutans Sw., 84
 Helenia, 376, 377, 393
 Helenium L., 393
 quadridentatum Lab., 393
 tenuifolium Nutt., 393
 Heleocharis R. Br., 31, 33
 Heleocharis acicularis R. Br., 33
 capitata R. Br., 33
 cellulosa Torr., 33
 flaccida Urb., 33
 geniculata R. Br., 33
 interstincta R. Br., 33
 mutata R. Br., 33
 nodulosa Schult., 33
 var. subnodulosa Kuk., 33
 retroflexa Urb., 33
 tenuissima Boeck., 33
 Heliantheae, 377, 384
 Helianthus L., 385, 390
 annuus L., 390
 tuberosus L., 390
 Heliconia L., 58
 bihai L., 58
 Helicteres L., 224, 226
 jamaicensis Jacq., 226
 semitriloba Bert., 226
 Heliotropium L., 310, 313
 campechianum H. B. K., 313
 crispiflorum Urb., 313
 Heliotropium curassavicum L., 313
 dichroum Urb., 313
 elegans Urb. et Ekm., 313
 glomerulifolium Urb. et Ekm., 313
 haïtiens Urb., 313
 humifusum H. B. K., 313
 humile R. Br., 313
 hypogæum Urb. et Ekm., 313
 indicum L., 313
 inundatum Sw., 313
 microphyllum Sw., 313
 parviflorum L., 313
 pedicellare Urb. et Ekm., 313
 plumerii Urb. et Ekm., 313
 uncinata Urb. et Ekm., 313
 Hemidiodia K. Schum, 354, 367

ocimifolia K. Schum, 367
 Hemisiphonia Urb., 334, 335
 antillana Urb., 335
 Henriettella Naud., 263, 268
 barkerii Urb. et Ekm., 268
 ciliata Urb. et Ekm., 268
 elliptica Urb., 268
 fascicularis Ch. Wr., 268
 var. sintenisii Cogn., 268
 Henriettella magaloclada Urb. et Ekm., 268
 reticulata Cogn., 268
 Hepaticæ, 2
 Hépatiques, 2
 Herbe ou z'herbe
 Herbe à balai, 218
 Herbe à blé, 19
 Herbe à côtes, 20
 Herbe à dardres, 141
 Herbe à flèche, 29
 Herbe à plomb, 316
 Herbe au diable, 282
 Herbe bête l'église, 13
 Herbe bourrique, 325
 Herbe caye, 14
 Herbe charpentier, 350
 Herbe de Guatémala, 12
 Herbe éléphant, 23
 Herbe fine, 25
 Herbe Guinée, 20
 Herbe Madam Bouvin, 301
 Herbe Madam Michel, 15
 Herbe panache, 14
 Herbe para, 20
 Herbe pied poule, 27
 Herbe pintade, 20
 Herbe quiquitte, 20
 Herbe rasoir, 35
 Herbe roseau, 29
 Herbe sûre, 20
 Herbe yaguidi, 14
 Herodotia Urb., 394, 395
 haïtiens Urb. et Ekm., 395
 mikainoïdes Urb. et Ekm., 395
 Herpestris Gaertn. f., 332, 334
 monnieria H. B. K., 335
 obovata Poepp., 335
 procumbens Urb., 335
 stricta Schrad., 335
 Heteranthera R. et P., 51
 limosa Willd., 51
 reniformis R. et P., 51
 Heteropogon Pers., 12, 15
 contortus Beauv., 15
 melanocarpus Benth., 15

Heteropteris Juss., 173,
174
laurifolia A. Juss., 174
purpurea H. B. K., 174
Heterospermum Cav., 386,
391
diversifolium H. B. K.,
391
Heterostachys Ung.-Sternb.,
101, 102
ritteriana Ung.-Sternb.,
102
Heterotrichum P. DC. 262,
267
angustifolium P. DC.,
267
umbellatum Urb., 267
Hevea Aubl., 179, 190
braziliensis Mull.-Arg.,
190
Hibiscus L., 216, 220
abelmoschus L., 221
brachypus Urb., 221
braziliensis L., 220
cannabinus L., 221
esculentus L., 221
furcellatus Lam., 221
var. azuensis Urb. et
Helwig, 221
var. scabicaulis Hel-
wig, 221
horridus Urb., 221
hottensis Helwig, 221
maculentus Lam., 221
rosa sinensis L., 221
sabariffa L., 221
schizopetalus Hook. f.
Hibiscus tiliaceus L., 220
trilobus Aubl., 221
vitifolius L., 221
Hicoria pecan Britt., 86
Hieracium L., 398, 399
gronovii L., 399
subsp. domingense
Zahn., 399
var. alpestre Zahn.,
399
var. glabrescens Zahn.,
399
var. normale Zahn.,
399
var. pinetorum Zahn.,
399
var. subvenosum
Zahn., 399
var. virescens Zahn.,
399
pennsylvanicum E. Fries.
399
Hierba de brujo, 129
Hieronyma Allem. 178,
182
domingensis Urb., 182
Hijo, 90

Hillia Jacq., 352, 358
parasitica Jacq., 358
tetrandra Sw., 358
Hippeastrum Herb., 53, 55
puniceum Urb., 55
vittatum Herb., 55
Hippocratea L., 201
comosa Sw., 201
domingensis Urb. et
Ekm., 201
Hippocratea volubilis L.,
201
Hippocrateaceae, 195, 201
Hippomane L., 180, 192
horrida Urb. et Ekm.,
192
mancinella L., 192
spinosa L., 192
Hirtella L., 131, 132
triandra Sw., 133
Hog plum, 197
Hoboli, 341
Holmskioldia Retz., 315,
319
sanguinea Retz., 319
Homalium Jacq., 235, 236
racemosum Jacq., 236
Homalocenchrus Mieg., 24
hexandrus Kuntze, 24
monandrus Kuntze, 24
Homme paille, 39
Honte, 137, 155
Hop clover, 145
Hormidium Lindl., 64, 67
tripterum Cogn., 67
Horse cassia, 141
Horse eye bean, 156
Horse radish tree, 129
Hortensia, 319, 341
Hottea Urb., 256, 261
crispula Urb., 261
miragoane Urb. et Ekm.,
261
torbeciana Urb. et Ekm.,
261
Huerteia R. et P., 202, 203
cubensis Griseb., 203
Huesito, 258
Hufelandia Nees., 120
pendula Nees., 120
Hura L., 180, 193
crepitans L., 193
Hyacinthus L., 52
orientalis L., 52
Hybanthus Jacq., 235
domingensis Urb. et
Ekm., 235
havanensis Jacq., 235
linearifolius Urb., 235
leucanthus Urb. et Ekm.,
235
portoricensis Urb., 235
Hybosperma Urb., 209,
210
spinosum Urb., 210
verrucosum Urb., 210
Hydrocharitaceae, 7, 9
Hydrocotyle L., 273, 275
hirsuta Sw., 275
lanipes Urb. et Ekm.,
275
pusilla A. Rich., 275
umbellata L., 275
verticillata Thunbg., 275
Hydromystria G. F. W.
Mey, 9
stolonifera G. F. W.
Mey, 10
Hydrophyllaceae, 303, 310
Hyeronima Allem. 178,
182
domingensis Urb., 182
Hygrophila R. Br., 345,
346
braziliensis Lindau, 346
lacustris Nees, 346
Hylocereus Britt. et Rose,
243, 244
triangularis Britt. et Rose,
244
Hymenachne Beauv., 18,
21
amplexicaulis Nees., 21
Hymenaea L., 139, 140
courbaril L., 140
Hymenocallis Salisb., 53,
54
arenicola Northrop, 54
Hypelate Sw., 203, 207
trifoliata Sw., 207
Hyperbaena Miers., 116
apiculata Urb. et Ekm.,
117
brevipes Urb. et Ekm.,
117
domingensis Benth., 117
glauciramis Urb. et Ekm.,
117
lindmanii Urb., 117
pellucida Urb. et Ekm.,
117
pruinosa Urb. et Ekm.,
117
salicifolia Urb. et Ekm.,
117
Hypericaceae, 227, 230
Hypericum L., 231
christii Urb., 231
constanzae Urb., 231
Hypericum dichotomum
Lam., 231
diosmoides Griseb., 231
fuertesii Urb., 231
millefolium Urb. et
Ekm., 231
perforatum L., 231
polycladum Urb., 231
pyncophyllum Urb., 231

Hypoxis L., 54, 55
decumbens L., 55
Hyptiodaphne Urb., 248,
249
crassifolia Urb., 249
Hyptis Jacq., 321, 325
americana Urb., 325
atrorubens Poit., 325
capitata Jacq., 325
chylanthia Urb. et Ekm.,
325
domingensis Urb., 325
escobilla Urb., 325
mutabilis Briq., 325
pectinata Poit., 325
schusteri Urb., 325
scoparia Poit., 325
scoparioides Urb., 325
suaredens Urb., 325
Hyptis suaveolens Poit., 325
verticillata Jacq., 325
Ibatia Dcne., 300, 302
maritima Dcne., 302
Icacinaeae, 195, 201
Ichnanthus Beauv., 18, 21
axillaris Hitchc. et Chase
21
nemorosus Doell., 21
pallens Munro, 21
Ignose, 56
Ignose chat, 56
Ignose Martinique, 56
Ignose seguine, 56
Ilang-Ilang, 119
Ilex L., 198
azuensis Læs., 199
barahonica Læs., 198
berteroi Læs., 199
var. buchiana Læs.,
199
caroliniana Læs., 199
var. fuertesiana Læs.,
198
clementis Britt. et Wils.,
199
cubana Læs., 199
cormonica Læs., 199
fuertesiana Læs., 199
var. b. selleana Læs.,
199
grisebachii Maxim., 198
var. haitiensis Læs.,
198
guianensis O. Ktze., 199
krugiana Læs., 198
f. b. paciportensis
Læs., 198
microwrightioides Læs.,
198
var. b. calvescens
Læs., 198
Ilex arborea Griseb., 198
var. domingensis Læs.,
198

var. occidentalis Læs.,
198
riedlæi Læs., 199
tuerckheimii Læs., 198
var. constanzae Læs.,
198
var. subalpina Læs.,
198
Illicium L., 117, 118
parviflorum Michx., 118
Ilysanthes Rafn., 332, 335
gratioloides Benth., 335
Immortel étranger, 338
Impatiens L., 207
balsamina L., 208
Imperata Cirillo, 12, 13
brasiliensis Trin., 13
contracta Hitchc., 13
Indigo, 146, 147
Indigo anil, 146
Indigo savane, 359
Indigofera L., 145, 146
argentea L., 146
lespedezioides H. B. K.,
146
microcarpa Desv., 146
mucronata Spreng., 146
suffruticosa Mill., 146
tinctoria L., 146
viscosa Lam., 146
Inga Scop., 134, 135
laurina Willd., 135
vera Willd., 135
Inuleae, 376, 383
Ionopsis H. B. K., 64, 73
satyrioides Rchb. f., 74
utricularioides Lindl., 74
Ipomoea L., 305, 307
acuminata R. et Sch.,
307
arenaria Steud., 307
batatas Lam., 307
buchii Urb., 307
calantha Griseb., 307
clausa Rudolphi, 307
crassicaulis Robins., 307
digitata L., 307
eriosperma Urb., 307
hederacea Jacq., 307
heptaphylla Voigt., 307
lachnaea Spreng., 307
leuconura Urb., 307
litoralis Boiss., 307
luteoviridis Ekm. et
Leonard, 307
macrorrhiza R. et Sch.,
307
Ipomea meyeri G. Don, 307
nematoloba Urb., 307
nematophylla Urb., 307
nil Roth., 307
pes caprae Sweet, 307
philomega House, 307
pitoniana Urb., 307
purpurea Lam., 307
reptans Poir., 307
rubra Millsp., 307
rubrocincta Urb., 307
var. brachyloba Urb.,
307
selleana Urb., 307
tenuissima Choisy, 307
tiliacea Choisy, 307
tuba G. Don 307
viridiflora Urb., 307
Iresine L., 103, 105
domingensis Urb., 105
elatior L. C. Rich., 105
herbstii Hook, 105
panniculata O. Ktze.,
105
Iridaceae, 51, 56
Isachne R. Br., 17, 22
rigidifolia Urb., 22
Isidorea A. Rich., 352, 355
brachyantha Urb., 355
leonardi Urb., 355
leptantha Urb., 355
pedicellaris Urb. et Ekm.,
355
pungens Robins., 355
tetramera Urb. et Ekm.,
355
Isochilus R. Br., 64, 70
linearis R. Br., 70
Isotoma Lindl., 374, 375
longiflora Presl., 375
Ixidium Eichl., 95
wrightii Eichl., 95
Ixora L., 353, 363, 364
coccinea L., 364
ferrea Benth., 364
jucunda Bot. Mag., 364
odorata Hook. f., 364
Jacaranda Juss., 337, 338
cowellii Brik. et Wils.,
338
poitaei Urb., 338
selleana Urb., 338
Jacinthe, 52
Jacquemontia Choisy, 305,
306
apocynoides Urb., 306
jamaicensis Hall. f., 306
nodiflora G. Don, 306
pentantha G. Don, 306
tamnifolia Griseb., 306
tuerckheimii Urb., 306
verticillata Urb., 306
Jacquinia L., 279
barahonensis Urb. et
Ekm., 279
barbasco Mez., 279
berterii Spreng., 279
var. acutifolia Griseb.,
279
var. angustior Urb.,
279

var. portoricensis Urb., 279
 comosa Urb. et Ekm., 279
 dichotoma Urb. et Ekm., 279
 eggersii Urb., 279
 var. intermedia Urb., 279
 incrustata Urb., 279
 keyensis Mez., 279
 linearis Jacq., 279
 polyphleba Urb. et Ekm., 279
 sphæroidea Urb., 279
 stenophylla Urb., 279
 Jalapón, 281
 Jasmin, 289
 Jasmin de nuit, 330
 Jasminum L., 289
 azoricum L., 289
 Jasminum grandiflorum L., 289
 pubescens Willd., 289
 sambac Sol., 289
 Jatropha L., 179, 190
 acrandra Urb., 190
 acuminata Desr., 190
 curcas L., 190
 gossypifolia L., 190
 hastata Jacq., 190
 hernandifolia Vent., 190
 var. epeltata Pax., 190
 integerrima Jacq., 190
 multifida L., 190
 Jaune d'œuf, 284
 Javillo, 193
 Jerusalem date, 140
 Jerusalem thorn, 142
 Jijiri, 341
 Jina, 135
 Jobero, 168
 Jobo, 197
 Jockey club, 59
 Jonc ou Grand Jonc, 7
 John Crow bush, 123
 Juan primero, 272
 Juca, 161
 Juglandaceæ, 85
 Juglandales, 76, 85
 Juglans L., 85
 jamaicensis C. DC., 85
 Juncellus lævigatus Clarke., 32
 Juniperus L., 4
 chinensis L., 5
 lucayana Britt., 5
 urbaniana Pilg. et Ekm., 5
 Jussia L., 270
 erecta L., 270
 leptocarpa Nutt., 270
 peruviana L., 270
 repens L., 270

suffruticosa L., 270
 Justicia L., 345, 350
 abeggii Urb. et Ekm., 350
 buchii Urb., 350
 carthagenensis Jacq., 350
 comata Lam., 350
 disparifolia Urb. et Ekm., 350
 pectoralis Jacq., 350
 peratanthoides Urb. et Ekm., 350
 periplocifolia Jacq., 350
 reptans Sw., 350
 sessilis Jacq., 350
 spinigera Urb. et Ekm., 350
 Kallaba, 313
 Kallstrœmia Scop., 163, 164
 caribæa Rydb., 164
 Kallstrœmia incana Rydb., 164
 maxima Wight et Arn., 164
 Karatas, 55
 Karwinskia Zucc., 209, 210
 caloneura Urb., 210
 Kikuyu grass, 23
 Kosteletzkya Presl., 216, 221
 pentasperma Presl., 221
 sagittata Presl., 221
 Krameria L., 133
 ixina L., 133
 Krameriaceæ, 129, 133
 Krugiodendron Urb., 208, 209
 ferreum Urb., 209
 Kyllinga Rottb., 31, 32
 brevifolia Rottb., 32
 peruviana Lam., 32
 pumila Michx., 32
 pungens Link., 32
 Labatia Sw., 283, 284
 hotteana Urb. et Ekm., 285
 Labatia sessiliflora Sw., 285
 L'abbé blanc, 338
 L'abbé franc, 338
 L'abbé rouge, 143
 Laboue cochon, 183
 La chose, 383
 Lactuca L., 398
 canadensis L., 399
 intybacea Jacq., 399
 sativa Jacq., 399
 Læstadia Kunth., 381
 domingensis Urb., 381
 Lætia L., 236, 238
 thamnina Sw., 238
 Lagenaria Ser., 370, 372
 leucantha Rusby, 373
 vulgaris Ser., 373
 Lagerstrœmia L., 250, 251
 indica L., 251
 var. floribus albis, 251
 Lagetta Juss., 248, 249
 lintearia Lam., 249
 Laguncularia Gaertn. f., 254, 255
 racemosa Griseb., 255
 Lai, 52
 Laissez-moi, 137
 Laitier, 295
 Laitue, 399
 Lalo, 215
 Laloi, 52
 Lalou, 215
 Lampsana L., 397, 398
 communis L., 398
 Langa chata, 380
 Langue bœuf, 378
 Langue chatte, 380
 Lanmant, 329
 Lantana L., 314, 316, 387
 aculeata L., 316
 alatipes Urb. et Ekm., 316
 bahamensis Britt., 316
 buchii Urb., 316
 canescens H. B. K., 316
 exarata Urb. et Ekm., 316
 floribunda Urb. et Ekm., 316
 involucreta L., 316
 microcarpa Urb., 316
 nannocarpa Urb., 316
 pauciflora Urb., 316
 reticulata Pers., 316
 subcordata Urb., 316
 trifolia L., 316
 Latanier balai, 38
 Latanier chapeau, 39
 Latanier d'Afrique, 39
 Latanier lan mer, 38
 Latanier zombi, 38
 Lantanopsis C. Wright, 384, 387
 hispidula C. Wr., 387
 hoffmanni Urb., 387
 Laplacea H. B. K., 229, 230
 alpestris Dyer, 230
 curtiana A. Rich., 230
 cymatoneura Urb., 230
 Laplacea samuelssonii O. C. Schmidt., 230
 Larmes de Job, 12
 Lasiacis Hitchc., 18, 21
 divaricata Hitchc., 21
 oaxacensis Hitchc., 21
 rugelli Hitchc., 21
 sloanei Hitchc., 21
 sorghoidea Hitchc. e Chase, 21
 Lasianthus Jack., 354, 365

lanceolatus G. Maza, 365
 Lasiocroton Griseb., 179, 186
 micranthus Pax. et Hoffm., 186
 Laugeria Vahl., 353, 362
 densiflora Hitchc., 362
 hotteana Urb., 362
 lineolata Urb., 362
 Lauraceæ, 114, 120
 Laurel, 121, 122
 Laurel blanco, 121
 Laurier, 121
 Laurier blanc, 122
 Laurier grandes feuilles, 122
 Laurier jaune, 120
 Laurier puant, 121
 Laurier rose, 121, 298
 Lava ropa, 301
 Lawsonia L., 250, 252
 inermis L., 252
 Lecythidaceæ, 248, 252
 Leersia Sw., 24
 hexandra Sw., 24
 monandra Sw., 24
 Leguminosæ, 129, 134
 Leiphaïmos Ch. et Schl., 292, 293
 aphylla Gilg., 293
 brachyloba Urb., 293
 domingensis Urb., 293
 parasitica Schlecht. et Cham., 293
 Lemaireocereus Britt. et Rose, 243, 244
 hystrix Britt. et Rose, 244
 Lemna L., 45
 paucicostata Hegelm., 46
 Lemnaceæ, 43, 45
 Lemoncillo, 238
 Lengua de vaca, 192, 272
 Lentibulariaceæ, 303, 344
 Leochilus Kn. et Westc., 64, 74
 labiatus O. Ktze., 74
 Leonotis Pers., 321, 322
 nepetifolia R. Br., 322
 Leontodon L., 397, 398
 taraxacoïdes Mèrat., 398
 Leonurus L., 321, 323
 sibiricus L., 323
 Lepanthes Sw., 64, 69
 constanza Urb., 69
 mornicola Urb., 69
 ovalis Fawc. et Rendle, 69
 serrulata Cogn., 69
 subalpina Urb., 69
 tenuis Schlechter., 69
 urbaniana Mansf., 69
 Lepidagathis W., 344, 347
 alopecuroïdea R. Br., 347

Lepidium L., 126
 virginicum L., 127
 Leptocereus Britt. et Rose, 243, 244
 weingartianus Britt. et Rose, 244
 Leptochloa Beauv., 26, 28
 domingensis Trin., 28
 fascicularis A. Gray, 28
 filiformis Beauv., 28
 mornicola Chase, 28
 scabra Nees., 28
 virgata Beauv., 28
 Leptocoryphium Nees., 16, 18
 lanatum Nees., 18
 Leptogonum Benth., 98, 100
 buchii Urb., 100
 domingense Benth., 100
 Letché, 206
 Leucæna Benth., 134, 137
 glauca Benth., 137
 trichodes Benth., 137
 Leucanthemum Mill., 394
 vulgare Lam., 394
 Leucas R. Br., 321, 323
 martinicensis R. Br., 323
 Leucocroton Griseb., 179, 186
 Leucocroton leprosus Pax. et Hoffm., 186
 Liabum Adans., 394, 395
 umbellatum Schultz-Bip., 395
 Liane à clou, 152
 Liane à minguet, 307
 Liane amitié, 122
 Liane à scie, 30
 Liane bandé, 158
 Liane barrique, 109
 Liane blanc, 201, 255
 Liane bon garçon, 116
 Liane cacorne, 139
 Liane caleçon, 240
 Liane carrée, 204
 Liane chique, 313
 Liane couleuvre, 240
 Liane crabe, 87
 Liane d'argent, 309
 Liane flamant, 188
 Liane françois, 380
 Liane fourmi, 189, 200
 Liane gain lait, 302
 Liane gratté, 189
 Liane jaune, 174
 Liane mébi, 201
 Liane mimebi blanche, 255
 Liane molle, 212
 Liane panier, 103
 Liane patte cheval, 117
 Liane persil, 204
 Liane St-Jean, 317
 Liane savon, 211

Liane tafia, 239
 Liane taureau, 174
 Liane tonnelle, 309
 Liane vers, 66
 Liane violon, 155
 Liane zorain, 338
 Lignum vitæ, 163
 Lila de agua, 51
 Lilas, 172, 329
 Lilas de nuit, 330
 Lilas étranger, 147
 Liliaceæ, 51
 Liliales, 6, 51
 Limnanthemum Gmel., 291, 293
 humboldtianum Griseb., 293
 Limnocharis H. et B., 9
 flava Buchen, 9
 Limoncillo, 258
 Limon France, 167
 Linaceæ, 161, 162
 Linaria L., 332, 333
 canadensis Dum.-Cours., 333
 Linociera Sw., 289
 axilliflora Griseb., 289
 caribæa Knobl., 289
 dictyophylla Urb., 289
 domingensis Knobl., 289
 ligustrina Sw., 289
 miragoanæ Urb., 289
 pubescens Urb. et Ekm., 289
 Linum L., 163
 humile Mill., 163
 Liparis L. C. Rich., 63, 68
 elata Lindl., 68
 Lippia L., 314, 316
 dulcis Trevir, 317
 flavida Urb., 316
 geminata H. B. K., 316
 var. microphylla Griseb., 316
 micromera Schauer, 316
 nodiflora Rich., 316
 reptans H. B. K., 316
 spinifera Urb., 317
 stœchadifolia H. B. K., 317
 Lirio, 289, 363
 Lisianthus L., 291, 292
 domingensis Urb., 292
 longifolius L., 292
 var. scabridus Perkins, 292
 Litchi Sonn., 203, 206
 chinensis Sonn., 206
 Lithachne Beauv., 16, 23
 pauciflora Beauv., 23
 Lithophila Sw., 103, 105
 muscoïdes Sw., 105
 var. caspitosa Urb., 105

Loasa L., 240, 241
 plumieri Urb., 241
 Loasaceæ, 228, 240
 Lobelia L., 374, 375
 assurgens L., 375
 var. portoricensis Urb., 375
 christii Urb., 375
 cliffortiana L., 375
 domingensis A. DC., 375
 ekmanii Urb., 375
 rotundifolia Juss., 375
 salicina Lam., 375
 Lobeliaceæ, 374
 Lobloily sweet wood, 121
 Lochnera Rchb., 294, 296
 rosea Rchb., 296
 Loganiaceæ, 288, 290
 Logwood, 142
 Lonchocarpus H. B. K., 151, 152
 domingensis P. DC., 152
 ehrenbergii Urb., 152
 Lonchocarpus latifolius H. B. K., 152
 longipes Urb. et Ekm., 152
 monophyllus Urb. et Ekm., 152
 neurophyllus Urb., 152
 pycnophyllus Urb., 152
 Loniceria L., 369
 caprifolium L., 369
 japonica Thunbg., 369
 Loranthaceæ, 94, 95
 Losange, 136
 Loup-garou, 129
 Lucerne, 145
 Lucuma Juss., 284
 cuprea Urb. et Ekm., 284
 domingensis Gært. f., 284
 serpentaria H. B. K., 284
 Lucia P. DC., 352, 356
 tetandra K. Schum., 356
 Ludwigia L., 270
 palustris Ell., 270
 repens Sw., 270
 Luffa Adans., 370, 372
 acutangula Roxb., 372
 cylindrica M. J. Rœm., 372
 Luis gomez, 135
 Lunania Hook., 235, 237
 buchii Urb., 237
 dentata Urb., 237
 ekmanii Urb., 237
 mauritii Urb., 237
 tenuifolia Urb. et Ekm., 237
 Luziola Gmel., 24
 spruceana Gmel., 24

Lycaste Lindl., 63, 73
 barringtonia Lindl., 73
 Lycium L., 326, 327
 americanum Jacq., 327
 var. chrysocarpum Urb. et Ekm., 327
 Lycopersicum Hill., 327, 330
 esculentum Mill., 330
 Lycopodiaceæ, 2
 Lyonia Nutt., 277
 acutifolia Urb. et Ekm., 278
 alpina Urb. et Ekm., 278
 angulata Urb. et Ekm., 278
 brachycarpa Urb. et Ekm., 278
 buchii Urb., 278
 costata Urb., 278
 darrasiana Urb. et Ekm., 278
 Lyonia dictyoneura Urb., 278
 eggersii Urb., 278
 furcyensis Urb., 278
 haïtiens Urb., 278
 heptamera Urb., 278
 microcarpa Urb. et Ekm., 278
 plumerii Urb. et Ekm., 278
 tinensis Urb., 278
 tippenhaueri Urb., 278
 truncata Urb., 278
 tuerckheimii Urb., 278
 Lys, 54
 Lysiloma Benth., 135, 136
 ambigua Urb., 136
 bahamensis Urb., 136
 latisiliqua Benth., 136
 Lythraceæ, 248, 249
 Lythrum L., 250
 lanceolatum Ell., 250
 Maba Forst., 287
 caribæa Hiern., 287
 domingensis Urb., 287
 Mabelie, 177
 Macaby, 94
 Machacha, 189
 Machaonia Humb. et Bonpl., 353, 362
 haïtiens Urb. et Ekm., 362
 Macoutouca, 40
 Macrioi, 265
 Macroptilium Benth., 154, 159
 domingense Urb., 159
 ekmanianum Urb., 159
 Madame Gloire, 213
 Madame Jean, 296
 Madame Naize, 142

Madame Parquet, 93
 Magnolia L., 117
 domingensis Urb., 117
 Magnoliaceæ, 114, 117
 Maguey, 55
 Mahagua, 220
 Mahagua de Cuba, 88
 Mahaut, 220
 Mahaut franc, 220
 Mahaut piment 88
 Mahogany, 171
 Maïs, 12
 Maïs bouilli, 318
 Maïs marron, 50
 Majaguilla, 220
 Malachra L., 216, 219
 alceifolia Jacq., 220
 capitata L., 220
 radiata L., 220
 urens Poit., 220
 Malaguettes, 257, 260, 261
 Malaguettes marron, 205
 Mala mujer, 241, 318, 329
 Malanga, 43
 Malanga deux palles, 44
 Malanga gratté, 45
 Malanga noir, 45
 Malanga thioté, 45
 Malaxis Soland., 62, 68
 grisebachiana Fawc. et Rendle, 68
 spicata Sw., 68
 umbelliflora Sw., 68
 Malnommé, 193
 Malpighia L., 173, 175
 angustifolia L., 175
 var. oblongata Ndz., 175
 aquifolia L., 175
 biflora Poir., 175
 cnide Spreng., 175
 var. ovalis Ekm. et Ndz., 175
 coccigera L., 175
 domingensis Small., 175
 galeottiana A. Juss., 175
 glabra L., 175
 haïtiens Urb. et Ndz., 175
 ilicifolia Ndz., 175
 macracantha Urb. et Ndz., 175
 martinicensis Jacq., 175
 nummularifolia Ndz., 175
 var. pusillifolia Ndz., 175
 ovatifolia Small., 175
 punicifolia L., 175
 setosa Spreng., 175
 urens L., 175
 var. megacantha Juss., 175
 velutina Ekm. et Ndz., 175
 var. typica Ekm. et Ndz., 175
 Malpighiaceæ, 160, 172
 Malva L., 216, 218, 220
 neglecta Wallr., 218
 Malvaceæ, 213, 215
 Malvales, 79, 213
 Malvastrum A. Gray, 216, 218
 corchorifolium Urb., 218
 coromandelianum Garcke, 218
 spicatum A. Gray, 218
 Maman guêpes, 91
 Mamanhouane, 325
 Maman laman, 328
 Mammia L., 231
 americana L., 232
 Mammia apple, 232
 Mammier, 119
 Mammillaria Haw., 243, 246
 glomerata P. DC., 246
 prolifera Haw., 246
 Mancenillier, 192, 197
 Mandarine, 167
 Manekia Trel., 81, 82
 urbani Trel., 82
 Manettia Mut., 352, 357
 calycosa Griseb., 357
 domingensis Sprague, 357
 lygustum Sw., 357
 secundiflora P. DC., 357
 Mangifera L., 196
 indica L., 196
 Mangle, 253, 255
 Mangle colorado, 253
 Mangle prieto, 255
 Manglier blanc, 255
 Manglier noir, 320
 Manglier prieto, 320
 Manglier rouge, 253
 Manglier petites feuilles, 207
 Manguier, 196
 Manioc amer, 191
 Manihot Adans., 180, 190
 dichotoma Ule, 191
 glaziovii Mull-Arg., 191
 utilissima Pohl., 191
 Manisuris L., 12, 13
 exaltata Kuntze, 13
 granularis Sw., 13
 Manteau St Joseph, 187, 325
 Manzanilla, 395
 Manzanillo, 192
 Mapou, 223
 Mapou africain, 223
 Mapou blanc, 223
 Mapou gris, 312
 Mapou zombi, 223

Mappia Jacq., 202
 racemosa Jacq., 202
 Maranta L., 60
 arundinacea L., 60
 Marantaceæ, 57, 60
 Marcgravia L., 229
 domingensis Urb., 229
 oligandra Ch. Wr., 229
 rectiflora Tr. et Pl., 229
 Marcgraviaceæ, 227, 229
 Margaritopsis Sauv., 354, 366
 lanceifolia Urb., 366
 triflora Urb., 366
 Marguerite, 316
 Maria, 232
 Marie-claude, 309
 Marie-Jeanne, 172
 Mariela, 388
 Marigouya, 239
 Marila Swartz, 231
 biflora Urb., 231
 dictiflora Urb., 231
 domingensis Urb., 231
 Mariscus Gaertn., 35
 jamaicensis Britt., 35
 filiformis Spreng., 32
 Marsdenia R. Br., 300, 302
 clausa R. Br., 302
 dictyophylla Urb., 302
 haïtiens Urb. et Ekm., 302
 linearis Dcne., 302
 nitida Dcne., 302
 saturejifolia A. Rich., 302
 Martinezia R. et P., 37, 42
 acanthophylla Becc., 42
 Martynia L., 341
 annua L., 341
 Martyniaceæ, 304, 341
 Mascagnia Bertero, 173
 buchii Urb. et Ndz., 173
 Masambey, 124
 Masoco, 56
 Mastuerzo, 335
 Mata cavaille, 301
 Mata gallina, 330
 Matayba Aubl., 204, 206
 apetalia Radlk., 206
 denticulata Radlk., 206
 domingensis Radlk., 206
 scrobiculata Radlk., 206
 Maté, 143
 Mato colorado, 158
 Matourin, 140
 Maxillaria R. et P., 64, 73
 rufescens Lindl., 73
 var. minor Fawc. et Rendle, 73
 Maximiliana Mart., 41
 crassipatha Mart., 41
 Maya cimarrona, 48
 Maydeæ, 11

Maytenus Juss., 199
 buxifolia Griseb., 200
 cassinoïdes Urb., 200
 domingensis Krug. et Urb., 200
 elliptica Krug. et Urb., 200
 haïtiens Urb., 200
 hotteana Urb., 200
 impressa Urb. et Ekm., 200
 jamaicensis Krug. et Urb., 200
 var. orbicularis Krug. et Urb., 200
 Maytenus microphylla Urb. et Ekm., 200
 mornicola Urb. et Ekm., 200
 reynoldioides Urb., 200
 Mecranium Hook. f., 263, 267
 alpestre Urb. et Ekm., 267
 amygdalinum Ch. Wr., 267
 birimosum Tr., 267
 haïtiens Urb., 267
 integrifolium Tr., 267
 microdictyum Urb. et Ekm., 267
 multiflorum Tr., 267
 ovatum Cogn., 267
 plicatum Urb., 267
 puberulum Cogn., 267
 salicifolium Urb., 267
 torbecianum Urb. et Ekm., 267
 tricotatum Urb. et Ekm., 267
 tuberculatum Urb., 267
 valde Urb., 267
 Médecinier barachin, 190
 Médecinier béni, 190
 Médecinier des Indes, 190
 Médecinier espagnol, 190
 Medicago L., 145
 lupulina L., 145
 sativa L., 145
 Melandryum Roehl., 113
 album Garcke, 113
 Melanthera Rohr., 385, 390
 amethystina O. E. Schulz., 390
 buchii Urb., 390
 molliuscula O. E. Schulz., 390
 Melastomataceæ, 248, 262
 Melia L., 171
 azedarach L., 171, 172
 Meliaceæ, 161, 170
 Melicocca L., 203, 206
 bijuga L., 206

- Melinis Beauv., 16
 minutiflora Beauv., 16
 Meliosma Bl., 208
 abbreviata Urb., 208
 herbertii Rolfe, 208
 impressa Krug. et Urb., 208
 recurvata Urb., 208
 Mélisse, 325
 Mélisse marron, 316
 Melocactus Lk. et Otto, 243, 246
 communis Link et Otto, 246
 Melochia L., 224
 hirsuta Cav., 224
 Melochia nodiflora Sw., 224
 pyramidata L., 224
 tomentosa L., 224
 Melon d'eau, 372
 Melon d'Espagne, 372
 Melon France, 372
 Melothria L., 370, 371
 domingensis Cogn., 371
 guadalupensis Cogn., 371
 Membrillito, 132
 Membrillo, 132
 Memiso, 87, 88, 214
 Menispermaceæ, 114, 116
 Mentha L., 321, 325
 arvensis L., 325
 citrata Ehrh., 325
 nemorosa Willd., 325
 Menthe, 325
 Menthaceæ, 304, 320
 Mentzelia L., 240, 241
 aspera L., 241
 Mercurialis L., 179, 186
 annua L., 186
 Meriania Sw., 262, 263
 ekmanii Urb., 264
 involucreta Naud., 264
 squamulosa Urb. et Ekm., 264
 Merremia Dennst., 305, 307
 ægyptia Urb., 307
 dissecta Hall. f., 307
 glabra Hall. f., 307
 quinquefolia Hall. f., 307
 umbellata Hall. f., 307
 Metastelma R. Br., 300, 301
 æmulans Schlecht., 301
 astephanoides Schlecht., 301
 crassiusculum Schlecht., 301
 decaisneanum Schlecht., 301
 domingense Schlecht., 301
- ephedroides Schlecht., 301
 filiforme Ch. Wr., 301
 gracile Dcne., 301
 leptocladum Schlecht., 301
 picardæ Schlecht., 301
 stenoglossum Schlecht., 301
 tylophoroïdes Schlecht., 301
 Metopium Engl., 196, 197
 brownei Urb., 197
 toxiferum Krug. et Urb., 197
 Mexican thistle, 123
 Michelia L., 117
 champaca L., 117
 Miconia R. et P., 262, 265
 abeggii Urb. et Ekm., 266
 adenocalyx Urb. et Ekm., 265
 albiviridis Urb. et Ekm., 265
 domingensis Cogn., 265
 guadalupensis Cogn., 265
 ambigua P. DC., 265
 apiculata Urb. et Ekm., 266
 artibonitensis Urb. et Ekm., 266
 azuensis Urb. et Ekm., 266
 arvensis L., 325
 citrata Ehrh., 325
 nemorosa Willd., 325
 brasiliensis Urb. et Ekm., 266
 buchii Cogn., 265
 calycina Cogn., 265
 christii Cogn., 265
 chrysophylla Urb., 265
 conioophora Urb. et Ekm., 266
 cubensis Ch. Wr., 265
 desportesii Urb., 265
 dodecandra Cogn., 265
 domingensis Cogn., 265
 favosa Naud., 265
 ferruginea P. DC., 265
 fuertesii Cogn., 265
 guianensis Cogn., 265
 haïtiens Urb. et Ekm., 266
 hypioides Urb. et Ekm., 266
 impetiolaris D. Don, 265
 krugii Cogn., 265
 lævigata P. DC., 265
 Miconia lanceolata P. DC., 265
 leptantha Urb. et Ekm., 266
 leptoneura Urb. et Ekm., 266
 luteola Cogn., 265

- macrophylla Tr. Melast., 265
 markgrafii Urb. et Ekm., 266
 microcarpa DC., 266
 multiglandulosa Cogn., 265
 nematophora Urb. et Ekm., 266
 niedenzuana Urb. et Ekm., 266
 ossæifolia Urb. et Ekm., 266
 otoschulzii Urb. et Ekm., 266
 plumerii Urb. et Ekm., 266
 prasina P. DC., 265
 pteropoda Benth., 265
 punctata D. Don, 265
 pyramidalis DC., 265
 racemosa P. DC., 265
 rigida Tr., 265
 rigidissima Urb. et Ekm., 265
 rubiginosa P. DC., 265
 samanensis Urb., 266
 selleana Urb. et Ekm., 265
 splendens Triana, 265
 staminea DC., 265
 stenobotrys Naud., 265
 subcompressa Urb., 265
 Miconia tetrandra D. Don, 266
 tetrastoma Naud., 265
 tetrazygioides Urb. et Ekm., 266
 viscidula Urb. et Cogn., 265
 xenotricha Urb. et Ekm., 265
 Micranthemum Michx., 332, 335
 orbiculatum Michx., 335
 Micrasepalum Urb., 354, 368
 haïtiense Urb. et Ekm., 368
 Micromeria Benth., 321, 324
 alpestris Urb., 325
 brownei Benth., 325
 viminea Urb., 325
 Micropholis Pierre, 283, 286
 sp. 287
 Microstylis Nutt., 63, 67
 hispaniolæ Schlecht., 67
 Microtea Sw., 108, 110
 debilis Sw., 110
 Mikania Willd., 379, 380
 barahonensis Urb., 380
 buchii Urb., 380

- Mikania cordifolia Willd., 380
 cyanosma Urb. et Ekm., 381
 lepidophora Urb., 380
 papillosa Klatt., 380
 polycephala Urb., 380
 polychaeta Urb., 380
 royoc L., 366
 scandens Willd., 380
 swartziana Griseb., 381
 tripartita Urb., 380
 Mimosa L., 135, 137
 ceratonia L., 137
 domingensis Benth., 137
 extranea Benth., 137
 invis Mart., 137
 mornicola Urb., 137
 pudica L., 137
 Mimosa, 134
 Mimops L., 284, 286
 albescens Hartog., 286
 balata Pierre, 286
 var. domingensis Pierre, 286
 gonavensis Urb. et Ekm., 286
 jaïmiqui Ch. Wr., 286
 Mirabilis L., 106
 jalapa L., 106
 Mirliton, 373
 Mirliton marron, 371
 Misanteca Cham. et Schlecht., 120
 triandra Mez., 120
 Mitracarpus Zucc., 354, 368
 brachystigma Urb., 368
 christii Urb., 368
 decumbens Urb., 368
 haïtiens Urb., 368
 var. glabrata Urb., 368
 hirtus, P. DC., 368
 sagæanus P. DC., 368
 Moccos de pavo, 109, 313
 Modiola Moench., 216, 217
 caroliniana G. Don, 218
 Molasses grass, 16
 Molinillo, 322
 Mollugo L., 110
 nudicaulis Lam., 111
 verticillata L., 111
 Mommsenia Urb. et Ekm., 262, 266
 apleura Urb. et Ekm., 266
 Mombin, 197
 Mombin bâlard, 172
 Mombin espagnol, 197
 Mombin franc, 197
 Momordica L., 370, 371
 charantia L., 372
 var. abbreviata Ser., 372

- Monocotyledoneæ, 2, 5
 Mora, 89
 Mora macho, 89
 Moraceæ, 87, 88
 Morila, 239
 Morinda L., 354, 366
 buchii Urb., 366
 citrifolia L., 366
 royoc L., 366
 Moringa Juss., 129
 oleifera Lam., 129
 Moringaceæ, 122, 128
 Morir-vivir, 137
 Morisonia L., 124, 125
 americana L., 125
 Moronobea Aubl., 231, 232
 coccinea Aubl., 232
 Morus L., 88
 alba L., 88
 Mostazo, 125
 Mouaou, 131
 Mountain ebony, 140
 Mouriria Aubl., 263, 269
 brachypoda Urb. et Ekm., 269
 domingensis Spach., 269
 gonavensis Urb. et Ekm., 269
 hotensis Urb. et Ekm., 269
 Mouriria lancifolia Urb. et Ekm., 269
 myrtilloïdes Poir., 269
 Moussara, 190
 Mousseline, 52
 Mousses terrestres, 2
 Moutarde, 127
 Mozartia Urb., 256, 258
 abbotiana Urb., 258
 Mucuna Adans., 154, 156
 pruriens P. DC., 156
 sloanei Fawc. et Rendle, 156
 urens Fawc. et Rendle, 156
 Muntingia L., 214
 calabura L., 214
 Murraea Konig., 165, 166
 exotica L., 166
 Musa L., 58
 cavendishii Lamb., 58
 paradisiaca L., 58
 var. sapientum Kuntze, 58
 Musaceæ, 57
 Muscade, 120
 Musci, 2
 Muscinées, 2
 Mutisieæ, 376, 396
 Myginda Jacq., 199, 200
 goga Jacq., 200
 Myop., 350
 Myosotis L., 311, 314

- intermedia Link., 314
 Myrcia P. DC., 256, 258
 citrifolia Urb., 258
 deflexa P. DC., 258
 hotteana Urb. et Ekm., 258
 leptoclada P. DC., 258
 splendens P. DC., 258
 Myrica L., 85
 apiculata Urb. et Ekm., 85
 cerifera L., 85
 microcarpa Benth., 85
 picardæ Krug. et Urb., 85
 reticulata Krug. et Urb., 85
 Myricaceæ, 85
 Myricales, 76, 85
 Myristica L., 120
 fragrans Houtt., 120
 Myristicaceæ, 114, 119
 Myrsinaceæ, 279, 280
 Myrtaceæ, 248, 255
 Myrtales, 78, 247
 Myrte, 166
 Myrtus L., 256
 bahamensis Urb., 257
 Najadaceæ, 7, 8
 Najadales, 5, 6, 7
 Najas L., 8
 guadalupensis Morong, 8
 marina L., 8
 Nama L., 309, 310
 jamaïcense L., 310
 Name de India, 56
 Narvalina Cass., 386, 392
 domingensis Cass., 392
 Nasturtium R. Br., 126
 aquaticum Gars., 126
 palustre P. DC., 126
 subsp. hispidum O. E. Schulz, 126
 var. glabrum O. E. Schulz, 126
 portoricense Spreng., 126
 pyrenaicum R. Br., 126
 Natal grass, 22
 Nazia Adans., 15
 aliena Scribn., 15
 Nectandra Rottb., 120, 121
 antillana Meissn., 122
 coriacea Griseb., 122
 membranacea Griseb., 122
 oligoneura Urb., 122
 patens Griseb., 122
 sintenisii Mez., 122
 Neea R. et P., 106, 107
 collina Heim., 108
 coccinea Heim., 108
 var. cubracteolata Heim., 108
 var. hertifolia Heim., 108

- demissa Heim., 108
 subcoccinea Heim., 108
 Neige, 181
 Nelumbo Adans., 115
jamaicensis DC., 115
lutea Pers., 115
 Neoabbottia Britt. et Rose, 243, 245
panniculata Britt. et Rose, 245
 Neobuchia Urb., 222, 223
paullina Urb., 223
 Neocogniauxia Schlechter, 65, 72
hexaptera Schlechter, 72
 Neomazaea Krug. et Urb., 352, 356
pungens Urb., 356
 Neoregnellia Urb., 224, 226
cubensis Urb., 226
 Nepsera Naud., 262, 263
aquatica Naud., 263
 Neptunia Lour., 134, 138
plena Benth., 138
pubescens Benth., 138
 Nerium L., 295, 298
oleander L., 298
 Neurolema R. Br., 394, 395
lobata R. Br., 395
 Neurotecma K. Schum., 337, 340
domatiata Urb. et Ekm., 340
 Nicandra Adans., 326, 327
physalodes Gaertn., 327
 Nicotiana L., 327, 331
tabacum L., 331
 Night flowering acacia, 136
 Nigua, 313
 Nigua peluda 313
 Nogal, 85
 Noisetier, 191
 Noix d'Acajou, 196
 Nopalea Salm-Dyck, 242, 247
cochenillifera Salm-Dyck, 247
 Noyau pays, 81
 Noyer des Indes, 189
 Nuez, 85
 Nutmeg, 120
 Nyctaginaceae, 106
 Nymphaea J. E. Sm., 115
amazonum Mart. et Zucc., 115
ampla P. DC., 115
 var. *plumieri* Planch., 115
 var. *pulchella* Casp., 115
 var. *speciosa* Casp., 115
jamesoniana Planch., 115
- Nymphæaceae, 114
 Nyphaea Lindl., 342, 343
domingensis Urb. et Ekm., 343
 Ochnaceae, 228
 Ochroma Sw., 222-223
pyramidale Urb., 223
 Ocimum L., 321, 325
basilicum L., 326
gratissimum L., 326
micranthum Willd., 326
 Ocotea Aubl., 120, 121
cuneata Urb., 121
floribunda Mez., 121
leucoxydon Maza, 121
 Octadesmia Benth., 65, 70
montana Benth., 70
scirpoidea Schlechter, 70
 Odontonema Nees., 345, 349
christii Lindau, 349
 Oenotheraceae, 248, 269
 Oeuf de poule, 138
 Oignon, 52
 Oignon de lys, 54
 Oleaceae, 94
 Oldenlandia L., 352, 355
callitrichoides Griseb., 356
corymbosa L., 356
herbacea P. DC., 356
selleana Urb., 356
 Oleaceae, 288
 Olive, 168
 Olivier bâtarde, 350
 Olivo, 125
 Olyra L., 16, 23
latifolia L., 23
 Omphalea L., 180, 191
commutata Mull-Arg., 191
triandra L., 191
 Oncidium Sw., 64, 74
alatum Cogn., 74
calochilum Cogn., 74
guibertianum A. Rich., 74
guttatum Rchb. f., 74
henekenii Rob. Schomb., 74
intermedium Bertero, 74
leiboldi Rchb. f., 74
papilio Lindl., 74
pulchellum W. Hook., 74
tuerckheimii Cogn., 74
variegatum Sw., 74
velutinum Lindl., 74
 Onze heures, 112
 Operculina S. Manso, 305, 307
populifolia Hall. f., 307
tuberosa Meissn., 307
 Oplismenus Beauv., 17, 22

- burmanni* Beauv., 22
hirtellus Beauv., 22
setarius R. et Sch., 22
 Opuntia Mill., 242, 247
antillana Britt. et Rose, 247
caribæa Britt. et Rose, 247
dillenii Haw., 247
haitiensis Britt., 247
moniliformis Haw., 247
picardæ Urb., 247
taylori Britt. et Rose, 247
testudinis crus Weber, 247
tuna Mill., 247
 Opuntiales, 78, 242
 Orange douce, 167
 Orange sure, 167
 Orchidaceae, 61
 Orchidales, 6, 61
 Oreganillo, 239
 Oregano, 316
 Oreille, 325
 Oreodoxa H. B. K., 40
regia H. B. K., 40
 Oreopanax Dcne. et Pl., 271
capitatum Dcne. et Pl., 271
 Origanum L., 321, 325
vulgare L., 326
 Orme d'Amérique, 225
 Ormosia Jacq., 144
krugii Urb., 144
 Ornithidium Salisb., 64, 73
coccineum Salisb., 73
confertum Griseb., 73
croceorubens Rchb. f., 73
vestitum Rchb. f., 73
 Oryza L., 24
latifolia Desv., 24
sativa L., 24
 Oryzæ, 11, 23
 Oseille, 99
 Oseille marron, 98
 Ossaea P. DC., 263, 268
abbottii Urb., 269
acuminata P. DC., 269
alloetricha Urb., 269
barahonensis Urb. et Ekm., 269
cinerea Cogn., 269
curvipila Urb. et Ekm., 269
domingensis Cogn., 269
ellipsoidea Urb. et Ekm., 269
 Ossaea furfuracea Urb., 269
hotteana Urb. et Ekm., 269
humilis Urb. et Ekm., 269
- hybophylla Urb., 269
 inaequidens Urb. et Ekm., 269
lanceifolia Urb., 269
lanceolata Urb. et Ekm., 269
lima Tr., 269
limoidea Urb., 269
lomensis Urb., 269
marigotiana Urb. et Ekm., 269
micrantha Macf., 269
polychæta Urb. et Ekm., 269
rubrinervis Urb. et Ekm., 269
scabrosa P. DC., 269
scalpta P. DC., 269
setulosa Urb., 269
 Otoschmidia Urb., 353, 361
haitiensis Urb., 362
 Otoschulzia Urb., 202
domingensis Urb., 202
 Ouache-ouache, 390
 Ouane primaire, 272
 Ouratea Aubl., 228
cinerea Urb., 229
jægeriana Urb., 229
ilicifolia Baill., 229
spinulosa Urb., 229
 Ox eye bean, 156
 Oxalidaceae, 160, 161
 Oxalis L., 162
barrelieri L., 162
domingensis Urb., 162
eggersii Urb., 162
hemitoma Urb., 162
martiana Zucc., 162
oligosperma Urb., 162
repens Thunb., 162
scoparia Norlind., 162
trouiniana Urb., 162
 Oxandra A. Rich., 118
lanceolata Baill., 118
laurifolia A. Rich., 118
 Ozua, 257
 Pabellon de rey, 103
 Pabellon de rez, 109
 Pachira Aubl., 222
aquatica Aubl., 222
emarginata A. Rich., 222
 Pachyanthus A. Rich., 262, 267
blancheanus Urb. et Ekm., 267
tuerckheimii Cogn., 267
urbanianus Cogn., 267
 Pachyrrhizus L. C. Rich., 154, 160
erosus Urb., 160
 Pachystachys Nees., 345, 348

- coccinea* Nees., 349
 Pacourina Aubl., 377
edulis Aubl., 378
 Pæpalanthus Mart., 47
tuerckheimii Ruhl., 47
 Palétuvier, 255, 320
 Palicourea Aubl., 353, 365
alpina P. DC., 365
 var. *eriantha* Griseb., 365
barbinervia P. DC., 365
brachystigma Urb., 365
crocea R. et Sch., 365
domingensis P. DC., 365
micrantha Urb. et Ekm., 365
patens Urb., 365
torbeciana Urb. et Ekm., 365
 Palo amargo, 87, 211
 Palo amarillo, 89, 363
 Palo bellaco, 183
 Palo berraco, 183
 Palo de cera, 85
 Palo de chivo, 141
 Palo de cruz, 355
 Palo de cuello, 362
 Palo damaso, 185
 Palo de encaje, 249
 Palo de hierro, 209
 Palo de leche, 296
 Palo de leche chiquito, 297
 Palo de Maco, 125
 Palo de Peo, 365
 Palo Perico, 107
 Palo peronia, 144
 Palo Peje, 169
 Palo de pez, 169
 Palo de toro, 383
 Palo robinson, 253
 Palo de tabaco, 149
 Palo de viento, 271, 272
 Palo de yagua, 238
 Palma christi, 189
 Palme, 40
 Palme à vin, 40
 Palme coyau, 38
 Palme marron, 40
 Palmiste, 40
 Palmiste à chapelet, 40
 Palmiste des Indes, 3
 Panache, 14, 349
 Pandanaceae, 6
 Pandanales, 5, 6
 Pandanus L., 6
furcatus Roxb., 6
 Panème, 274
 Paniceae, 11, 16
 Panicum L., 18, 20
aciculare Muhlenb., 21
acuminatum Sw., 21
adpersum Trin., 20
- barbinode* Trin., 20
boliviense Hack., 21
chrysopsidifolium Nash., 21
condensum Nash., 20
diffusum Sw., 20
dichotoniflorum Michx., 20
distantiflorum A. Rich., 20
elephantipes Nees, 20
exiguiglorum Griseb., 20
fasciculatum Sw., 20
geminatum Forsk., 20
 Panicum ghiesbreghtii Fourn., 20
glutinosum Sw., 20
hirsutum Sw., 20
hirticaule J. Presl., 20
lancearium Trin., 21
laxum Sw., 20
maximum Jacq., 20
molle Sw., 21
numidianum, 20
reptans L., 20
schiffneri Hack., 20
scoparium Lam., 21
stenodes Griseb., 20
strigosum Muhlenb., 20
trichanthum Nees., 21
trichoides Sw., 20
utowanæum Scribn., 20
venezuelæ Hack., 20
xalapense H. B. K., 20
zizanioides H. B. K., 21
 Paobelia, 184
 Papaver L., 122, 123
rhœas L., 123
 Papaveraceae, 122
 Papaverales, 78, 122
 Papaye, 240
 Papaye sauvage, 190
 Papilionateae, 134, 144
 Para grass, 20
 Paralabatia Pierre, 283, 284
fuertesii Urb., 284
 Parasol chinois, 32
 Parathesis Hook. f., 280, 281
serrulata Mez., 281
 Parcha, 240
 Parésol, 311
 Paressseux, 272
 Pariétaire, 94
 Parkinsonia L., 139, 142
aculeata L., 142
 Parra, 212
 Parra cimarrona, 212
 Parrot weed, 123
 Parthenium L., 384, 387
hysterophorus L., 387
 Pascua, 30
 Paspalum L., 17, 19

- alterniflorum A. Rich., 19
 breve Chase, 20
 cæspitosum Flugge, 20
 ciliatifolium Michx., 20
 ciliiferum Hitchc., 20
 conjugatum Bergius, 20
 decumbens Sw., 20
 densum Poir., 20
 dispar Chase, 20
 distachyum Poit., 19
 distichum L., 19
Paspalum distortum Chase, 20
 epile Nash., 20
 fimbriatum H. B. K., 19
 glabrum Poir., 20
 heterotrichum Trin., 19
 leptocaulon Nash., 19
 alterniflorum A. Rich., 19
 millegrana Schreb., 20
 notatum Flugge, 19
 orbiculatum Poir., 20
 panniculatum L., 20
 pleostachyum Döell., 20
 plicatum Michx., 19
 pulchellum H. B. K., 20
 rupestre Trin., 20
 secans Hitchc. et Chase, 20
 simpsoni Nash., 20
 stellatum Flugge, 20
 vaginatum Sw., 19
 virgatum L., 20
Passiflora L., 239
 anadenia Urb., 239
 berteriana Balb., 239
 bicrura Urb., 239
 bilobata A. Juss., 239
Passiflora capsularis L., 240
 cupræa L., 240
 ekmanii Kilipp. et Urb., 240
 fœtida L., 239
 heterophylla Lam., 240
 laurifolia L., 240
 maliformis L., 240
 multiflora L., 239
 murucuja L., 240
 orbiculata Cav., 240
 pallens Pæpp., 240
 pectinata Griseb., 240
 pedata L., 240
 quadrangularis L., 240
 rubra L., 240
 sexflora A. Juss., 239
 var. angustifolia Mast., 239
 var. hederacea Mast., 239
 var. lineariloba Mast., 239
 var. minima Mast., 239
 var. pallida Mast., 239
 suberosa L., 239
Passifloraceæ, 228, 239
 Pastinaca L., 273, 274
 sativa L., 274
 Pata de chivo, 140
 Patate, 308
 Patate lan mer, 307
 Patate marron, 307
 Pativier, 207
 Patte cheval, 117
 Patte tortue, 247
 Paullinia L., 203, 204
 cururu L., 204
 pinnata L., 204
 Pavonia Cav., 216, 220
 coccinea Cav., 220
 ekmanii Helwig, 220
 hotteana Helwig, 220
 leiocarpa Urb., 220
 acuminata Cav., 220
 punctata Urb., 220
 spicata Cav., 220
 spinifex Cav., 220
 typhalea Cav., 220
 Pavot, 123
 Pavot rouge, 123
 Pear, 133
 Peanut, 150
 Pecana, 86
 Pêche, 132
 Pêche marron, 121
 Pectis L., 393
 brevicaulis Urb., 394
 carthusianorum Lees., 394
 christii Urb., 394
 ciliaris L., 394
 domingensis Urb., 394
 elongata H. B. K., 394
 humifusa Sw., 394
 leptocéphala Urb., 394
 linifolia L., 394
 multiceps Urb., 394
 pusilla Urb., 394
 samanensis Urb., 394
 Pectis swartziana Lees., 394
Pedaliaceæ, 304, 340
 Pedilanthus Neck., 180, 194
 angustifolius Poit., 194
 itzaus Millsp., 194
 latifolius Millsp., 194
 tithymaloïdes Poit., 194
 Pedinopetalum Urb. et Wolff, 273, 275
 domingense Urb. et Wolff, 275
 Peireskia L., 242, 247
 aculeata Mill., 247
 bleo P. DC., 247
 portulacifolia Haw., 247

- Pela puerco, 44
Pelargonium L'Hér., 161
 hortorum Bailey, 161
 Pelexia Lindl., 62, 66
 adnata Spreng., 66
 calcarata Cogn., 66
 setacea Lindl., 66
Peltophorum Vogel., 139, 143
 berterianum Urb., 143
 Pencil flower, 150
 Pendula, 318
 Penelopeia Urb., 371, 373
 suburceolata Urb., 373
 Pennisetum L. C. Rich., 16, 22
 clandestinum Choir., 23
 domingense Spreng., 23
 glaucum R. Br., 23
 purpureum Schum., 23
Peperomia R. et P., 81, 82
 acuminata Cav., 82
 alata R. et P., 82
 alpina A. Dietr., 83
 alveolata Trel., 83
 barahonæ C. DC., 83
 basellæfolia Trel., 83
 brachypoda Urb., 83
 brouetiana Trel., 83
 buchii C. DC., 82
 var. macrostachya Trel., 82
 cabaiana Trel., 83
 capitis bovis Trel., 83
 circinnata Link., 83
 constanzana C. DC., 83
Peperomia crassispica Trel., 83
 crispipila Trel., 83
 cubensis C. DC., 83
 var. haitiensis Trel., 83
 cupularis Urb., 83
 densibacca C. DC., 82
 desfontainesi Trel., 84
 distachya A. Dietr., 83
 dominicana C. DC., 83
 var. roberjotana Trel., 83
 eggersii C. DC., 82
 emarginella C. DC., 82
 ephemera Ekm., 83
 exilis Griseb., 82
 foraminum C. DC., 83
 fuertesi C. DC., 82
 galioides H. B. K., 83
 glabella A. Dietr., 82
 var. brachyphylla C. DC., 82
 var. jimenesana C. DC., 82
 gloriosæfolia Trel., 84
 hemionitidifolia Ham., 83

- hernandifolia A. Dietr., 82
 hispidula Dietr., 83
 hirsutifolia Trel., 84
 humilis A. Dietr., 83
 infravillosa Trel., 84
 ionophylla Griseb., 83
 lentibacca C. DC., 83
 leonardii Trel., 83
Peperomia macorisiana Trel., 84
 maculosa W. Hook., 82
 maleuviana Trel., 83
 montium C. DC., 82
 mornicola C. DC., 83
 myrtillus Miq., 83
 nizaitensis C. DC., 82
 obtusifolia A. Dietr., 83
 olafiana Trel., 84
 parvulifolia Trel., 83
 pellucida H. B. K., 82
 perherbacea Trel., 83
 perinduta C. DC., 83
 var. nashii Trel., 83
 perodiniana Trel., 83
 polystachya W. Hook., 83
 var. godetiana Trel., 83
 portoricensis Urb., 82
 productamenta Trel., 83
 propugnaculi Trel., 83
 pterocaulis Miq., 83
 quadrifida H. B. K., 83
 quadrifolia H. B. K., 83
 quadrivii Trel., 82
 racemosa Trel., 83
 reflexa A. Dietr., 83
 rotundifolia H. B. K., 82
 var. pilosior C. DC., 82
Peperomia septemnervis R. et P., 83
 serpens Loud., 82
 subbasellæfolia Trel., 83
 taylorii C. DC., 84
 tenella A. Dietr., 83
 var. deltoïdes Trel., 83
 tithymaloïdes Dietr., 83
 tortugana Trel., 83
 truncata Trel., 83
 unguiculata Trel., 83
 urocarpa Fisch. et Mey., 82
 verticillata A. Dietr., 83
 Pera Mutis, 180, 185
 depressa Urb. et Ekm., 185
 domingensis Urb., 185
 glomerata Urb., 185
 Peralejo, 228
 Peratanthe Urb., 354, 366

- ekmanii Urb., 366
 Periantra Mart., 154, 155
 berteriana Benth., 155
 Perles de Noël, 306
 Peronia, 153
 Peronilla, 144, 153
 Perroquet, 48
 Persea Mill., 120, 121
 americana Mill., 121
 Persea domingensis Mez., 121
 krugii Mez., 121
 Persil, 276
 Persil marron, 274
 Pété, 219
 Pête-pête, 145
 Pété vié grand moune, 217
 Petit, Voir Ptit ou Ti
 Petit bois blanc, 201
 Petit bois d'Inde, 259
 Petit coco, 41
 Petites dentelles, 92
 Petit mapou, 190
 Petit médecinier, 190
 Petit pompon, 187
 Petitia Jacq., 315, 318
 domingensis Jacq., 319
 urbanii Ekm., 319
 Petiveria L., 108, 109
 alliacea L., 109
 Petrea Houst., 315, 317
 volubilis L., 317
 Petroselinum Hoffm., 273, 276
 sativum Hoffm., 276
 Phanerogamæ, 1
 Pharus L., 23, 24
 glaber H. B. K., 24
 latifolius L., 24
 parvifolius Nash., 24
 Phaseoleæ, 144, 153
 Phaseolus L., 154, 159
 adenanthus G. F. W. Mey., 159
 antillanus Urb., 159
 chryanthus Savi, 159
 Phaseolus lathyroides L., 159
 lunatus L., 159
 peduncularis H. B. K., 159
 ricciardianus Tenore, 159
 vulgaris L., 159
 Phenax Wedd., 91, 93
 ekmanii Urb., 93
 granulatus Urb., 93
 haitiensis Wedd., 93
 hirtus Wedd., 94
 lævis Urb. et Ekm., 93
 microcarpus Urb., 93
 pauciflorus Urb., 93
 sessilifolius Urb. et Ekm., 94
 urticifolius Urb., 93
 Philodendron Schott., 43, 44
 angustatum Schott., 44
 consanguineum Schott., 44
 fuertesi Schott., 44
 lacerum Schott., 44
 Philoxerus R. Br., 103, 105
 vermicularis P. Beauv., 105
 Phœbe Nees., 120, 121
 elongata Nees., 121
 Phœbe montana Griseb., 121
 Phœniceæ, 36
 Phœnices, 6, 36
 Phœnix L., 37, 38
 dactylifera L., 38
 Phoradendron Nutt., 95, 96
 anceps Krug. et Urb., 96
 antillarum Trel., 96
 barahonæ Urb. et Trel., 96
 chrysocarpum Krug. et Urb., 96
 domingense Trel., 96
 dichotomum Krug. et Urb., 96
 ficulneum Trel., 96
 fravens Griseb., 96
 haitiense Urb., 96
 hexastichum Griseb., 96
 latifolium Griseb., 96
 mucronatum Krug. et Urb., 96
 ovatifolium Urb., 96
 quadrangulare Krug. et Urb., 96
 racemosum Krug. et Urb., 96
 tetrapterum Krug. et Urb., 96
 trinervium Griseb., 96
 var. domingense Krug. et Urb., 96
 Phragmites Trin., 28, 29
 phragmites Karst., 29
 Phyllanthus L., 178, 181
 anisophyllus Urb., 181
 aquaticus Ch. Wr., 181
 berterianus Mull.-Arg., 181
 brachyphyllus Urb., 181
 buchii Urb., 181
 carolinensis Walt., 181
 cyclanthera Baill., 181
 epiphyllanthus L., 181
 fuertesi Urb., 181
 grandifolius L., 181
 hotteanus Urb. et Ekm., 181

- lathyroïdes H. B. K., 181
 leptoneurus Urb., 181
 maleolens Urb. et Ekm., 181
 micranthus A. Rich., 181
 myriophyllus Urb., 181
 niruri L., 181
 nivosus Bull., 181
 nobilis Mull-Arg., 181
 var. antillanus Mull-Arg., 181
 nummularioides Mull-Arg., 181
 polycladus Urb., 181
 saxicola Small., 181
 trigonus Urb. et Ekm., 181
 Phyllocactus Link., 242, 245
 hookeri Link., 246
 Phyllostylon Capan, 87
 brasiliensis Capan, 87
 Physalis L., 327, 328
 angulata L., 328
 var. ramosissima O. E. Schulz, 328
 microcarpa Urb. et Ekm., 328
 peruviana L., 328
 pubescens L., 328
 turbinata Medik., 328
 Physurus L. C. Rich., 66
 hirtellus Lindl., 66
 plantagineus Lindl., 66
 sagæanus A. Rich., 66
 Phytolacca L., 109
 icosandra L., 109
 purpurascens A. Br. et Bché., 109
 rivoïdes Kth. et Bché., 109
 thyrsoflora Fenzl., 109
 Phytolaccaceæ, 100, 108
 Picardæa Urb., 352, 355
 haïtiens Urb., 355
 Picramnia Sw., 168, 169
 Picramnia antidesma Sw., 169
 domingensis Urb., 169
 macrocarpa Urb. et Ekm., 169
 pentandra Sw., 169
 Picrasma Bl., 168
 excelsa Planch., 168
 selleana Urb., 168
 Picrodendron Planch., 168, 169
 macrocarpum Britt., 169
 Pictetia P. DC., 148, 149
 aculeata Urb., 149
 obcordata P. DC., 149
 spinifolia Urb., 149
 var. desvauxii Urb., 149
 var. obovata Urb., 149
 var. pleonophylla Urb., 149
 var. ternata Urb., 149
 Pilea Lindl., 91
 alpina Urb., 92
 baltenweckii Urb., 92
 barahonensis Urb., 92
 betulifolia Wedd., 92
 bicolor Urb., 92
 brachyclada Urb., 92
 brittoniæ Urb., 93
 cæspitosa Urb., 92
 Pilea cardiophylla Urb., 92
 caulescens Urb., 92
 cellulosa Urb., 92
 cephalantha Wedd., 92
 cephalophora Urb., 92
 chloroclada Urb., 93
 christii Urb., 92
 consanguinea Wedd., 92
 coronopifolia Urb. et Ekm., 93
 cyclophora Urb., 92
 depressa Bl., 92
 var. microphylla Griseb., 92
 diandra Urb., 93
 dictyocarpa Urb., 92
 dispar Urb., 92
 distantifolia Urb., 93
 domingensis Urb., 92
 ekmanii Urb., 93
 erosa Urb., 92
 franquevilleana Wedd., 92
 frutescens Urb., 92
 geminata Urb., 92
 gyrophylla Urb., 93
 herniarioides Lindl., 92
 lanceolata Wedd., 92
 laxa Wedd., 92
 leptocardia Urb., 93
 Pilea lobulata Urb., 92
 lurida Ch. Wright, 92
 melastomoides Urb., 92
 microphylla Liebm., 92
 microthombea Urb., 92
 minguetii Urb., 92
 muscosa Sw., 93
 norlindii Urb., 93
 nummularifolia Wedd., 92
 pachycaulis Urb., 93
 pachycephala Urb., 92
 palustris Urb., 92
 parietaria Bl., 92
 perfragilis Urb. et Ekm., 93
 phenacoïdes Urb. et Ekm., 93

- polyclada Urb., 92
 propinqua Wedd., 92
 puncticaulis Wedd., 92
 radiculosa Urb., 93
 repens Wedd., 92
 rugosa Wedd., 92
 selleana Urb., 93
 semidentata Wedd., 92
 serpyllacea Liebm., 92
 stelluligera Wedd., 92
 Pilea stenophylla Wedd., 92
 tippenhaueri Urb., 92
 trianthemoides Lindl., 93
 truncata Urb., 93
 undulata Urb., 92
 Pilocarpus Vahl., 164, 167
 racemosus Vahl., 167
 Pimande, 158
 Piment, 328
 Piment bouc, 328
 Piment zouzéau, 328
 Pimenta Lindl., 256, 260
 officinalis Lindl., 261
 Pin d'Australie, 80
 Pina de puerco, 366
 Pina macho, 165
 Pinaceæ, 3, 4
 Pinales, 3
 Pinillosia Ossa, 384, 386
 berterii Urb., 386
 Pinné jaune, 165
 Pino, 165
 Pinon, 190
 Pinus L., 4
 occidentalis Sw., 4
 Piper L., 80, 81
 acampostachys Trel., 81
 aduncum L., 81
 amalago L., 81
 atropremnon Trel., 81
 buchii Urb., 81
 cabaianum Trel., 81
 camptostachys Urb., 81
 chrysosolepidum Trel., 81
 constanzanum Urb., 81
 cuspidatum Desv., 81
 densibaccum Trel., 81
 depressibacum Trel., 81
 eocenicum Trel., 81
 fontium Trel., 81
 fuertessii CDC., 81
 hispaniolæ Trel., 81
 hispidum Trel., 81
 jacquemontianum C. DC., 81
 linguae-folium Ham., 81
 var. brevifolium Trel., 81
 macrophyllum H. B. K., 81
 marginatum Jacq., 81
 medium Jacq., 81
 var. leonardi Trel., 81

- oviedoï Urb., 81
 parryanum Trel., 81
 peltatum L., 81
 perpallidum Ekm., Urb. et Trel 81
 Piper picardæ C. DC., 81
 pseudoconfusum C. DC., 81
 rugosum Lam., 81
 samanense Urb., 81
 santo-domingense Trel., 81
 scabrum Sw., 81
 sulcinerve Urb., 81
 swartzianum C. DC., 81
 thebaudianum Trel., 81
 torbecanum Trel., 81
 trigonocarpum Trel., 81
 tuberculatum Jacq., 81
 vanderveldeanum Trel., 81
 Piperaceæ, 80
 Piperales, 77, 80
 Piperanthera C. DC., 81, 82
 cupularis C. DC., 82
 Piptadenia Benth., 134, 138
 peregrina Benth., 138
 Piptocoma Cass., 377, 378
 rufescens Cass., 378
 Piquant arada, 238
 Piquant carré, 238
 Piquant couena, 247
 Piquant cousin, 23
 Piquant jambe, 393
 Piquant pied, 393
 Piquant rosé, 237
 Piquant sauteur, 247
 Piquant vers, 23
 Piqueria Cav., 379
 laxiflora Robins, 379
 trinervia Cav., 379
 Piriqueta Aubl., 238
 caroliniana Urb., 238
 var. exasperata Urb., 238
 var. glabra Urb., 238
 cistoides Meyer, 238
 ovata Urb., 238
 Piscidia L., 151, 152
 piscipula Sarg., 152
 Pisonia L., 106, 107
 aculeata L., 107
 albidia Stendl., 107
 var. glutinosa Heim., 107
 var. platyphylla Heim., 107
 brevipetiolata Urb., 107
 discolor Spreng., 107
 domingensis Heim., 107
 fragrans Dum. Cours., 107

- ligustrifolia Heim., 107
 obtusata Jacq., 107
 ochracea Heim., 107
 rotundata Griseb., 107
 Pistache, 150
 Pistache des Indes, 226
 Pistache marron, 141, 176
 Pistia L., 43, 45
 stratiotes L., 45
 Pisum L., 153
 sativum L., 153
 Pitajaya, 243
 Pitcairnia L'Her., 47, 48
 angustifolia Red., 48
 fuertessii Mez., 48
 fulgens Dcne., 48
 latifolia Sol., 48
 tomentosa Hortul., 48
 xanthocalyx Mart., 48
 Pite, 55
 Pite espagnol, 55
 Pite heniquen, 55
 Pite pays, 55
 Pite sisal, 55
 Pithecolobium Mart., 135
 arboreum Urb., 136
 berterianum Benth., 136
 circinnale Benth., 135
 filipes Benth., 135
 glaucum Urb., 135
 latifolium Benth., 136
 micranthum Benth., 136
 nervosum Urb., 135
 oppositifolium Urb., 136
 tortum Mart., 136
 unguis-cati Benth., 135
 Plantaginaceæ, 351
 Plantaginales, 79, 350
 Plantago L., 351
 lanceolata L., 351
 major L., 351
 Plantain, 58, 351
 Plante rageur, 389
 Plantano cimarron, 58
 Plantano sylvestre, 58
 Platygynne Mercier, 179, 188
 hexandra Mull-Arg., 188
 Pleadendron Van Tiegh., 234
 ekmanii Urb., 234
 Plethadenia Urb., 164, 165
 granulata Urb., 165
 Pleurothallis R. Br., 64, 69
 anthoctenium Rchb. f., 69
 appendiculata Cogn., 69
 aristata Hook., 69
 barahonensis Cogn., 69
 constanzensis Cogn., 69
 crassipes Lindl., 69
 cryptantha Cogn., 69
 domingensis Cogn., 69
 dussii Cogn., 69

- erosa Urb., 69
 fuertessii Cogn., 69
 gelida Lindl., 69
 helena Fawc. et Rendle, 69
 hotteana Mansf., 69
 lanceola Spreng., 69
 longilabris Lindl., 69
 melanantha Rchb. f., 69
 miguelii Schelchter, 69
 Pleurothallis Mornicola Mansf., 69
 obovata Lindl., 69
 racemiflora Lindl., 69
 ruscifolia R. Br., 69
 testifolia Lindl., 69
 tricotata Cogn., 69
 velaticaulis Rchb. f. 69
 wilsoni Lindl., 69
 Plinia L., 256, 261
 abeggii Urb., 261
 acutissima Urb., 261
 caricensis Urb., 261
 cidensis Urb., 261
 ekmaniana Urb., 261
 haïtiens Urb. et Ekm., 261
 icardiana Urb., 261
 microcycla Urb., 261
 Pluchea Cass., 383
 eggersii Urb., 383
 odorata Cass., 383
 purpurascens P. DC., 383
 Plumbaginaceæ, 282
 Plumbaginales, 79, 282
 Plumbago L., 282
 capensis Thunb., 282
 scandens L., 282
 Plumeria L., 294, 295
 barahonensis Urb., 295
 berterii A. DC., 295
 biglandulosa Urb., 295
 cuneifolia Helwig, 295
 discolor Urb. et Ekm., 295
 domingensis Urb., 295
 gibbosa Urb., 295
 longiflora Urb. et Ekm., 295
 marchii Urb., 295
 obtusa L., 295
 paulinæ Urb., 295
 rubra L., 295
 stenopetala Urb., 295
 var. angustissima Urb., 295
 subsessilis A. DC., 295
 trouinensis Urb. et Ekm., 295
 tuberculata Lodd., 295
 Poa L., 28, 30
 annua L., 30
 compressa L., 30

pratensis L., 30
Poaceæ, 10
Poales, 5, 10
Podocarpus l'Hér., 3
 angustifolius Griseb., 3
 var. wrightii Pilg., 3
Podocarpus buchii Urb., 3
Pogonia Juss., 62, 65
 macrophylla Lindl., 65
Poecilopsis Schlecht., 300, 302
 crispiflora Schlecht., 302
 ovatifolia Schlecht., 302
 tuerckheimii Schlecht., 302
Poil à gratter, 189
Poinsetta, 194
Poire, 133
Poireau, 52
Poiretia Vent., 148, 149
 scandens Vent., 149
Poirier, 163
Pois, 220
Pois blanc, 159
Pois cochon, 160
Pois congo, 158
Pois de merveille, 204
Pois de souche, 159
Pois doux, 135
Pois et riz, 255
Pois France, 153
Pois gratté, 156, 188
Pois inconnu, 160
Pois Jérusalem, 159
Pois lentille, 159
Pois maldioc, 158
Pois maldioc lan mer, 158
Pois mangé cochon, 160
Pois manioc, 160
Pois noir, 159
Pois lasinette, 136
Pois plante, 141
Pois-pois, 44
Pois rouge, 159
Pois sucrin, 135
Pois vallière, 148
Poison lasinette, 136
Poitea Vent., 146, 147
 galegoïdes Vent., 148
Poivre Jamaïque, 261
Polanisia Rafin, 124
 viscosa P. DC., 124
Polemoniaceæ, 303, 309
Polemoniales, 79, 303
Polianthes L., 54, 55
 tuberosa L., 55
Polycarpon Læfl., 113, 114
 tetrphyllum L., 114
Polygala L., 176
 americana Mill, 176
 crucianelloïdes P. DC., 176
 fuertesii Blake, 176

 grandiflora Walt., 176
 grandiflora Walt., 176
 var. leptophylla Chod., 176
 var. orbicularis Chod., 176
 hecatantha Urb., 176
 longicaulis H. B. K., 176
 panniculata L., 176
 penaea L., 176
 santa-Luciæ Chod., 176
Polygalaceæ, 160, 176
Polygonaceæ, 98
Polygonales, 77, 98
Polygonum L., 98, 99
 acuminatum H. B. K., 99
 glabrum Willd., 99
 pennsylvanicum L., 99
 punctatum Ell., 99
Polypetalæ, 76, 77
Polyrrhiza Pfitz., 63, 75
 sallei Cogn., 75
Polyscias Forst., 271, 272
 balfouriana Bailey, 272
 filicifolia Bailey, 272
 fruticosa Harms., 272
 guilfoylei Bailey, 272
 pinnata Forst., 272
Polystachya W. Hook., 63, 68
 minuta Britt., 68
Pomara, 260
Pomegranate, 252
Pomme, 133
Pomme cajou, 196
Pomme cythère, 197
Pomme d'amour, 329
Pomme de terre, 329
Pomme liane, 240
Pomme mal cadé, 209
Pomme rose, 260
Pomme të, 329
Pomme torche, 244
Pomme zombi, 192
Pompon, 322
Pontederiaceæ, 46, 50
Ponthieva R. Br., 62, 67
 ekmanii Mansf., 67
 glandulosa R. Br., 67
 haitiensis Mansf., 67
 harrisii Cogn., 67
 pauciflora Fawc. et Rendle, 67
 ventricosa Fawc. et Rendle, 67
Populus L., 84
 italica Du Roi, 84
Porana Burm., 305, 306
 panniculata Roxb., 306
Poreau, 52
Porophyllum Adans., 393
 ellipticum Cass., 393
Portlandia L., 355
 domingensis Britt., 355

Portulaca L., 112
 halimoides L., 112
 oleracea L., 112
 var. parvifolia Griseb., 112
 phæosperma Urb., 112
 pilosa L., 112
 quadrifida L., 112
Portulacaceæ, 100, 111
Potamogeton L., 7
 coloratus Vahl., 7
 var. jamaicensis Graebn., 7
 filiformis L., 7
 fluitans Roth., 7
 subsp. americanus Cham. et Schl., 7
 foliosus Raf., 7
 malinus Miq., 7
 pectinatus L., 7
 pulchelliformis Hagstr., 7
 pusillus L., 7
Potamogetonaceæ, 6, 7
Pothomorphe Miq., 80, 82
 peltata Miq., 82
 umbellata Miq., 82
Pourpier, 112
Pourpier bord de mer, 111
Prêles, 2
Prescottia Lindl., 62, 67
 oligantha Lindl., 67
 stachyoïdes Lindl., 67
Priamosia Urb., 236, 237
 domingensis Urb., 237
Prickly poppy, 123
Primavera, 54
Primulaceæ, 279, 281
Primulales, 79, 279
Pringa leche, 190
Pringa moza, 91, 310
Printemps, 142
Priva Adans, 314, 317
 domingensis Urb., 317
 lappulacea Pers., 317
Prockia L., 235, 236
 crucis L., 236
Prosopis L., 134, 138
 juliflora P. DC., 138
Protium Burm., 170
 glaucescens Urb., 170
Proustia Lag., 396, 397
 crassinervis Urb., 397
 stenophylla Urb. et Ekm., 397
Prune tree, 132
Prunus L., 131, 132
 americana Marshall, 132
 myrtifolia Urb., 132
 occidentalis Sw., 132
 persica Stokes, 132
Pseudolmedia Trec., 88, 89
 spuria Griseb., 89
Pseudophœnix H. Wendl., 38, 40

ekmanii Burret, 40
elata Cook, 40
gracilis Ekm., 40
insignis Cook, 40
navassana Ekm., 40
saonæ Cook, 40
vinifera Becc., 40
Psidium L., 256, 257
 acanthum Urb., 257
 dictyophyllum Urb. et Ekm., 257
 guajava L., 257
 guineense Sw., 257
 hotteanum Urb. et Ekm., 257
Psidium trilobum Urb. et Ekm., 257
Psychotria L., 353, 364
 agnata P. DC., 365
 alpestris Urb. et Ekm., 365
 angustifolia Poir., 364
 baltenweckii Urb., 364
 barahonensis Urb., 364
 berteriana P. DC., 365
 brachiata Sw., 365
 brownei Spreng., 365
 buchii Urb., 364
 christii Urb., 364
 cælocalyx Urb., 364
 cyclophylla Urb., 364
 dolichocalyx Urb., et Ekm., 365
 fuertesii Urb., 364
 grandis Sw., 364
 granulata Urb. et Ekm., 365
 haitiensis Urb., 364
 heterochroa Urb., 364
 holoxantha Urb. et Ekm., 365
 horizontalis Sw., 364
 lasiophthalma Griseb., 365
 ligustrifolia Millsp., 364
 marmeladensis Urb., 365
 mornicola Urb., 364
 microdon Urb., 364
Psychotria nutans Sw., 364
 pendula Urb., 365
 pernitida Urb., 364
 pinularis Sessé et Moc., 364
 plumierii Urb., 364
 pubescens Sw., 365
 revoluta P. DC., 364
 sulzeri Small., 365
 surianii Urb., 364
 tenuifolia Sw., 364
 tetrapyrena Urb., 364
 uliginosa Sw., 364
 undata Jacq., 364
 var. poitaei Urb., 364
 viridialba Urb., 364

Pteridophyta, 1, 2
Pterocarpus L., 151, 152
 officinalis Jacq., 152
Pterocaulon Ell., 383
 alopecuroïdeum P. DC., 383
 virgatum P. DC., 383
Pterocissus Urb. et Ekm., 211, 212
 mirabilis Urb. et Ekm., 212
Ptit baume marron, 323
Ptit buis, 176
Ptit coco, 279
Ptit croco, 42
Ptit gaïac, 136
Ptit liane ibo, 297
Ptit mil chandelle, 23
Ptychosperma Labill., 37, 40
 wendlandianum Burret, 41
Punica L., 252
 granatum L., 252
Punicaceæ, 248, 252
Pyrolaceæ, 277
Pyrus L., 131, 133
 communis L., 133
 malus L., 133
Quamoclit Mœnch., 305, 308
 coccinea Mœnch., 308
 pinnata Boj., 308
Quararibaea Aubl., 222, 223
 turbinata Poir., 223
Quatre chemins, 281
Quélimbé, 45
Quénépe, 206
Quénépe chinois, 206
Queue rat, 104
Quinique, 143
Quinquina pays, 358
Quinze sous, 382
Quisqualis L., 254, 255
 indica L., 255
Radis, 128
Radis marron, 128
Raisin, 212
Raisin lan mer, 100
Raisin marron, 99, 281
Rajania L., 56
 angustifolia Sw., 56
Rajania cordata L., 56
 hastata L., 56
 var. angusta R. Knuth., 56
 var. euastata R. Knuth., 56
 var. incisa R. Knuth., 56
 var. latior R. Knuth., 56
 var. triloba R. Knuth., 56
minutiflora Uline, 56
mucronata Willd., 56
ovata Sw., 56
 var. ehrenbergii R. Knuth., 56
pilifera Urb., 56
quinquefolia L., 56
spiculiflora Uline, 56
tenuiflora Knuth., 56
Ramie, 93
Ramirea Aubl., 32, 35
 maritima Aubl., 35
Ramon, 89
Ramon de vaca, 272
Randia L., 352, 359
 aculeata L., 359
 erythrocarpa Krug. et Urb., 359
 parvifolia Lam., 359
Ranunculaceæ, 114, 115
Ranunculales, 77, 78, 114
Ranunculus L., 115, 116
 cubensis Griseb., 116
 domingensis Urb. et Ekm., 116
 flagelliformis Smith., 116
Ranunculus parviflorus L., 116
 recurvatus Poir., 116
Rapanea Aubl., 280, 281
 ferruginea Mez., 281
 guianensis Aubl., 281
 magnolifolia Urb. et Ekm., 281
Raphanus L., 126, 128
 raphanistrum L., 128
 sativus L., 128
 var. radícula Pers., 128
Raton, 206
Rauwolfia L., 294, 297
 biauriculata Mull-Arg., 297
 canescens L., 297
 lamarckii A. DC., 297
 nitida Jacq., 297
Ravenala Adans., 5, 8
 madagascariensis Gmel., 58
Ravenia Vell., 164, 166
 spectabilis Planch., 166
Red bead vine, 153
Red Spanish, 48
Régisse, 153
Reimarochloa Hitchc., 17, 19
 brasiliensis Hitchc., 19
Relbunium Endl., 354, 369
 hypocarpium Hemsl., 369
Remirea Aubl., 32, 35
 maritima Aubl., 35
Renealmia L. f., 59
 antillarum Gagnep., 59
 aromatica Griseb., 59
 densiflora Urb., 59

Réséda, 252
 Reynaudia Kunth., 24
 filiformis Kunth., 24
 Reynosia Griseb., 209
 affinis Urb. et Ekm., 210
 cuneifolia Urb. et Ekm., 210
 domingensis Urb., 210
 regia Urb. et Ekm., 210
 uncinata Urb., 210
 Rhabdadenia Mull-Arg., 294, 297
 berterii Mull-Arg., 297
 paludosa Miers., 297
 polyneura Urb., 297
 Rhachicallis P. DC., 352, 356
 americana O. Ktze., 356
 Rhacoma L., 199, 200
 crossopetalum L., 200
 gonoclada Urb., 200
 ilicifolia Trel., 200
 Rhamnaceæ, 208
 Rhamnales, 78, 208
 Rhamnus L., 209, 210
 sphærosperma Sw., 210
 Rheedia L., 231, 232
 barkeriana Urb. et Ekm., 232
 lateriflora L., 232
 verticillata Griseb., 232
 Rhipsalis Gaertn., 242, 246
 cassythia Gaertn., 246
 Rhizophora L., 253
 mangle L., 253
 Rhizophoraceæ, 248, 253
 Rhodopis Urb., 154, 156
 planisiliqua Urb., 156
 Rhœo Hance, 49, 50
 discolor Hance, 50
 Rhynchosia Lour., 154, 158
 minima P. DC., 158
 parvifolia P. DC., 158
 phaseoloides P. DC., 158
 pyramidalis Urb., 158
 reticulata P. DC., 158
 stenophylla Urb. et Ekm., 158
 swartzii Urb., 158
 Rhynchospora Vahl., 32, 34
 aristata Bæck., 35
 barbata Kunth., 34
 buchii Urb., 34
 corymbosa Britt., 34
 cymosa Ell., 35
 cyperoides Mart., 34
 domingensis Urb., 34
 ekmanii Urb., 35
 elongata Kuk., 35
 exaltata Kunth., 35
 eximia Bæck., 35
 fascicularis Vahl., 35
 glauca Vahl., 35

Rhynchospora lindeniana
 Griseb., 35
 micrantha Vahl., 35
 miliacea Gray., 35
 pusilla Griseb., 34
 racemosa C. Wr., 35
 setacea Bæck., 35
 stenophylla Chapm., 35
 Rhytidophyllum Mart., 342, 343
 auriculatum Hook., 344
 var. angustatum Urb., 344
 var. genuinum Urb., 344
 var. plumerianum Urb., 344
 var. stipulare Urb., 344
 berterioanum Mart., 344
 bicolor Urb., 344
 leucomallon Hanst., 344
 lonatum Urb. et Ekm., 344
 petiolare P. DC., 344
 vernicosum Urb. et Ekm., 344
 Ricin, 189
 Ricinus L., 179, 189
 communis L., 189
 Ringworm shrub, 141
 Rivea Choisy, 304, 308
 bracteata Hall. f., 309
 corymbosa Hall. f., 309
 Rivina L., 108, 109
 humilis L., 109
 Robe, 197
 Roble, 339
 Rochefortia Sw., 310, 312
 acanthophora Griseb., 312
 cuneata Sw., 312
 Rollinia St-Hil., 118, 119
 mucosa Baill., 119
 Romain, 194
 Romarin, 183, 322
 Rondeletia L., 352, 356
 areolata Urb., 357
 azuensis Urb., 356
 berteriana P. DC., 356
 brachyantha Urb., 357
 brauseana Urb., 356
 brigandina Urb. et Ekm., 357
 cacuminis Urb. et Ekm., 357
 carnea Urb. et Ekm., 357
 christii Urb., 356
 chrysantha Urb. et Ekm., 357
 domatiata Urb., 357
 formonia Urb. et Ekm., 357

fuertesii Urb., 356
 hincheana Urb. et Ekm., 357
 heterochroa Urb., 356
 Rondeletia merillona Urb., 357
 microcarpa Urb. et Ekm., 357
 mornicola Urb. et Ekm., 357
 nalgensis Urb. et Ekm., 357
 ochracea Urb., 356
 pitreana Urb. et Ekm., 357
 royenifolia P. DC., 357
 selleana Urb. et Ekm., 357
 virgata Sw., 357
 Roroli, 341
 Rosa L., 131, 133
 borboniana Desp., 133
 Rosa cimarron, 237
 Rosamora, 131
 Rosamora blanca, 131
 Rosaceæ, 129, 130
 Rosales, 78, 129
 Rosary pea, 153
 Roseau, 29
 Rosmarinus L., 320, 322
 officinalis L., 322
 Rotala L., 250
 ramosior Kæhne, 250
 Rottbællia L. f., 13
 exaltata L. f., 13
 Roucou, 234
 Rourea Aubl., 133
 surinamensis Miq., 133
 Rousselia Gaudich., 91, 94
 humilis Urb., 94
 Roystonea O. F. Cook, 37, 40
 regia Cook, 40
 Rubiaceæ, 351
 Rubiales, 80, 351
 Rubus L., 131
 barkerianus Helwig., 131
 domingensis Focke, 131
 florulentus Focke, 131
 var. eggertii Focke, 131
 jamaicensis L., 131
 rosifolius J. E. Smith, 131
 var. coronarius Sims., 131
 selleanus Helwig, 131
 Ruellia L., 345, 347
 coccinea Vahl., 347
 domingensis Spreng., 347
 geminiflora H. B. K., 347
 lepidota Urb., 347
 nudiflora Urb., 347
 var. insularis Leon., 347

tuberosa L., 347
 Rumex L., 98
 acetosella L., 99
 Rumex crispus L., 98
 crispus obtusifolius, 99
 obtusifolius L., 98
 patientia L., 99
 Ruppia L., 7
 maritima L., 7
 Russelia Jacq., 332, 334
 equisetiformis Ch. et Schl., 334
 juncea Zucc., 334
 Ruta L., 164, 165
 chalepensis L., 166
 Rutaceæ, 161, 164
 Rytillix Raf., 12, 14
 granularis Skeels., 14
 Sabal Adans, 36, 39
 cauiarum Becc., 39
 domingensis Becc., 39
 neglecta Becc., 39
 Sabbatia Adans, 291, 292
 cubensis Urb., 292
 Sabiaceæ, 195, 208
 Sablier, 193
 Saccharum L., 12, 13
 officinarum L., 13
 Sacciolepis Nash., 18, 21
 striata Nash., 21
 Safran, 59, 366
 Sagittaria L., 8
 intermedia M. Mich., 8
 lancifolia L., 8
 Sagou marron, 60
 Salade d'eau, 45
 Salicaceæ, 84
 Salicales, 76, 84
 Salicornia L., 101, 102
 perennis Mill., 102
 Salix L., 84
 babylonica L., 85
 Salmea P. DC., 385, 390
 scandens P. DC., 390
 Salvia L., 323, 383
 arborescens Urb. et Ekm., 324
 var. dolichocarpa Urb., 324
 arduinervis Urb. et Ekm., 324
 azuensis Urb., 324
 bahorucana Urb. et Ekm., 324
 barkeriana Urb. et Ekm., 324
 bidens Urb., 323
 Salvia brachyloba Urb., 324
 brachyphylla Urb., 324
 var. subglabra Urb., 324
 buchii Urb., 324

cabonii Urb., 324
 calaminthæfolia Vahl., 324
 coccinea B. Juss., 324
 cognata Urb. et Ekm., 324
 constanza Urb., 324
 densiflora Benth., 324
 foveolata Urb. et Ekm., 324
 haïtiens Urb. et Ekm., 324
 hotteana Urb. et Ekm., 324
 incumbens Urb. et Ekm., 324
 lachnaiocloa Briq., 324
 micrantha Vahl., 323
 microdictya Urb. et Ekm., 324
 occidentalis Sw., 323
 otoschulzii Urb. et Ekm., 324
 var. neurocalyx Urb. et Ekm., 324
 parciflora Urb., 324
 saccifera Urb. et Ekm., 324
 selleana Urb., 324
 serotina L., 324
 setosa Fernald, 324
 thormanni Urb., 324
 tortuensis Urb., 324
 tuerckheimii Urb., 324
 typenhauerii Urb., 324
 Salvia uncinata Urb., 324
 wunschmannii Krug. et Urb., 324
 Salvia blanca, 383
 Sambucus L., 369
 canadensis L., 369
 var. laciniata A. Gray, 369
 Samolus L., 282
 floribundus H. B. K., 282
 Samuelsonia Urb. et Ekm., 345, 349
 verrucosa Urb. et Ekm., 349
 Samyda L., 236, 237
 dodecandra Jacq., 237
 oligostemon Urb., 237
 rosea Sims., 237
 tenuifolia Urb., 237
 Sanchezia Ruiz. et Pav., 345, 346
 nobilis Hook. f., 346
 Sandbox tree, 193
 Sangre de Cristo, 342
 Sanguinaria, 194
 Sans cesse, 296
 Sansevieria Thunbg., 52
 guineensis Willd., 52

Santalales, 77, 94
 Saona, 209
 Sapindaceæ, 195, 203
 Sapindales, 76, 195
 Sapindus L., 203, 205
 saponaria L., 205
 f. inæqualis Radlk., 205
 Sapium Jacq., 180, 192
 buchii Urb., 192
 haïtiense Urb., 192
 jamaïcense Sw., 192
 Sapotaceæ, 283
 Sapote, 284
 Sapotier, 284
 Sapotille, 284, 286
 Sapotille marron, 286
 Sapotillier marron, 285
 Saracha R. et P., 327, 328
 antillana Krug. et Urb., 328
 Sarcophagus Griseb., 208, 209
 crenatus Urb., 209
 domingensis Krug. et Urb., 209
 microdictus Urb. et Ekm., 209
 parvifolius Urb. et Ekm., 209
 punctatus Urb. et Ekm., 209
 reticulatus Urb., 209
 Sarcopilea Urb., 91, 93
 domingensis Urb., 93
 Satanier, 206
 Satureia L., 321, 323
 domingensis Urb. et Ekm., 323
 Sauvagesia L., 228, 229
 erecta L., 229
 Savia Willd., 178, 180
 erythroxyloides Willd., 181
 sessiliflora Willd., 181
 Savonnette pays, 205
 Scævola L., 375
 plumierii Vahl., 375
 Schæfferia Jacq., 199, 200
 angustifolia Urb. et Ekm., 200
 ephedroides Urb., 200
 frutescens Jacq., 200
 Schlegelia Miq., 337, 340
 brachyantha Griseb., 340
 portoricensis Urb., 340
 Schœnus L., 31, 35
 nigricans L., 35
 Schœphia Schreb., 94
 chrysophylloides Planch., 94
 haïtiens Urb. et Britt., 94

- navasana Urb. et Ekm., 94
 obovata Ch. Wr., 94
 olivacea Urb. et Ekm., 94
 Schradera Vahl., 352, 358
 capitata Vahl., 359
 Schrankia Willd., 135, 137
 leptocarpa P. DC., 137
 Schultesia Mart., 291, 292
 heterophylla Miq., 293
 stenophylla Mart., 293
 Sciadodendron Griseb., 271, 272
 excelsum Griseb., 272
 Scirpus L., 31, 34
 cubensis Poepp., 34
 lacustris L., 34
 olneyi A. Gray., 34
 spadiceus Bæck., 34
 Scitamineae, 6, 57
 Scleria Bergius, 32, 35
 ciliata Michx., 35
 cubensis Bæck., 35
 distans Poir., 35
 var. interrupta Kuk., 35
 eggersiana Bæck., 35
 hirtella Sw., 35
 lithosperma Sw., 35
 microcarpa Nees., 35
 mitis Bergius, 35
 pterota Presl., 35
 secans Urb., 35
 setacea Poir., 35
 Sclerotherix Presl., 240, 241
 fasciculata Presl., 241
 Scolosanthus Vahl., 353, 363
 acanthoides Urb., 363
 densiflorus Urb., 363
 selleanus Urb. et Ekm., 363
 Scolosanthus triacanthus P. DC., 353
 Scoparia L., 333, 335
 dulcis L., 335
 Screw pine, 6
 Scrophularia L., 332, 334
 domingensis Urb., 334
 eggersii Urb., 334
 micrantha Desv., 334
 Scrophulariaceae, 303, 332
 Scutachne Hitchc. et Chase, 17, 21
 dura Hitchc. et Chase, 22
 Scutellaria L., 320, 322
 havanensis Jacq., 322
 Scybalium Schott et Endl., 97
 jamaicense Schott et Endl., 97
 Sebastiania Spreng., 180, 191
- corniculata Mull-Arg., 191
 picardæ Urb., 191
 Secchium Juss., 371, 373
 edule Sw., 373
 Securidaca L., 176, 177
 virgata Sw., 177
 Securinega Juss., 178, 182
 abegii Urb. et Ekm., 182
 acidoton Fawc. et Rendle, 182
 Selenicereus Britt. et Rose, 243, 244
 grandiflorus Britt. et Rose, 244
 quadrangularis Britt. et Rose, 244
 urbanianus Britt. et Rose, 244
 Selleophytum Urb., 384, 388
 buchii Urb., 388
 Semen contra, 101
 Semma, 141
 Sen, 141, 147
 Sen amargo, 147
 Sen de la tierra, 147
 Séné, 141
 Senecio L., 395, 396
 buchii Urb., 396
 cancellatus P. DC., 396
 constanza Urb., 396
 fuertesii Urb., 396
 haïtiensis Krug. et Urb., 396
 Senecio hotteana Urb. et Ekm., 396
 lucens Urb., 396
 picardæ Krug. et Urb., 396
 plumbeus Griseb., 396
 stenodon Urb., 396
 trineurus Griseb., 396
 vulgaris L., 396
 Senecioneae, 376, 377, 394
 Senites Adans., 28, 29
 haïtiensis H. et C., 29
 zeugites Nash., 29
 Sensitive, 137
 Serjania Schum., 203, 204
 acupunctata Radlk., 204
 angustifolia Willd., 204
 cuneolata Radlk., 204
 diversifolia Radlk., 204
 var. parvula Radlk., 204
 sub. var. multifoliata Radlk., 204
 filicifolia Radlk., 204
 polyphylla Radlk., 204
 sinuata Schum., 204
 f. ilicifolia Radlk., 204

- f. plumieriana Radlk., 204
 subdentata Juss., 204
 Serpent, 297
 Sesame, 341
 Sesamum L., 341
 orientale L., 341
 Sesbania Pers., 146, 148
 grandiflora Pers., 148
 occidentalis Pers., 148
 sericea P. DC., 148
 Sesuvium L., 110, 111
 portulacastrum L., 111
 Setaria Beauv., 16, 22
 barbata Kunth., 22
 geniculata Beauv., 22
 lutescens Stuntz., 22
 scandens Schrad., 22
 setosa Beauv., 22
 tenax Hitchc., 22
 vulpiseta R. et Sch., 22
 Shame weed, 137
 Sherardia Dill., 354, 368
 arvensis L., 368
 Shoe black, 221
 Sicyos L., 371, 373
 laciniatus L., 373
 Sida L., 216, 218
 acuminata P. DC., 219
 acuta Burm., 219
 var. albiflora Ekm., 219
 Sida ciliaris L., 219
 cordifolia L., 219
 glabra Mill., 219
 var. setifera Helwig., 219
 glomerata Cav., 219
 glutinosa Commers., 219
 hederifolia Cav., 219
 humilis Cav., 219
 jamaicensis L., 219
 linifolia Juss., 219
 maculata Cav., 219
 procumbens Sw., 219
 var. pilosa Cav., 219
 pyramidata Desportes, 219
 rhombifolia L., 219
 spinosa L., 219
 tridentata Cav., 219
 urens L., 219
 Sideroxylon L., 283, 285
 domingense Urb., 285
 foetidissimum Jacq., 285
 Siegesbeckia L., 384, 388
 agrestis Poepp. et Endl., 388
 Sifflet, 215
 Sigua blanca, 122
 Sigua prieta, 120
 Silene L., 113
 venosa Aschers., 113
 Simarouba, 169

- Simaruba Aubl., 168
 berteriana Krug. et Urb., 168
 glauca DC., 168
 officinalis P. DC., 168
 Simarubaceae, 161, 167
 Sinapis L., 126, 127
 arvensis L., 127
 Sinaso, 135
 Siphocampylus Pohl., 374, 375
 decumbens Juss., 375
 domingensis A. DC., 375
 igneus Urb., 375
 laciniatus Urb., 375
 tuerckheimii Urb., 375
 Sisymbrium L., 126, 127
 ekmanii O. E. Schulz., 127
 haïtiensis O. E. Schulz., 127
 officinale Scop., 127
 Sisyrinchium L., 57
 graminoides Bickn., 57
 micranthum Cav., 57
 Sloanea L., 214
 berteriana Choisy, 214
 castor Urb. et Ekm., 214
 domingensis Urb., 214
 ilicifolia Urb., 214
 Small leaved sweet wood, 122
 Smilax L., 52, 53
 balbisiana Kunth., 53
 coriacea Spreng., 53
 var. ilicifolia O. E. Schulz., 53
 domingensis Willd., 53
 hastata Jacq., 53
 havanensis Jacq., 53
 var. dentata A. DC., 53
 var. ovata A. DC., 53
 oblongata Sw., 53
 var. viscidifolia O. E. Schulz., 53
 papyracea Duham., 53
 populnea Kunth., 53
 var. horrida O. E. Schulz., 53
 Solanaceae, 303, 306
 Solandra Sw., 327, 330
 longiflora Tuss., 330
 Solanum L., 327, 328
 aculeatum O. E. Schulz., 329
 Solanum antillarum O. E. Schulz., 329
 bahamense L., 329
 var. subarmatum Schulz., 329
 cahosianum Urb. et Ekm., 329

- carolinense L., 329
 ciliatum Lam., 329
 crotonoides Lam., 329
 erianthum D. Don, 329
 fugax Jacq., 329
 var. albidiochraceum, 329
 var. flexuosum, 329
 guanicense Urb., 329
 hoplophorum O. E. Schulz., 329
 hotteanum Urb. et Ekm., 329
 jamaicense Mill., 329
 lanceifolium Jacq., 329
 mammosum L., 329
 marmeladense Urb. et Ekm., 329
 melongena L., 329
 microphyllum Dun., 329
 var. ischyranthum Bitter, 329
 miragoana Urb., 329
 nigrum L., 329
 var. americanum O. E. Schulz., 329
 orthacanthum O. E. Schulz., 329
 persicifolium Dun., 329
 var. parvifolium O. E. Schulz., 329
 plumieri Dun., 329
 polygamum Vahl., 329
 Solanum pyrifolium Lam., 329
 rugosum Dun., 329
 schulzianum Urb., 329
 seaforthianum Andr., 329
 var. disjunctum O. E. Schulz., 329
 selleanum Urb. et Ekm., 329
 squarrosus O. E. Schulz., 329
 testaceum O. E. Schulz., 329
 tortipes Urb. et Ekm., 329
 torvum Sw., 329
 var. daturifolium O. E. Schulz., 329
 tuberosum L., 329
 umbellatum Mill., 329
 verbascifolium L., 329
 virgatum Lam., 329
 wendlandii Hook. f., 329
 Solidago L., 381
 canadensis L., 381
 Sonchus L., 397, 398
 asper L., 398
 oleraceus L., 398
 Sopaipo, 209

- Sophoclesia Kltzsch., 277, 278
 domingensis Urb. et Ekm., 278
 Sophora L., 144
 oligosperma Urb. et Ekm., 145
 tomentosa L., 145
 Sophoreae, 144
 Sorghastrum Nash., 13, 15
 parviflorum Hitchc. et Chase, 15
 Sorghum Pers., 13, 14
 halepense Pers., 14
 vulgare Pers., 15
 Sorrosie, 372
 Spananthe Jacq., 273, 276
 paniculata Jacq., 276
 Spanish bayonet, 53
 Sparganophorus Crantz., 377
 vaillantii Crantz., 377
 Spartina Schreb., 26, 27
 palens Muchlenb., 27
 var. juncea Hitchc., 27
 Spathodea Beauv., 337, 338
 campanulata Beauv., 338
 Specularia Heist., 374
 perfoliata A. DC., 374
 Spermacoce L., 354, 368
 glabra Michx., 368
 tenuior L., 368
 Spermatophyta, 1, 2, 3
 Sphacele Benth., 321, 324
 urbani Briq., 324
 Sphaeralcea St-Hil., 216, 218
 abutiloides G. Don, 218
 Sphenopholis Scribn., 25, 26
 obtusata Scribn., 26
 Spigelia L., 290
 anthelmia L., 290
 Spilanthes L., 385, 390
 iodicæ Moore, 390
 uliginosa Sw., 390
 urens Jacq., 390
 Spiranthes L. C. Rich., 62, 66
 elata L. C. Rich., 66
 fawcettii Cogn., 66
 monophylla Cogn., 66
 Spiranthes quinquelobata Urb., 66
 stablii Cogn., 66
 Spirodela Schleid., 45
 polyrrhiza Schleid., 45
 Spondias L., 196, 197
 brunea Urb., 197
 cytherea Sonn., 197
 dulcis Forst. f., 197
 mombin L., 197

- purpurea L., 197
 robe Urb., 197
 Sporobolus R. Br., 24, 25
 argutus Kunth., 25
 berterianus H. et C., 25
 cubensis Hitchc., 25
 domingensis Kunth., 25
 indicus R. Br., 25
 litoralis Kunth., 25
 virginicus Kunth., 25
 Stachys L., 321, 323
 arvensis L., 323
 Stachytarpheta Vahl., 314, 317
 Stachytarpheta adulterina Urb. et Ekm., 317
 cayennensis Vahl., 317
 jamaicensis Vahl., 317
 mutabilis Vahl., 317
 strigosa Vahl., 317
 Staphyleaceae, 195, 202
 Stegnosperma Benth., 109, 110
 halimifolium Benth., 110
 Stelis Sw., 64, 68
 chabreana Mansf., 69
 desportesii Urb., 68
 domingensis Cogn., 68
 jensenii Urb., 69
 ophioglossoides Sw., 69
 repens Cogn., 69
 tippenhaueri Urb., 68
 Stemmadenia Benth., 294, 296
 bella Miers, 296
 Stenandrium L., 332, 334
 durantifolia Sw., 334
 maritima L., 334
 parviflora Ait., 334
 Stenandrium Nees., 345, 348
 acuminatum Urb., 348
 scabrosum Nees., 348
 tuberosum Urb., 348
 undulatum Urb. et Ekm., 348
 Stenophyllus alpestris Britt., 34
 capillaris Britt., 34
 junciformis Britt., 34
 tuerckheimii Britt., 34
 Stenorrhynchus Lindl., 62, 66
 aphyllus Lindl., 66
 lanceolatus Griseb., 66
 orchioides Lindl., 66
 speciosus Lindl., 66
 Stenotaphrum Trin., 16, 23
 secundatum O. Ktze., 23
 Sterculia L., 224, 226
 apetala Karst., 226
 Sterculiaceae, 213, 223
 Stellaria L., 113
 antillana Urb., 113
 var. domingensis Urb., 113
 Stevensia Poit., 352, 357
 buxifolia Poit., 357
 laurifolia Urb., 357
 ovatifolia Urb. et Ekm., 357
 samanensis Urb., 357
 Stictocardia Hall. f., 305, 309
 tiliifolia Hall. f., 305, 309
 Stigmatophyllum, v. stigmaphyllon A. Juss., 173, 174
 angulosum A. Juss., 174
 f. III laciniatum Ekm., 174
 diversifolium A. Juss., 174
 haïtienense Urb. et Nd., 174
 var. linearis Urb. et Nd., 174
 var. ovata Urb. et Nd., 174
 lingulatum Small, 174
 var. sericans Nd., 174
 ovatum Nd., 174
 palmatum A. Juss., 174
 periplocifolium Juss., 174
 f. intermedium Nd., 174
 puberum A. Juss., 174
 sagittatum A. Juss., 174
 Stinking toe, 140
 St-Jean d'hiver, 194
 Stragornia, 251
 Stragornia blanc, 251
 Strophantus P. DC., 295, 298
 gratus H. Baill., 298
 Strychnos L., 290, 291
 grayi Griseb., 291
 Strumpfia Jacq., 353, 364
 maritima Jacq., 364
 Stylosanthes Sw., 148, 150
 hamata Taub., 150
 viscosa Sw., 150
 Styracaceae, 283, 288
 Styra L., 288
 obtusifolius Griseb., 288
 ochraceus Urb., 288
 Suada Forsk., 101, 102
 insularis Britt., 102
 fruticosa Forsk., 102
 Sucrier, 135
 Sucrin, 135
 Suela-consuela, 50
 Sureau, 81
 Sureau plantain, 81

- Suriana L., 167, 168
 maritima L., 168
 Sweed wood, 120, 122
 Swietenia Jacq., 171
 mahogani Jacq., 171
 Symphytum L., 311, 314
 officinale L., 314
 Symplocaceae, 283, 287
 Symplocos Jacq., 287
 berterii Miers, 287
 domingensis Urb., 287
 hotteana Urb. et Ekm., 287
 hyboneura Urb., 287
 pilifera Urb., 287
 Synedrella Gaertn., 386, 391
 nodiflora Gaertn., 391
 Syngonium Schott., 43, 45
 auritum Schott., 45
 Syzygium Gaertn., 256, 260
 jambolanum P. DC., 260
 Tabac, 331
 Tabac marron, 383
 Tabacon, 329
 Tabebuia Gomes, 337, 339
 acrophylla Britton, 339
 apiculata Urb. et Ekm., 339
 berterii Britton, 339
 brigandina Urb. et Ekm., 339
 buchii Britton, 339
 conferta Urb., 339
 densifolia Urb., 339
 Tabebuia dolichopoda Urb. et Ekm., 339
 domingensis Britt., 339
 ekmanii Urb., 339
 erosa Urb. et Ekm., 339
 gonavensis Urb., 339
 grisebachii Urb., 339
 hotteana Urb. et Ekm., 339
 lindahlia Urb., 339
 microphylla Urb., 339
 multinervis Urb. et Ekm., 339
 obovata Urb., 339
 ostenfeldii Urb., 339
 pentaphylla Hemsl., 339
 polyantha Urb. et Ekm., 339
 revoluta Britt., 339
 samanensis Urb., 339
 Tabernamontana L., 294, 296
 citrifolia L., 296
 coronaria Willd., 296
 Tabernau, 136
 Tæniomena Schlecht., 300, 301
 occidentale Schlecht., 301

- Tafetan, 365
 Tagetes L., 393
 patula L., 393
 Talinum Adans., 112
 domingense Urb. et Ekm., 112
 panniculatum Gaertn., 112
 triangulare Willd., 112
 Tamaricaceae, 227, 233
 Tamarin, 140
 Tamarin marron, 143
 Tamarind, 140
 Tamarindo, 140
 Tamarindus L., 139, 140
 indica L., 140
 Tamarix L., 233
 anglica Webb., 233
 gallica L., 233
 Tamonea Aubl., 314, 316
 subbiflora Urb. et Ekm., 316
 Tapura Aubl., 177
 haïtienense Urb. et Ekm., 177
 Taquito, 137
 Tarana, 289
 Taraxacum Hall., 397, 398
 officinale Weber, 398
 vulgare Schrank, 398
 Tassel amaranth, 103
 Tavernon, 136
 Taxaceae, 3
 Tayo, 45
 Tayo bambou, 44
 Tayo marron, 45
 Tcha-tcha, 136
 Tecoma Juss., 337, 340
 stans Juss., 340
 Tendre à caillou, 137
 Té, 335
 Té chino, 317
 Té de Santa Maria, 335
 Té marino, 389
 Tephrosia Pers., 146, 147
 cathartica Urb., 147
 cinerea Pers., 147
 var. litoralis Benth., 147
 domingensis Pers., 147
 purpurea Pers., 147
 sessiliflora Urb., 147
 toxicaria Pers., 147
 Teramnus Sw., 154, 155
 labialis Spreng., 155
 uncinatus Sw., 155
 Terminalia L., 254
 catappa L., 254
 domingensis Urb., 254
 intermedia Urb., 254
 Ternstroemia L. f., 229
 barkerii Ekm., 230
 gracilifolia O. C. Schmidt., 230

- microcalyx Krug. et Urb., 230
 nashii Urb., 230
 obovalis A. Rich., 230
 selleana Ekm. et Schmidt., 230
 Ternstroemiaceae, 227, 229
 Tête jeune fille, 329
 Tetragamestus Rchb. f., 64, 70
 modestus Rchb. f., 70
 Tetragastris Gaertn., 170
 balsamifera O. Ktze., 170
 Tetramicra Lindl., 63, 71
 bulbosa Mansf., 71
 canaliculata Urb., 71
 ekmanii Mansf., 71
 parviflora Lindl., 71
 pratensis Rolfe, 71
 schœnina Rolfe, 71
 schomburgkii Rolfe, 71
 Tetranthus Sw., 384, 387
 cupulatus Urb., 387
 hirsutus Spreng., 387
 litoralis Sw., 387
 Tetrapteris Cav., 173, 174
 aequalis Ch. Wr., 174
 buxifolia Cav., 174
 citrifolia Pers., 174
 haïtienense Urb. et Nd., 174
 Tetrazygia L. C. Rich., 262, 264
 bicolor Cogn., 265
 crotonifolia P. DC., 264
 elaeagnoides P. DC., 264
 fuertesii Cogn., 264
 humilis Urb. et Ekm., 265
 longicollis Urb. et Cogn., 264
 macrocarpa Urb. et Ekm., 265
 pallens Cogn., 264
 Teucrium L., 320, 321
 cubense Jacq., 322
 inflatum Sw., 322
 picardæ Krug. et Urb., 322
 Thalamifloræ, 77, 78
 Thalassia Sol., 9
 testudinum Sol., 9
 Thalia L., 60
 geniculata L., 60
 Thalictrum L., 116
 domingense Urb., 116
 Thalophyta, 1
 Thé métile, 387
 Thé pays, 335
 Thé suisse, 335
 Themedra Forsk., 12, 15
 quadrivalvis O. Ktze., 15
 Theobroma L., 224, 225
 cacao L., 225
 Theophrasta L., 279
 americana L., 279
 jussiae Lindl., 279
 Theophrastaceae, 279
 Thespesia Soland., 216, 221
 populnea Soland., 221
 Thevetia L., 294, 297
 neriifolia Juss., 297
 Thibaudia H. B. K., 277, 278
 domingensis Urb., 278
 Thouinia Poit., 203, 204
 deflexa Radlk., 205
 domingensis Urb. et Radlk., 205
 inaequalis Radlk., 205
 milleri Leonard, 205
 multinervis Radlk., 205
 racemosa Radlk., 205
 revoluta Radlk., 205
 rigidissima Radlk. et Ekm., 205
 Thouinia scoparia Radlk., 205
 simplicifolia Poit., 205
 spicata Radlk. et Ekm., 205
 tomentosa P. DC., 205
 trifoliata Poit., 205
 Thouinidium Radlk., 203, 205
 pinnatum Radlk., 205
 pulverulentum Radlk., 205
 Thrinax L. f., 36, 38
 longistyla Becc., 38
 ekmanii Burret, 38
 wendlandiana Becc., 38
 Thuja L., 4, 5
 orientalis L., 5
 Thunbergia L. f., 344, 346
 alata Bojer, 346
 fragrans Roxb., 346
 grandiflora Roxb., 346
 Thym, 325, 326
 Thymelaeaceae, 248
 Thymus L., 321, 326
 vulgaris L., 326
 Ti baume, 325
 Ti baume marron, 378
 Ti baume, 176
 Ti caïmite, 286
 Ti caleçon, 140
 Ti coco, 279
 Ti cocro, 42
 Ti gaïac, 136
 Ti janvier, 143
 Ti lalo, 219
 Ti lalou, 215
 Ti liane ibo, 297
 Ti mil chandelle, 23
 Ti mil franc, 15
 Ti pois marron, 145
 Ti zanite, 141

Tibouchina Aubl., 262, 263
 longifolia Baill., 263
 Tiliaceae 213, 214
 Tillandsia L., 47, 48
 aloifolia W. Hook., 48
 balbisiana Schult., 48
 bromoides Mez., 48
 buchii Urb., 48
 circinnata Schlecht., 48
 compacta Griseb., 49
 domingensis Mez., 49
 fasciculata Sw., 48
 fendleri Mez., 49
 festuoides Brongn., 48
 hotteana Urb., 49
 juncea Poir., 48
 panniculata Cham. et Schlecht., 49
 polystachya L., 48
 pruinosa Sw., 49
 pulchella W. Hook., 49
 recurvata L., 49
 selleana Harms., 49
 setacea Sw., 48
 sublaxa J. G. Bak., 48
 tenuifolia L., 49
 tuerckheimii Mez., 49
 Tillandsia usneoides L., 48
 utriculata L., 48
 valenzuelana A. Rich., 48
 vestita Cham. et Schlecht., 49
 Tinaja, 49
 Tinantia Scheitw., 49, 50
 erecta Schlecht., 50
 Tithonia Desf., 385, 389
 diversifolia A. Gray, 389
 rotundifolia Blake, 389
 tagetiflora Desf., 389
 Todo el ano, 296
 Tomate, 330
 Tope-tope, 328
 Topi, 60
 Topillo, 163
 Topinambour, 60
 Topinambour blanc, 55
 Toque molle, 239
 Torchon, 372
 Torilis Adans, 273, 275
 anthriscus Benth., 275
 Torralbasia Urb., 199
 domingensis Urb., 199
 Torteza, 156
 Tortuella Urb., 354, 367
 abietifolia Urb. et Ekm., 367
 Torulinum Desv., 32
 eggersii Clarke, 32
 Tournefortia L., 310, 312
 bicolor Sw., 313
 Tournefortia conocarpa Urb., 313
 ferruginea Lam., 313

gibberosa Urb., 313
 glabra L., 313
 gnaphalodes R. Br., 313
 hirsutissima L., 313
 laurifolia Vent., 313
 minuta Bertero, 313
 oblongata Urb. et Ekm., 313
 peruviana Poir., 313
 petionvillæ Urb. et Ekm., 313
 picardæ Urb., 313
 scabra Lam., 313
 var. ovalifolia Griseb., 313
 selleana Urb. et Ekm., 313
 setifera Urb. et Ekm., 313
 stenophylla Urb., 313
 suffruticosa L., 313
 volubilis L., 313
 Tous-moux, 59
 Tradescantia L., 49, 50
 geniculata Jacq., 50
 Tragia L., 179, 188
 biflora Urb. et Ekm., 188
 volubilis L., 188
 Tragopogon L., 397, 398
 scorzonifolius L., 398
 Tragus Hall., 15
 alienus Schult., 15
 Traveler's palm, 58
 Trema Lour., 87
 domingense Urb., 87
 lamarkianum Bl., 88
 micranthum Bl., 87
 molle Bl., 87
 Tres palabras, 205
 Trianthema L., 110, 111
 portulacastrum L., 111
 Tribulus L., 163, 164
 cistoides L., 164
 Trichacne Nees., 16, 18
 insularis Nees., 19
 Trichilia L., 171, 172
 cuneifolia Urb., 172
 dictyoneura Urb., 172
 glabra L., 172
 hirta L., 172
 Trichilia monacantha Urb., 172
 pallida Sw., 172
 stenophylla Urb. et Ekm., 172
 truncata Leonard, 172
 Tricholaena Schrad., 17, 22
 rosea Nees., 22
 Trichopilia Lindl., 64, 74
 fragrans Rchb. f., 74
 Trichostigma A. Rich., 108, 109
 octandrum H. Walt., 109

Tridax L., 386, 392
 procumbens L., 393
 Trifoliceae, 144, 145
 Trifolium L., 145
 arvense L., 145
 minus Sm., 145
 repens L., 145
 Triopteris L., 173
 aequalis Ch. Wr., 174
 buchii Urb. et Ndz., 174
 var. mascagnioïdes Urb. et Ndz., 174
 Triopteris jacquemontii Urb. et Ndz., 174
 ovata Cav., 174
 var. domingensis Ndz., 174
 rigida Sw., 174
 Triphasia Lour., 165, 167
 trifolia P. Wils., 167
 Tripogon R. et S., 26, 28
 spicatus Ekm., 28
 Tripsacum L., 11, 12
 dactyloides L., 12
 laxum Nash., 12
 Trisetum Pers., 25, 26
 spicatum Richt., 26
 Tristegineae, 11, 16
 Triumphetta L., 214, 215
 hispida L. C. Rich., 215
 lappula L., 215
 rhomboïdea Jacq., 215
 semitriloba Jacq., 215
 Trixis Gmel., 396, 397
 antimenorrhoea Mart., 397
 Trixis divaricata Spreng., 397
 radialis Lag., 397
 Trois côtes, 265
 Trois feuilles, 205
 Trois paroles, 205
 Trois pieds, 311
 Tropaeolaceae, 160, 162
 Tropaeolum L., 162
 majus L., 162
 Tropis L., 88
 racemosa Urb., 89
 Tropidia Lindl., 63, 68
 polystachya Ames, 68
 Tubéreuse, 55
 Tuerckheimocharis Urb., 332, 334
 domingensis Urb., 334
 Tulipe, 54
 Turkey blossom, 164
 Turnera L., 238, 239
 diffusa Willd., 239
 pumilea L., 239
 ulmifolia L., 239
 var. angustifolia Willd., 239
 var. intermedia Urb., 239

Turneraceae, 228, 238
 Turpinia Vent., 202
 panniculata Vent., 203
 picardæ Urb., 203
 Typha L., 7
 domingensis Kunth., 7
 Typhaceae, 6
 Ulmaceae, 87
 Umbellales, 78, 271
 Umbelliferae, 271, 272
 Uncinia Pers., 32, 36
 hamata Urb., 36
 Uniola L., 28, 29
 virgata Griseb., 29
 Urugoga L., 354, 365
 domingensis Urb., 365
 var. barahonensis Urb., 365
 var. fuertesii Urb., 365
 Urechites Mull-Arg., 294, 298
 dolichantha Urb., 298
 lutea Britt., 298
 var. angustifolia Ekm. et Helwig., 298
 Urena L., 216, 220
 lobata L., 220
 sinuata L., 220
 Urera Gaudich., 91
 baccifera Gaudich., 91
 domingensis Urb., 91
 Urticaceae, 87, 90
 Urticales, 76, 86
 Utricularia L., 344
 foliosa L., 344
 obtusa Sw., 344
 pusilla Vahl., 344
 Uva, 100
 Uvero, 99
 Uvilla, 99, 100
 Vaccinium L., 277, 278
 cubense Griseb., 278
 Vaillant garçon, 169
 Valeriana L., 370
 candolleana Gardn., 370
 domingensis Urb., 370
 scandens Læfl., 370
 Valerianaceae, 351, 369
 Vallahonda, 138
 Vallesia R. et P., 294, 296
 montana Urb., 296
 Vallisneria L., 9
 spiralis L., 9
 Vanilla Juss., 63, 65
 claviculata Sw., 66
 eggersii Rolfe, 66
 inodora Schiede, 65
 planifolia Andr., 66
 poitaei Rchb. f., 66
 wrightii Rchb. f., 65
 Vanille, 66
 Vegaea Urb., 280, 281
 pungens Urb., 281

Velo de novia, 306
 Vendôme, 317
 Vera, 163
 Verbascum L., 332, 333
 thapsus L., 333
 Verbena L., 314, 315, 317
 domingensis Urb., 315
 scabra Vahl., 315
 Verbenaceae, 304, 314
 Verbesina L., 385, 390
 alata L., 391
 Verbesina domingensis Urb., 391
 tetraptera Urb. et Ekm., 391
 Verhuellia Miq., 80, 82
 reniformis C. DC., 82
 Vermicelle, 305
 Vernonia Schreb., 377, 378
 albicaulis Pers., 378
 barkerii Urb. et Ekm., 378
 buchii Urb., 378
 buxifolia Less., 378
 cinerea Less., 378
 ekmanii Urb., 378
 fruticosa Sw., 378
 sapium Ekm., 378
 sericea L. C. Rich., 378
 subsp. racemosa Ekm., 378
 sprengeliana Schultz-Bip., 378
 stenophylla Less., 378
 tuerckheimii Urb., 378
 Vernoniae, 376, 377
 Veronica L., 333, 336
 agrestis L., 336
 arvensis L., 336
 Verveine, 317
 Verveine violette, 317
 Vétiver, 14
 Vibona, 271
 Vicia L., 153
 angustifolia L., 153
 hirsuta S. F. Gray, 153
 sativa L., 153
 Vicieae, 144, 153
 Vigna Savi, 154, 159
 repens O. Ktze, 160
 sinensis Endl., 160
 vexillata A. Rich., 160
 Vigne vierge, 112
 Vilmorinia C. DC., 146, 147
 glycyphylla Urb., 147
 longiflora DC., 147
 multiflora DC., 147
 plumierii Urb., 147
 Vinagrillo, 162
 Vine guingo pea, 156
 Viola L., 235
 domingensis Urb., 235
 odorata L., 235

Violaceae, 227, 234
 Violaes, 78, 227
 Violette, 235
 Violon, 30
 Vitaceae, 208, 211
 Vitex L., 314, 319
 divaricata Sw., 319
 var. haitiensis Urb., 319
 domingensis Urb. et Ekm., 319
 heptaphylla A. Juss., 319
 umbrosa Sw., 319
 Vitis L., 211, 212
 tilifolia H. et B., 212
 vinifera L., 212
 Vivora, 44
 Wallenia Sw., 280, 281
 apiculata Urb., 281
 aquifolia Urb. et Ekm., 281
 ekmanii Urb., 281
 illicifolia Urb. et Ekm., 281
 laurifolia Sw., 281
 var. raunkiaeri Urb., 281
 urbaniana Mez., 281
 Waltheria L., 224
 americana L., 225
 var. elliptica C. Schum., 225
 Wandering Jew, 50
 Warszewiczella Rchb. f., 64, 74
 flabelliformis Cogn., 75
 Washingtonia H. Wendl., 36, 38
 filifera H. Wendl., 39
 Water bean, 115
 Wedelia Jacq., 385, 389
 ehrenbergii Schlecht., 389
 var. mayerhoffii O. E. Schulz., 389
 gracilis L. C. Rich., 389
 jacquinii L. C. Rich., 389
 longipes Urb., 389
 reticulata P. DC., 389
 serrata L. C. Rich., 389
 trilobata Hitchc., 389
 var. hirtella O. E. Schulz., 389
 Weinmannia L., 130
 pinnata L., 130
 West indian locust tree, 140
 West indian sumach, 130
 White clover, 145
 White wood, 121
 Wigandia H. B. K., 309, 310
 urens Urb., 310
 Wild brazilleto, 130

- Wild cassada, 132
 Wild coffee, 141
 Wild hops, 159
 Wild liquorice, 153
 Wild strawberry, 131
 Wissadula Medik., 216,
 217
 amplissima R. E. Fries,
 217
 contracta R. E. Fries,
 217
 hernandioides Garcke,
 217
 periplocifolia Presl., 217
 stellata C. Schum., 217
 Wulffia Neck., 385, 389
 havanensis P. DC., 389
 Wunschmannia Urb., 337
 staminea Urb., 338
 Xanthium L., 384, 388
 echinatum Murray, 388
 Xanthosoma Schott., 43,
 44
 atroviride Koch et Bou-
 ché, 45
 belophyllum Kunth, 45
 hastifolium C. Koch, 45
 jacquinii Schott, 44
 plumieri Schott, 44
 sagittifolium Schott, 45
 violaceum Schott, 45
 Ximenia L., 94
 americana L., 94
 horrida Urb. et Ekm.,
 94
 Xylobium Lindl., 63, 73
 palmifolium Benth., 73
 Xylosma G. Forst., 236
 buxifolium A. Gray, 236
 coriaceum Eichl., 236
 glaucescens Urb., 236
 lineolatum Urb. et Ekm.,
 236
 schæfferioides A. Cray.,
 236
 Xyridaceæ, 46
 Xyridales, 6, 46
 Xyris L., 46
 jupicai L. C. Rich., 46
 Yagrumo macho, 123
 Yarey, 39
 Yaya, 118, 355
 Yaya boba, 118
 Yam, 56
 Yam chatte, 56
 Yam Guinée, 56
 Yam Martinique, 56
 Yam seguiné, 56
 Yellow mombin, 197
 Yerba buena, 325
 Yerba buena cimarrona,
 323
 Yesquin, 372
 Yeux bourrique, 156
 Yeux mouton, 319
 Ylang-Ylang, 117
 Yuca, 191
 Yuca cimarrona, 190
 Yucca L., 52, 53
 aloëfolia L., 53
 Zabocat, 121
 Z'aiguille, 392
 Zamia L., 3
 integrifolia Ait., 3
 media Jacq., 3
 Zamorette, 329
 Zamorette mâle, 329
 Zamorette marron, 329
 Zanmande, 254
 Zarza rosa, 131
 Zea L., 11
 mays L., 12
 var. indurata Bailey,
 12
 Zebrina Schnizl., 49, 50
 pendula Schnizl., 50
 Zéchalotte, 52
 Zephyranthes Herb., 53, 54
 bifolia M. J. Rœm., 54
 eggersiana Urb., 54
 tubispatha Herb., 54
 Zépina, 103
 Zépina piquant, 103
 Zeugites Schreb., 29
 americana Willd., 29
 haïtiens Urb., 29
 Z'herbe (voir herbe)
 Zibline, 162
 Zicaque, 132
 Zingiber Adans, 59
 cassumunar Roxb., 59
 officinale Roscæ, 59
 Zingiberaceæ, 57, 58
 Zinnia L., 384, 388
 multiflora L., 388
 Zizyphus Juss., 208, 209
 jujuba Lam., 209
 rhodozyllon Urb., 209
 Zombi nan bois, 239
 Zongnon, 52
 Zorain, 338
 Zoreille bourrique, 52
 Zornia Gmel., 148, 150
 diphylla Pers., 150
 Z'os douvant, 259
 Zoysiæ, 11, 15
 Zuelania A. Rich., 236,
 238
 guidonia Britt. et Wils.,
 238
 Zygothylaceæ, 160, 163
 Z'yeux mouton, 319

