
a Anchoring predicts replication in non-European ancestries
OR (95% CI)
Pooled, five ancestries
1.52 (1.34–1.72)
By ancestry
African
1.61 (1.42–1.83)
Central/South Asian
1.46 (1.29–1.66)
East Asian
1.45 (1.24–1.68)
Middle Eastern
1.24 (1.08–1.43)
Admixed American
1.23 (1.01–1.49)
Wrong-gene eQTL (control)
1.00 (0.89–1.14)
Anchoring, sensitivity analyses
Within PAV− CS
1.58 (1.39–1.80)
Within PAV+ CS
0.79 (0.53–1.20)
|ΔMAF| ≤ 0.1
1.35 (1.08–1.69)
European lead variant only
1.51 (1.33–1.71)
Lead CS per gene
1.10 (0.79–1.52)
PAV itself (same model)
2.16 (1.78–2.63)
0.5
1
2
3
Odds ratio for replication (95% CI)
b PAV-only CS replicate as often as anchored CS
8,065 evaluable CS
Replicated in non-European ancestries (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
45.8
73.7
70.4
76.8
Neither
PAV only
Anchor only
Anchor + PAV
c The full model adds little beyond concordance + signal strength
Full minus conc. + signal (P)
MSPA (n=70)
+0.062 (0.20)
Seer (n=139)
-0.006 (0.59)
Generation Scotland (n=142)
-0.011 (0.76)
HOLBAEK (n=155)
+0.007 (0.32)
Non-European replication (n=3,493)
+0.012 (3.1×10−4)
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Held-out AUC
full model
concordance + signal strength
concordance only
d Support does not follow tier order
Supported or replicated (%)
0
25
50
75
100
P = 0.17
P = 0.39
P = 0.25
P = 0.42
P = 1.1×10−55
MSPA
Seer
Gen. Scotland
HOLBAEK
Non-Eur. repl.
Tier 1
Tier 2
Tier 3
Tier 4