

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	高警訊藥品使用及管理作業標準 High-Alert Drug Use Notes				
編號	A31000-Q02-W-B15	制定者	NI 謝慧君	公布日期	94 年 02 月 28 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 5.4 版/29 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解高警訊藥品使用及管理作業標準。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

依據藥劑科_住院調劑組_A34030-000-P-002_高警訊藥品管理辦法

（一）凡經由不當使用或不當管理，而可能對病人造成嚴重傷害的藥物稱之為高警訊藥品。

本院需每位醫療人員保持高度警覺之高警訊藥品 High-Alert Medications 共計有 230 個品項。

- 1.高警訊一級藥品共 10 項（附件一）。
- 2.高警訊二級藥品共 95 項（附件二）。
- 3.管制藥 1-4 級共 26 項（附件三）。
- 4.化療藥品共 99 項（附件四）。
- 5.毒劇類中藥共 0 項。

（二）高警訊藥品之管理

- 1.藥品儲存處須有藥物名稱、劑量標示及警告標誌，擺放整齊且位置固定。
- 2.「高警訊藥品」字樣用「黃底紅字」加上「骷髏頭」標示，藥物標籤應為黃底紅字，藥名需有※符號，骷髏頭位置需在標籤左側，如圖示：



主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	2/29

- 3.於醫師開立處方、藥袋及處方上高警訊藥品前加註※特殊標記，系統及藥袋上於藥名部分以紅字顯示加強辨識，醫護人員使用前請提高警覺。
- 4.高警訊藥品資訊放置於藥劑科網頁供院內同仁查詢及參考。
- 5.單位內高警訊藥品每天需有三班人員交班並清點數量，如下表：

分級	代碼	品項名
管 1	MORP	※（管 1）（針）Morphine 10mg/ml/amp inj
	MORP3	※(管 1)(長效)Morphine SR 30mg/tab
	MORPT1	※（管 1）（口）Morphine 15mg/tab
	MORPS	※（管 1）（液）Morphine Sulfate Oral Sol'n 2mg/ml,60ml/bot
管 2	CODET1	※（管 2）（大）Codeine 30mg/tab
	DEMEI	※（管 2）Demerol 50mg/amp inj
	DURO1	※（管 2）（小）Durogesic 12mcg/hr patch
	DURO2	※（管 2）（中）Fentanyl HPQ(Durogesic)25µg/hr Transdermal
	DURO5	※（管 2）（褐 50）Fentanyl Transdermal Patch 50 µg/hr
	FENT	※（管 2）（10ml,限高劑量）FENTANYL 500mcg/10ml/amp inj
	FENT2	※（管 2）（小）（限麻醉科）Fentanyl-Fresenius 100mcg/2cc inj
	METHA	※(管 2)Methadone (美沙酮計畫) Oral Conc.10mg/ml(限住院開立)
	OXYC	※(管 2)(長效)OxyContin CR 10 mg/tab
	OXYN	※(管 2)OxyNorm IR 5mg/cap (56 cap/box)
	PAIN	※(管 2)PAINKYL fentanyl (buccal soluble films) 200mcg
	RAPIF	※(管 2)(限麻醉科)Alfentanil inj 1mg/2ml/amp
管 3	KETA5	※（管 3）Ketalar 50mg/ml inj
警 1	KCL	※（警 1）KCL 20mEq 10ml inj
	KHPO	※（警 1）Potassium phosphate(K 88meq,PO4 60mM)20ml/amp

- 6.單位常備藥之高警訊藥品，每雙月最後一週會由該樓層藥師稽核高警訊藥品，高警訊藥品有效期限應大於六個月，有效期限稽核時，效期小於 6 個月的藥品由樓層藥師更換新品，並於稽核表中紀錄，稽核後需由藥師及單位護理長或負責人完成雙方簽章。
- 7.下表所列之高警訊藥品於交換藥車及點收退藥時藥師需與護理人員雙重核對後簽收，病房單位領回後，若未立即使用，先放置管制藥抽屜（冷藏藥請放冰箱），

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	3/29

並註明病人基本資料，每班交班時應確實交接對點及記錄於高警訊藥品點交紀錄表（表單二）。但加護單位領回，若未立即使用，每班交班時應確實交接對點及記錄於高警訊藥品點交紀錄表，如有轉床請原單位將高警訊藥品點交紀錄表及患者離開單位藥品移交總表帶至轉入單位並進行雙人簽核後，留存於原單位，轉入單位請重新書寫並雙人簽核（表單二）。

分級	藥品	
管制	管 1~3 級	
	DORM3	※（管 4）Midatin (Midazolam) 5mg/1ml/amp
警 1	KCL	※（警 1）KCL 20mEq 10ml inj
警 2	ESME	※（警 2）Esmeron 50mg/5ml/vial(需冷藏)
	GENS	※（警 2）Genso injection 25mg/2.5ml/amp（需冷藏）
	NIMB	※（警 2）Cisatracurium-hameln(冷藏)10mg/5ml/amp(限 ICU 使用)
	RELA	※（警 2）Relaxin 500mg/vial inj
	ROCU	※（警 2）Rocuronium 10mg/ml*10ml/vial（需冷藏）
	ROCU2	※(警 2)Rocuronium 50mg/5ml/vial(需冷藏)

（三）高警訊藥物品之執行

1.依據藥劑科制定之 A34030-000-P-002_高警訊藥品管理辦法，高警訊一級藥物瓶

身無警示標示之藥品需以紅色圓點標示 （如附件五）。若藥品瓶身附有警示

標示(    )，則不須再以紅色圓點標示 。高警訊

一級藥品，HIS 系統藥品圖片加註「黃底紅色警字」，加強醫護人員核對提示，

如圖示 。

2.醫師開立高警訊藥品後，護理人員至 HIS 住院護理系統／查詢患者／點選床號病人／核對醫囑（高警訊藥品前方出現※）／核對狀態點選正確或其他選項。高警訊藥品中之高警訊一級藥物、管制藥一~二級針劑：Morphine 10mg/ml/amp、Demerol 50mg/amp inj、Fentanyl-Fresenius 100mcg/2cc inj、管四 Midazolam 5mg/1ml/amp 針劑及化療藥物（含口服及注射劑）（如附件四），系統畫面以「骷

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	4/29

顧頭」提示醫護人員需雙重核對，給藥時須由兩位護理人員攜藥至病人單位，辨識病人正確後給予藥物，並至 HIS 住院護理系統／查詢患者／點選床號病人／核對醫囑／核對狀態已點選正確或其他選項／高警訊藥品執行狀態點選已執行或其他選項，執行狀態點選已執行後須輸入另一位護理人員身分證字號及密碼以完成執行（若有剩餘藥物需再次與原雙重核對護理人員確認餘量後丟棄），標準給藥作業標準請參照護理部_A31000-Q02-W-B11_標準給藥作業標準。病人辨識作業標準請參照護理部_A31000-Q02-W-A09_病人辨識作業標準。

- 3.靜脈注射若有加入高警訊藥品，標示之標籤紙請用紅筆註記，以利提醒。
- 4.未使用完之高警訊一級藥物、管制藥及化療藥物，主護需與原雙重核對護理人員確認品項與餘量，將藥物抽出（化療藥物除外），打入感染可燃廢棄物垃圾桶丟棄，並將空瓶丟棄至 Amp、Vial 回收桶（除 Morphine、Demerol 需回收至藥局）。

（四）高警訊藥品之記錄

- 1.護理紀錄上應呈現病人接受注射之高警訊藥品，靜脈滴注幫浦流速須完整呈現，Insulin (actrapid、novorapid)、Propofol 兩項高警訊藥品依其藥品特性以資訊系統輔助跳出提示視窗之時間進行監測評值外，靜脈給藥為 15 分鐘監測評值，其他途徑給藥皆為 30 分鐘監測評值。Insulin (actrapid、novorapid)在給藥後 2 小時需觀察是否有低血糖症狀（頭暈、冒冷汗、無力、心跳加快、嘴唇發麻）、Propofol 給藥當下及給藥後 5 分鐘監測血壓及呼吸。
- 2.使用高警訊及高危險藥品應注意使用情形，有不良反應應立即通知醫師進行處理。
- 3.針對使用輸液幫浦之高警訊藥品，應每兩小時確認其班內輸液累積量，並於紀錄上呈現，以確保劑量正確。
- 4.依據醫療部_224000-000-P-021_類鴉片止痛劑使用指引，(1)類鴉片止痛藥品係指含嗎啡(morphine)、可待因(codeine)、鴉片(opium)、配西汀(pethidine)、阿華吩坦尼(alfentanil)、吩坦尼(fentanyl)、羥二氫可待因酮(oxycodone)、二氧嗎啡酮(hydromorphone)及丁基原啡因(buprenorphine)等成分之第一級至第三級管制藥品

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	5/29

製劑。(2)類鴉片止痛藥品的監測與紀錄應包含生命徵象及常見副作用，高風險病人應加強監測血氧飽和度與換氣功能。加護單位轉出之病人應至少監測至病人離開加護病房後三天，醫師得依病人病情變化判斷是否延長監測時間，監測頻率建議與病人生命徵象監測頻率相同。(3)使用類鴉片止痛劑之高風險病人係指：A. 頭頸癌手術，且使用類鴉片止痛劑併用一種以上鎮靜劑藥物之病人；B.術前或術後評估為困難插管病人，且使用類鴉片止痛劑併用一種以上鎮靜劑藥物之病人。

(五) 高警訊藥品之注意事項

1.需使用輸液幫浦之高警訊藥品品項如下表，系統設定提示醫護人員，以確保劑量正確。

代碼	品項名	提示內容
5FU1	※（化）Fluoro-uracil Valeant 1000mg/20ml inj	需使用 Pump
ACTII	※（警 2）(r-TPA)Actilyse 50mg/vail inj	IVD 時-需使用 Pump
ACTR1	※（警 2）Actrapid IU100iu/ml*10ml（需冷藏）	濃度 > 0.1unit/ml 或總劑量 > 25unit 需使用 Pump
AGGR	※（警 2）Aggrastat 12.5mg/50ml	需使用 Pump
CORDI	※（綠條）Cordarone 3ml(150mg/amp) SANOFI	需使用 Pump
DOBU	※（警 1）Gendobu 250mg/20ml	需使用 Pump
DOPAB	※（警 2）Gipamine(Dopamine) 600mg/200ml/bag	需使用 Pump
DOPAV	※（警 1）Dopamine 200mg/5ml/amp	需使用 Pump
DORM3	※（管 2）Midatin (Midazolam)5mg/1ml/amp	IVD 時-需使用 Pump
ESME	※（警 2）Esmeron 50mg/5ml/vial（需冷藏）	IVD 時-需使用 Pump
FRES	※（管 4）Propofol (Fresofol)1%,10mg/ml*20ml	需使用 Pump
ANES	※（管 4）Anesvan (Propofol) 10mg/ml*20ml	需使用 Pump
GENS	※（警 2）Genso injection25mg/2.5ml/amp（需冷藏）	IVD 時-需使用 Pump
HEPA1	※（警 1）Heparin (Hepac) 5000iu/ml;5 萬 iu/10ml/vial	需使用 Pump
KCL	※（警 1）K C L 20mEq 10ml inj	需使用 Pump
LEVO	※（警 1）Norepinephrine 4mg/4ml inj WINTHROP	需使用 Pump
MORP	※（管 1）（針）Morphine 10mg/ml/amp inj	IVD 時-需使用 Pump
NIMB	※（警 2）Cisatracurium-hameln(冷藏)10mg/5ml/amp inj	IVD 時-需使用 Pump
NS3	※（警 2）NaCl 3% 500ml inj 永豐	需使用 Pump
PRIMZ	※（警 2）PrimACOR inj 10mg/10ml/vial Sanofi	需使用 Pump

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	6/29

代碼	品項名	提示內容
ROCU	※（警 2）Rocuronium 10mg/ml*10ml/vial（需冷藏）	IVD 時-需使用 Pump
ROCU2	※（警 2）Rocuronium 50mg/5ml/vial（需冷藏）	IVD 時-需使用 Pump
YUTO	※（警 2）（針）Yutopar(Anpo) 50mg/5ml 信東	需使用 Pump

2.下列高警訊藥品給藥後應進行監測與評估，系統設定提示醫護人員。

代碼	品項名	提示內容
ACTR	※（警 2）Actrapid IU100iu/ml*10ml（需冷藏）	皮下注射(SC)在給藥 2 小時後，建議觀察是否有低血糖症狀或監測血糖濃度；靜脈注射(IV)在給藥 1 小時後，建議進行觀察調整。
NOVOR	※（警 2）NovoRapid 300U/3ml（需冷藏）	皮下注射(SC)在給藥 2 小時後，建議觀察是否有低血糖症狀或監測血糖濃度；靜脈注射(IV)在給藥 1 小時後，建議進行觀察調整。
COUM	※（警 2）Cofarin(Coumadin) 5mg/tab	病人初次服用，建議至少 1-4 週間隔監測 PT/INR 值；待穩定後，建議至少每 3 個月監測一次。
DIGOI2	※（警 1）（針）Lanoxin(Digoxin) 0.5mg/2ml/amp inj GSK	病人初次使用後 5-7 天，建議監測血中濃度；待穩定後，建議至少 3-6 個月監測一次。
FRES	※（管 4）Propofol 1%,10mg/ml*20ml	加護單位在給藥前及給藥後 5 分鐘後應監測呼吸、血壓等生命徵象是否穩定，後續應持續定時監測，手術室外的單位使用則依照麻醉相關作業程序進行。
ANES	※（管 4）Anesvan (Propofol) 10mg/ml*20ml	
HEPA1	※（警 1）Heparin(Hepac) 5000iu/ml;5 萬 iu/10ml/vial	建議在給藥 3-6 小時後，監測血中 aPTT 值；若凝血試驗有過度延長或出血現象發生，應考慮停止投予。

3.查詢高警訊藥品相關資訊請至中山醫學大學附設醫院首頁／各科訊息／醫事單位-藥劑科／參照藥劑科高警訊藥品管理辦法（編號：A34030-000-P-002）。

（六）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。


四、使用表單

（一）退藥（退回藥庫）明細表（編號：A34000-000-F-005）。

（二）高警訊藥品點交紀錄表（編號：A31000-Q16-F-B41）。

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	7/29

五、流程圖



主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	8/29

六、參考資料

(略)

七、附件

(一) 高警訊一級藥物共 10 項

代碼	品項名	學名
ISMP：Classes/Categories - 1.adrenergic agonists, IV-C01CA24		
BOSMI	※(警 1)Adrenalin 1mg/1ml/amp	Epinephrine HCL 1mg/1ml/amp
DOBU	※(警 1)Gendobu 250mg/20ml	Dobutamine 250mg/20ml
DOPAV	※(警 1)Dopamine 200mg/5ml/amp	Dopamine HCl 40mg/ml
ISUP	※(警 1)Proterol-L 0.2 mg/1ml inj	Isoproterenol 0.2 mg/1ml inj
LEVO	※(警 1)Norepinephrine 4mg/4ml/amp	Norepinephrine bitartate 1mg/ml
ISMP：Classes/Categories - 5.antithrombotic agents, including		
HEPA1	※(警 1)Heparin (Hepac) 5000iu/ml;5 萬 iu/10ml/vial	Heparin inj 5000iu/ml ;10ml/vial
ISMP：Classes/Categories - 8. dextrose, hypertonic, 20% or greater		
GLUC3	※(警 1) (50%)Vitagen 20ml inj	Glucose 50% 10g/20ml/amp inj
ISMP：Classes/Categories – 11. inotropic medications, IV (e.g., digoxin, milrinone)		
DIGOI2	※(警 1)Lanoxin(Digoxin) 0.5mg/2ml/amp inj GSK	Digoxin 0.5mg/2ml/amp inj
ISMP：Specific - 9.potassium chloride for injection concentrate		
KCL	※(警 1)K C L 20mEq 10ml inj	KCl 1500mg/10mL/amp (K+ 20mEq/10ml/amp)
ISMP：Specific - 10.potassium phosphates injection		
KHPO	※(警 1)Potassium phosphate(K 88meq,PO4 60mM) 20ml/amp	Potassium Phosphate (K ₂ HPO ₄ 244mg, KH ₂ PO ₄ 236mg)/ml (每毫升 P : 3mmol,K:4.4mEq),20ml/amp

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	9/29

(二) 高警訊二級藥物共 95 項

代碼	品項名	學名
ISMP：Classes/Categories - 1.adrenergic agonists, IV		
DOPAB	※(警 2)Gipamine(Dopamine) 600mg/200ml/bag	Dopamine HCl 600mg
YUTO	※(警 2)(針)Anpo(Yutopar) 50mg/5ml/amp 信東	Ritodrine HCl 50mg/5ml/amp
ISMP：Classes/Categories - 2. adrenergic antagonists, IV		
TRAN2	※(警 2)Chenday 25mg/5ml/amp	Labetalol HCl 25mg/5ml
ISMP：Classes/Categories - 3. anesthetic agents, general, inhaled and IV		
無		
ISMP：Classes/Categories - 4. antiarrhythmics, IV		
ADEN1	※(警 2)Adenocor 6mg/2ml/vial	Adenosine 6mg/2ml/vial (3mg/ml)
CORDI	※(警 2)Cordarone 150mg/3ml/amp	Amiodarone HCL 150mg/3ml
XYLOI	※(警 2)Lignocaine 2% 100mg/5ml/amp	Lidocaine 2% 100mg/5ml/amp (20mg/ml)
ISMP：Classes/Categories - 5.antithrombotic agents, including		
ACTII	※(警 2)(r-TPA)Actilyse 50mg/vial	r-TPA=alteplase 50mg/vial inj (含 1 vial 藥品和 1 vial solvent)
AGGR	※(警 2)Aggrastat 12.5mg/50ml/bot	Tirofiban hydrochloride 12.5mg/50ml/bot
ARIX	※(警 2)Arixtra 2.5mg/0.5ml/vial	Fondaparinux sodium 2.5mg/0.5ml
CLEX	※(警 2)Clexane 6000anti-Xa IU/0.6ml/vial	Enoxaparin 60mg/vial (100IU/mg)
COUM	※(警 2)(抗凝血)Cofarin 5mg/tab	Warfarin Sodium 5mg/tab
ELIQ	※(警 2)(大)Eliquis F.C. 5mg/tab	Apixaban 5mg/tab
ELIQ1	※(警 2)(小,黃)Eliquis F.C. 2.5mg/tab	Apixaban 2.5mg/tab
INNO	※(警 2)Innohep 2 萬 anti-XaIU/2ml/vial	Tinzaparin Na.20000anti-XaIU/2ml/ vial
LIXI	※(警 2)(大)Lixiana F.C. 60mg/tab	Edoxaban Tosilate 60mg
LIXI3	※(警 2)(小)Lixiana F.C. 30mg/tab	Edoxaban Tosilate 30mg
PRAD1	※(警 2)Pradaxa 110mg/cap	Dabigatran etexilate 110mg
UROK0	※(警 2)(綠)Urokinase 6 萬 U/vial inj(需冷藏)	Urokinase 6 萬 U/vial inj
XARE	※(警 2)(中 10)Xarelto F.C. 10mg/tab	Rivaroxaban 10mg/tab
XARE15	※(警 2)(大 15)XARELTO F.C. 15mg/tab	Rivaroxaban 15mg/tab
XARE2	※(警 2)(小 2.5)Xarelto F.C. 2.5mg/tab	Rivaroxaban 2.5mg/tab

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	10/29

代碼	品項名	學名
ISMP：Classes/Categories - 6. cardioplegic solutions		
PLEG	※(警 2)Plegisol 1000ml	每公升含(Ca 2+)2.4mEq， (Mg2+)32mEq， (K+)16mEq， (Na+)110mEq， (Cl-)160mEq。滲透壓 304mOsm/L， pH3.8(3.5-3.9)
ISMP：Classes/Categories - 7. chemotherapeutic agents, parenteral and oral		
附件（四）化療藥		
ISMP：Classes/Categories - 8. dextrose, hypertonic, 20% or greater		
DEXT4	※(警 2)Dextran-40 inj OZUKA(Dextran40 50g/Dextrose 25g)	Dextran 40:50g / Dextrose:25g 500ml/bot
VITA	※(警 2)Vitacal (5.44 mEq Ca2+) 20ml/amp inj.	Calcium chloride 2%(5.44 mEq Ca2+), Glucose 10%,20ml/amp
ISMP：Classes/Categories - 9. dialysis solutions, peritoneal and hemodialysis		
DIAN1	※(警 2)DIANEAL 1.5% DEX 2L 腹膜透析液	DIANEAL 1.5% DEX 2L 腹膜透析液
DIAN11	※(警 2)DIANEAL 1.5% DEX 1.5L 腹膜透析液	DIANEAL 1.5% DEX 1.5L 腹膜透析液
DIAN12	※(警 2) (單袋)DIANEAL 1.5% DEX 2.5L 腹膜透析液	DIANEAL 1.5% DEX 2.5L 腹膜透析液
DIAN122	※(警 2) (雙袋)Dianeal 1.5% DEX 2.5L 腹膜透析液 百特	Dianeal 1.5% DEX 2.5L 腹 膜透析液 百特 Baxter
DIAN15	※(警 2)DIANEAL 1.5% DEX 5L 腹膜透析液	DIANEAL 1.5% DEX 5L 腹膜透析液
DIAN2	※(警 2)DIANEAL 2.5% DEX 2L 腹膜透析液	DIANEAL 1.5% DEX 2.5L 腹膜透析液
DIAN22	※(警 2) (單袋)DIANEAL 2.5% DEX 2.5L 腹膜透析液	DIANEAL 2.5% DEX 2.5L 腹膜透析液
DIAN222	※(警 2) (雙袋)Dianeal 2.5% DEX 2.5L 腹膜透析液	Dianeal 2.5% DEX 2.5L 腹 膜透析液 百特 Baxter
DIAN25	※(警 2)DIANEAL 2.5% DEX 5L 腹膜透析液	DIANEAL 2.5% DEX 5L 腹膜透析液
DIAN42	※(警 2)DIANEAL 4.25% DEX 2L 腹膜透析液	DIANEAL 4.25% DEX 2L 腹膜透析液
DIAN45	※(警 2)DIANEAL 4.25% DEX 5L 腹膜透析液	DIANEAL 4.25% DEX 5L 腹膜透析液
DIALC25	※(警 2)Dianeal Low Ca 2.5% DEX 5L 百特	Dianeal Low Ca 2.5% DEX 5L 百特 Baxter

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	11/29

代碼	品項名	學名
ISMP：Classes/Categories - 10.epidural and intrathecal medications		
MARCH	※(警 2)Marcaine heavy spinal 0.5% 4ml	Bupivacaine HCl 0.5%w/glucose 8% 0.5% Astra (20mg/4ml/amp)
MARCI	※(警 2)Marcaine 0.5% 1ml inj ASTRA	Bupivacaine HCl 0.5% 100mg/20ml/vial
ROPI	※(警 2)Ropica Inj 10 mg/ ml,20ml/vial	Ropivacaine 200mg/20ml/vial (10mg/ml)
ISMP：Classes/Categories – 11. inotropic medications, IV (e.g., digoxin, milrinone)		
PRIMZ	※(警 2)PrimACOR inj 10mg/10ml/amp	Milrinone lactate 10mg/10ml/amp Sanofi
ISMP：Classes/Categories – 12.insulin, subcutaneous and IV		
ACTR	※(警 2)Actrapid IU100iu/ml*10ml(需冷藏)	Neutral human insulin 1000U/10ml 需冷藏
HUMA	※(警 2)Humalog Mix 50 100U/ml;3ml/vial (需冷藏)	50%Insulin lispro,50%insulin lispro protamine 3ml/vial
HUMA25	※(警 2)Humalog Mix 25 100U/ml (需冷藏)	25%Insulin lispro,75%insulin lispro protamine 3ml/vial
LEVE	※(警 2)Levemir FlexPen 100IU/ml 3ml/pen(需冷藏)	Insulin detemir 100IU/ml 3ml/pen NOVO
MONO	※(警 2)(瓶)綠 Insulatard 1000U/10ml(需冷藏)	Insulin Monocomponen
NOVOR	※(警 2)(筆)NovoRapid 300U/3ml(需冷藏) FlexPen	Insulin Aspart 300IU/3ml
OZEM	※(警 2)(藍)Ozempic 1mg (4mg/3ml/vial) (須冷藏)	Semaglutide 4mg/3ml/vial(1.34mg/ml)
OZEM1	※(警 2)(紅)Ozempic 0.25mg;0.5mg (2mg/1.5ml/vial) (須冷藏)	Semaglutide 2mg/1.5ml/vial(1.34mg/ml)
RYZO	※(警 2)Ryzodeg FlexTouch 30IU/70IU/ml,3ml/vial(需冷藏)	Insulin aspart30IU, insulin degludec70IU
SAXE	※(警 2)Saxenda 18mg/3ml/vial (須冷藏)	Liraglutide 18mg/3ml/vial (6mg/ml)
SOLIQ	※(警 2)Soliqua 300IU/150µg/3ml/vial(需冷藏)	Insulin glargine 100 IU/Lixisenatide 50µg/ml ;3ml/vial
TOUJ	※(警 2)Toujeo 450IU/1.5ml/vial(需冷藏)	Insulin Glargine 300IU/ml (450IU/1.5ml/vial)
TRES	※(警 2)Tresiba FlexTouch 300IU/3ml/vial(需冷藏)	Insulin degludec 100IU/ml, 3ml/vial
TRUL	※(警 2)Trulicity 1.5mg/0.5mL/vial (2pen/box)(須冷藏)	Dulaglutide 1.5mg/0.5mL/vial
VICT	※(警 2)Victoza 6mg/ml 3ml/vial (2pen/box)(需冷藏)	Liraglutide 6mg/ml 3ml/vial
ISMP：Classes/Categories - 13. liposomal forms of drugs		
AMBI	※(警 2) Ampholipad 50mg/vial (需冷藏)	Amphotericin B liposome 50mg/vial

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	12/29

代碼	品項名	學名
ISMP：Classes/Categories - 14. moderate sedation agents, IV		
無		
ISMP：Classes/Categories – 15. moderate and minimal sedation agents, oral, for children		
CHLOH1	※(警 2)Clodrin(Chloral hydrate) 30ml/bot	Chloral hydrate 3000mg/30ml/bot (100mg/ml)
ISMP：Classes/Categories - 16.opioids, IV, transdermal and oral (including liquid concentrates, immediate and sustained-release formulations)		
無		
ISMP：Classes/Categories – 17. neuromuscular blocking agents		
ESME	※(警 2)Esmeron 50mg/5ml/vial(需冷藏)	Rocuronium 10mg/ml,5ml/vial
ROCU	※(警 2)Rocuronium 10mg/ml*10ml/vial(需冷藏)	Rocuronium bromide 10mg
ROCU2	※(警 2)Rocuronium 50mg/5ml/vial(需冷藏)	Rocuronium 10mg/ml (50mg/5ml/vial)
GENS	※(警 2)Genso injection 25mg/2.5ml/amp (需冷藏)	Atracurium Besylate 10mg/ml*2.5ml
RELA	※(警 2)Relaxin 500mg/vial inj	Succinylcholine Cl 500 mg inj
ISMP：Classes/Categories –18.parenteral nutrition preparations		
CLIN17	※(警 2)Clinimix(N17G35E) 1500ml/pack solution for infusion	glucose 263g, amino acid 75g, (Na53,K45,Mg3.8,Ca3.4,氣 60,磷酸鹽 23)mmol
NUME	※(警 2)(TPN 給藥)Numeta G13%E emulsion 300ml/pack	每包含無水葡萄糖 40g(13.3%)、胺基酸 9.4g(3.1%)、脂肪 7.5g 及 數種電解質
OLIN7	※(警 2)(TPN 給藥) Oliclinomel1000 E emulsion 1500ml/pack	Amino Acids 60g, glucose 240g,fat 60g,電解質 (1500ml/pack)
SMOFK1	※(警 2)SmofKabiven 1904ml/pack(門診不用給)	葡萄糖 135g、氨基酸 60g、 脂肪 54g、(鈉 48、鉀 36、 鎂 6.0、鈣 3.0、氯 42)mmol
ISMP：Classes/Categories - 19. sodium chloride for injection, hypertonic, greater than 0.9% concentration		
NS3	※(警 2)NaCl 3% 500ml inj	NaCl 3% 15g/500ml/pack inj
ISMP：Classes/Categories - 20.sterile water for injection, inhalation, and irrigation (excluding pour bottles) in containers of 100 mL or more		
STER2	※(警 2)(限開刀房)Steril water for irrigation 2000ml	Steril water for irrigation 2000ml

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	13/29

代碼	品項名	學名
WATE3	※(警 2)(注射用)Water for injection 1000ml inj	Water for injection 1000ml inj
WATE4	※(警 2)Sterile Water for Irrigation 1000ml/bot	Water for injection 1000ml/bot 永豐
ISMP：Classes/Categories - 21. sulfonylurea hypoglycemics, oral		
AMARM	※(警 2)Amaryl M 2/500mg	Glimepiride 2mg;Metformin 500mg
DIAM3	※(警 2)Diamicron MR (不可磨粉) 30mg/tab	Gliclazide 30mg/tab
GLID	◆※(警 2)Glipizide 5mg/tab	Glipizide 5mg/tab
GLUCM	※(警 2)GlucoMET F.C. 5/500mg	Glyburide(Glibenclamide) 5mg;Metformin 500mg
ISMP：Specific - 1. EPINEPHrine, IM, subcutaneous		
EPIP	※(警 2)Epipen Epinephrine Auto-Injector 0.3mg/dose/vial	Epinephrine 0.3mg/vial
ISMP：Specific - 2. epoprostenol (e.g., Flolan), IV		
無		
ISMP：Specific - 3. insulin U-500 (special emphasis*)		
無		
ISMP：Specific - 4. magnesium sulfate injection		
MAGL	※(警 2)Maglol 10%(16.2mEq) 2g/20ml	Magnesium Sulfate 2g/20ml/amp (16.23mEq Mg2+)
MAGL1	※(警 2)(大)Magnesium Sulfate inj 162.3mEq Mg (20g/200ml)	Magnesium Sulfate (0.81mEq/ml Mg2+) , 100mg/ml , 200ml/bot
ISMP：Specific - 5. methotrexate, oral, non-oncologic use		
附件（四）化療藥		
ISMP：Specific - 6.nitroprusside sodium for injection		
無		
ISMP：Specific - 7. opium tincture		
無		
ISMP：Specific - 8 . Oxytocin, IV		
DURA1	※(警 2) Duratocin Inj. 100mcg/ml	Carbetocin 100mcg/1ml/vial
PITO	※(警 2)Oxytocin(Piton-S) 10IU/ml	Oxytocin 10IU*1ml
ISMP：Specific - 9. potassium chloride for injection concentrate		
附件（一）警 1		
ISMP：Specific - 10. potassium phosphates injection		
附件（一）警 1		

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	14/29

代碼	品項名	學名
ISMP：Specific - 11. promethazine injection		
無		
ISMP：Specific - 12. Vasopressin, IV or intraosseous		
PITR	※(警 2)Pitressin(water) 20U inj	Vasopressin 20units
ISMP 2014：Specific - radiocontrast agents, IV		
GASTS	※(警 2)Gastrografin 100ml	Na. amidotrizoate 100MG\Meglumine amidotrizoate 660mg
ISOV	※(警 2)Isovist inj 10cc	Iotrolan 10ml (iotrolan 240 and 300 mg of iodine per ml)
LIPI	※(警 2)Lipiodol 10ml inj GUERBET	Ethiodized oil 38% w/w(iodised ethyl ester of the fatty acid
UROG75	※(警 2)Urografin 76% 50ml/vial	Diatrizoate Na.+Diatrizoate meglumine 76% 50ml/vial
VISI	※(警 2)Visipaque inj 320mg I/ml,100ml/bot	Iodixanol 320mg I/ml,100ml/bot
ISMP:Specific - Tranexamic acid injection		
TRAN5	※(警 2) (針)Tranexamic Acid 250mg/5ml/amp	Tranexamic Acid 250mg/5ml

(三) 管制藥 1-4 級共 26 項

管制分級	代碼	品項名	學名
ISMP：Classes/Categories - 16.opioids■ IV ■ transdermal ■ oral (including liquid concentrates, immediate and sustained-release formulations)			
1 級	MORP	※(管 1)(針) Morphine 10mg/ml/amp inj	Morphine 10mg/ml/amp
	MORP3	※(管 1)(長效)Morphine SR 30mg/tab	Morphine Sulfate 30mg/tab
	MORPT1	※(管 1)(口)Morphine 15mg/tab	Morphine sulfate 15mg
	MORPS	※(管 1)(液)Morphine Sulfate Oral Sol'n 2mg/ml,60ml/bot	Morphine Sulfate 2mg/ml,60ml/bot
2 級	CODET1	※(管 2)Codeine 30mg/tab	Codeine Phosphate 30mg/tab
	DEMEI	※(管 2)Demerol 50mg/amp inj	Pethidine(Meperidine) 50mg/amp inj
	DURO1	※(管 2)Durogesic 12µg/hr patch	Fentanyl 12 µ g/h (實際為 12.5 µ g/h)
	DURO2	※(管 2)(粉 25)Fentanyl Transdermal Patch 25 µg/hr	Fentanyl 25 µ g/h

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	15/29

管制分級	代碼	品項名	學名
	DURO5	※(管 2)(褐 50)Fentanyl Transdermal Patch 50 µg/hr	Fentanyl 50 µg/h
	FENT	※(管 2)(10ml,限高劑量) FENTANYL 500mcg/10ml/amp inj	Fentanyl 500mcg/10ml inj
	FENT2	※(管 2)(2ml) Fentanyl 100mcg/2ml inj	Fentanyl 100mcg/2ml inj
	METHA	※(管 2)Methadone (美沙酮計畫) Oral Conc.10mg/ml(限住院開立)	Methadone HCl 10mg/ml,1000ml/bt
	OXYC	※(管 2)(長效)OxyContin CR 10 mg/tab	Oxycodone HCl 10 mg/tab
	OXYN	※(管 2)OxyNorm IR 5mg/cap (56 cap/box)	Oxycodone HCl 5mg/cap
	PAIN	※(管 2)PAINKYL fentanyl (buccal soluble films) 200mcg	Fentanyl citrate 200mcg
	RAPIF	※(管 2)(限麻醉科)Alfentanil inj 1mg/2ml/amp	Alfentanil 1mg/2ml/amp
ISMP : Classes/Categories - 3. anesthetic agents, general, inhaled and IV			
3 級	KETA5	※(管 3)Ketamin-hameln(Ketalar) 50mg/ml (10ml/vial)	Ketamine 50mg/ml (10ml/vial)
	FRES	※(管 4)Propofol (Fresofol)1%,10mg/ml*20ml	Propofol 1%,10mg/ml,20ml inj
	ANES	※(管 4) Anesvan (Propofol) 10mg/ml*20ml	Propofol 1%,10mg/ml,20ml
ISMP : Classes/Categories -14. moderate sedation agents, IV			
4 級	ATIVI	※(管 4)(針)Ativan(Anixicam) 2mg/ml inj(需冷藏)	Lorazepam 2mg/ml inj 需冷藏
	DORM3	※(管 4)(針)Midatin 5mg/1ml/amp	Midazolam 5mg/1ml
	VALII	※(管 4) (針)Dupin(Valium) Injection 5mg/ml	Diazepam 5mg/ml (2ml/amp)
ISMP : Classes/Categories - 16.opioids, IV, transdermal and oral (including liquid concentrates, immediate and sustained-release formulations)			
	TRAMTX	※(管 4) (小)Tramtor 50mg/cap (Tramal)	Tramadol 50mg/cap
	TRAMX	※(管 4) Tramtor(Tramal) 100mg/2ml/amp	Tramadol 100mg/2ml/amp
	ULTRT	※(管 4)Utraphen(止痛) 37.5/325mg/Tab	Tramadol/Acetaminophen 37.5/325mg
Others			
	RU486	※(管 4)RU-486(Apano) 200mg/ 50tab/box	Mifepristone 200mg/tab

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	16/29

(四) 化療藥品共 99 項

藥品代碼	品項名	學名
	ISMP：Specific - 5. methotrexate, oral, non-oncologic use	
MTXT	※(口)Trexan (MTX) 2.5mg/tab	Methotrexate 2.5mg/tab
	ISMP：Classes/Categories - 7. chemotherapeutic agents, parenteral and oral	
6MP	※(化)Mercaptopurine 50mg/tab	Mercaptopurine 50mg/tab
AFIN	※(審)(大)Afinitor 5mg/tab	Everolimus 5mg/tab (mTOR inhibitor)
AFIN2	※(罕)(審)(小)Votubia 2.5mg/tab	Everolimus 2.5mg/tab (mTOR inhibitor)
ALEC	※(審)Alecensa 150mg/cap	Alectinib 150mg/cap
ALKE	※(化)(A)Alkeran 2mg/tab(需冷藏)	Melphalan 2mg
ALUN	○※(審)Alunbrig F.C. 90mg/tab	Brigatinib 90mg/tab
ALVOT	※(審)Alvotinib 400mg/tab	imatinib 400mg/tab
AMIV	○※(恩慈)Amivantamab 350mg/7ml/vial(50mg/ml)(需冷藏)(搭配過濾器)	Amivantamab 350mg/7ml/vial(50mg/ml)
ATEZO	○※(恩慈)Atezolizumab 1200mg/vial(需冷藏)(L)	Atezolizumab 1200 mg/vial
BAVE	○※Bavencio 200mg/10mL/vial(搭配過濾器)(需冷藏)	Avelumab 200mg/10mL/vial
BLIN	※(審)(化)Blincyto 35mcg/vial(需冷藏)(搭配set+過濾器)	Blinatumomab 35mcg
CABO	○※(60)Cabometyx F.C 60mg/tab	Cabozantinib 60mg/tab
CABO4	○※(審)(40)Cabometyx F.C 40mg/tab	Cabozantinib 40mg/tab
CAMP1	※(化)Campto 100mg/5ml/vial(限自費使用)	Irinotecan HCL 100mg/5ml/vial
CAPM2	○※(恩慈)Tabrecta F.C.200mg/tab(△)	Capmatinib 200mg/tab
DARZ	○※(審)Darzalex 100mg/5ml/vial(需冷藏)(搭配過濾器)	Daratumumab 20mg/ml,100mg/vial
ENDOT	※(化)(口)Endoxan 50 mg/tab	Cyclophosphamide 50mg/tab
ENTRE	○※(恩慈)Entrectinib(Rozlytrek) 200mg/cap(△)	Entrectinib 200mg/cap
ERBI5	※(審)Erbitux 100mg/20ml/vial(需冷藏)	Cetuximab 100mg/20ml/vial
ERWI	○※(簽呈)(化) Erwinaze 10000 IU/vial (需冷藏)	L-Asparaginase 10000 IU/vial
GAZY	○※(審)Gazyva 1000mg/40ml/vial (需冷藏)	Obinutuzumab 1000mg/40ml
GIOT	※(30)Giotrif F.C 30mg/tab	Afatinib dimaleate 30 mg/tab
GIOT4	※(40)Giotrif F.C 40 mg/tab	Afatinib dimaleate 40 mg/tab

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	17/29

藥品代碼	品項名	學名
GLIV1	※(審)Glivec 100mg/tab	Imatinib 100mg/tab
GOLF	※(審)(化)Golfer 25mg/cap	Tegafur 25 mg,Gimeracil 7.25 mg,Oteracil potassium 24.5 mg
GOLF1	※(化)Golfer 25mg/cap	Tegafur 25 mg,Gimeracil 7.25 mg,Oteracil potassium 24.5 mg
HYDR	※(化)Hydrea 500mg/cap	Hydroxyurea 500mg
IBRA	※(審)(125)Ibrance 125mg/cap	Palbociclib 125 mg/cap
IBRA1	※(審)(100)Ibrance 100mg/cap	Palbociclib 100mg/cap
ICLU	※(審)Iclusig F.C. 15mg/tab	Ponatinib 15mg/tab
IMBR	※(審)Imbruvica Capsules 140mg/cap	Ibrutinib 140mg/cap
IMFI1	※(醫免)Imfinzi Injection 120 mg/2.4ml/vial(需冷藏)(搭配過濾器)	Durvalumab 120 mg/2.4ml/vial
INLY	○※(審)Inlyta F.C. Tab. 1 mg	Axitinib 1 mg/tab
IRES	※Iressa F.C. 250mg/tab	Gefitinib 250mg/tab
JAKE	○※(審)Jakavi 5mg/tab	Ruxolitinib 5mg/tab
KEYT1	※(審)Keytruda 100mg/4ml/vial (需冷藏)(搭配過濾器)	Pembrolizumab 25mg/ml * 4ml
KISQ	※(審)Kisqali F.C. 200mg/tab	Ribociclib succinate 200mg
LEEV	※(審)Leevk F.C.100mg/tab	Imatinib mesylate 100mg
LENV	※(10)(審)LENvima 10 mg/cap	Lenvatinib 10 mg/cap
LENV4	※(4)(審)Lenvima 4 mg/cap	Lenvatinib 4 mg/cap
LEUK	※(化)Leukeran 2mg(需冷藏)	Chlorambucil 2mg(需冷藏) WELLCOME
LONS	※(化)(審)Lonsurf(複) 15mg/tab(20tab/box)	Trifluridine 15mg ; Tipiracil 7.065mg
LORV	○※(審)Lorviqua F.C.25mg/tab	Lorlatinib 25mg/tab
LYNP	○※(審)Lynparza F.C.150mg/tab	Olaparib 150mg/tab
MEKI	※(審)Mekinist 2mg/tab (需冷藏)	Trametinib Dimethyl Sulfoxide 2mg
MOBO	○※(恩慈)(TAK-788)Mobocertinib 40mg/cap(△)	Mobocertinib 40mg/cap
NAVE2	※(化)Navelbine 20mg/cap(需冷藏)	Vinorelbine 20mg/cap(需冷藏)
NAVE3	※(化)Navelbine 30mg/cap(需冷藏)	Vinorelbine 30mg/cap(需冷藏)
NERL	※Nerlynx F.C. 40mg/tab	Neratinib 40mg/tab
NEXA	◆※(審)Nexavar F.C 200mg/tab	Sorafenib 200mg/tab
OFEV	○◆※(審)Ofev 150 mg/cap	Nintedanib 150mg

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	18/29

藥品代碼	品項名	學名
OLIT1	○※(恩慈 2 0 0)HM61713 200mg,30tab/box(需整盒開立)	Olmutinib 200mg/tab
OLIT2	○※(恩慈 4 0 0)HM61713 400mg,30 tab/box(需整盒開立)	Olmutinib 400mg/tab
OPDI	○※(大)(恩慈)Nivolumab(Opdivo) 100mg/vial(搭配過濾器)	Nivolumab 100mg/10ml/vial
OPDIV1	※(醫免)Opdivo 20mg/vial (L)(需冷藏)(搭配過 濾器)	Nivolumab 20mg/2ml/vial
OPDIVO	※(審)(大)Opdivo 100mg/vial (L)(需冷藏)(搭配 過濾器)	Nivolumab 100mg/10ml/vial
OSIM	○※(恩慈)Tagrisso (Osimertinib) F.C. 80mg/tab	Osimertinib 80mg/tab
PERJ	※(審)Perjeta 420mg/vial (需冷藏)	Pertuzumab 420mg/14ml/vial
PHES	○※(化)Phesgo 600/600mg/vial(需冷藏)	Pertuzumab 600mg/Trastuzumab 600mg
PIQR	○※(小)(恩慈)Piqray 50mg/tab, 35 tab/bot	Alpelisib 50mg/tab
POLIV	○※Polivy 140 mg/vial (需冷藏)(搭配過濾器)	polatuzumab vedotin140 mg/vial
ROZL	※(審)Rozlytrek 200mg/cap (90 tab/box)	Entrectinib 200mg/cap
RYBR	※Rybrevant 350mg/7ml/vial(50mg/ml)(需冷 藏)(搭配過濾器)	Amivantamab 50mg/ml
RYDA	※(審)Rydapt 25mg/cap	Midostaurin 25mg/cap
SPRY	※(大)Sprycel F.C.50mg/tab	Dasatinib 50mg/tab
SPRY2	○※(簽呈)(小)Sprycel F.C.20mg/tab	Dasatinib 20mg/tab
STIV	※(審)Stivarga FC 40mg/tab (28tab/box)	Regorafenib 40mg/tab
SUTE	◆※(審)Sutent 12.5mg 28cap/Box Pfizer	Sunitinib 12.5mg/cap 輝瑞 Pfizer
TABR	※Tabrecta F.C.200mg/tab	Capmatinib 200mg/tab
TAFI	※(審)Tafinlar 75mg/cap	Dabrafenib Mesylate 75mg
TAGR	※(審)Tagrisso 80mg/tab	Osimertinib 80mg/tab
TALZ	○※(審)Talzenna 0.25mg/cap	Talazoparib Tosylate
TARC	◆※(大)Tarceva F.C 150mg/tab	Erlotinib 150mg/tab
TARC1	◆※(小)Tarceva F.C 100mg/tab	Erlotinib 100mg/tab
TASI	◆※(200)Tasigna 200mg/cap	Nilotinib 200mg/cap
TASI1	◆※(150)Tasigna Capsules 150mg	Nilotinib 150mg/cap
TECE2	※(審)(大)Tecentriq 1200 mg/20ml/vial (需冷 藏)(搭配過濾器)	Atezolizumab 1200 mg/vial

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	19/29

藥品代碼	品項名	學名
TEMO0	※(化)(審)小 Tamos 20mg/cap 5cap/box	Temozolomide 20mg/cap
TEMO1	※(化)(審)大 Tamos 100mg/cap 5cap/box	Temozolomide 100mg/cap
TEPO	○※(恩慈)Tepotinib 250mg/tab(14tab/box 整盒開立)(△)	Tepotinib HCl hydrate 250mg(=225mg tepotinib)
TERN	※Ternibin F.C.250mg/tab	Gefitinib 250mg
TIRA	○※(恩慈)Velexbru(Tirabrutinib) 80mg/tab	Tirabrutinib 80mg/tab
TS20	◆※(化)TS-1 20mg/cap,7cap/片	Tegafur 20mg,Gimeracil 8.8mg,Oteracil potassium 19.6mg/cap
TYKE	※Tykerb 250mg/tab (70Tab/Bot)	Lapatinib Ditosylate 250mg/tab
UFUR	※(化)UFUR 100mg/cap 黃片	Tegafur 100mg\Uracil 224mg
VECT	○※(審)Vectibix sol'n for infusion 100mg/5ml/vial(需冷藏)(搭配過濾器)	Panitumumab 100mg/5ml/vial
VENC	※(審)Venclexta 100mg/tab	Venetoclax 100mg
VERZ	※VERZENIO 150mg/tab	abemaciclib 150mg
VESA	Vesanoid 10mg/cap	Tretinoin 10mg/cap
VITRA	○※(恩慈)VITRAKVI 100mg/cap	Larotrectinib 100mg
VIZI	※(大)Vizimpro F.C 45mg/tab	Dacomitinib 45mg/tab
VIZI1	※(小)Vizimpro F.C 30mg/tab	Dacomitinib 30mg/tab
VOTR	※(審)Votrient F.C. 200mg/tab	Pazopanib HCl 200mg
VP16T	※(化)Vepesid 50mg/cap	Etoposide 50mg/cap
XALK	※(審)Xalkori 250mg/cap	Crizotinib 250mg
XELO	※(化)Calveda(Capecitabine) 500mg/tab	Capecitabine 500mg
YERV	※Yervoy 50mg/vial(5mg/ml)(需冷藏)	Ipilimumab 50mg/10ml/vial
ZYKA	※(審)Zykadia 150mg/Cap	Ceritinib 150mg/Cap

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	20/29

(五) 高警訊一級藥品貼上紅點標籤，以加強提示品項如下表

代碼	品項名	學名
DIGOI2	※(警 1)Lanoxin(Digoxin)0.5mg/2ml/amp inj GSK	Digoxin 0.5mg/2ml/amp inj
DOPAV	※ (警 1) Dopamine 200mg/5ml/amp	Dopamine HCl 40mg/ml
KHPO	※ (警 1) Potassium phosphate (K 88meq,PO4 60mM)20ml/amp	Potassium Phosphate (K ₂ HPO ₄ 244mg, KH ₂ PO ₄ 236mg)/ml (每毫升 P : 3mmol,K:4.4mEq),20ml/amp

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	21/29

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
94.02.28	1.0	新制定	94 年 02 月 28 日 護理部照護標準 委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
99.11.23	2.1	應落實覆誦與確認給藥名稱，主護與雙重核對護理人員應核對病人、藥物、時間、劑量、途徑，藥品字母應全部核對，勿流於形式	99 年 11 月 23 日 護理部照護標準 委員會通過
101.06.06	2.2	將說明分類為高警訊藥物之定義、管理、執行、記錄及注意事項，並加入 HIS2008 核對及執行流程	101 年 06 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過
101.12.12	2.3	1.與護理部_A31000-Q02-W-B06_高警訊藥品管理辦法內容整合，合併為高警訊藥物使用及管理作業標準。 2.依據藥劑科_住院調劑組_A34030-000-P-002_高警訊藥品管理辦法增減高警訊藥物分類並修改藥品效期管理辦法。	101 年 12 月 12 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.06	2.4	1.說明（二）7.新增:KCl(20mEq 10ml inj)領回，若未立即使用，應放置麻管抽屜，並註明病人基本資料，以利交班核對。加護單位 KCl(20mEq 10ml inj)領回，若未立即使用，每班交班時應確實交接對點及記錄。 2.說明（三）5.新增:未使用完之高警訊藥物一級（需雙重核對的品項），須由兩位護理同仁雙重核對後，將藥物抽出，打入感染可燃廢棄物垃圾桶丟棄，並將空瓶丟棄至 Amp、Vial 回收桶（後續委託的廠商將進行玻璃回收、壓碎、高溫等處理）。	依據護理部 102 年 02 月 05 日公告 編號：QM102-001
102.02.22	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.06.11	3.1	增加高警訊一級藥物及管制藥等需以紅色圓點標示品項，護理人員給藥需雙重核對及刪減化療藥物品項※（化）Glivec。	102 年 06 月 11 日 護理部照護標準 委員會通過
102.12.10	3.2	增加高警訊藥物使用靜脈幫浦滴注前，幫浦查核機制並附圖。	102 年 12 月 10 日 護理部照護標準 委員會通過

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	22/29

修正日期	版本	修正說明	備註
103.04.01	3.3	說明內容部份修辭	103 年 04 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
103.06.03	3.4	若有剩餘藥物需雙重核對餘量，確保高警訊一級藥物剩餘藥物之管控	103 年 06 月 03 日 護理部照護標準 委員會通過
104.04.07	3.5	依據藥劑科制定之 A34030-000-P-002_高警訊藥品管理辦法刪修高警訊藥物品項及細目	104 年 04 月 07 日 護理部照護標準 委員會通過
104.06.19	3.6	1.依據藥劑科制定之 A34030-000-P-002_高警訊藥品管理辦法 104 年 05 月 19 日藥劑科主管會議通過修定 1. 行 政 院 公 告 藥 品 Propofol (Fresofol)1%,10mg/ml*20ml 為 4 級管制藥品。 2.新增 2 級管制藥物 Methadose (Methadone, 美沙酮計畫) Oral Conc.10mg/ml。	104 年 06 月 19 日 護理部照護標準 委員會通過
105.04.07	3.7	原第三項第(二)目之 7~ KCl(20mEq 10ml inj)領回，若未立即使用，應放置麻管抽屜，並註明病人基本資料，以利交班核對。加護單位 KCl(20mEq 10ml inj)領回，若未立即使用，每班交班時應確實交接對點及記錄。 經 105 年 03 月 15 日督導會議討論 更改為：KCl(20mEq 10ml inj)、Nimbex、(警 2) Relaxin、(警 2) Fresofol、(管 4) Citosol 及管制藥品 1-3 級，各單位領回後，若未立即使用，應放置麻管抽屜，並註明病人基本資料，每班交班時應確實交接對點及記錄。	105 年 04 月 07 日 護理部照護標準 委員會通過
105.06.07	3.8	1. 經 105 年 05 月 10 日督導會議討論 原第三項第(二)目之 7~ KCL(20mEq 10ml inj)、Nimbex、(警 2)Relaxin、(警 2) Fresofol、(管 4) Citosol 及管制藥品 1-3 級，各單位領回後，若未立即使用，應放置麻管抽屜，並註明病人基本資料，每班交班時應確實交接對點及記錄。 更改為~ (警 1) KCL(20mEq 10ml inj)、(警 2) Nimbex、(警 2) Relaxin、(管 4) Propofol、(管 4) Citosol 及管制藥品 1-3 級於交換藥車及點收退藥時藥師需與護	105 年 06 月 07 日 護理部照護標準 委員會通過

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	23/29

修正日期	版本	修正說明	備註
		理人員雙重核對後簽收，病房單位領回後，若未立即使用，應放置麻管抽屜，並註明病人基本資料，每班交班時應確實交接對點及記錄於高警訊藥物點交紀錄表（表單二）。但加護單領回，若未立即使用，每班交班時應確實交接對點及記錄於高警訊藥物點交紀錄表，如有轉床請原單位將高警訊藥物點交紀錄表及患者離開單位藥品移交總表帶至轉入單位並進行雙人簽核後，留存於原單位，轉入單位請重新書寫並雙人簽核（表單二）。 2. 依據藥劑科高警訊藥品管理辦法 A34030-000-P-002 修正，參考美國 ISMP 2014（Institute for Safe Medication Practices）公佈之高警訊藥品 22 大類及 12 個特定品項調整高警訊品項。 調整高警訊一級藥物，由原 16 項調降為 10 項、高警訊二級藥物由原 40 項調為 97 項、管制藥 1-4 級原 49 項調降為 27 項、化療藥品原 55 項調為 57 項。	
105.08.02	3.9	1. 第三項第（三）目之 1 刪除：高警訊一級藥物、管制藥（如附件五）及化療藥物（含口服及注射劑）（如附件四）護理人員給藥需雙重核對。 改為~高警訊一級藥物、管制藥（Morphine、Demerol）及化療藥物（含口服及注射劑）（如附件四）護理人員給藥需雙重核對。 2. 第三項第（三）目之 2 修正：高警訊藥物中之高警訊一級藥物、管制藥（Morphine、Demerol）及化療藥物（含口服及注射劑）（如附件四）時需兩位護理人員覆核。	105 年 08 月 02 日 護理部照護標準委員會通過
105.08.17	4.0	1. 第三項第（三）目之 1 新增：若藥品瓶身附有警示標示(    )，則不須再以紅色圓點標示； 2. 新增第三項第（四）目之 3. 針對使用輸液幫浦之高警訊藥品，應每兩小時確認其班內輸液累積量，並於紀錄上呈現，以確保劑量正確。	105 年 08 月 17 日 護理部週會決議通過
105.12.06	4.1	1. 第三項第（三）目之 1 刪除刪除：高警訊藥物分為四大類，高警訊一級藥物共 10 項、高警訊二級藥物共 97 項、管制藥 1-4 級共 27 項、化療藥品共 57 項。	105 年 12 月 06 日 護理部照護標準委員會通過

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	24/29

修正日期	版本	修正說明	備註
		修改為~藥劑科依據美國 ISMP 2014 年，本院需每位醫療人員保持高度警覺之高警訊藥品 High-Alert Medications 共計有 188 個品項。 (1)高警訊一級藥物共 10 項。 (2)高警訊二級藥物共 97 項。 (3)管制藥 1-4 級共 28 項。 (※新增 2 級管制藥物 OxyNorm Immediate Release Capsules 5mg/cap) (4)化療藥品共 53 項。 2. 刪除：高警訊藥物分為四大類；更改需使用輸液幫浦之高警訊藥品品項加入下列高警訊藥品給藥後應進行監測與評估，系統設定提示醫護人員。	
106.04.19	4.2	1. 原主題名稱刪除：高警訊藥物使用及管理作業標準； 更改為~高警訊藥品使用及管理作業標準。 2. 第三項第（一）目刪除：高警訊藥物之定義：依據美國 ISMP (Institute for Safe Medication Practices)訂立，凡藥物的種類或給藥的設備，因經由不當使用，而具有造成重大傷害的潛在危險，則將該藥物定義為高警訊藥品。改為~經由不當使用或不當管理，而可能對病人造成嚴重傷害的藥物稱之為高警訊藥品。 3. 第三項第（二）目之 3 增加「骷顱頭」標示與其他藥品做區隔。於醫師開立處方、藥袋及處方上高警訊藥品前加註※，特殊標記以供辨識，如圖示：※（警 1）、※（警 2）、※（管 1）、※（管 2）、※（管 3）、※（管 4）、※（化）醫護人員使用前請提高警覺。 4. 第三項第（二）目之 5 增加：單位內高警訊藥品每天需有三班人員交班並清點數量之代碼及品項。 5. 第三項第（二）目之 7 刪除：藥品效期符合標準，每雙月最後一週會由該樓層藥師稽核高警訊藥品，稽核後需由藥師及單位護理長或負責人完成雙方簽章，稽核時藥品有效期限應大於六個月，效期在 3-6 個月的藥品由該樓層藥師更換新品，並於稽核表中紀錄，若發現效期<3 個月，請單位自行處理 【到中山醫學大學附設醫院首頁／各科訊息／醫	106 年 04 月 19 日 護理長週會決議通過

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	25/29

修正日期	版本	修正說明	備註
		事單位-藥劑科／各式表格／下載退藥（退回藥庫）明細表，至藥庫更換】，樓層藥師紀錄於稽核表中，下一次稽核若未更換新品，則由樓層藥師開異常處置表通知護理部。 更改為~每雙月最後一週會由該樓層藥師稽核高警訊藥品，高警訊藥品有效期限應大於六個月，有效期限稽核時，效期小於 6 個月的藥品由樓層藥師更換新品，並於稽核表中紀錄，稽核後需由藥師及單位護理長或負責人完成雙方簽章。 6. 原 8.病人使用（警 1）Heparin、（警 2）Coumadin 治療前及過程中，均應評估病人凝血功能數值。更改至（七）3。 7. 原：若為高警訊藥物中之高警訊一級藥物、管制藥（Morphine、Demerol）；更改為~若為高警訊藥物中之高警訊一級藥物、管制藥一~三級針劑：Morphine 10mg/ml/amp、Demerol 50mg/amp inj、Fentanyl-Fresenius 500mcg/10ml inj、Fentanyl-Fresenius 100mcg/2cc inj、管四 Dormicum 5mg/5ml 針劑，醫護人員使用前須雙重核對。 8. 原:護理紀錄上應呈現病人接受注射之高警訊藥品，靜脈滴注幫浦流速須完整呈現，並於 15 分鐘後記錄高警訊藥物使用反應及處理情形。更改為~護理紀錄上應呈現病人接受注射之高警訊藥品，靜脈滴注幫浦流速須完整呈現，除了 Insulin(actrapid、novorapid)、Propofol 兩項高警訊藥品依其藥品特性以資訊系統輔助跳出提示視窗之時間進行監測評值外，靜脈給藥為 15 分鐘監測評值，其他途徑給藥皆為 30 分鐘監測評值。Insulin(actrapid、novorapid)在給藥後 2 小時需觀察是否有低血糖症狀（頭暈、冒冷汗、無力、心跳加快、嘴唇發麻）、Propofol 給藥前、及給藥後 5 分鐘監測血壓及呼吸。 9. 需使用輸液幫浦之高警訊藥品品項，刪除 DIGOI2※（警 1）Lanoxin(Digoxin) 0.5mg/2ml/amp inj 10. 高警訊藥品給藥後應進行監測與評估，系統設定提醫護人員；更改(1)原: ACTR ※（警 2）Actrapid IU100iu/ml*10ml（需冷藏）在給藥 1-3 小時後，建議觀察是否有低血糖症狀或監測血糖濃度。更改為	

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	26/29

修正日期	版本	修正說明	備註
		~在給藥 2 小時後，建議觀察是否有低血糖症狀或監測血糖濃度。(2)增加: NOVOR ※ (警 2) NovoRapid 300U/3ml (需冷藏)，在給藥 2 小時後，建議觀察是否有低血糖症狀或監測血糖濃度。(3)原:FRES※ (管 4) Propofol (Fresofol)1%,10mg/ml*20ml 使用麻醉鎮靜藥品請至少每 15 分鐘監測呼吸、血壓等生命徵象是否穩定；更改為~加護單位在給藥 5 分鐘後應監測呼吸、血壓等生命徵象是否穩定，後續應持續定時監測，手術室外的單位使用則依照麻醉相關作業程序進行。 11. 原:查詢高警訊藥品相關資訊請至中山醫學大學附設醫院首頁／各科訊息／醫事單位-藥劑科／用藥安全／高警訊藥品／高警訊藥品管理辦法 (105 年 05 月 10 日更新)，藥劑科網址 http://nt.csh.org.tw/into/pharm/default.htm，或參照藥劑科高警訊藥品管理辦法 A34030-000-P-002。 更改為~查詢高警訊藥品相關資訊請至中山醫學大學附設醫院首頁／各科訊息／醫事單位-藥劑科／高警訊藥品／高警訊藥品管理辦法 (106 年 03 月 20 日更新)，藥劑科網址 12. 更改附件五:原 7 項改為 6 項:刪除 ACTR※ (警 2) Actrapid IU100iu/ml*10ml (需冷藏)	
107.06.13	4.3	1. 修訂第三項第一、三目及第七項高警訊藥品數量及品項名稱 2. 第三項第五目之 3※ (警 2) Actrapid、※ (警 2) NovoRapid 300U/3ml 之提示視窗新增說明	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
107.07.25	4.4	1. 第三項第一目修訂高警訊二級藥品共 99 項，管制藥 1-4 級共 28 項。 2. 第三項第二目部份說明內容刪修並新增系統及藥袋上於藥名部分以紅字顯示加強辨識。 3. 第三項第三目部份說明內刪修並新增 HIS 系統藥品圖片加註「黃底紅色警字」，加強醫護人員核對提示。 4. 第三項第四目之 4 新增說明內容。 5. 第三項第五目新增 DORM3。 6. 第七項內容修訂。	107 年 07 月 25 日 護理部週會通過

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	27/29

修正日期	版本	修正說明	備註
107.12.13	4.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目之 5 新增說明內容：（除 Morphine、Demerol 需回收至藥局），並刪除（後續委託的廠商將進行玻璃回收、壓碎、高溫等處理）。 3. 第三項第六目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	107 年 12 月 13 日照護標準組會議通過；108 年 01 月 09 日護理長會議通過；108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。
108.04.11	4.6	1. 第三項第一目修訂高警訊二級藥品數量。 2. 第三項第二目之 5；第三項第五目修訂高警訊藥品清單。 3. 第三項第二目之 8 新增高警訊藥物點交項目。 4. 第七項修訂藥物清單。	108 年 04 月 11 日照護標準組會議通過；108 年 05 月 15 日護理長會議通過；108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.04.09	4.6	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
109.10.20	4.7	1. 新增及修訂高警訊藥品品項。 2. 修正第三項第五目高警訊藥品之注意事項內容：修改※（警 2）Actrapid 之提示視窗。 3. 新增口服化療標靶藥物為高警訊品項。	109 年 10 月 08 日照護標準組會議通過；109 年 10 月 14 日護理長會議通過；109 年 10 月 20 日督導會議通過公布。
110.07.06	4.8	依藥局急救車藥品管理辦法修改藥物名稱。	110 年 04 月 01 日照護標準組會議通過；110 年 05 月 12 日護理長會議通過；110 年 07 月 06 日督導會議通過公布
111.05.03	4.9	依據藥劑科制定之 A34030-000-P-002_高警訊藥品管理辦法刪修高警訊藥物品項及細目。	111 年 04 月 07 日照護標準組會議通過；111 年 04 月 13 日護理長會議通過；111 年 05 月 03 日督導會議通過公布。

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	28/29

修正日期	版本	修正說明	備註
111.11.08	5.0	依據藥劑科制定之 A34030-000-P-002_高警訊藥品管理辦法刪修高警訊藥物品項及細目。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.04.06	5.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.09.05	5.1	第三項第四目說明內容修訂。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過；112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.03.19	5.2	1. 依據藥劑科 A34030-000-P-002_高警訊藥品管理辦法，刪修高警訊藥品品項及細目。 2. 新增高警訊藥物第五類：毒劇類中藥。 3. 新增藥品學名欄位。	113 年 02 月 01 日照護標準組會議通過；113 年 03 月 13 日護理長會議通過；113 年 03 月 19 日督導會議通過公布
113.04.16	5.3	1. 第三項第二目之 2.5.6.說明內容修訂。 2. 依據藥劑科制定之 A34030-000-P-002_高警訊藥品管理辦法刪修高警訊藥物品項及細目。	113 年 04 月 11 日照護標準組會議通過；113 年 04 月 16 日督導會議通過公布。
114.04.10	5.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	5.4	「高警訊藥物」更名為「高警訊藥品」。	115 年 02 月 05 日照護標準組會議通過；115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。

主題名稱	高警訊藥品使用作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B15	版本	第 5.3 版	頁碼/總頁數	29/29