

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	一般傷口引流護理作業標準 General Operating Standards to Wound Drainage				
編號	A31000-Q02-W-C17	制定者	N08 李昀臻	公布日期	99 年 07 月 06 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 07 月 08 日
版本/總頁數	第 3.4 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 07 月 08 日

一、目的

使護理人員能瞭解一般傷口引流之護理作業標準。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）一般傷口引流之目的

1. 促進傷口癒合。
2. 預防感染。
3. 使體內積聚液（血水，膿液）排出體外，避免壓迫，刺激周圍器官。
4. 引流各種術後傷口。

（二）一般傷口引流之安全指引

1. 預防感染方面：

- (1) 保持引流袋（瓶）低於腰部以下，防止逆流。
- (2) 遵守無菌原則，執行換藥或接觸引流管（瓶）前後應洗手，並定期更換敷料或引流袋（瓶），必要時使用 Skin-Barrier 果膠類保護皮膚，以預防傷口分泌物侵蝕皮膚。但若是皮膚已經受損，則必須採用親水性的敷料來保護皮膚。
- (3) 維持傷口乾燥，若傷口紗布不慎滲溼時應予以更換。
- (4) 引流袋（瓶）定期更換，更換時依序以 2% chlorhexidine 消毒擦拭接頭處，要避免引流液回流，以避免污染（以 Hemovac 引流者，則無須更換引流袋），並於引流袋註記更換日期。

主題名稱	一般傷口引流護理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C17	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	2/6

(5)視情況依引流量多寡由醫師拔除引流管，並以紗布或敷料覆蓋傷口，維持傷口乾燥，觀察有無感染徵象。

2. 維持良好的引流功能方面：

(1) 引流袋垂掛於床邊，使低於傷口，引流管之長短，避免太長垂落於地上或太短妨礙病人翻身或活動，且引流管應有適當固定。

(2) 採半坐臥式，鼓勵病人翻身，可促進傷口引流液之引流，儘可能即早下床活動。

(3) 引流液達引流袋的一半量時，應立即傾倒，紀錄其引流液之性質；當引流液排空後將引流袋壓扁，以重建負壓引流效果。

(4) 如為橡皮引流管引流不暢通時，可以一手固定近端之引流管，再予以拉擠(Milking)，可促其通暢，注意勿使引流管扭曲。

(5) 若使用 Penrose 類引流管來接引流袋時，則常在 Penrose 上以消毒之安全別針固定，以免滑入傷口內。

(三) 若觀察到有異常徵象與症狀，應立即通知醫師處理

1. 發燒，劇烈嘔吐，腹痛。
2. 引流管滑脫。
3. 引流出大量鮮紅色血液。
4. 引流量突然減少或無引流量，且紗布滲液多。
5. 傷口紅腫熱痛，並有膿樣分泌物。

(四) 需給予的衛生教育

1. 教導病人保持傷口敷料乾淨，注意勿使引流管扭曲。
2. 鼓勵病人翻身，可促進傷口引流液之引流。
3. 引流袋自然垂掛於床邊，使低於傷口，避免引流液回流，並避免污染。

(五) 需記錄之重要事項

1. 引流管種類、部位、數目及是否通暢。

主題名稱	一般傷口引流護理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C17	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	3/6

2. 傷口情況、敷料用量。
3. 引流液之量、味道及性質如顏色、是否有異味或沉澱物等。
4. 是否有異常徵象與症狀。

（六）常見的引流管種類

1. Penrose：是一種薄而扁平內徑約 2.5~6 cm 的引流管，藉毛細現象將滲液吸出體外，適用於較小、未有合併症的傷口，可依據其引流量適度的剪短。
2. Hemovac：利用『負壓真空抽吸引流』，多用於骨科、乳房等非腹部手術引流。可收集 500cc 之大量引流液，使用前及倒出引流液後須將容器壓扁，當引流帶充滿 1/2 時須排空。
3. Vacuum ball：利用『負壓真空抽吸引流』，多用於泌尿外科、乳房切除、頭頸部（甲狀腺手術）及骨科術後。使用方法與 Hemovac 相同。
4. Rubber Drain：可以承接引流袋，適用於滲出物較多的傷口，是最常用的引流管之一。
5. T-tube：是一種 T 字型引流管，可外接小腿集尿袋，常於膽道手術中置放於被打開的 CBD（總膽管）中，以引流膽汁。

（七）注意事項

1. 若同時有多處傷口，應依照無菌原則，宜先換無引流管的傷口，再換有引流管之傷口，引流管種類、部位、數目及是否通暢。
2. 各類引流管出口要明確標示其名稱及功能，列為重要的交班內容；更換引流袋時，必須確認管路的來源及接管之正確性。
3. 治療時應圍上床簾以維護病人的隱私。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	一般傷口引流護理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C17	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	4/6

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 蘇麗智、簡淑真、劉波兒、蘇惠珍、林靜娟、呂麗卿...李美雲等(2012)．實用基本護理學（六版，545-618 頁）．台北：華杏。
- (二) 臺大醫院護理部(2001)．傷口引流護理．於陳月枝總校閱，臺大護理技術（320-323 頁）．台北：華杏。
- (三) 台北榮民總醫院(2009)．傷口引流管的護理．2009 年 10 月 5 日取自
http://www.vghtpe.gov.tw/iframe_pat03b.html
- (四) 羅夢伶(2015)．手術病人之護理．於胡月娟總校閱，內外科護理學（五版，724-727 頁）．台北：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	一般傷口引流護理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C17	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.07.06	1.0	新制定。	99 年 07 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.06.01	2.1	合併指引：執行換藥或接觸引流管前後應洗手。	100 年 06 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.02	3.1	新增第六項參考資料。	104 年 06 月 02 日 護理部照護標準 委員會通過。
105.06.07	3.2	更新第六項參考資料。	105 年 06 月 07 日 護理部照護標準 委員會通過。
106.06.05	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.04	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.06.06	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過;108 年 06 月 12 日護理長會議 通過;108 年 06 月 18 日督導會議通 過公布。
110.07.08	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	一般傷口引流護理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C17	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
112.06.08	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.07.08	3.4	1.第三項第二目第 1 點之(4)：酒精性優碘及酒精棉球更改為 2% chlorhexidine。 2.第三項第二目第 2 點之(5)：刪除：（一般之 Rubber Tube 或 Nelaton Tube，大多會以消毒之安全別針固定，以免滑入傷口）。	114 年 06 月 11 日照護標準組會議通過;114 年 06 月 11 日護理長會議通過;114 年 07 月 08 日督導會議通過公布。