



中山醫學大學附設醫院

Chung Shan Medical University Hospital

約束紀錄單

病人資料

日期	次數	原因	方法	醫囑	起訖時間	項目	— : —			— : —			— : —			— : —			— : —			備註
							查看	翻身	鬆開	查看	翻身	鬆開	查看	翻身	鬆開	查看	翻身	鬆開	查看	翻身	鬆開	
					— : —	執行																
					— : —	簽名																
					— : —	執行																
					— : —	簽名																
					— : —	執行																
					— : —	簽名																
					— : —	執行																
					— : —	簽名																
					— : —	執行																
					— : —	簽名																
					— : —	執行																
					— : —	簽名																
					— : —	執行																
					— : —	簽名																
					— : —	執行																
					— : —	簽名																
					— : —	執行																
					— : —	簽名																

2009/12/29 病歷管理委員會審核通過

約束記錄備註：

約束的原因：

1. 預防病患傷害自己或他人
2. 預防意識不清且躁動不安的病患發生意外及醫療設備被扯落
3. 執行特殊照護或技術時使用固定不動

約束的方法：

1. 四肢約束法：限制肢體的活動，以免病患拔除引流管，或搔抓傷口縫合處
2. 軀幹約束法：較適合短時間使用，預防病患自床上跌落，可採用胸式約束法於躁動的病患
或使用木乃伊包裹法於嬰幼兒。此法易造成制動的問題，常是最後才使用的約束方法
3. 床欄約束法：阻止病患離開床或由床上跌落
4. 手肘、膝蓋約束法：避免肘、膝的彎曲，較適用於嬰兒和幼童
5. 手套約束法：限制手指的活動，避免抓傷，或拉扯引流管及敷料，約束時應讓病患抓握手捲，以保持手指於正常位置

約束時的注意事項：

1. 勿為了工作的方便使用約束，約束應為必要的治療性措施
2. 核對醫囑，並且提供適當的約束法，不以約束來威脅或懲罰病患
3. 約束前向病患及其家屬解釋使用約束的理由，以得到病患和家屬的瞭解
4. 結繩於床的本體，而非床上活動的支架、欄杆
5. 預防約束部位的損傷：
 - (1) 對於被約束的病患，至少每30分鐘觀察約束部位的循環、溫度、感覺和活動的狀況；
精神科病患則至少15分探視一次
 - (2) 約束時，維持身體的功能位置，鬆緊度應適宜，以能伸入1~2隻手指為原則
 - (3) 每2小時鬆開約束時部位，協助病患變換姿位
6. 滿足病患被約束時的身體基本需要
7. 置紅燈線於病患可觸及處
8. 詳細記錄發生原因及處理經過於護理記錄上。

記錄範例說明：

次數：約束的次數 原因：以1、2、3表示（參考備註） 方法：以1、2、3表示（參考備註）

醫囑：有醫囑則打勾

起訖時間：約束開始及約束結止

執行：已執行打勾

翻身：L=左邊代表 Left、M=中位代表 Middle、R=右邊代表 Right，各別表示卧位

日期	次數	原因	方法	醫囑	起訖時間	項目	8：00			8：30			9：00			__：__			__：__			備註
							查看	翻身	鬆開	查看	翻身	鬆開	查看	翻身	鬆開	查看	翻身	鬆開	查看	翻身	鬆開	
7/2	1	2	1	√	8：00	執行	√	R		√	L	√	√	M	√							
					9：00	簽名	淑 珍			淑 珍												