

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	靜脈注射及灌注評核表	編 號	A31000-Q06-F-A11
			版 本	第 3.0 版
	制定 單位	護理部	修正日期	113 年 05 月 21 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：

1. 實際操作或口述。
2. 評核護理紀錄。

三、評核內容：

1. 準備給液系統：

- a. 核對醫囑後，三讀五對取出給液溶液。
- b. 特殊藥物，先點選藥物圖片進入藥典系統查詢注意事項及配製方法，確認稀釋溶液及是否有「獨立 line 輸注」或「不可與含鈣溶液混合注射」之提示，如：Vancomycin, Rocephin(Ceftriaxone)及 Mycamine 等。
- c. 點滴瓶上貼上病人基本資料與專用標籤，使用高警訊藥物則以紅筆註明。
- d. 能遵守無菌原則使用新的使用新的注射針及針筒抽取藥物。
- e. 如有剩藥可標示正確開封日期、使用期限（應依廠商說明開封後使用期限，如說明書未載使用期限，則最長不可超過 28 天）。
- f. 不可將針頭留置於藥品上重複抽取藥物。
- g. 單一劑量或單次使用藥品限單一病人使用。
- h. 取出靜脈給液套並關上管夾。
- i. 在滴室下方貼上到期日期標籤。
- j. 插入已消毒之瓶塞。
- k. 擠壓滴室使其充滿 1/2~1/3 的溶液並排氣。

2. 進行靜脈注射：

- a. 綁上止血帶。
- b. 依序以棉籤沾 75%Alcohol → 2%Tincture-Iodine → 75%Alcohol，或是使用 2%Chlorhexidine 消毒皮膚，由內往外環狀消毒，直徑約 3 吋（7.62cm），應等上次的消毒液風乾後，再塗擦下一個消毒液及注射。（※2%Chlorhexidin 不適用 2 個月以下嬰幼兒）
- c. 從遠端肢體→近端，On 上靜脈留置針後，接上給液管路。
- d. 標示注射日期及更換日期（或貼上更換日之貼紙）。
- e. 硬針丟至針頭收集盒。
- f. 注射後針具（包括針頭、針筒、注射藥品使用的管路 tubing 及轉接器 connector）能依醫療廢棄物處理正確丟棄，不可重複使用及能正確記錄。

3. 進行靜脈給液：

- a. 接上靜脈導管，打開管夾並調整滴速。
- b. 評估穿刺部位有無腫脹情形。

（若小於 3 歲之幼童對於不適症狀無法清楚表達，若其出現哭鬧不止的反應，請移除遮蓋物，並檢視靜脈留置針注射部位上方是否有皮膚蒼白、腫脹、輸液滲漏等情形）

- c. 以 Tegaderm 及膠布固定穿刺部位及靜脈給液導管。

4. 紀錄溶液種類、量、時間滴速、病人反應及交班事宜。

