

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	皮內注射評核表	編 號	A31000-Q06-F-A14
			版 本	第 2.2 版
	制定 單位	護理部	修正日期	108 年 03 月 18 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：

1. 護理人員實際操作或口述。
2. 查核護理記錄。

三、評核內容：

1. 能正確核對醫囑及辨識病人。
2. 能遵守無菌原則使用新的注射針及針筒抽取藥物，
3. 如有剩藥可標示正確開封日期、使用期限（應依廠商說明開封後使用期限，如說明書未載使用期限，則最長不超過 28 天）。
4. 不可將針頭留置於藥品上重複抽取藥物。
5. 單一劑量或單次使用藥品限單一病人使用。
6. 正確執行消毒方法。
7. 能正確執行注射
 - (1) 正確注射部位(最常見部位為前臂中段內側，或上臂外側、背部肩胛骨及下方、前胸的鎖骨下方。
 - (2) 針頭與皮膚成 5-15 度角使針頭針眼斜面全部插入皮內組織。
 - (3) 不反抽針心，緩慢連續性地注入藥液，使皮膚凸出一個小水泡，直徑約 0.8cm。
 - (4) 正確在注射處用藍筆沿注射部位邊緣處劃圈，並註明時間。
8. 注射後針具（包括針頭、針筒、注射藥品使用的管路 tubing 及轉接器 connector）能依醫療廢棄物處理正確丟棄，不可重複使用及能正確記錄。

單位：_____

評核者：_____

日期	被 評核者	床號	評核內容											皮內注射 正確率(%)	安全注射行 為正確率(%)
			1	2	3	4	5	6	7(1)	7(2)	7(3)	7(4)	8		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%

5.黃色標記之項次 2.3.4.5.6.8 為安全注射行為之評核內容。

6.皮內注射正確率(%)：計算全部項次。

7.安全注射行為正確率(%)：僅計算 2.3.4.5.6.8 項次