

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	口服給藥法評核表	編 號	A31000-Q06-F-A15
			版 本	第 2.5 版
	制定 單位	護理部	修正日期	108 年 03 月 18 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員、意識清楚且無學習障礙的病人或病人的主要照顧者（含中興分院）。
（門診、OR 不適用）

二、評核方式：

1. 請病人或主要照顧者回答相關問題。
2. 查核護理記錄。

三、評核內容：

1. 詢問病人或主要照顧者：
 - a. 病人或主要照顧者能正確說出藥物作用一項以上。
 - b. 病人或主要照顧者能正確說出藥物副作用一項以上。
2. 查核記錄：臨時醫囑給藥後 30 分鐘有確實評值。
3. 護理人員：
 - a. 辨識病人方式：核對病人床頭卡、病歷、手圈、及引導病人或家屬自述其姓名及加問第二道識別資料（如出生年月日、身分證字號等）（2 項以上）。
 - b. 給藥時三讀五對：
 - (1) 從 UD 車或藥盒取出藥袋時，藥袋上之姓名、藥名、劑量、途徑、時間與 HIS 系統護理執行之醫囑相符（一讀五對）。
 - (2) 藥物自藥袋取出時，核對藥物與 HIS 系統護理執行之醫囑相符：姓名、藥名、劑量、途徑、時間相符（二讀五對）。
 - (3) 藥袋放回藥盒前或丟棄前，藥袋再次與 HIS 系統護理執行之醫囑相符：姓名、藥名、劑量、途徑、時間相符（三讀五對）。
 - c. 給藥前確認病人正確，再次核對執行給藥時「五對」：姓名、藥名、劑量、途徑、時間。
 - d. 瞭解藥物作用或副作用。
 - e. 拒藥時之處理是否正確（應先不發藥），護理人員親視病人服藥。
 - f. 若同時準備好當班之口服藥物時，需於每次給藥前再次執行取藥時之三讀以確認。
4. 藥物必需磨粉時：
 - a. 將藥置於研鉢中磨碎，將藥粉置於包藥紙中包好。
 - b. 研鉢使用後應立刻洗淨晾乾，避免藥物殘渣於研鉢內。
 - c. 避免將不同材質磨藥組的鉢、杵放一起使用，以免磨出非藥物的成份。

