

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	結腸造口灌洗評核表	編號	A31000-Q06-F-B04
	制定單位	護理部	版本	第 2.3 版
			修正日期	108 年 06 月 17 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：全院各單位的護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：至病人處查核或以口述或實際演練方式表現其平常結腸造口灌洗的觀念與技術。

三、評核內容：

1. 向病人及其家屬解釋整個過程及應注意事項，並拉上隔簾或圍上屏風。
2. 協助病人採側臥、半坐臥或坐姿，若體力夠，可直接坐在馬桶上。
3. 將不滲水布中單置於造口側下方，彎盆、便盆置於易取處。
4. 帶上手套，取下病人的人工造口袋，以濕紗或濕巾輕拭周圍，置污物於彎盆內。
5. 為病人黏上（或扣上）灌洗袋，尾端置於便盆內。若病人坐於馬桶上，則尾端直接放入馬桶內。打開灌洗袋控制鈕，於彎盆排除導管內空氣。
6. 於錐狀灌洗頭處塗上潤滑劑，並以食指沾潤滑劑伸入造口內約 5 公分，並擴張約 1 分鐘，將錐狀頭緩慢插入造口處約 5 公分，以手稍加壓固定，使錐狀頭盡量與造口處密合。
7. 打開控制鈕，使溶液緩緩流入，時間約 5-10 分鐘，適量後關上控制鈕。灌洗的水量依病人反應而定，最初 50c.c.漸增至 500-800 cc。灌洗時，觀察病人反應，若有疼痛厲害或灌入受阻，則暫停，可輕輕按摩病人腹部或教病人深呼吸，待症狀消失再調快速度。
8. 灌完後，勿馬上移除錐狀灌洗頭，使其加壓 3-5 分鐘。移去錐狀頭，使排出液順著灌洗袋流至便盆或馬桶內。
9. 教導病人在腹部作順時鐘環狀按摩，以利液體排出，整個過程約 30-60 分鐘。
10. 完全排出後，移去灌洗袋及繫腰帶，灌洗袋置彎盆內。
11. 造口處以濕紗或濕巾輕拭乾淨，貼上人造皮保護墊，再黏上造口袋。若糞便已成形，且能定期排便，則只需在造口上蓋上紗布。
12. 整理用物，若灌洗用具下次還要使用，則以清水洗淨、晾乾。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評 核 內 容												正確率 (%)	備註
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

註： 1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 表示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%