

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	胸腔放液穿刺術評核表	編號	A31000-Q06-F-B11
			版本	第 2.3 版
	制定 單位	護理部	修正日期	108 年 06 月 17 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：至病人處查核或以口述或實際演練。

三、評核內容：

1. 向病人及家屬解釋治療目的與過程並請病人或家屬簽署同意書。
2. 協助病人採坐姿：
 - a. 可讓病人坐於床緣，足部給予支托，將頭及雙手臂枕於床上桌。
 - b. 利用有靠背的椅子反坐，使二腿跨坐椅上，雙手臂及頭枕於椅背上。
 - c. 若病人極軟弱無法坐起，可採臥姿，床頭抬高 30~40 度，且稍臥向健側，可提供枕頭支持肢體，促進舒適，並將要做穿刺部位的同側手臂上舉，越過頭部到對側。
3. 協助醫師進行胸腔放液穿刺術：醫師放置 20G 2"IC 完成後接上三路活塞，並於三路活塞一端接上 20 c.c.空針，另一端接上輸液套管及無菌空瓶。引流液 30 分鐘內不要超過 1200 c.c.，以免造成合併症。
4. 協助病人躺向患側加壓 3-5 分鐘。
5. 記錄抽出液之性質、顏色、量及黏稠度、放液時間及病人檢查前後的呼吸狀況等情形。
6. 觀察病人有無不良反應，如眩暈、胸部有壓迫感、咳嗽不止或咳血等：胸腔放液穿刺可能造成之合併症:氣胸、皮下氣腫、膿性感染。若液體大量被抽出時，可能會造成縱膈腔突然移位，引起肺水腫，甚至壓迫心臟而休克。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評 核 內 容								正確率 (%)	備註
			1	2a	2b	2c	3	4	5	6		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%