

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血液採檢技術評核表	編 號	A31000-Q06-F-B40
			版 本	第 3.5 版
	制定 單位	護理部	修正日期	114 年 09 月 15 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（不適用單位：OPD、OR）。

二、評核方式：

護理人員以口述或實際操作。

三、評核內容：

- 核對醫囑及備管方式：護理人員確認HIS醫囑並核對姓名、床號、病歷號、及檢驗項目，依醫囑中採血項目取出正確之試管，並在試管上貼上病人基本資料的條碼貼紙，檢驗單上需蓋確認章(cross-matching採檢時)。
- 血型及cross-matching採檢時之核對方式：要與另一位護理人員於HIS護理系統雙重核對後，列印條碼貼紙貼於試管上。
- 採血前核對：以兩種以上方式辨識病人並再次核對試管上之條碼貼紙是否正確。
- 選擇採血部位後進行採血：綁上止血帶打一活結，並請病人握拳，從遠端到近端肢體尋找適當的血管。選定血管後，如病人皮膚表面有髒汙時需先用溼紙巾/蘆薈泡沫清潔，再以酒精棉片由內往外環狀消毒2-3吋採血部位，待皮膚上酒精蒸發，下針前告知病人，以BD翼型安全採血套組、BD安全血液檢體移轉連接器穿刺靜脈抽取適量血量。
- 執行血液培養時之步驟：
 - 先以2%Chlorhexidine消毒培養瓶口。
 - 病人皮膚表面若有髒汙先清潔(濕紙巾/蘆薈泡沫清潔)。
 - 以2%Chlorhexidine由內往外環狀消毒3吋。
 - 血液注入培養瓶順序：使用安全採血套組時，先注入嗜氧瓶(Aerobic)後再注入厭氧瓶(Anaerobic)；使用空針採血時，需先更換另一支新的針頭後，注入厭氧瓶(Anaerobic)，再注入嗜氧瓶(Aerobic)。
- 採血後於靜脈內進行按壓退針處，採血部位加壓5-10分鐘（視病人情況而定），執行針頭回縮動作，直接丟入尖銳物收集盒內。
- 至HIS檢驗檢體傳送系統完成總包送檢。
- 抽靜脈血之禁忌部位：點滴輸注或輸血之同側手臂、水腫部位、血塊部位、疤痕部位、乳房移植或手術同側手臂、動靜脈瘻管或任何導管同側手臂。

