

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	週邊置入中心靜脈導管沖洗護理 評核表	編號	A31000-Q06-F-B42
			版本	第 2.9 版
	制定 單位	護理部	修正日期	114 年 12 月 15 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：全院各單位（含中興分院）。

二、評核方式：

1. 請受試者以口述法或實際演練法。
2. 查核交班單或護理記錄。

三、評核內容：

1. 更換新的注射帽：
 - a. PICC 接頭處的消毒順序為 75%Alcohol→2%Tincture-Iodine→75%Alcohol 或是使用 2%Chlorhexidine 消毒。每次塗擦應等上次的消毒液風乾後，再塗擦下一消毒液。
 - b. 以無菌技術更換新的注射帽。
2. 沖洗前先確認導管無滑脫，並測試導管是否會回血。
3. PICC 末端導管可分為密閉式(closed-ended)及開放式(open-ended)，其導管沖洗方式如下：
 - a. 密閉式(closed-ended)末端：使用 0.9%生理食鹽水 10c.c.進行沖洗封管，並更換新的注射帽。
 - b. 開放式(open-ended)末端：使用 0.9%生理食鹽水 10c.c.沖洗後，再使用海派封管沖洗液 3-5c.c.(300-500 IU)進行沖洗封管，並更換新的注射帽。（台灣腫瘤護理學會之靜脈導管臨床照護指引建議：肝素沖洗量為 3-5 c.c.且肝素濃度為 heparin 100 units/ml）。
 - c. 脈衝式正壓方式沖洗技術：推→停→推→停。
4. 沖洗時機：
 - a. 持續性的滴注點滴，建議需每 12 小時執行一次導管沖洗，若是 TPN 或 PPN 建議每 8 小時視情況予沖洗。
 - b. 間歇性的滴注點滴時，需在每次使用後執行一次導管沖洗。
 - c. 導管未輸液期間，每 7 天執行一次導管沖洗。
 - d. 每次輸完血或測完回血後。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床 號	評 核 內 容										正確率 (%)	備 註
			1a	1b	2	3a	3b	3c	4a	4b	4c	4d		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%