

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	協助電氣痙攣治療評核表	編號	A31000-Q06-F-B47
	制定單位	護理部	版本	第 1.4 版
			修正日期	113 年 07 月 02 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：精神科護理人員。

二、評核方式：

1. 以口述或實際執行方式協助電氣痙攣治療。
2. 查核護理記錄。

三、評核內容：

1. 治療前準備：

- a. 確認病人並已完成電氣痙攣治療同意書、麻醉同意書及自費手術麻醉費同意書填寫。
- b. 治療前一日須洗頭髮，清除油垢。
- c. 禁食 6-8 小時，測量生命徵象，治療前排空膀胱，取下身上飾品及活動假牙，病人勿化妝、口紅及擦指甲油。
- d. 急救車及 DC shock 備於床旁並插電。

2. 治療過程：

- a. 連接三合一生理監視器及使用壓舌板並依醫囑鼻導管給氧 3L/min。
- b. 在兩側額顳處及身體指定部位貼上 2 個金屬導電貼片及 9 個導極貼片。
- c. 固定額頭及下顎處及雙側肩、肘、髖、膝關節
- d. 麻醉科醫師以靜脈注射給予 Glycopyrodyn 減少唾液分泌、短效之靜脈全身麻醉劑 Fresofol 後確認病人進入深沉睡眠，精神科醫師準備第一次通電誘發其痙攣大發作。
- e. 第一次痙攣結束，休息一分鐘，麻醉科醫師評估意識、是否再給予藥物 Fresofol，精神科醫師進行第二次通電誘發其痙攣大發作。

3. 治療後護理：

- a. 痙攣結束後維持呼吸道通暢，取出壓舌板。
- b. 持續使用三合一生理監視器及血氧監測器，移除電痙攣治療貼片。
- c. 使用床欄防止跌倒。
- d. 記錄治療前、第一次痙攣結束、第二次痙攣結束的生命徵象、血氧濃度變化，治療結束後每 5 分鐘記錄生命徵象、血氧濃度變化且持續 30 分鐘。
- e. 病人清醒後評估是否有不適副作用、步態、平衡測試、四肢肌力，無不良反應再協助返回個人病室休息或提供飲水觀察吞嚥反應。
- f. 將病人治療情形註明於護理紀錄並執行 HIS 計價。

