

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	兒用鼻胃管置放及灌食評核表	編號	A31000-Q06-F-D04
	制定單位	護理部	版本	第 2.4 版
			修正日期	114 年 04 月 08 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：

護理人員口述或執行兒用鼻胃管之護理與技術。

三、評核內容：

1. On N-G Tube 之技術。

- 選擇病人適合之 N-G Tube，並測量插入長度（鼻尖至耳垂再至劍突或由口插入胃管：嘴角至耳垂再至劍突）。
- N-G Tube 前端以溫開水或 Jelly 潤濕。
- 採仰臥，抬高頭部 20~30 度。
- 測試 N-G Tube 是否在胃內（反抽可抽出胃液；置聽診器於胃部位置，以空針打入 1~2cc 之空氣，應可聽到空氣入胃的聲音，然後再將空氣回抽）。
- 以麻醉膠布固定並標明插入日期及到期日。

2. N-G Feeding 之技術

- 確定鼻胃管位置。
- 以空針反抽胃內容物，並觀察消化情形。
- 抬高針筒使液面到胃部距離 6~8 吋(15~20 公分)，藉重力原理讓溶液流入胃內。
- Feeding 後倒入 1~2cc 溫開水清潔 N-G Tube（若為長的鼻胃管，則需倒入 10cc 溫開水）。
- Feeding 後抬高頭部 20~30 度並採右側臥。
- N-G Tube 每七天更換，應注意輪流插不同的鼻孔，每天給予鼻胃管護理並旋轉 45~90 度及口腔護理。
- 拔除鼻胃管時應先將鼻胃管反抽後再拔出，以避免吸入性肺炎。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床 號	評 核 內 容												正確率 (%)	備 註
			1a	1b	1c	1d	1e	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g		

註： 1. 正確：以 V 表示 2. 不正確：以 X 表示 3. 不適用：以一表示

4. 正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%