

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	小兒中心靜脈導管插入術評核表	編號	A31000-Q06-F-D13
	制定單位	護理部	版本	第 2.5 版
			修正日期	110 年 12 月 13 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：請受試者以口述或實際操作。

三、評核內容：

- 核對醫囑並辨識病人（至少二種以上方法），並向病人或家屬解釋小兒中心靜脈導管插入治療之目的及填寫同意書。
- 洗手準備用物。
- 圍上屏風或窗簾注意病人隱蔽性。
- 將 CVP 模組及導線置於 EKG monitor 上。
- 將 CVP pressure 導線及 kit 固定於點滴架上將 CVP set 與 0.9% 500ccN/S 注射液（內含 Heparin 200u）接上，並將 pressure bag 加壓至 300 mm Hg 後再排氣。
- 將 EKG monitor 之 CVP 功能打開，並設定正常值及適當壓力。
- 依醫囑予以保護性約束（必要時可依醫師醫囑給予鎮定劑）。
 - 使病人平躺，若從內頸靜脈或鎖骨下靜脈插入時，宜將其頭部轉向對側，並在肩下置一枕頭，使靜脈充盈易插入，可減少空氣栓塞。
 - 若從股靜脈插入時，宜在病童腰下墊大毛巾，使靜脈充盈。
- 以大棉棒沾 2% Tr.Iodine 及 75% Alcohol 之消毒液遞給醫師，消毒欲穿刺部位。
- 遞給醫師無菌手套，及協助醫師取出無菌治巾及小眼洞巾，鋪一無菌區以露出穿刺部位。
- 以無菌技術將紗布、5ml 空針及 20 或 22 號針置於無菌面上。
- 消毒麻醉藥瓶口，協助醫師以注射器抽取 2% Xylocaine 3-5c.c，由醫師於插入部位施行局部麻醉。
- 護理人員將中心靜脈導管外包裝拆開，由醫師拿取。
- 穿刺步驟：
 - 醫師以 20 號或 22 號穿刺針採 30-45 度角施行穿刺後，至靜脈血流出為止。
 - 先後將 Guide wire 及 dilator 輔助中心靜脈導管推入靜脈內。
 - 由醫師取空針反抽確定有回血後，再將血 push 回靜脈內，並鎖緊點滴帽及夾住 catheter。
- 以無菌技術遞給醫師縫合用物，以協助醫師在蝴蝶片處之皮膚縫合固定。
- 將 monitor 接於 CVP 近側端（Distal 端）。
- 清潔血跡及消毒（0.9% N/S+B-Iodine）後，直接用 OP site 貼於導管與皮膚接合處。
- 取下洞巾，並接上 T-connect 及 CVP set。
- 使病人平躺對準右心房及 CVP monitor 零點，以測出 CVP 值(正常為：8-12 cmH₂O)。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	小兒中心靜脈導管插入術評核表	編 號	A31000-Q06-F-D13
			版 本	第 2.5 版
	制定 單位	護理部	修正日期	110 年 12 月 13 日
			頁數/總頁數	2/2

單位：_____

評核者：_____

[illegible]

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%