

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	皮內注射技術 Intradermic Injection ; I.D. ; Intracutaneous Injection ; I.C.					
	編號	A31000-Q05-W-A14	制定者	SI 王寶珍	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日	
版本/總頁數	第 4.0 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日	

一、目的

護理人員能正確操作皮內注射技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

測敏感性，如 Tuberculin test。



（二）用物準備

護理工作車 1 台，用物含以下：


- (1)消毒酒精棉片。
- (2)無菌安全式空針視需要選擇尺寸。
- (3)針頭收集筒。
- (4)藥物依醫囑。
- (5)藍色原子筆。

主題名稱	皮內注射法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A14	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/8



(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
1. 工作前洗手。	
2. 準備用物： (1) 將護理工作車推至病人單位，核對 HIS 系統／護理執行，核對處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率／核對狀態，核簽“正確”。	
(2) 核對醫囑取出所需藥物進行三讀五對。	1. 三讀五對（同口服給藥技術）。 2. 注意藥物使用期限、是否變質。
3. 以二種以上方式辨識病人。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
4. 向病人及家屬解釋目的及注意事項並評估病人且建立其安全感以取得合作。	
5. 拆開空針及針頭包裝套，取出空針，並接好針頭。	注意勿污染無菌區，針頭與針筒必須旋緊，針頭斜面對準刻度。  滑蓋式安全空針  針頭套 — 針頭 — 針筒 滑蓋式安全針具
6. 備藥方法： (1) 從 vial 或 Ampule 抽取藥物。	1. 以無菌操作技術在清潔乾淨區域準備注射藥品，注射針、針筒、注射藥品使用的管路(tubing)和轉接器(connector)等，只能使用於單一病人。 2. 遵守無菌原則；應使用新的注射針和針筒進入藥瓶抽取藥品，不可將針頭留置於藥瓶上重複抽取藥品，且病人使用過注射針和針筒不可重複使用。
(2) 抽取正確的試驗藥物。	1. 需注意正確之劑量。

主題名稱	皮內注射法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A14	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
	2. 多劑量包裝的藥品在開封後應標註開封日期，並依廠商說明使用，超過開封後可使用期限應立即丟棄；若廠商說明書未載明開封後可使用期限，則最長不可超過 28 天。 2. 如為單一劑量包裝或單次使用的小瓶裝、安剖瓶僅限單一病人使用。
(3)將空針及針頭內之空氣排出。	防止空氣灌入組織。
(4) 套上針頭套（單手回套），將空針針頭朝外，針心朝內放入原本裝空針的塑膠套內（避免污染）。	
7.準備病人：協助病人露出正確注射部位，選擇色澤淺、毛髮少且皮膚層淺薄而完整處。 (1)以 75%酒精棉片於注射部位由內往外環狀消毒，直徑 3 吋(7.62cm)，待酒精揮發後即可注射。	常用部位： 1. 前臂中段內側----最常用。 2. 上臂外側。 3. 前胸鎖骨下方。 4. 背部肩胛骨下方。 勿用有顏色及刺激性強之消毒溶液，以免影響反應結果之判斷。
8.為病人注射：遵守無菌原則。 (1)手持空針，除去針頭套，再檢視空針內有無空氣並排除。	
(2)取一酒精棉片，置於易取得之處。	
(3)用手繃緊注射部位。	
(4)手持空針使針頭與皮膚成 5-15 度角使針頭針眼斜面全部插入皮內組織。  皮膚與針頭呈 5-15 度注射	針頭斜面與針筒之刻度必須朝上，避免注入時，藥液滲出。 固定方法：不換手，右手支撐注射角度及固定針頭，避免動搖針頭而增加病人的不舒適。
(5)手緩慢的放鬆皮膚（不反抽針心），緩慢連續性地注入藥液約 0.1cc，使皮膚凸出一個小水泡，直徑約 0.8cm。	注射時須觀察病人全身之反應，若有異常應立即停止注射，通知醫師。

主題名稱	皮內注射法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A14	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
(6)A.手離開針心推柄，另一手迅速拔出針頭，注射完畢依規定針頭不回套，若為滑蓋式安全針具，注射完滑動護套包覆針頭，丟棄針頭於針頭回收筒，針筒丟棄於感染性垃圾桶，不可重複使用。 B.以酒精棉片輕拭水泡周圍的藥液或血液，但勿按壓。	 滑蓋式安全注射針，注射完滑動護套包覆針頭。 注射部位不要揉，並囑病人勿以手抓注射部位。
(7)用藍筆沿注射部位邊緣處劃圈，並註明時間。	勿用紅筆，以免影響判讀結果。 
(8)告知病人判讀的時間，以降低病人焦慮，有任何不適之反應，應馬上通知。	告知病人不可擦去記號及觀察時間。
(9)協助病人恢復舒適臥位並整理周圍環境。	
9. 工作後洗手。	
10. 完成 HIS 系統／「護理執行」／「執行狀態」核簽「已執行」。	
11. 記錄： (1) 記錄時間、藥名、部位、病人反應等。	
(2) 按時請醫師檢查結果與反應，並將結果 Positive 或 Negative 紀錄於醫囑及護理記錄中。	
12. 注意事項：一般診斷試驗如 PPD 應在注射後 48-72 小時看反應。	

主題名稱	皮內注射法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A14	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/8

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 林文絹等(2019)·皮內注射法，基本護理學-OSCE 技術篇 (185-189 頁)·台北：華杏。
- (二) 曾雀芬 (2023)·皮內注射法·於王月琴等編著·基本護理學 (下冊)(13-45 - 13-49 頁)·永大。
- (三) 蘇麗智等(2021)·皮內注射法，實用基本護理學 (下)(八版，206-210 頁)·台北：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	皮內注射法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A14	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定	89 年 01 月 31 日 護理部技術標準 委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.02.01	2.1	增加皮內注射圖片	101 年 02 月 01 日 護理部技術標準 委員會通過
101.10.03	2.2	1. 步驟 8(4)說明刪除：對照組用 1cc 空針抽取 0.5 cc 之 N.S.或 0.5 cc 之蒸餾水。 2. 步驟 9(2)刪除：一手打試驗藥物，若需對照組則在另一手打對照藥液。步驟 9(2)說明刪除：病人的右手先注入 Distill water 0.1 cc 再於左手注入測驗藥物 0.1 cc。注射量最多不超過 0.1 cc。	101 年 10 月 03 日 通過護理部技術 標準委員會。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.03.18	3.1	1. 用物準備新增：消毒溶液(75%酒精、2% Chlorhexidine)。 2. 步驟及要點說明內容部份修辭及更新參考資料版本。	103 年 03 月 18 日 通過護理部技術 標準委員會。
104.03.17	3.2	1. 第三項第(三)目步驟及要點說明內容部份修正。 2. 修正第六項參考資料版本。	104 年 03 月 17 日 護理部技術標準 委員會通過
105.03.15	3.3	1. 第三項第(三)目之 2(1)及 10 刪除護理系統改為 HIS 系統。 2. 增修第三項第(三)目之 3 病人辨識統一說明。	105 年 03 月 15 日 護理部技術標準 委員會通過
106.03.14	3.4	1. 第三項第(二)、(三)目說明內容增修安全針具使用及圖示說明。 2. 第三項第(三)目之 11(2)部分內容刪修。 3. 更新第六項參考資料。	106 年 03 月 14 日 護理部技術標準 委員會通過
107.05.09	3.5	1. 第三項第二、三目刪除消毒溶液(75%酒精、2%Chlorhexidine)、乾棉片罐、泡鏽罐及鏽子。 2. 第六項第一目參考資料修訂。	107 年 05 月 09 日 護理長會議通過

主題名稱	皮內注射法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A14	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/8

修正日期	版本	修正說明	備註
108.03.18	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目用物準備文字修訂。 3. 第三項第三目步驟及要點說明：第 5 點文字修訂、第 6 點新增說明、6(2)新增步驟說明、6(4)增加圖片、8(6) 步驟說明修訂。 4. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 5. 第六項參考資料修訂。	108 年 03 月 18 日護理技術組會議通過；108 年 04 月 10 日護理長會議通過；108 年 04 月 23 日督導會議通過公布。
109.03.16	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	3.7	1. 第三項第一目之刪除測過敏反應，如 Penicillin test。 2. 第三項第三目之 2 刪除說明：先詢問是否有過敏史 3. 第三項第三目之 6 說明文字修訂。 4. 第三項第三目之 12(1)刪除說明。 5. 第三項第四目整目刪除。	110 年 09 月 23 日護理技術組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布
111.03.21	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.05.02	3.8	年度檢閱，統一技術標準消毒方式。	112 年 03 月 20 日護理技術組會議通過；112 年 04 月 12 日護理長會議通過；112 年 05 月 02 日督導會議通過公布
113.04.16	3.9	更新第六項參考資料。	113 年 03 月 18 日護理技術組會議通過；113 年 04 月 10 日護理長會議通過；113 年 04 月 16 日督導會議通過公布。

主題名稱	皮內注射法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A14	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
114.03.17	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	4.0	1.主題內容「法」修訂為「技術」。 2.第六項參考資料修訂。	115 年 03 月 16 日 護理技術組會議 通過；115 年 03 月 18 日護理長會議 通過；115 年 04 月 07 日督導會議通 過公布。