

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	壓力性損傷的防範及處置評核表	編號	A31000-Q07-F-007
	制定單位	護理部	版本	第 3.1 版
			修正日期	115 年 04 月 14 日
			頁數/總頁數	1/3

一、評核對象：病人或照顧者、護理人員（含中興分院）。

（不適用單位：OPD、OR、HD、NICU、IR、BR、DR、R10、ER）。

二、評核方式：

1. 實地查核。
2. 請護理人員回答相關問題。
3. 詢問病人或主要照顧者。
4. 查核護理紀錄。

三、評核內容：(請找壓力性損傷危險因子評估 ≤ 16 分病人進行查核若無則口述)

1. 查核護理紀錄：
 - a. 病人入院 8 小時內壓力性損傷危險因子評估。
 - b. 壓力性損傷危險因子評估 ≤ 16 分呈現相關護理問題。(有傷口，給予皮膚狀態不完整或組織狀態不完整；未有傷口，給予易皮膚狀態不完整之護理問題)
 - c. 呈現壓力性損傷相關護理措施及定期評值。
 - d. HIS 系統護理衛教呈現壓力性損傷相關衛教之紀錄。（加護單位除外）
 - e. 持續評估及紀錄病人狀況(查核護理紀錄)。
 - f. 新入院、轉入與每週進行壓力性損傷危險因子評估。
2. 給予個別性衛教及提供衛教單張或影片(詢問照顧者，若無照顧者則詢問主護)：
 - a. 詢問照顧者或病人多久翻身一次。（2 小時）
 - d. 詢問照顧者或坐輪椅之病人多久改變坐姿。（1 小時）
 - c. 照顧者或病人能說出壓力性損傷預防方法至少 2 項，如：避免長時間壓迫、使用氣墊床、補充營養、乾燥的皮膚使用保濕乳霜、定時更換尿布..等。
3. 查核長期受壓狀況皮膚照護狀況使用減壓預防措施：(實地查核)
 - a. 床頭張貼翻身鐘。（加護單位除外）
 - b. 臥床病人擺位適當，30 度側臥避免直接壓在大轉子處。
 - c. 提供適當減壓工具(如:泡棉敷料、脂肪墊、氣墊床等(病人拒絕自費產品時，則不適用))。
 - d. 在骨凸處放置枕頭或替代物。
 - e. 可在皮膚表面塗抹保護性乳液或保濕性乳霜。
 - f. 抬高床頭時勿超過 30 度。
 - g. 大小便失禁病人查看尿布清潔乾淨與乾燥。
4. 查核醫療器材受壓狀況(實地查核)：
 - a. 使用氧氣面罩類醫療器材時，使用減壓工具(例如:BiPAP 的面罩使用泡棉敷料進行保護(例如:畢麗護)或矽質面罩進行減壓。
 - b. 氧氣面罩帶子鬆緊度適當，或使用紗布、治療巾等進行保護，避免持續受壓。
5. 發生壓力性損傷後之護理處置(護理人員口述)：
 - a. 進行傷口通報與紀錄，包含：傷口評估、測量傷口（傷口大小、深度、周圍組織：描述是否有水腫、壞死、滲液、異味）。
 - b. 依醫囑執行傷口照護。
 - c. 定期進行傷口評估與紀錄完整性。
 - d. 至少每七天記錄傷口狀況並有照片。

